



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:


- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



STANFORD UNIVERSITY LIBRARY





STANFORD · VNIVERSITY · LIBRARY





CAROLI LINNÆI
EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI,

PHYSIATR. REGII, MED. & BOTAN. PROFESS. UPSAL. ACAD.
PARIS. UPSAL. HOLMENS. PETROPOL. BEROL. IMPERIAL.
BERNENS. LONDIN. ANGLIC. EDENBURG. MONSPEL.
TOLOS. FLORENT. SOC.

SPECIES
PLANTARUM,

EXHIBENTES
PLANTAS RITE COGNITAS

AD
GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS, NOMINIBUS
TRIVIALIBUS, SYNONYMIS SELECTIS,
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM
SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS

TOMUS I.

Editio Tertia.

VINDOBONAE.

TIPIB. JOANNIS THOMÆ DE TRATTNER,
CÆS. REG. AULÆ. TYPOGRAPHI ET BIBLIOP.

MDCCLXIV.

582

L758

edg

r-1

J

418453

Ignoto Genere proprio

nulla descriptio, *quamvis accurate trad*

certam demonstrat

sed plerumqu

CÆSALP

Donel

LECTORI ÆQUO.

Homo sui conscius observat MUNDUM
Omnipotentis theatrum, undique ador-
natum summis omnisciaë Sapienciaë miraculis,
se vero in hunc tamquam hospitem introdu-
ctum, ut hisce deliciis sese delectando magni-
ficentiam Domini agnoscat. Indignus profe-
cto is censendus hospes, qui, pecoris instar,
tantum gulæ inservit, nec magnalia Possesso-
ris intueri atque æstimare novit.

HOSPITES ut digni evadamus orbis, opera
hæc Creatoris scrutari nobis necesse est,
cum nos commodis combinavit
Ens, ut inde omnia nostra bo-
nus, et nulla ratione queamus;
is hæc agimus, eo etjam plu-
generi humani cedunt.
EM t rite acquiramus,
a nêto *Nomine* com-
ofitis copia rerum
commercium om-
gua, cessabit.
inter Homines
sub *Physica* &

LECTORI.

Chemia Elementa; sub *Zoologia*, *Botanica*,
Lithologia tria Naturæ regna.

REM HERBARIAM heic libare lubet, quæ
quondam paucarum plantarum erat Scientia;
hodie vero copia detectorum evasit omnium
amplissima.

INVENTORUM recentioris ævi indefessis la-
boribus notitiam debemus plurium Planta-
rum, quam omnibus priscorum temporum
eruditis, inter quos imprimis nominandi *Chu-
sius*, *Columna*, *Baubini*, *Hermannus*, *Rbee-
de*, *Rumphius*, *Sloane*, *Sherardus*, *Rajus*,
Plukenetius, *Tournefortius*, *Flumierus*, *Vail-
lantius*, *Dillenius*, *Burmannus*, *Gronovius*,
Rayenus, *Gmelinus*, *Millerus*, *Brownius*,
Jacquinius.

NOTITIA plantarum constabat quondam No-
minibus arbitrariis, *memoriæ* tabulæ infixis,
quam vacillantem *Icones* sublevabant.

SYSTEMATICORUM sapientia indagavit
ordinem, qui memoriæ succurreret, & scien-
tiam solidis fundamentis inædificaret, quem
debemus Principibus Viris *Gesnero*, *Cæsulpi-*

LECTORI

no, Baubino, Morifono, Hermanno, Tournefortio, Vaillantio, Dillenio, aliisque.

ARIADNEUM hoc filum Systematicorum terminatur *Generibus*, quod tentavi ad *Species* usque extendere, confectis legitimis harum differentiis, ut etiam in hisce sua sibi constaret certitudo, quum *omnis vera cognitio cognitione specifica innitatur*; hac enim deficiente vacillat & historia, ut in plerisque *Peregrinatorum* diariis.

SPECIES plantarum ut mihi familiares redderem, peragravi Alpes *Lapponicas*; totam *Sueciam*; partem *Norvegiae, Daniae, Germaniae, Belgii, Angliae, Galliae*; perquisivi deinde **HORTOS** Botanicos: *Parisinum, Oxoniensem, Chelsejanum, Hartecampensem, Leidensem, Ultrajectinum, Amstelædamentem, Upsaliensem* aliosque: evolvi etiam **HERBARIA** *Burseri, Hermannii, Cliffortii, Burmanni, Oldenlandi, Gronovii, Royeni, Sloanei, Sherardi, Bobarti, Milleri, Tournefortii, Vaillantii, Jussiaci, Suriani, Bæckii, Brownii, &c.* Meo suafu **DISCIPULI** quon-

L E C T O R I.

dam dilectissimi: *P. Kalmius* Canadam, *F. Hasselquist* Ægyptum, *P. Osbeck* Chinam, *Toren* Suratte, *Solander* Angliam, *Alstroemer* Europam australem, *Martin* Spitsbergam, *Pontin* Malabariam, *Kæbler* Italiam, *Forskæhl* Orientem, *P. Læfving* Hispaniam, *Montin* Lapponiam adierunt, plantasque lectas mecum communicarunt. E variis terris demum misere Amici BOTANICI semina plantasque ficcas non paucas, uti *B. Jussieu*, *Royenus*, *J. Gesnerus*, *Wachendorfius*, *Sibtorpius*, *Montius*, *Gleditschius*, *Krascheninikoffius*, *Minuartius*, *Velezius*, *Kleinhoff*, *Ortega*, *Eilis*, *Seguier*, *Allionius*, *Zinnius*, *Gouanus*, *Gerardus*, nec non *O. Munchhausen* L. B; *S. C. Bielke*, L. B; *J. Rathgeb* Equ *Demidoff* Nob; *Collinson*, *Braad*, aliique. *Clifford* omnes, quas in duplo habuit; *Lagerström* indiæ orientalis plurimas; *Gronovius* plerasque Virginicas; *Gmelinus* Sibiricas facile omnes; *Burmannis* præter plurimas proprias & intuendas misit capenses Oldenlandi at *Sauvagesius* integrum suum thesaurum plan-

L E C T O R I

plantarum dedit, exemplo raro & inaudito, unde factum, ut copiam plantarum obtinuerim non mediocrem.

DIFFERENTIALS Specificas antehac Plantis non paucis imposui in Flora *Lapponica*, *Suecica*, *Zeylanica*; in Horto *Cliffortiano*, *Upsaliensi*. Iisdem principiis institere præstantissimi Botanici *Gronovius*, *Royenus*, *Wachendorff*, *Gorter*, *Jaquin*, *Colden*, *Hill*, *Hudson*, *Gouan*, *Dalibard*, *Kramer*, *Leyser*, *Meesse*, *Le Monier*, *Gvettard*, *Sauvages*, inque non paucis *Hallerus*, *Gmelinus*, *Allionius*, *Seguier*, *Scopoli*, *Gerard*, *Burmammus*, aliique, quorum opera plurimæ Species evasere ratæ & evidentes.

NOMINA hæc, passim dispersa, in gratiam studiosorum consultum duxi colligere, acquiritas dein plantas addere, inque unum Systema reducere; at vero pluribus *Speciebus* observatis, præstantioribus notis detectis, aptioribus *Terminis* cufis, debui interdum differentias emendare, antea quamvis optimas.

L E C T O R I.

Characteres essentialis pro NOMINE SPECIFICO constituere non levidense opus est; requirit enim *Specierum* plurium accuratam collationem, harum attentissimam *partium* indagacionem, *differentium* selectionem, *Terminorum* denique artis propriam applicacionem, ut evadant compendiosissimi tutissimi que.

NON VISAS plantas heic omisi, toties elusus ab auctoribus, ne dubia certissimis miscerem si vero aliquando contigerit non sufficienter inspexisse plantam, vel specimen imperfectum obtinuisse, signo † hoc notavi, ut alii eandem accuratius examinent.

NUMERUM plantarum totius orbis longe parciolem esse, quam vulgo creditur, fati certo calculo intellexi, utpote qui vix 10000. attingat.

TRIVIALIA nomina in margine apposui, ut missis ambagibus, uno quamlibet Herbam nomine complecti queamus; hæc vero absque selectu posui, quippe quem alius dies poseit Caveant autem quam sanctissime omnes san

LECTORI.

Botanici, unquam proponere nomen triviale sine sufficienti differentia specifica, ne ruat in pristinam barbariem scientia. Mutatio horum, licet in melius, plus nocet quam proderit.

SYNONYMA paucissima in **EUROPÆIS** plantis adhibui, contentus *C. Baubino & Iconographo* præstantiore; in **EXOTICIS** vero plura, quum difficiliora minusque trita sint.

DESCRIPTIONES * tantum in obscuris adhibere necessum fuit, easque sine ambagibus, ut obtinerem compendium tironibus gratum.

LOCA natalia more meo adjeci, inque notissimis *Fruticantes* †, *Perennes* ‡, *Biennes* §, *Annuas* ○ notavi.

GENERA nonnulla *nova*, nonnulla *immutata* adhibui; quæ in nova editione Generum plantarum propediem sistere animus est.

ADVERSARIORUM tela nunquam retorfi, acerrima convitia, insimulationes, cavillationes, buccinationes (præstantiorum longe Virorum, omni ævo, laboris præmia), tranquillo animo sustinui, nec suis auctoribus hæc

L E C T O R I.

invideo, si inde ipsis apud vulgus gloria major. Fero hæc, quæ in me ne capillum quidem mutant, & cur non ferrem iniquos, qui a veris Botanicis & quidem consummatissimis, quibus assurgere debent illi, summis cumulatus sim encomiis? Parem deinde adversariis referre gratiam, nec anni ingravescentes, nec munus, quo fungor, nec memores patiuntur. Quod mihi superest brevioris ævi, tranquillius utilioribus observationibus impendam. Res naturales enim proprio privilegio munitæ persistunt, ut quemadmodum errores in his commissi a nullo defendi, ita nec veritates observationibus innixæ a toto eruditorum orbe conculcari possint; judices itaque provocho seros Nepotes.

*Pascitur in vivis livor, post fata quiescit.
Tum suus ex merito quemque tuetur bonos*

Dabam 1762. d. 1. Septembris Upsaliæ.

A U-

A U C T O R E S.

* R E F O R M A T O R E S.

FRIA	Philosophia Botanica.	<i>Holmiæ.</i>	1751.	<i>off.</i>
	Critica Botanica.	<i>Lugd.</i>	1737.	<i>off.</i>
	Classes Plantarum.	<i>Lugd.</i>	1738.	<i>off.</i>
	Systema Naturæ. II.	<i>Holmiæ.</i>	1759.	<i>off.</i>
	Genera Plantarum.	<i>Holmiæ.</i>	1754.	<i>off.</i>
	Species Plantarum.	<i>Holmiæ.</i>	1753.	<i>off.</i>
	Hortus Cliffortianus.	<i>Amstel.</i>	1737.	<i>fol.</i>
	Hortus Upsaliensis.	<i>Holmiæ.</i>	1748.	<i>off.</i>
	Flora Lapponica.	<i>Amstel.</i>	1737.	<i>off.</i>
	Flora Sveciæ.	<i>Holmiæ.</i>	1755.	<i>off.</i>
	Flora Zeylanica.	<i>Holmiæ.</i>	1747.	<i>off.</i>
	Materia Medica.	<i>Holmiæ.</i>	1749.	<i>off.</i>
	Amœnitates Academic. I.	<i>Holmiæ.</i>	1749.	<i>off.</i>
	Amœnitates Academic. II.	<i>Holmiæ.</i>	1751.	<i>off.</i>
	Amœnitates Academic. III.	<i>Holmiæ.</i>	1756.	<i>off.</i>
	Amœnitates Academic. IV.	<i>Holmiæ.</i>	1759.	<i>off.</i>
	Amœnitates Academic. V.	<i>Holmiæ.</i>	1760.	<i>off.</i>
	Amœnitates Academic. VI.	<i>Holmiæ.</i>	<i>inedit.</i>	<i>off.</i>
	Iter Oelandicum.	<i>Holmiæ.</i>	1745.	<i>off.</i>
	Iter Gotlandic.	<i>Holmiæ.</i>	<i>cum priore.</i>	
	Iter Westrogoth.	<i>Holmiæ.</i>	1747.	<i>off.</i>
	Iter Scanicum.	<i>Holmiæ.</i>	1751.	<i>off.</i>
		*		
ILM. P.	Iter American.	<i>Holmiæ.</i>	1753.	<i>off. vol. 3.</i>
SECK. P.	Iter Ind. orient.	<i>Holmiæ.</i>	1757.	<i>off.</i>
MEN. O.	Iter Surattense.	<i>Holmiæ.</i>	<i>cum priore.</i>	
WELQUIST. F.	Iter Palæstinum.	<i>Holmiæ.</i>	1757.	<i>off.</i>
WFLING. P.	Iter Hispanicum.	<i>Holmiæ.</i>	1758.	<i>off.</i>
		*		
QUIN. N.	Enum. plantar.	<i>Lugdbat.</i>	1760.	<i>off.</i>
OWN.	Hist. nat. Jamaicae.	<i>London.</i>	1756.	<i>fol.</i>
EDEN. C.	Plant. Coldingh.	<i>Act. Ups.</i>	1743.	<i>quart.</i>
ROBOVIUS J. F.	Flora Virginica.	<i>Leyda.</i>	1739.	<i>off. vol. 2.</i>
	Flora Orientalis.	<i>Leyda.</i>	1755.	<i>off.</i>
ITER. D.	Flora Geldrica.	<i>Harder.</i>	1757.	<i>off. vol. 2.</i>
	Flora Ingrica.	<i>Petrop.</i>	1761.	<i>off.</i>
RESE. D.	Flora Frisica.	<i>Franecq.</i>	1760.	<i>off.</i>
LL J.	Flora Britannica.	<i>London.</i>	1760.	<i>off.</i>
YDSON.	Flora Anglica.	<i>London.</i>	1762.	<i>off.</i>
LIBARD.	Flora Parisiensis.	<i>Parisis.</i>	1749.	<i>duod.</i>
LIAN.	Flora Monspel.	<i>Monsp.</i>	1762.	<i>off.</i>
LAMER.	Flora Austriaca.	<i>Wien.</i>	1756.	<i>off.</i>
WIL. N.	Flora Vindelic.	<i>Wien.</i>	1762.	<i>off. LEY-</i>

LEYSER. F. W.	Flora Halensis.	<i>Hale.</i>	1761. ocl.
LEE. J.	Indroduct. in Botan.	<i>London.</i>	1760. ocl.
MILLER. PH.	Dictionar. Hortulan.	<i>London.</i>	1760. fol.
ROYEN. A.	Flora Leydenfis.	<i>Lugdb.</i>	1740. ocl.
WACHENDORFF.	Hort. Ultraecl.	<i>Tajecl.</i>	1747. ocl.
SAUVAGES. F.	Flora Monspel.	<i>Haga.</i>	1751. ocl.
GERARD. L. C.	Flora Galloprov.	<i>Parifis.</i>	ocl.
GUETTARD.	Obfervat. plantar.	<i>Parifis.</i>	1747. ocl. vol.
MONIER. L. G.	Cat. plant. Alvern.	<i>Parifis.</i>	1745. quart.
HALLER A.	Stirpes Helveticæ.	<i>Gætting.</i>	1742. fol.
	Hortus Gætting.	<i>Gætting.</i>	1749. ocl.
	Opusc. Botanica.	<i>Gætting.</i>	1753. ocl.
ZINN. J. G.	Hortus Gætting.	<i>Gætting.</i>	1757. ocl.
GMELIN. J. G.	Flora Sibirica.	<i>Petropol.</i>	1750. quart. vo.
SEGUIER. J. F.	Plantæ Veronenf.	<i>Verona.</i>	1745. ocl. vol.
ALLIONIUS. C.	Stirpes Pedem.	<i>Taurin.</i>	1755. quart.
	Stirpes Nicæenfes.	<i>Paris.</i>	1757. ocl.
	Hortus Taurinenf.	-----	ocl.
SCOPOLI. J.	Flora Carniolica.	<i>Wien.</i>	1760. ocl.
BÜTTNER. D. G.	Planta Cunonis.	<i>Amftel.</i>	1750. ocl.
MARTYN J.	Decades rarior.	<i>London.</i>	1628. fol.
EHRET. D.	Icones pl. felect.	<i>London.</i>	fol.
TREW.	Tabul. Ehretii.	<i>Noriberg.</i>	1750. fol.
OEDER.	Flora Danica.	<i>Haffnia.</i>	1761. fol.
MILLER. Ph.	Icones ad Diét.	<i>London.</i>	fol.
PLUMIER. C.	Icones per Burman.	<i>Amftelcd.</i>	1755. fol.

* * RESTAURATORES.


MORISON. R.	Histor. plantarum.	<i>Oxon.</i>	1680. fol. vol.
	Hortus Blefenfis.	<i>London.</i>	1669. ocl.
RAJUS. J.	Histor. plantar.	<i>London.</i>	1686. fol. vol.
	Synopf. Anglica.	<i>London.</i>	1724. ocl.
HERMANNUS. P.	Hortus Lugdbat.	<i>Lugdb.</i>	1687. ocl.
	Paradis. Batavus.	<i>Lugdb.</i>	1688. quart.
TOURNEFORT. J.	Institut. Herbariæ.	<i>Parifis.</i>	1719. quart.
	Corollarium	<i>Parifis.</i>	conjunctim.
PLUMIER. C.	Genera pl. Amer.	<i>Parifis.</i>	1703. quart.
	Species pl. Amer.	<i>Parifis.</i>	cum priore.
	Plantæ Americ.	<i>Parifis.</i>	1693. folio.
	Filices Americ.	<i>Parifis.</i>	1705. folio.
VAILLANT.	Flores compof.	<i>Atl. Par.</i>	1718. &c.
	Botan. Parilienf.	<i>Paris.</i>	1747. fol.
FEWILL. L.	Journ. de Peru.	<i>Paris.</i>	1714. quart. v.

HAAVE	Hortus Lugd. bat.	Lugdb.	1720. quart. vol. 2.
ANNUS L.	Theſaurus Zeylan.	Amſtel.	1737. quart.
	Decades African.	Amſtel.	1738. quart.
N. L.	Gerania diff. acad.	Lugdb.	1759. quart.
ENIUS	Hortus Eltham.	London.	1732. fol.
	Hiſtor. Muſcor.	Oxonii	1741. quart.
ANUS J.	Stirpes rariores.	Petrop.	1739. quart.
KAMER J. G.	Flora Norib.	Norib.	1700. quart.
UCHZER J.	Hiſtor. Agroſt.	Tiguri.	1719. quart.
	Itinera alpina.	Tiguri.	1702. quart.
TI J.	Prodr. Gramin.	Bonon.	1719. quart.
ELI J.	Gener. nova.	Florant.	1729. quart.
	Hortus Piſanus.	Florant.	1723. folio.
AUM	Centur. rarior.	Petropol.	1728. oſt.

* * * FUNDATORES.

ENNET	Almag. Botanic.	London.	1696. quart.
	Mant. Almag.	London.	1700. quart.
	Amalt. Botanic.	London.	1705. quart.
	Phytographia.	London.	1690. quart.
VER	Gazoph. naturæ.	London.	1702. fol.
NE	Cat. pl. Jamaic.	London.	1696. oſt.
	Hiſt. pl. Jamaic.	London.	1707. fol. vol. 2.
SBY	Hiſt. nat. Carol.	London.	1731. fol. vol. 2½.
IDE	Hortus Malabar.	Amſtel.	1678. fol. vol. 12.
PHIUS.	Herbar. Amboin.	Amſtel.	1740. fol. vol. 6½.
IRLINI	Hortus Amſtel.	Amſtel.	1697. fol. vol. 2.
	Plantæ rariores.	Lugdb.	1706. quart.
	Prælect. Botanic.	Lugdb.	1703. quart.
MIUS J.	Centur. plantar.	Gedan.	1678. fol.
	Prodr. per filium.	Gedan.	1739. quart.
FFERUS	Amcen. exoticæ.	Leemgo.	1712. quart.
IRT	Memor. de plant.	Parif.	1676. fol.
NOL. P.	Botanic. Monſp.	Monſp.	1686. oſt.
ELIER J.	Icones.	Parififis.	1714. fol.
JO P.	Muſeum	Venet.	1697. quart.
	Plantæ Siculæ.	Oxon.	1674. quart.
IUS	Exoticæ plantæ.	Venet.	1627. quart.
ELIUS	Flora Pruſſic.	Regio.	1703. quart.
ALME	Specim. plantar.	Parif.	1611. quart.
UTI J.	Canad. plantæ.	Parif.	1635. quart.
GRAVE J.	Hiſt. nat. Braſil.	Lugdb.	1648. fol.
G.	Hiſt. nat. Braſil.	Amſtel.	1658. fol.

BAUHINUS C.	Pinax Theatr.	<i>Bafil.</i>	1671. quart.
	Prodr. Theatr.	<i>Bafil.</i>	1671. quart.
	Theatr. Botanic.	<i>Bafil.</i>	1658. fol.
BAUHINUS J.	Histor. Plantar.	<i>Ebrod.</i>	1650. fol. vol. ;
COLUMNA.	Ecphrasis	<i>Romæ.</i>	1616. quart. vo
	Phytobasanos.	<i>Flor.</i>	1744. quart.
CLUSIUS C.	Histor. rarior.	<i>Antw.</i>	1601. fol.
	Exotica.	<i>Antw.</i>	1605. fol.
DODONÆUS	Pempt. stirpium.	<i>Antw.</i>	1616. fol.
LOBELIUS	Jcones.	<i>Antw.</i>	1591. quart.
FUCHSIUS	Historia stirpium.	<i>Basel.</i>	1542. fol.
GESNERUS	Historia plantar.	<i>Norib.</i>	1759. fol.
CAMERARIUS J.	Epitome Matth.	<i>Francf.</i>	1586. quart.
	Hortus. Medic.	<i>Francf.</i>	1588. quart.
TABERNÆM.	Histor. plantar.	<i>Basel.</i>	1664. folio.
DALECHAMP.	Histor. plantar.	<i>Lugdb.</i>	1587. folio.



Classis I.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

CANNA.

- CANNA foliis ovatis utrinque acuminatis nervosis. *indica.*
Roy. lugdb. 11. Fl. zeyl. 1. Hort. upf. 1.
 Canna spatulis bifloris. *Hort. cliff. 1.*
 Cannacorus. *Rumph. amb. 5. p. 177. t. 71. f. 2.*
 Arundo indica latifolia. *Bauh. pin. 19.*
 Katu Bala. *Rheed. mal. 11. p. 85. t. 43.*
Habitat inter tropicos Asiæ, Africæ, Americæ. 24.
 CANNA foliis lanceolatis petiolatis nervosis. *angustifolia.*
 Canna foliis lanceolatis petiolatis. *Hort. cliff. 1.*
 Arundo indica florida angustifolia. *Morif. hist. 3. p. 250.*
f. 8. t. 14. f. 6.
Habitat inter tropicos Americæ: umbrosis spongiosis. 24.
Species hæc vix distinguenda est a præcedente, quamvis hu-
milior & angustior evadat, qui itaque pro varietatibus
utramque assumunt, vix errant.
 CANNA foliis petiolatis lanceolatis enervibus. *Roy. glauca.*
lugdb. 11.
 Canna foliis enervibus. *Virid. cliff. 104.*
 Cannoides. *Hort. cliff. 488.*
 Cannacorus glaucóphyllus, ampliore flore, iridis palustris facie. *Dill. elth. 69. t. 59. f. 69.*
Habitat in Carolina? 24

AMOMUM.

- AMOMUM scapo nudo, spica ovata. *Hort. cliff. 3. Zingiber.*
Hort. upf. 1. Flor. zeyl. 3. Mat. med. 1 Roy. lugdb. 12.
 Zingiber majus. *Rumph. amb. 5. p. 156. t. 66. f. 1.*
 Zingiber. *Bauh. pin. 35. Brown. jam. 119.*
 Muschi. *Rheed. mal. 11. p. 21. t. 12.*
Habitat in Indiis inter tropicos. 24
 AMOMUM scapo nudo, spica oblonga obtusa. *Hort. Zerumbet.*
cliff. 3. Hort. upf. 1. Fl. zeyl. 2. Roy. lugdb. 12. Ehret.
pic. t. 14. f. 1. Mill. ic. 17. t. 25. Brown. jam. 113.

2. MONANDRIA MONOGYNIA.

Zingiber latifolium sylvestre. *Herm. lugdb.* 636. 1
 Lampujum. *Rumph. amb.* 5. p. 148. t. 64. f. 1.
 Katou-Inschi-kua. *Rheed. mal.* 11. p. 27. t. 13.
Habitat in India. 2

Cardamom. 3. AMOMUM scapo simplicissimo brevissimo br
 alternis laxis. *Fl. zeyl.* 4. *Mat. med.* 2.
 Cardamomum minus. *Rumph. amb.* 5. p. 152. t. 6:
 Elettari 2. *Rheed. mal.* 11. p. 9. t. 6.
Habitat in Indiæ umbrosissimis, cænosis montium
cibus. 2

Gran. parad. 4. AMOMUM scapo ramofo brevissimo.
 Amomum caule ramofo. *Mat. med.* 3.
 Grana paradisi officinarum. *Bauh. pin.* 413.
 Elettari. *Rheed. mal.* 11. t. 6.
Habitat in Madagascar, Guinea. 2

COSTUS.

arabicus. 1. COSTUS. *Hort. cliff.* 2. * *Hort. upf.* 2. *Fl. z*
Mat. med. 4. *Roy. lugdb.* 11. *Hill. plant.* 149. t.
 Costus arabicus. *Bauh. pin.* 36. *Mer. surin.* 36. t.
 Alpinia floribus spicatis: bracteis ovalibus.
amer. 11.
 Zingiber sylvestre majus, fructu in pediculo sing
Sloan. jam. 61. hist. 1. p. 165. t. 105. f. 2.
 Amomum minus, scapo vestito, floribus spicatis. *B*
jam. 113.
 Paco Caatinga. *Marcgr. bras.* 48.
 Tliana kua. *Rheed. mal.* 11. p. 15. t. 8?
Habitat in India utraque. 2

ALPINIA.

racemosa. 1. ALPINIA. *Roy. lugdb.* 12.
 Alpina racemosa alba, cannacori foliis. *Plum. ic.* 10
 Zingiber sylvestre minus, fructu e caulium sumu
Sloan. jam. 61. hist. 1. p. 165. t. 105. f. 1.
 Paco seroca. *Marcgr. bras.* 48?
Habitat in America calidiore. 2

MARANTA.

arundinacea 1. MARANTA culmo ramofo.
 Maranta. *Hort. cliff.* 2. * *Roy. lugdb.* 11.

Maranta arundinacea, cannacori folio. *Plum. gen.* 26.

Mart. cent. 39. t. 39.

Habitat in America calidiore. 2.

2. **MARANTA** culmo simpliciter.

Galanga.

Galanga. Rumph. amb. 5. p. 143. t. 63.

Habitat in India aquosa. 2.

Galanga hæc officinarum est.

CURCUMA.

1. **CURCUMA** foliis lanceolato-ovatis: nervis lateralibus rarissimis.

rotunda.

Curcuma foliis ovatis utrinque acuminatis: nervis lateralibus paucissimis. *Roy. lugdb.* 12. *Fl. zeyl.* 6.

Curcuma. Rumph. amb. 5. p. 162. t. 67.

Manja kua. Rheed. mal. 11. p. 19. t. 10. *

Habitat in India. 2.

2. **CURCUMA** foliis lanceolatis: nervis lateralibus numerosissimis.

longa.

Curcuma foliis lanceolatis utrinque acuminatis: nervis lateralibus numerosissimis. *Roy. lugdb.* 12. *Fl. zeyl.* 7.

Mat. med. 5.

Curcuma radice longa. Herm. lugdb. 208. t. 209.

Manjella-kua. Rheed. mal. 2. p. 21. t. 11.

Habitat in India. 2.

KAEMPFERIA.

1. **KAEMPFERIA** foliis ovatis sessilibus. *Fl. zeyl.* 8.

Galanga.

Kaempferia Hort. cliff. 2. t. 3. *Roy. lugdb.* 12.

Souchorus. Rumph. amb. 5. p. 173. t. 69. f. 2.

Wanbom. Kaempf. amoen. 501. t. 902.

Kattijula-kelengu. Rheed. mal. 11. p. 81. t. 41.

Habitat in India. 2.

2. **KAEMPFERIA** foliis lanceolatis petiolatis. *Fl. zeyl.* 9.

rotunda

Zedoaria rotunda. Bauh. pin. 36.

Malan kua. Rheed. mal. 11 p. 17. t. 9.

Habitat in India. 2.

THALIA.

1. **THALIA.** *Roy. lugdb.* 11.

geniculata.

Coctufa arundinacea, amplis cannacori foliis. *Plum. gen.* 26. ic. 108. f. 1.

- Maranta petiolis ganglinosis. Brown. jam. 112.*
Cana indica, radice alba alexipharmaca. Sloan. jam. 29
hist. 1. p. 253. t. 149. f. 2. Raj. suppl. 573.
Canna indica angustifolia, pediculis longis ad imum
folium nodo singulari geniculata. Pluk. alm. 79.
Radix quædam in malacca, quæ adversus vulnera
gittis toxico illitis præsentaneum remedium. Bauh
pin. 301.
Aguti guepo-obi. Marcgr. bras. 53. Raj. hist. 1203.
Habitat in America meridionali. 24
Folia alterna, ovato-oblonga: nervis transversis parallelis.
Petioles teretes, geniculo instructi, inferne membranacei
vaginales.

BOERHAVIA.

- 5a. 1. BOERHAVIA caule erecto glabro.
 Boerhavia, folani folio, erecta glabra. *Amm. herb.*
 241.
Habitat in Vera Cruce. 24
- ufa. 2. BOERHAVIA caule diffuso,
 Boerhavia diffusa. *Fl. zeyl. 10. Hort. upf. 2.*
Boerhavia foliis ovatis. Hort. cliff. 17. Roy. lugdb. 234
Valerianella curassavica, semine aspero viscoso. Her
par. 237. t. 237,
Talu-dama. Rheed. mal. 7. p. 105. t. 56.
Habitat in India. 24
- adens. 3. BOERHAVIA caule scandente, floribus diandris.
 Boerhavia sarmentosa. *Brown. jam. 123.*
Solanum bacciferum americanum, fructu corymboso
Pluk. alm. 349. t. 226. f. 7.
Valerianella, alfinis folio, scandens. Sloan. jam. 9
hist. 1. p. 210. Raj. suppl. 244.
Valerianella curassavica, semine aspero viscoso. Pl
alm. 381. t. 113. f. 7.
Antaniphosphyllum scandens, alfinis majoris folio. Vail
act. 1722. p. 258.
Habitat in Jamaica ad urbem jago de la vega. 24
- ndra. 4. BOERHAVIA glabra diffusa, floribus diandris.
Habitat in India. Ott. Munchausen L. B. 24
Statura B. diffusæ, sed Caulis & fructus glabri. F
dunculi folio breviores, sæpius triflori. Flores 1
 nores

nores, albi. pedicellati. Fructus sulcati, pentagoni, truncati. Simillimam accipi ex Asia caule pubescente.

BOERHAVIA caule repente.

repens.

Boerhavia nubica minor. Vaill. sex. 53.

Boerhavia nubica minima. Vaill. sex. 55.

Habitat in Nubia inter Mocho & Tangos. 24

SALICORNIA.

SALICORNIA patula, articulis apice compressis emarginato-bifidis.

herbacea.

Salicornia herbacea. Fl. fvec. 1. Mat. med. 8.

Salicornia annua. Sauv. monsp. 7.

Salicornia. Hort. cliff. 490. Roy. lugdb. 205. Dod. pempt. 82.

Salicornia caulium ramorumque articulis emarginatis bifidis. Gron. virg. 129.

virginica.

Habitat in Europæ litoribus maritimis. ☉

Virginica β. ad Salinas Saxonie frequentissima, vix ac ne vix distincta est species; articuli in salsis enim magis emarginati evadunt.

SALICORNIA caule erecto fruticoso.

fruticosa.

Salicornia sempervirens. Sauv. monsp. 7.

Kali geniculatum majus. Bauh. pin. 289.

Habitat in Europæ maritimis. †

Sempervirens & erecta longeque major a priori videtur diversa, præterquam quod etiam spicæ differant; hæc in Svecia non visa, ubi prior notissima; differentia levis erit, si ulla.

SALICORNIA articulis obtusis basi incrassatis, spicis ovatis.

arabica.

Kali geniculatum minus. Bauh. pin. 289. Moris. hist. 2. p. 610. f. 5. t. 33. f. 7. Raj. hist. 211.

Habitat in Arabia.

SALICORNIA articulis cylindricis, spicis filiformibus.

caspiica.

Kali arborescens, tamarisci facie. Buxb. cent. 1. t. 11. f. 1.

Habitat in squalidis maris Caspii & Mediæ. †

HIPPURIS.

- vulgaris. 1. HIPPURIS. *Fl. lapp.* 1. *Fl. suec.* 2, 2. *Hort. cliff.*
Roy. lugdb. 205. *Dalib. parif.* 1
 Equisetum palustre, brevioribus foliis, polyspermu
Bauh. pin. 15.
 Polygonum femina. *Cam. epit.* 689.
Habitat in Europæ fontibus. 2

DIGYNIA.

CORISPERMUM.

- hystopifolium. 1. CORISPERMUM floribus lateralibus. *Hort. upf.*
 Corispermum floribus alternis. *Hort. cliff.* 3. *It. 80*
 316. *Roy. lugdb.* 205. *Sauv. monsp.* 52.
 Corispermum hystopifolium. *Juss. act.* 1712. p. 244.
Habitat ad Volgam Tartariæ: Gillau Borussiae, Mo
spelii, locis arenosis. ○
 squarrosum. 2. CORISPERMUM spicis squarrosis. *Hort. upf.* 3.
 Rhagothis foliis arundinaceis. *Buxb. cent.* 3. p. 30. t. 3.
Habitat ad Volgam Tartariæ, inque desertis Colli-
rum. ○

CALLITRICHE.

- verna. 1. CALLITRICHE foliis superioribus ovalibus, floribus androgynis. *Fl. suec.* 3.
 Corispermum foliis oppositis. *Fl. lapp.* 2. *Gron. virg.*
 Stellaria aquatica. *Bauh. pin.* 141.
 β Lenticula palustris bifolia, fructu tetragono. *Bauh. pin.*
 352.
 Callitriche Plinii. *Column. ecphr.* 1. p. 315. t. 316.
Habitat in Europæ fossis aquosis, Vere florens.
 autumnalis. 2. CALLITRICHE foliis omnibus linearibus apice bifidis, floribus hermaphroditis. *Fl. suec.* 4.
 Lenticula palustris angustifolia, folio apice dissecto.
Læf. pruss. 140. t. 38.
Habitat in Europæ fossis aquosis, Autumno florens.

BLITUM.

- capitatum. 1. BLITUM capitellis spicatis terminalibus. *Hort. upf.*
 Blitum foliis triangularibus dentatis, calycibus baccatis
 capitulis summis nudis. *Virid. cliff.* 1. *Roy. lugdb.* 206.
 Bli-

Blitum foliis triangularibus dentatis. *Hort. cliff.* 28.

Atriplex baccifera. *Raj. hist.* 197.

Atriplex sylvestris lappulas habens. *Bauh. pin.* 119.

Habitat in Europa: præsertim in comit. Tyrolensi. ☉

BLITUM capitellis sparsis lateralibus. *Hort. ups.* 3.

virgatum.

Blitum foliis triangularibus dentatis, calycibus baccatis, capitulis summis foliosis. *Hort. cliff.* 495. *Roy. lugdb.* 206.

Atriplex sylvestris, mori fructu. *Bauh. pin.* 519.

Habitat in Tartaria, Hispania, G. Narbonensi. ☉

CINNA.

CINNA.

arundinacea

Habitat in Canada, unde semina per D. Kalm. 24.

Gramen magnitudine *Avenæ*. Culmi plurimi, glabri.

Folia latiuscula, glabra, margine scabra. Panicula

oblonga, attenuata, compressiuscula, secunda. Calycis

Gluma bivalvis, uniflora, carinata carina scabra: val-

vula majore mucrone aristiformi. Corollæ Gluma bi-

valvis: valvula exteriori intra minorem calycis, calyce

toto paullo longior, infra apicem mucronata. Anthera

purpurea. Styli hirsuti.



Classis II.

DIANDRIA
MONOGYNIA.

NYCTANTHES.

- arbor tristis. 1. NYCTANTHES caule tetragono, foliis ovatis acuminatis, pericarpis membranaceis compressis. *Fl. zeyl.* 11.
 Arbor tristis myrto similis. *Bauh. pin.* 469.
 Manja-pumeran. *Rheed. mal.* 1. p. 35. t. 21.
Habitat in India †
- Sambac. 2. NYCTANTHES foliis inferioribus cordatis obtusis superioribus ovatis acutis. *Hort. upf.* 4.*
 Nyctanthes caule volubili, foliis subovatis acutis
Hort. cliff. 5. *Flor. zeyl.* 12. *Roy. lugdb.* 398.
 Syringa arabica, foliis mali aurantii. *Bauh. pin.* 398.
 Jasminum limonii folio conjugato. *Burm. zeyl.* 128.
 58. f. 2. *Angl. hortul.* t. 27.
 Jasminum f. Sambac arabum, folio acuminato. *Till. pis.* 87. t. 31.
 Jasminum arabicum. *Clus. cur.* 3. t. 3.
 Flos manoræ. *Rumph. amb.* 5. p. 52. t. 30.
Habitat in India. †
- undulata. 3. NYCTANTHES foliis ovatis acuminatis undulatis ramis teretibus.
 Jasminum indicum, flore polypetalo exalbido, fructu minori. *Raj. hist.* 1601.
 Tsieregam mulla. *Rheed. mal.* 6. p. 97. t. 55.
Habitat in Malabar. †
- hirsuta. 4. NYCTANTHES petiolis pedunculisque villosis.
 Rava-pon. *Rheed. mal.* 4. p. 99. t. 48.
Habitat in India. †
- angustifolia. 5. NYCTANTHES foliis obtusis lanceolatis ovatisque.
 Jasminum indicum angustifolium, fructu gemino. *Tournef. inst.* 598.

Katu-pittiegam mulla *Rheed. mal. 6. p. 93. t. 53, Raj. hist. 1602.*

Habitat in Malabariæ arenosis. †

JASMINUM.

1. JASMINUM foliis oppositis pinnatis. *Hort. cliff. 5. officinale.*

Hort. upf. 5. Mat. med. 9. Roy. lugdb. 397.

Jasminum vulgatus, flore albo. Bauh. pin. 397.

Habitat in India. †

2. JASMINUM foliis oppositis pinnatis: foliolis extimis confluentibus. *grandiflorum.*

Jasminum humilium, magno flore Bauh. pin. 397. Raj. hist. 1600.

Gelseminum catalanicum. Cam. epit. 37.

Pittiegam-mulla. Rheed. mal. 6. p. 91.

Habitat in Malabaria. †

Simillimum J. officinali, sed Caulis rectus, nec scandens. Foliola cauli propiora magis ovata, nec minora; extima tria confluentia ex petiolo dilatato, ut distincta cadere nequeant. Corollæ majores, subtus rubræ.

3. JASMINUM foliis oppositis ternatis. *Hort. cliff. 5. azoricum.*

Fl. zeyl. 13. Roy. Lugdb. 397.

Jasminum azoricum trifoliatum, flore albo, odoratissimo.

Comm. hort. 1. p. 159. t. 82.

Jasminum sylvestre triphyllum: floribus rubellis umbellatis. Burm. zeyl. 127. t. 58. f. 1.

Jasminum album trifoliatum, flore magno Pluck. alm. 195. t. 393. f. 1.

Habitat in India. †

4. JASMINUM foliis alternis ternatis simplicibusque, *fruticans.*

ramis angulatis. Hort. cliff. 5. Hort. upf. 5. Roy. lugdb. 397. Sauv. monsp. 174.

Jasminum luteum, vulgo dictum bacciferum. Bauh. pin. 298.

Trifolium fruticans. Dod. pempt. 571.

Habitat in Europa australi, et toto Oriente. †

5. JASMINUM foliis alternis ternatis pinnatisque, *humile.*

ramis angulatis. Hort. upf. 5.

Jasminum foliis alternis ternatis acuminatis. Hort. cliff. 6, Roy. lugdb. 398.

Jasminum humile luteum. Bauh. pin. 397.

Jasminum luteum. Bese. cyst. æst. 140. f. 2.

Habitat - - - - - b

odoratiffi-
mum.

6. **JASMINUM** foliis alternis ternatis pinnatisque, ternatis teretibus. Hort. upf. 5.

Jasminum foliis alternis ternatis obtusis. Hort. cliff. 1.
Roy. lugdb. 397.

Jasminum indicum flavum odoratissimum. Ferr. cult. 93

Jasminum flavum odoratum. Barr. ic. 62.

Habitat in India? b

LIGUSTRUM.

vulgare.

1. **LIGUSTRUM.** Hort. cliff. 6. Fl. svec. 4. 5. Roy. lugdb. 398. Dalib. parif. 2.

Ligustrum germanicum. Bauh. pin. 475.

Phillyrea. Dod. pempt. 775.

Habitat in Europæ collibus glareosis. b

PHILLYREA.

media.

1. **PHILLYREA** foliis ovato-lanceolatis subintegerrimis. Hort. upf. 5.

Phillyrea foliis ovato-lanceolatis vix crenatis. Hort. cliff. 4. Roy. lugdb. 398.

Phillyrea ligustri folio. Bauh. pin. 476.

Phillyrea 3. Clus. hist. 1. p. 52.

Habitat in Europæ australioris collibus. b

angustifolia.

2. **PHILLYREA** foliis lineari-lanceolatis integerrimis. Hort. cliff. 4. Roy. lugdb. 398.

Phillyrea angustifolia prima. Bauh. pin. 476.

Phillyrea angustifolia secunda. Bauh. pin. 476.

Phillyrea 4. 5. Clus. hist. 1. p. 52.

Habitat in Italia, Hispania. b

latifolia.

3. **PHILLYREA** foliis cordato-ovatis serratis. Hort. cliff. 4. Hort. upf. 6. Roy. lugdb. 398.

Phillyrea latifolia spinosa. Bauh. pin. 476.

Phillyrea folio leviter serrato. Bauh. pin. 476.

Phillyrea 1, 2. Clus. hist. 1. p. 51. 52.

Habitat in Europa australi. b

OLEA.

OLEA.

1. OLEA foliis lanceolatis.
 Olea foliis lanceolatis, ramis teretiufculis. *Hort. cliff.*
 4. *Mat. med.* 10. *Roy. lugdb.* 398. europæa.
 Olea fativa *Bauh. pin.* 472.
 Olea *Dod. pempt.* 821.
- β. Olea foliis lanceolatis, ramis tetragonis. *Hort. cliff.* 4.
Roy. lugdb. 399.
 Olea sylvestris, folio duro subtus incano. *Bauh. pin.* 472.
Habitat in Europa australi. †
- γ. OLEA foliis ovatis. *Hort. cliff.* 4. *Roy. lugdb.* 399. capensis.
 Ligustrum capense sempervirens, folio crasso subrotundo. *Dill. clth.* 193 t. 170. f. 194.
Habitat ad Cap. b. Spei. †

CHIONANTHUS.

1. CHIONANTHUS pedunculis trifidis trifloris. virginica.
 Chionanthus, *Hort. cliff.* 17. *Gron. virg.* 10. *Roy.*
lugdb. 17.
 Amelanchier virginiana, laurocerasi folio. *Pet. ficc.*
 241. *Catesb. carol.* 1. p. 68. t. 68.
Habitat in America septentrionali. †
2. CHIONANTHUS pedunculis paniculatis multifloris. zeylonica.
 L. Zeyl. 14.
 Arbor zeylanica, cotini foliis subtus lanugine villosis.
Burm. Zeyl. 31.
 Arbuscula zeylanica, cotini foliis subtus lanugine villosis,
 floribus albis cuculli modo laciniatis. *Pluk.*
alm. 44. t. 241. f. 4.
Habitat in Zeylona. †

SYRINGA.

1. SYRINGA foliis ovato cordatis. *Hort. cliff.* 6. *Hort.*
ups. 6. *Roy. lugdb.* 397. *Dalib. paris.* 2. vulgaris.
 Syringa cærulea. *Bauh. pin.* 398.
Habitat versus Persiam. †
2. SYRINGA foliis lanceolatis. persica.
 Syringa foliis lanceolatis integris *Hort. cliff.* 6. *Hort.*
ups. 6. *Roy. lugdb.* 397. *Mill. dict.* t. 164. f. 1.
 Syringa babylonica, indivisis densifloribus foliis. *Pluk.*
alm. 359. t. 227. f. 2.

Agem

Agem Lilac persarum. *Corn. canad.* 190.

laciniata.

β. *Syringa* foliis lanceolatis integris dissectisque. *Hort. cliff.* 6. *Hort. ups.* 6. *Roy. lugdb.* 397.

Ligustrum foliis laciniatis. *Bauh. pin.* 476. *Mill. dict.* t. 164. f. 2.

Habitat in Persia ? †

ERANTHEMUM.

capense.

1. **ERANTHEMUM**, *Fl. zeyl.* 15. * *Amæn. acad.* 385.*

Ephemerum, lychnidis flore, africanum. *Herm. parad.* 153. *Amm. herb.* 232.

Centaurium minus, foliis oblongis acutis, flore patulo puniceo majori. *Raj. suppl.* 527.

Habitat in Æthiopia.

Habitus Chironiæ, unicum specimen minus perfectum videtur ideoque accuratius examinanda.

CIRCÆA.

lutetiana.

1. **CIRCÆA** caule erecto, racemis pluribus. *Fl. svec.* 6.

Circæa. *Hort. cliff.* 7. *Roy. lugdb.* 303. *Dalib. parif.* 3. *It. scan.* 213.*

Solanifolia *Circæa dicta major*. *Bauh. pin.* 168. *It. wgoth.* 213.

Circæa lutetiana. *Lob. ic.* 266.

canadensis.

β. *Circæa canadensis latifolia*, flore albo. *Tournef. inst.* 301.

Habitat in Europæ & Americæ borealis nemoribus. 2
Hæc sesquipedalis Caule erecto, Racemis terminali & lateralibus; *Perianthium consistens calycina*, s. corolla longe crassius rudiisque, nec corollæ concolor.

alpina.

2. **CIRCÆA** caule ascendente, racemo unico. *Fl. svec.* 7.

Circæa calyce colorato. *Fl. lapp.* 3.

Solanifolia *Circæa alpina*. *Bauh. pin.* 163.

Circæa minima. *Column. ecphr.* 2. p. 79. t. 80.

Habitat ad radices montium in frigidis Europæ. 2.

Planta vix digiti longitudine, magis procumbens; calyce colorato, uti corolla; differt quidem a priori atamen nimis affinis.

VERONICA.

* *Spicatæ.*

sibirica.

1. **VERONICA** spicis terminalibus, foliis septenis verticillatis, caule subhirsuto.

Ve-

Veronica spicata altissima, foliis verticillatim dispositis.

Amm. ruth. 20. t. 4.

Habitat in Dauria. 2.

Caulis quadripedalis, hirtus. Folia 7. f. 6. verticillata, V. virginicæ duplo latiora. Pedunculi terminales solitarii; laterales foliolis duobus oppositis ovalibus. Corollæ cæruleæ tubo oblongo; limbo acuto parvo. Stamina 8 Pistillum corolla duplo longiora.

VERONICA spicis terminalibus, foliis quaternis quinisve.

virginica.

*Veronica foliis quaternis quinisve. Hort. cliff. 7. * Gron. virg. 4. Roy. lugdb. 301. Cold. noveb. 3.*

Veronica virginiana procerior, foliis ternis, quaternis & etiam quinis caulem amplexantibus, spicis florum candidissimis. Pluk. alm. 383. t. 70. f. 2.

Habitat in Virginia. 2.

VERONICA spicis terminalibus, foliis ternis æqualiter ferratis. *Hort. upf. 7. **

spuria.

Veronica spicata angustifolia. Bauh. pin. 246.

Veronica mas surrecta elatior. Barr. rar. 155. t. 891.

Habitat in Europa australiore, Sibiria, Thuringia. 2.

VERONICA spicis terminalibus, foliis ternis inæqualiter ferratis. *Fl. svec. 2. n. 8.*

maritima.

Veronica floribus spicatis, foliis ternis Fl. svec. 1. p. 6.

Veronica foliis sæpius ternis. Virid. cliff. 2. Hort. cliff. 7. Roy. lugdb. 301.

Veronica caule erecto, spicis pluribus, foliis lanceolatis, ferratis. Fl. lapp. 4.

Lysimachia spicata cærulea. Bauh. pin. 246.

Pseudo Lysimachium cæruleum. Dod. pempt. 86.

Habitat in maritimis Europæ macris apricis. 2.

VERONICA spicis terminalibus, foliis oppositis lanceolatis ferratis acuminatis. *Hort. upf. 7. * Fl. svec. 2. n. 9. **

longifolia

Veronica spicata latifolia. Bauh. pin. 246.

Veronica i. erectior latifolia. Clus. hist. 1. p. 546.

Veronica spicata longifolia altera. Amm. ruth. 26.

Veronica spicata, urticæ folio. Amm. ruth. 26.

Habitat in Tartaria, Austria, Suecia, 2.

incana,

6. VERONICA spicis terminalibus, foliis oppositis crenatis obtusis, caule erecto tomentoso. *Hort. upf.* 7
 Veronica caule fruticoso, foliis oblongis: inferioribus crenatis petiolatis; superioribus sessilibus integerrimis. *Roy. lugdb.* 530.

Veronica spicata lanuginosa & incana, floribus caeruleis. *Amm. ruth.* 30.

Habitat in Ucraina, Samara. 24

spicata.

7. VERONICA spica terminali, foliis oppositis crenatis obtusis, caule ascendente simplicissimo. *Fl. svec.* 2. n. 10.

Veronica floribus spicatis, foliis oppositis, caule erecto. *Fl. svec.* 1. n. 7. *Dalib. parif.* 3.

Veronica foliis oppositis, caule spica terminato. *Hort. cliff.* 8. *Roy. lugdb.* 302.

Veronica spicata minor. *Bauh. pin.* 247. *Vai. parif.* 33. f. 4.

Habitat in Europæ borealis campis. 24

hybrida.

8. VERONICA spicis terminalibus, foliis oppositis crenatis serratis scabris, caule erecto. *Fl. svec.* 2. n. 11.

Veronica spicata cambrobritannica, bugulæ subhirsutæ folio. *Raj. angl.* 3. p. 278. t. 11. f. 1.

Habitat in Europa rarius. 24

Folia veronica sequentis, Caulis præcedentis; sed spicæ majores pallidiores. 24

officialis.

9. VERONICA spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis, caule procumbente. *Mat. med.* 11. *Fl. svec.* 2. n. 12.

Veronica floribus spicatis, foliis oppositis, caule procumbente. *Fl. svec.* 1. n. 8. *Dalib. parif.* 3.

Veronica caule repente, scapis spicatis, foliis oppositis ovatis strigosis. *Fl. lapp.* 5. *Hort. cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 302.

Veronica mas supina & vulgatissima. *Bauh. pin.* 246

Veronica *Cam. ep. t.* 461.

- β. Veronica mas repens pyrenaica, folio longiori glabro. *Pluk. phyt.* 223. f. 1.

Habitat in Europæ sylvestribus sterilibus. 24

* * Corymboso-racemosa.

aphylla.

10. VERONICA corymbo terminali, scapo nudo.

Veronica

Veronica foliis ovatis radicalibus, caule nudo. *Roy. lugdb.* 302.

Veronica alpina pumila, caule aphylo. *Bocc. mus.* 2. p. 17. t. 1. & 9.

Veronica parva saxatilis, cauliculis nudis. *Pluk. alm.* 384. t. 114. f. 3. *Segu. ver.* 241. t. 3. 2.

Chamædrys alpina minima hirsuta. *Bauh. pin.* 243. *Habitat in alpibus Europæ australioris.* 2

11. *VERONICA* corymbo terminali, caule adscendente bellidoides, te diphyllo.

Veronica caule non ramoso, floribus congestis terminato, foliis ovatis subasperis. *Fall. helv.* 531. t. 12. f. 1.

Veronica alpina, bellidis folio. *Bauh. pin.* 247. prod. 116. *Burf. XIV:* 27.

Habitat in Helvetia, Pyrenæis. 2

12. *VERONICA* corymbo terminali, folii lanceolatis fruticulosa, obtusiusculis, caulibus fruticulosis.

Veronica foliis ovatis crenatis, fructu ovati, floribus in summo caule purpurascens. *Hall. helv.* 532. t. 9. f. 1.

Veronica alpina frutescens. *Bauh. pin.* 247.

Habitat in Alpibus Austriæ, Helvetiæ, Pyrenæis. 5

Planta spithamea: surculis perennantibus caulibus erectis, simplicibus. Folia superiora majora, lanceolata, obtusa, glabra. Differt a *V. alpina* caule erectiusculo, magis lignoso, foliis angustioribus, calycibus glabris.

13. *VERONICA* corymbo terminali, foliis oppositis, calycibus hispida alpina, Fl. svec. 2. n. 15. Oed. dau. t. 16.

Veronica floribus corymbosis terminibus, calycibus hispida. *Fl. svec.* 1. n. 13.

Veronica caule floribus terminato, foliis ovatis crenatis. *Fl. lapp.* 7. t. 9. f. 4. *

Veronica caule inferne procumbere fruticoso, foliis ovatis oppositis, racemo terminali. *Roy. lugdb.* 302.

Veronica saxatilis. *Bauh. hist.* 3. p. 24. *Raj. extr.* 261. * *Habitat in alpibus Europæ.* 2

14. *VERONICA* racemo terminali subspicato, foliis serpyllifolia ovatis glabris crenatis. *Fl. svec.* 2. n. 16.

- Veronica floribus solitariis subcorymbosis, foliis ovatis glabris crenatis. *Fl. suec.* 1. n. 14. *Dalib. parif.* 4
- Veronica foliis inferioribus oppositis ovatis, superioribus alternis lanceolatis, floribus solitariis. *Hort. cliff.* 9. *Gron. virg.* 4. *Roy. lugdb.* 302. *Cold. noveb.* 1.
- Veronica fibribus sparsis, foliis ovatis crenatis glabris. *Fl. app.* 6.
- Veronica patensis serpyllifolia. *Bauh. pin.* 247.
- Veronica femina. *Bauh. hist.* 3. p. 285.
- Veronica; nummulariæ folio, pyrenaica. *Tournef. inf.* 145. *Plul. alm.* 384. t. 23. f. 4.
- Habitat in Europa & America septentrionali ad vias agros.* 2
- Beccabunga. 15. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caue repente. *Fl. suec.* 11. 14. *Mat. med.* 12. *Dalib. parif.* 7.
- Veronica foliis oppositis lævibus crenatis, floribus racemosis lateralibus. *Roy. lugdb.* 302.
- Veronica foliis oppositis lævibus crenatis, floribus laxe spicatis ex alis. *Hort. cliff.* 8. *Gron. virg.* 4.
- Anagallis aquatica major (minorque), folio subrotundo. *Bauh. pin.* 252.
- Anagallis aquatica. *Dod. pempt.* 823.
- Habitat in Europa ad scaturigines vix congelandas.*
- Anagall. ▽ 16. VERONICA racemis lateralibus, foliis lanceolatis serratis, caule erecto. *Fl. suec.* 10. 13. *Dalib. parif.* 7
- Veronica foliis oppositis lævibus crenatis, floribus laxe spicatis ex alis. *Gron. virg.* 4.
- Anagallis aquatica major, folio oblongo. *Bauh. pin.* 253
- Berula major. *Tabern. hist.* 1094.
- Habitat in Europa ad fossas & in Oriente.* ☉
- scutellata. 17. VERONICA racemis lateralibus pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. *Fl. suec.* 9. 17. *Dalib. parif.* 7.
- Veronica foliis linearilanceolatis integris, racemis lax floriferis. *Fl. lapp.* 9. *Hort. cliff.* 10. *Roy. lugdb.* 303
- Anagallis aquatica angustifolia scutellata. *Bauh. pin.* 253
- Anagallis aquatica angustifolia. *Bauh. hist.* 3. p. 780.
- Habitat in Eurœæ inundatis.* 2
- Teucrium. 18. VERONICA racemis lateralibus longissimis, foliis ovatis rugosis dentatis obtusiusculis, caule erecto.

- Veronica foliis imis cordatis superioribus angustioribus.
Hall. herb. 529.
- Chamædrys spuria major altera f. frutescens. *Bauh. pin.* 248.
- Chamædrys spuria major angustifolia. *Bauh. pin.* 248.
- Teucriti IV. tertia species. *Clus. hist.* 1. p. 349.
- Habitat in Germania. 2.
- Racemi densi, stricti, subspicati. Folia obtusius serrata.
19. VERONICA racemis lateralibus, foliis lineari-lanceolatis pinnato-dentatis. *austriaca.*
- Chamædrys austriaca, foliis tenuissime laciniatis. *Bauh. pin.* 248. *prodr.* 117.
- Chamædrys spuria tenuissime laciniata. *Bauh. hist.* 3. p. 287.
20. Veronica cappadocia, foliis laciniatis. *Tournef. cor.*
- Habitat in Austria. 2.
- Folia fere Goronopi glabra. Præcedenti nimis affinis.
21. VERONICA racemis lateralibus, foliis multipartitis laciniatis. *multifida.*
- Veronica montana, folio vario. *Buxb. cent.* 1. p. 24. t. 38.
- Habitat in Armeniæ, Iberiæ *graminosi.* 2.
22. VERONICA racemis lateralibus paucifloris, calycibus hirsutis, foliis ovatis rugosis crenatis petiolatis, caule debili. *Amæn. acad.* 4. p. 263. *montana.*
- Chamædrys spurie affinis rotundifolia scutellata. *Bauh. pin.* 249.
- Aliffon dioscoridis montanum. *Column. ephr.* 1. p. 286. t. 288.
- Habitat in Italiæ, Germaniæ *umbrosi.* 2.
23. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovato-oblongis serratis, caulibus prostratis. *prostrata.*
- Chamædrys incana spuria minor angustifolia. *Bauh. pin.* 249. *prodr.* 117, *Bauh. hist.* 1. p. 287.
- Habitat in Germaniæ, Italiæ *collibus.* 2.
- Caules duriusculi, canescentes, subtomentosi. Folia obtusa, subpetiolata, exceptis superioribus, e quorum alis Racemi longi. Flores late violacei, conferti, calycibus inæqualibus.
24. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis sessilibus rugosis dentatis, caule debili. *Fl. suec.* 13. 18. *Chamædrys.*
- Dalib. paris.* 4.

Veronica foliis oppositis plicatis dentatis, scapis
 alis inferioribus laxè spicatis. *Hort. cliff.* 8. *Roy. lugdb.* 303.

Veronica foliis cordatis sessilibus oppositis, racem
 laxè floriferis. *Fl. lapp.* 8.

Chamædrys spuria minor rotundifolia. *Bauh. pin.* 24

Hierobotane mas. *Dalech. hist.* 1337.

Habitat in Europæ pratis. 24

latifolia. 24. VERONICA racemis lateralibus, foliis cordatis
 gosis dentatis, caule stricto.

Veronica foliis oppositis plicatis dentatis, scapis
 alis superioribus laxè spicatis: *Hort. cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 303.

Veronica pratensis omnium maxima. *Buxb. cent.* 1.
 23. t. 34.

Chamædrys spuria major latifolia. *Bauh. pin.* 248.

Habitat in Helvetia, Bithynia, Austria. 24

paniculata. 25. VERONICA racemis lateralibus longissimis, foliis
 lanceolatis ternis ferratis, caule ascendente.

Veronica angustifolia, floribus paniculatis.
ruth. 32.

Habitat in Tartaria. 24

*Statura V. latifoliæ, sed Folia angustissime lanceola
 plerumque ternæ. Racemi longissimi, saturate cerni
 ad tria superiora genicula terni.*

*** *Pedunculis unifloris.*

agrestis. 26. VERONICA floribus solitariis, foliis cordatis in
 sis pedunculo brevioribus. *Fl. svec.* 17. 20. *Dalib. paris.* 6.

Veronica foliis cordatis crenatis, floribus solitariis
 dunculatis. *Roy. lugdb.* 303.

Veronica foliis alternis cordatis crenatis, floribus
 litariis. *Hort. cliff.* 9.

Alfine chamædryfolia, flosculis pediculis oblongis
 sidentibus. *Bauh. pin.* 250.

Alfine foliis triflaginis. *Tabern. hist.* 1089.

Habitat in Europæ cultis arvis. ☉

arvensis. 27. VERONICA floribus solitariis, foliis cordatis inci
 pedunculo longioribus. *Fl. svec.* 16. 19. *Dalib. paris.*

Veronica foliis oppositis cordatis crenatis, floribus
 tariis sessilibus. *Hort. cliff.* 9. *Gron. virg.* 4. *Roy. lugdb.* 30

Alfne veronicæ foliis, flosculis cauliculis adhaerentibus. *Bauh. pin.* 250.

Plantine polyichides. *Dalech. hist.* 1239.

Habitat in Europæ arvis cultis. ☉

2. VERONICA floribus solitariis, foliis cordatis planis quinquelobis. *Fl. svec.* 18. 21. *Dalib. parif.* 6. hederifolia.

Veronica foliis alternis cordatis quinquelobis, floribus solitariis. *Hort. cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 303.

Alfne hederulæ folio. *Bauh. pin.* 250. *Tabern. hist.* 1088.

3. Veronica chia, cymbalaræ folio, verna, flore albo: umbilico virescente. *Tournef. cor.* 7. *Buxb. cent.* 1. p. 25. t. 39. f. 1.

Habitat in Europæ ruderatis. ☉

Semina umbilicata sunt huic propria.

9. VERONICA floribus solitariis, foliis digitato-partitis pedunculo brevioribus. *Fl. svec.* 19. 22. *Dalib. parif.* 6. triphyllos.

Veronica foliis alternis inferioribus quinquepartitis; superioribus tripartitis, floribus solitariis. *Hort. cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 302.

Alfne triphyllos cærulea. *Bauh. pin.* 250.

Alfne parva erecta, folio alfine hederaceo. *Lob. ic.*

464.

Habitat in Europæ agris ☉

6. VERONICA floribus solitariis, foliis digitato-partitis pedunculo longioribus. *Fl. svec.* 20. 23. verna.

Veronica humilis erecta montana, flore parvo cæruleo. *Dill. app.* 38.

Habitat in Sueciæ, Germaniæ, Hispaniæ aridis apricis. ☉

7. VERONICA floribus solitariis subsessilibus, foliis oblongis subdentatis, caule erecto. romana.

Habitat in Europæ australioris agris. ☉

8. VERONICA floribus solitariis pedunculatis, foliis ovatis glabris crenatis, caule erecto subpiloso. acinifolia.

Veronica minima, clinopodii minoris folio glabro, romana. *Boca mus.* 2. p. 29. t. 102. *Raj. suppl.* 423.

Vaill. parif. 201. t. 23. f. 3.

Veronica erecta, acini folio glabro, floribus cæruleis. *Dill. app.* 39.

Habitat in Europa australi.

- peregrina. 33. VERONICA floribus solitariis sessilibus, foliis lanceolato-linearibus glabris obtusis integerrimis, caeruleo. *Fl. svec.* 15, 24. *
 Veronica terrestris annua, folio polygoni, flore alba.
Morif. hist. 2. p. 322. f. 3. t. 34. f. 19.
Habitat in Europæ hortis, arvisque. ☉
- marilandica. 34. VERONICA floribus solitariis sessilibus, foliis linearibus, caulibus diffusis.
 Veronica caulibus procumbentibus, foliis linearibus floribus sessilibus lateralibus. *Gron. virg.* 4.
Habitat in Virginia.

PÆDEROTA.

- bonæ spei. 1. PÆDEROTA foliis pinnatifidis. *Amzn. acad. afr.* 1. *
 Veronica africana, floribus adgenicula pedicellis uncialibus. *Herm. afr.* 783. *Fluk. phyt.* 320. f. 5.
 Anagallis foliis sinuatis. *Roy. lugdb.* 416.
Habitat ad Cap. bon. spei.
- Bonarota. 2. PÆDEROTA foliis ferratis.
 Veronica Bonarota corymbo terminali, foliis oppositis serrato-dentatis, calycibus linearibus. *Sp. pl.* 1. p. 2.
 Veronica petræa sempervirens. *Pon. bald.* 356.
 Chamædryas alpina saxatilis. *Bauh. pin.* 248.
 Bonarota. *Mich. gen.* 19. t. 15. f. 12.
Habitat in Alpibus Italicis, Austriacis. 2
Corollæ tubus longior, quam in priore, ut in Veronicæ spicatis, sed Calyx 5. partitus.

JUSTICIA.

- Adhatoda. 1. JUSTITIA arborea, foliis lanceolato-ovatis, bracteis ovatis persistentibus, corollarum galea concava. *Zeyl.* 16. * *Hort. ups.* 7.
 Justicia foliis ovato-lanceolatis, spicis foliosis, florum galea concava. *Hort. cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 291.
 Adhatoda zeylanensium. *Herm. lugdb.* 642. t. 64.
Pluk. alm. 9. t. 173. f. 3.
 Ecbolium *Riv. mon.* 129.
Habitat in Zeylona. b
- Ecbolium. 2. JUSTICIA arborea, foliis lanceolato-ovatis, bracteis ovatis deciduis mucronatis, corollarum galea reflexa. *Fl. zeyl.* 17. *

Adhatoda spica longissima, flore reflexo. Burm. zeyl.

7. t. 4. f. 1.

Carim-curini. Rheed. mal. 2. p. 31. t. 20. Pluk. alm.

126. t. 171. f. 4.

Habitat in Malabaribus, Zeylona. †

Simillima J. infundibuliformi, sed huic Spica terminalis sessilis.

JUSTICIA fruticosa, foliis lanceolato-ovatis qua- infundibuli-
ternis, bracteis lanceolatis ciliatis. formis.

Manja-Kurini. Rheed. mal. 9. p. 121. t. 62.

Habitat in India. †

Frutex ramis teretibus. Folia quaterna, lanceolato-ovata, integerrima, glabra, longius petiolata. Pedunculi ad singula caulis genicula solitarii, longitudine folii, læves: Spica oblonga, distiche imbricata, bracteis lanceolatis ciliatis; inter quas Bracteolæ 4, lineares & Calyx apice pilosus. Corolla speciosa, alba; tubo filiformi, stamina includente; Limbo magnitudine Narcissi poetici, lobis 5. expansis: infimo majore.

JUSTICIA fruticosa, foliis lanceolato-ovatis hirsu- scorpioides.
tis sessilibus, spicis recurvatis. †

Justicia foliis oblongo-ovatis hirsutis sessilibus, floribus spicatis alaribus, caule fruticoso. Mill. dist. n. 1.

Habitat in Vera Cruce. †

JUSTICIA fruticosa, foliis lanceolato-ovatis pictis, picta.
corollis fauce inflatis.

Folium bracteatum. Rumph. amb. 4. p. 73. t. 30.

Munde-maram. Rheed. mal. 6. t. 60.

Habitat in Asia. †

Calyx minimus, quinquedentatus. Corolla ringens fauce inflata: Lab. superius incurvum, emarginatum; L. inferius patens, trifidum, æquale. Stamina 2. sub labio superiore.

JUSTICIA fruticosa, foliis lanceolato-ovatis, bra- Betonica.
cteis ovatis acuminatis venoso-reticulatis coloratis.

*Fl. zeyl. 18. **

Betonica frutescens. Bont. Jav. 146.

em-curini. Rheed. mal. 2. p. 126. t. 21.

Habitat in India. †

JUSTICIA fruticosa, foliis lanceolatis integerrimis, hyssopifolia.

pedunculis trifloris ancipitibus, bracteis calyce
vioribus. *Mill, dict. t. 13,*

Justicia foliis lineari-lanceolatis, floribus sæpius si-
riis. *Hort. cliff. 10. Roy. lugdb. 291:*

Ecbolii indici f. *Adhatodæ* cucullatis floribus æn-
hyssopifolia planta ex insulis fortunatis. *Pluk,*
132. t. 286. f. 1.

Habitat in insulis Fortunatis, b

procumbens 8. *JUSTICIA* procumbens, foliis lanceolatis integ-
mis, spicis terminalibus lateralibusque alternis,
cæcis setaceis. *Fl. zeyl. 19. **

Euphrasia, alfine angustiore folio, rubiæ modo si-
ta, golcondeæ. *Pluk. alm, 142. t. 56. f. 3. & t.*
f. 4.

Habitat in Zeylona. 2.

pectinata. 9. *JUSTICIA* diffusa, spicis axillaribus sessilibus tor-
tosis secundis dorso imbricatis: bracteis semilan-
latis. *Amæn. acad, 4. p. 299. **

Habitat in Asia,

repens. 10. *JUSTICIA* repens, foliis ovatis subcrenatis, si-
terminalibus, bracteis lanceolatis. *Fl. zeyl. 20.*

Adhatoda spicata, flosculos ex foliolis membranac-
Burm. zeyl. 7. t. 3. f. 2,

Habitat in Zeylona. 2.

Bractææ margine utroque late membranacæ.

chinensis. 11. *JUSTICIA* herbacea, foliis ovatis, floribus lat-
libus, pedunculis trifloris, bracteis ovalibus.

Habitat in China.

Caulis angulati, pedales, inferne ramosi, folia oppo-
petiolata, ovata, acuminata, obtusifuscula, vix cre-

Ex alis pedunculi duo s. tres, singuli breves, &
triflori, involucrio diphylo, setaceo, nudo, bracteis
tis, obtusis, longitudine floris.

echioides. 12. *JUSTICIA* foliis lanceolato-linearibus obtusis
libus, racemis ascendenti secundis, bracteis seta-
*Fl. zeyl. 21. **

Euphrasiæ affinis Indica echioides. *Herm. lugdb. 1*
2. 669.

Peetumba. *Rheed. mal. 9. p. 87. t. 46.*

Habitat in India,

13. **JUSTICIA** foliis ovatis integerrimis, bracteis cuneiformibus, ramis sexangularibus. *sexangularis.*
Justicia annua, hexangulari caule, foliis circææ conjugatis, flore miniat. *Amm. herb. 274. Hort. cliff. 10.*
Euphrasia, alfine majori folio, flore galeato pallide luteo, jamaicensis. *Pluk. alm. 142. t. 279. f. 6.*
Habitat in Vera cruce, Jamaica. ☉
14. **JUSTICIA** foliis ovatis integerrimis, bracteis subulatis: ramis hexagonis. *Amæn. acad. 5. p. 391. ** *affurgens.*
Justicia herbacea affurgens, ad alas alternas nodos & summitates florida. *Brown. jam. 118. t. 2. f. 1. **
Habitat in Jamaica.
15. **JUSTICIA** foliis lanceolato-ovatis integerrimis, pedunculis dichotomis. *nasuta.*
Pulcolli. Rheed. mal. 9. p. 135. t. 69.
Habitat in India. Torén.
Rami obsolete angulati. Folia lato-lanceolata f. lanceolata-ovata, obtuse acuminata, integerrima, minus glabra. Pedunculi dichotomi, longitudine foliorum. Flores sessiles, bracteis minimis, lineatis. Calyces minimi. Corollæ tubus filiformis, longus. Limbi labium superius lineare, angustum, brevius, reflexum; L. inferius æquale, trifidum. Stamina extra fauces prominentia. Stylus capillaris, persistens.
16. **JUSTICIA** foliis ovatis utrinque mucronatis integerrimis glabris, caule geniculato, spicis secundis. *purpurea.*
Orb. it. 230.
Folium tinctorum. Rumph. amb. 6. p. 51. t. 22. f. 1.
Habitat in China. Osbeck.
Caulis herbaceus, brachiatus. Folia lato-ovata, apice ☉ basi mucronata, glabra, petiolata, integerrima. Articuli caulis ☉ rami supra basin Geniculo tumido, quod supra angustius evadit, notantur. Spicæ ad latera ☉ apices ramorum, secundæ. Bractæe angustæ, lanceolatae, longitudine capsularum. Corollæ purpureæ: labiis erectis; altero lineari angustissimo; altero lato trilobo. Stamina duo, purpurea, longitudine corollæ.
17. **JUSTICIA** foliis lanceolato-ovatis, pedunculis sexfloris, pedicellis lateralibus bifloris bracteis ovatis parallelis. *bivalvis.*
Bungum Rumph. amb. 6. p. 55. t. 22. f. 1.
Adel-odagam. Rheed. mal. 9. p. 81. t. 43.

- ¹ *Habitat in Asia indica. J. Burmannus.*
 Caulis brachytatus. Folia opposita, integerrima. Pedunculi breves, terminati Involucro diphylllo, setaceo E dunculisque 4. parvis, parallelis: mediis duobus in floribus; lateralibus vero iterum similiter diphyllis bifloris. Calyces omnes inter Bracteas duas ovatas se ipsis mæ res. Corollæ Labium superius lanceolatum; inferius ovatum. Stamina 2, longitudine corollæ. *Rheedi planta foliis serratis* ♂ flore albo difert, eandem tamen J parare nequeo.

- gangetica. 18. JUSTICIA foliis ovatis, racemis simplicibus longis floribus alternis secundis, bracteis obsoletis. *Amæ acad. 4. p. 299. **
Habitat in Asia indica.

DIANTHERA.

- americana. 1. DIANTHERA spicis solitariis alternis.
 Dianthera. *Gron. virg. 6. **
 Gratiolæ affinis floridana, foliis floribus & capsulis 1 spica brevi, pediculis e foliorum alis innixis. *Plu amalth. 114. t. 423. f. 5.*
Habitat in Virginia, Florida. 24
 Caulis simplicissimus. Folia linearia. Pedunculi alterna longitudine foliorum. Spicæ ovatæ.
- comata. 2. DIANTHERA spicis filiformibus verticillatis: inferioribus umbellatis.
 Dianthera foliis lanceolato ovatis, racemo spatioso assurgente, spicillis verticillatis, *Brown. jam. 111*
 Antirrhinum minus angustifolium, flore dilute cæruleo. *Sloan. jam. 49. hist. 1. p. 160. t. 103. f. 2.*
Habitat in Jamaica.

GRATIOLA.

- officinalis. 1. GRATIOLA floribus pedunculatis, foliis lanceolatis serratis. *Mat. med. 18.*
 Gratiola. *Riv. mon. 157. Hort. cliff. 9. Roy. lugdb. 292*
Dalib. parif. 8. Sauv. monsp. 137.
 Gratiola centauroides. *Zauh. pin. 279.*
Habitat in Lusatia, Gallia ♂ *australioris Europæ humidiusculis. 24*
- Monnieria. 2. GRATIOLA foliis ovali-oblongis, pedunculis unis floribus, caule repente. *Amæn. acad. 4. p. 305. **

- Monieria minima repens, foliis subrotundis, floribus
 singularibus alaribus. *Brown. jam.* 269.
- Monioria ramosa repens, foliis linearibus oppositis.
Ehret. pict. t. 14. f. 2.
- Anagallis aquatica, portulacæ aquaticæ caule & fo-
 liis. *Sloan. jam. 87. hist. I. p. 203. t. 129. f. 1.*
- Habitat in Jamaica.*
- GRATIOLA foliis lanceolatis obtusis subdentatis, virginiana.
*Gron. virg 6. **
- Tiera Maya Nari. *Rheed. mal. 9. p. 165. t. 85.*
- Habitat in Virginia, Malabar.*
- GRATIOLA floribus subsessilibus.
- Gratiola latiore folio, flore albo. *Fewill. peruv. 3. t. 47.* peruviana.
Habitat in Peru.

PINGUICULA.

- PINGUICULA nectarii apice incrassatø. Inſtanica.
Viola palustris, Pinguicula dicta, lusitanica. Grif. lusit.
- Habitat in Lusitania. 21.*
- PINGUICULA nectario cylindraceo longitudine vulgaris.
 petali. *Fl. lapp. 11. Fl. svec. 21, 25. Roy. lugdb. 304.*
- Pinguicula montana, flore calcari donato. *Bauh. pin. 243.*
- Pinguicula. *Clus. hist. 1. p. 311.*
- Habitat in Europæ uliginosis. 24.*
- PINGUICULA nectario conico petalo breviorè. alpina.
*Fl. lapp. 12. t. 12. f. 3. *. Fl. svec. 22, 26.*
- Pinguicula flore albo minore, calcari brevissimo. *Raj.*
hist. 752.
- Habitat in Alpibus Lapponicis. 24.*
- PINGUICULA scapo villoſo. *Fl. lapp. 13. t. 12. f. 2.* villoſa.
Fl. svec. 23, 27.
- Pinguicula cornubiensis, flore minore carneo. *Raj.*
hist. 752.
- Habitat in Lapponia, Sibiria. 24.*

UTRICULARIA.

- UTRICULARIA nectario subulato, foliis integer- alpina
 rimis. *Jacq. amer. 11.*
- Habitat in Alpibus Martinicæ insule.*

- foliosa, 2. **UTRICULARIA** nectario conico, fructibus cernui radicibus utriculo destitutis. *Læfl. it.* 281. *
Linaria palustris, fœniculi folio. Plum. spec. 6. ico
165. f. 2.
Habitat in America australi
Simillima U vulgari, sed Radix repens; Flores in sca
plures 6-10, & nulli utriculi ad radículas.
- vulgaris. 3. **UTRICULARIA** nectario conico, scapo pauciflora
Fl. lapp. 14. Fl. svec. 44. 28. Fl. zeyl. 22. Ro
lugdb. 304.
*Lenticularia. Riv. mon. 78. **
Millefolium aquaticum lenticulatum. Bauh. pin. 141.
Habitat in Europæ fossis, paludibus profundioribus. 24.
Nectarium subulatum, longitudine labii inferioris, cui a
proximatum; faux clausa palato gibbo. Planta nobis d
plex: altera MAJOR a Rivino delineata, calyce post
ce rotundato. Altera MINOR calyce postice transv
so, & quasi truncato; crescunt conjunctim.
- minor. 4. **UTRICULARIA** nectario carnato. *Fl. svec. 2*
*29. **
Millefolium palustre galericulatum minus. Pluk. al
251. t. 99 f. 6.
Aparine aquis innatans trevisana, foliis perchepl
capreolis donata. Bocc. mus. 1. p. 23. t. 4.
Habitat in Europæ fossis rarius.
Nectarium obsoletum, deorsum spectans; faux, absque g
bo palato, pervia & hians.
- subulata. 5. **UTRICULARIA** nectario subulato. *Gron. virg.*
Habitat in Virginia.
- gibba. 6. **UTRICULARIA** nectario gibbofo.
Utricularia florum nectario gibbofo, scapo nunc u
flore nunc biflora. Gron. virg. 129.
Habitat in Virginia.
- bifida. 7. **UTRICULARIA** scapo nudo bifido. *Osbeck. it. 2*
1. 3. f. 2.
Habitat in China. Osbeck.
Caulis filiformis, digiti longitudine, bifidus s. duplici
cemo, nudus. Flores alterni, lutei: labio superi
lateribus acuto.
- serulosa. 8. **UTRICULARIA** scapo nudo, squamis alternis
*gis subulatis. Fl. zeyl. 23. **

Nelipu. *Rheed. mal.* 9. p. 137. t. 70.

Habitat in Zeylona.

VERBENA.

* *Diandrae dispermae.*

- VERBENA** diandra, spicis longissimis foliosis. cubica.
Verbena foliis ovatis acuminatis, spica foliosa. *Hort. cliff.* 10. *
- Verbena* orubica, teucree folio, primis veris flore, filiquis & seminibus longissimis. *Pluk. alm.* 383. t. 222. f. 4. ☉ t. 327. f. 7.
- Sherardia* urticae folio subtus incano, floribus violaceis *Ehret. pict.* t. 5. f. 1.
Habitat in Oruba insula americana septentrionalis.
- VERBENA** diandra, spicis longissimis carnosissimis nudis, foliis lanceolato-ovatis oblique dentatis, caule laevi. indica.
Habitat in Zeylona. ☉. *Dav. Royen.*
- Simillima V. jamaicensi, sed Caulis laevis absque pilis.*
 Folia glabra nec retrorsum scabra, magis lineata, non serrata, sed dentibus obtusis obliquis dentata; basi sensim angustata, nec petiolis late marginatis. Flores caerulei antheris tantum duabus, reliquis filamentis 2 castratis.
- VERBENA** diandra, spicis longissimis carnosissimis nudis, foliis spatulato-ovatis serratis, caule hirsuto. jamaicensis.
Verbena foliis obtuse ovalibus, spica carnosissima nuda. *Hort. cliff.* 10. *Roy. lugdb.* 327.
- Verbena* folio subrotundo serrato, flore caeruleo. *Sloan. hist.* 171. t. 107. f. 1.
Habitat in Jamaica ☉ *Caribæis.* 24. ☉.
- VERBENA** diandra, spicis ovatis, foliis lanceolatis serrato-plicatis, caule fruticoso. *Roy. lugdb.* 327. stoechadifolia.
Sherardia nodiflora, stoechadis serratifolii folio. *Vaill. sex.* 49.
- Lavandula*, foliis crenatis latioribus, americana frutescens *Plum. spec.* 6. ic. 162. f. 1.
Habitat in Americae Gallia aequinoctialis.
- VERBENA** diandra, spicis laxis, calycibus alternis prismaticis truncatis aristatis, foliis ovatis obtusis. prismatica.
Verbena minima, chamædryos folio. *Sloan. jam.* 64. *hist.* 1. p. 172. t. 107. f. 2.

Ver-

Verbena, scutellariæ s. cassidæ folio, dispermos americana. *Pluk. alm.* 382. t. 70. f. 1.

Habitat in Jamaica.

mexicana. 6. **VERBENA** diandra, spicis laxis, calycibus fructu reflexis rotundato didymis hispida.

Verbena mexicana, trachelii folio, fructu aparines *Dill. elth.* 407. t. 302. f. 389.

Habitat in Mexico. 24

Caulis tetragonus, marginibus scaber: Rami oppositi, sèperne dichotomi, Racemi dichotomiæ longi. Folia cordata, oblonga, scabra, petiolis brevissimis.

lappulacea. 7. **VERBENA** diandra? calycibus subrotundis erectis sculis, seminibus echinatis.

Scorodonia floribus spicatis purpurascens pentapetaloidibus. Sloan. jam. 66. *hist.* 1. p. 174. t. 110. f. 1

Blairia. Houst. Ann. herb. 277.

Habitat in Jamaica.

curassavica. 8. **VERBENA** diandra, spicis longis, calycibus aristatis, foliis ovatis argute ferratis.

Veronæ similis fruticosa curassavica. Herm. parad. 244 *Kæmpfer. Houst. m. ff.*

Habitat in Curassao Americæ.

* *Tetrandræ.*

nodiflora. 9. **VERBENA** tetrandra, spicis capitato-conicis, foliis ferratis, caule repente. *Fl. zeyl.* 399.

Verbena foliis verticaliter ovatis, spicis globosis. Hort. cliff. 11.

Verbena foliis verticaliter ovatis, spicis solitariis ovatis. Roy. lugdb. 327.

Verbena caule repente, foliis oblongis superne crenatis, pedunculis solitariis capitatis. Gron. virg. 7.

Verbena nodiflora. Bauh. pin. 269. *prodr.* 125.

Habitat in Virginia. ☉

bonariensis. 10. **VERBENA** tetrandra, spicis fasciculatis, foliis lanceolatis amplexicaulibus. *Hort. upf.* 8.

Verbena foliis lanceolatis, floribus congestis fastigatis. Hort. cliff. 11. *Roy. lugdb.* 326.

Verbena bonariensis altissima, lavendulæ canariensis folio, spica lavendulæ. Dill. elth. 406. t. 300. f. 381

Habitat in agro Bonariensi. 24

VERBENA tetrandra, spicis longis acuminatis, foliis hastatis. *Hort. upf.* 8. hastata.

Verbena foliis lanceolatis ferratis, spicis filiformibus paniculatis. *Roy. lugdb.* 327.

Verbena americana altissima, spica multiplici, urticæ foliis angustis, floribus cæruleis. *Herm. parad.* 242. t. 242.

Habitat in Canadæ humidis. 24.

VERBENA tetrandra, spicis filiformibus, foliis indivisis lanceolatis ferratis obtusiusculis subsessilibus. Corollina.

Verbena corolinensis, melissæ folio aspero. *Dill. elh.* 407. t. 301. f. 388.

Verbena caroliniana, folio integro ferrato scabro. *Raj. suppl. app.* 249. n. 10.

Habitat in America septentrionali. 24.

VERBENA tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis indivisis ovatis ferratis acutis petiolatis. *Hort. upf.* 9. urticifolia.

Verbena foliis ovatis, caule erecto, spicis filiformibus paniculatis. *Hort. cliff.* 11. *Gron. virg.* 7. *Roy. lugdb.* 327.

Verbena recta canadensis, urticæ foliis. *Morif. hist.* 3. p. 418. f. 11. t. 25. f. 3.

Habitat in Virginia, Canadæ aridis. 24.

VERBENA tetrandra, spicis filiformibus, foliis multifido-laciniatis, caulibus numerosis. *Hort. upf.* 8. spuria.

Verbena humilior, foliis incisis. *Clayt. virg.* 8.

Habitat in Canada, Virginia. 24.

VERBENA tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule solitario. *Fl. svec.* 2. n. 30. officinalis.

Verbena foliis multifido-laciniatis, spicis filiformibus. *Hort. cliff.* 11. *Fl. svec.* 1. n. 26. *Roy. lugdb.* 327. *Dalib. parif.* 9. *Sauv. monsp.* 279.

Verbena communis, flore cæruleo. *Bauh. pin.* 269.

Verbena recta *Dod. pempt.* 150.

Habitat in Europæ mediterraneæ ruderatis. ☉

VERBENA tetrandra, spicis filiformibus solitariis, foliis bipinnatifidis. supina.

Verbena tenuifolia. *Bauh. pin.* 269.

Verbena supina. *Clus. hist.* 2. p. 46.

Habitat in Hispania.

LYCOPUS.

- europæus.** 1. **LYCOPUS** foliis sinuato-ferratis. *Fl. fvec. 2. n.*
Lycopus foliis indivisis. Fl. fvec. 1. n. 27. Da
ris. 2.
Lycopus. Hort. cliff. 11. Roy. lugd. 326.
Marrubium palustre glabrum. Bauh. pin. 230.
Sideritis matthioli. Dalech. hist. 1117.
Habitat in Europæ ripis humentibus. 2
- virginicus.** 2. **LYCOPUS** foliis æqualiter ferrulatis.
Lycopus foliis lanceolatis tenuissime ferratis.
virg. 8.
Habitat in Virginia. 2

AMETHYSTEA.

- cærulea.** 1. **AMETHYSTEA.** *Hort. upf. 9. Amoen. acad. 3;*
Amethystina montana erecta, foliis exiguis d
trifidis ferratis, flosculis cum coma e cærul
thinis. Amm. ruth. 4. Hall. act. upf. 1742. p. 51
Habitat in Sibiria montosis. ☉

CUNILA.

- mariana** 1. **CUNILA** foliis ovatis ferratis, corymbis ter
 bus dichotomis.
Satureja origanoides. Sp. pl. 1. p. 568.
Hedysmos. Mitch. E. N. C. 1748. app. 211.
Thymus foliis ovatis acuminatis ferratis, coryr
teralibus terminalibus pedunculatis. Gron. vi
Calamintha mariana, mucronatis rigidioribus
natis foliis, flosculorum calyculis villis ar
Pluk. mant. 34. t. 344. f. 1.
Calamintha erecta virginiana, mucronato folio
Morif. hist. 3. p. 413. f. 1 t. t. 19. f. 7.
Habitat in Virginia. 2
- pulegioides.** 2. **CUNILA** foliis oblongis unidentatis, floribus
 cillatis.
Melissa pulegioides. Sp. plant. 1. p. 593.
Melissa floribus verticillatis glomeratis secund
itudinem caulis, foliis tomentosis. Gron. vi
Kalm. it. 2. p. 314.
Habitat in Virginia, Canadae siccis. ☉
Planta spithamea, brachiata. Folia lanceola

ta, scabriuscula, uno alterove dente notata: superiora angustiora. Verticilli secundum totam longitudinem plantæ. Calyx decemstriatus scaber: Labio superiore trifido acuminato; inferiore setaceo. Corolla alba fauce violacea: Labio superiore vix emarginato. Stamina duo corolla breviora, fertilia & Filamenta alia duo minorâ castrata.

CUNILA foliis ovalibus integerrimis, floribus verticillatis, caule tetragono, thymoides.

Thymus pulegioides. Sp. pl. 1. p. 592.

Acinos thymi folio & facie, floribus inexpanfis. Moris. hist. 3. p. 404. f. 11. t. 19. f. 6.

Habitat Monpelii ☉. D. Sauvages.

Habitus præcedentis. Caulis erectus, spithameus. Ramis paucis simplicibus brevibus. Folia ovalia, obtusa, subtus striata. Verticilli secundum totam caulis longitudinem. Stamina inquirant in viva ejus contrarietate.

ZIZIPHORA.

ZIZIPHORA capitulis terminalibus, foliis ovatis. capitata.

Ziziphora foliis lanceolatis, floribus terminatricibus.

Hort. cliff. 305. Roy. lugdb. 313.

Minopodium fistulosum pumillum indiæ occidentalis, summo caule floridum. Pluk. alm. 111. t. 164. f. 4.

Thymus humilis latifolius. Buxb. cent. 3. p. 28. t. 51.

1.

Habitat in Syria, Armeria. ☉

ZIZIPHORA foliis ovatis, floribus racemoso-spica. hispanica.

ca, bracteis obovatis nervosis acutis. Amoen. acad.

p. 263. *

Habitat in Hispania. ☉

ZIZIPHORA floribus lateralibus, foliis lanceolatis. tenuior.

Ziziphora foliis lanceolatis, floribus ex alis. Hort.

cliff. 305.

Ziziphora foliis lanceolatis, floribus lateralibus. Roy.

lugdb. 313. Hort. upf. 9.

Acinos syriaca, folio mucronato, capsulis hirsutis.

Moris. hist. 3. p. 404. f. 11. t. 19. f. 3. 4

Habitat in Syria? ☉

ZIZIPHORA floribus lateralibus, foliis ovatis. acinoides.

Clinopodium fupinum incanum. Ann. ruth. 66.

Habitat in Sibiria. ☉

Habitus Thymi Acinos, sed majora quintuplo omnia. lina Z. capitata; Flores laterales ut in Z. tenuiore, copiosiores. Calyces similiter hispidi; stamina corollæ tubum protrusa.

MONARDA.

fistulosa.

1. **MONARDA** capitulis terminalibus, caule obtusogulo. *Hort. upf. 12. Mill. dict. t. 122. f. 2.*

Monarda floribus capitatis, caule obtuso. Vir. cliff. Roy. ludg. 313.

Monarda. Hort. cliff. 11.

Origanum fistulosum canadense. Corn. canad. 13. t. 1

β. *Monarda mollis. Amoen. acad. 3. p. 399.*

Clinopodium majus virginienſe, foliis minus hirtis atque densioribus, floribus fistulosis. Morif. hist. 3. p. 374.

Habitat in Canada. 2

didyma.

2. **MONARDA** floribus capitatis sub-didynamis, caule acutangulo. *Mill. ic. 122. f. 1.*

Monarda caule acute angulato, capitulis terminalibus. Hort. cliff. 495. Cold. noveb. 7.

Monarda floribus capitatis verticillatisque, caule acute angulato, foliis lanceolato serratis glabris. Bütn. cum. 226.

Habitat in Pensilvania, Noveboraco.

clinopodia.

3. **MONARDA** floribus capitatis, foliis lævissimis serratis,

Monarda foliis ovato-lanceolatis, verticillis lateribus dichotomis corymbosis, foliis inæqualiter serratis. Gron. virg. 9.

Habitat in Virginia. 2

Radix repens. Facies plantæ præcedentis quoad statum at folia gerit Clinopodii incani omnino; neque huic sicut rubra, sed purpurea, nec flores tetrandri; foliisque herberrimis distincta a prima; Folia ovato-oblonga, acuminata, profunde serrata, petiolata, utrinque lævia. Folia quadrangularis, magis quam in prima, minus acuminata quam in secunda. Flores in capitulum bracteis rotundis, pallidi.

punctata.

4. **MONARDA** floribus verticillatis, corollis punctatis. *Hort. upf. 12.*

Ma

Monarda floribus verticillatis. Hort. cliff. 495. Gron. virg. 9. Roy. lugdb. 313.

Clinopodium virginianum angustifolium, quovis verticillo duodecim foliolis rubentibus cincto. Pluk. alm. III. t. 24. f. 1.

Habitat in Virginia. ☉

5. **MONARDA** floribus verticillatis, corollis involu- cro longioribus, ciliata.

*Monarda spica interrupta, involucris longitudine verticillorum lanceolatis. Gron. virg. 9. **

Clinopodium angustifolium non ramosum, flore cæruleo; labio tritido atro purpureis maculis ornato. Pluk. alm. 10. t. 164. f. 3. Morif. hist. 3. p. 374. f. II. t. 8. f. 6.

Habitat in Virginia.

ROSMARINUS.

ROSMARINUS. *Hort. cliff. 14. Hort. upf. II. Mat. med. 16. Roy. lugdb. 310.* officialis.

Rosmarinus spontaneus, latiore folio. Bauh. pin. 217.

Rosmarinus hortensis, angustiore folio. Bauh. pin. 217.

Habitat in Hispaniæ, G. narbonensis, Italiæ, Orientis, Galilææ collibus. ☽

SALVIA.

SALVIA foliis lineari-lanceolatis denticulatis, floribus pedunculatis. *Hort. cliff. 13. * Roy. lugdb. 309.* ægyptiaca.

Horminum ægyptium minimum ramosissimum. Lippi. Boerh. lugdb. 1. p. 66.

Habitat in Ægypto.

SALVIA foliis lanceolatis, calycibus diphyllis. cretica.

Habitat in Creta.

SALVIA foliis radicalibus lyratis dentatis, corollarum galea brevissima. lyrata.

Salvia corollarum labio superiore brevior; fauce patente. Gron. virg. 8.

Salvia foliis sinuato-ferratis glabris, calyce piloso viscido, corolla vix calycem superante. Zinn. gæt. 298?

Horminum virginianum, caule aphylo, foliis quercinis, tubuloso longo flore. Morif. hist. 3. p. 395. f. II. t. 13. f. 27.

Habitat in Virginia.

Linnei Spec. plant. pars. I. C

4. SAL-

- officinalis.** 4. SALVIA foliis lanceolato-ovatis integris crenula
floribus spicatis; calycibus acutis. *Hort. cliff.*
Hort. upf. 10. *Mat. med.* 13. *Roy. lugdb.* 307. &
monf. 143.
Salvia major. *Bauh. pin.* 237.
- β. Salvia minor aurita & non aurita. *Bauh. pin.* 237.
Habitat in Europa australi. ☽
- pomifera.** 5. SALVIA foliis lanceolato ovatis integris crenula
floribus spicatis, calycibus obtusis. *Hort. cliff.*
Roy. lugdb. 307.
Salvia cretica frutescens pomifera, foliis longioribus
incanis & crispis. *Tournef. cor.* 10. *itin.* 1. p. 92. t.
Salvia baccifera. *Bauh. pin.* 237.
Habitat in Creta.
- urticifolia.** 6. SALVIA foliis ovato-oblongis duplicato-ferratis, caly-
cibus tridentatis: lacinia summa tridentata. *Gr*
virg. 8.
Horminum minus, betonicae folio, flore purpureo
Pluk. amalt. 119. t. 420. f. 1.
Horminum virginianum erectum, urticae foliis, flore
minore. *Morif. hist.* 3. p. 395. f. 11. t. 13. f. 31.
Habitat in Virginia, Florida.
- viridis.** 7. SALVIA foliis oblongis crenatis, corollarum galea
semi-orbiculata, calycibus fructiferis reflexis.
Salvia foliis ovato-oblongis obtusis æqualiter crenatis
corollarum galea semi-orbiculata. *Hort. upf.* 11.
Horminum coma viridi. *Tournef. inst.* 178.
Habitat - - - ☉
- Horminum.** 8. SALVIA foliis obtusis crenatis, bracteis summis
coloratis. *Vir. cliff.* 4. *Hort. c*
12. Mat. med. 14. *Roy. lugdb.* 310.
Horminum sativum. *Bauh. pin.* 238.
Horminum verum matthioli. *Gesn. fasc.* 17. t. 11. f.
Habitat in Græcia, Apulia. ☉
- sylvestris.** 9. SALVIA foliis cordato lanceolatis undatis biferratis
maculatis acutis, bracteis coloratis flore brevioribus
Horminum sylvestre salvifolium majus maculatum
Bauh. pin. 239.
Horminum sylvestre v. altera species. *Cus. hist.* 2. p.
Habitat in Austriæ inferioris, Bohemiæ agrorum man-
nibus, vineis. 24

10. **SALVIA** foliis cordato-lanceolatis ferratis planis, nemorosa. bracteis coloratis, corollæ labio infimo reflexo.
Salvia foliis cordato-lanceolatis simpliciter ferratis, staminibus galea. n. æquantibus. *Zinn. gzt.* 297.
Horminum sylvestre salviolium minus. *Bauh. pin.* 239.
Sclarea, folio *salviæ*, minor s. glabra. *Tournef. inst.* 180.
Habitat in Austria, Tartaria. ♂
Folia Radicalia cordata; Caulina ovato-lanceolata, æqualiter ferrata, supra nuda, subtus subtomentosa. Spicæ ante florescentiam exacte tetragonæ, bracteis coloratis flore brevioribus. Corollæ punctis impalpabilibus adpersæ; Labii inferioris medius lobus arcte sub calyce reflexus.
11. **SALVIA** foliis cordato-ovatis rugosis tomentosis, hamatodes, calycibus hispidis, radice tuberosa. †
Horminum sanguineum, asphodeli radice. *Triumph. obs.* 69. t. 69.
Horminum sylvestre maculatum tuberosum. *Honuphr.*
Horminum sylvestre majus hæmatodes glabrum, flore cæruleo, italicum. *Barr. rar.* 234. t. 185.
Habitat in Italia. 24
Habitus Phlomidis, sed teneritudo Salviæ; Calyces pilis rectis exstantibus undique hispidi sunt.
12. **SALVIA** foliis cordato-oblongis: summis amplexicaulibus, verticillis subnudis, corollis galea glutinosi. *Fl. svec.* 2. n. 32. pratensis.
Salvia foliis ovatis inciso-crenatis, verticillis subnudis.
Hort. cliff. 12. *Fl. svec.* 1. n. 28. *Hort. upf.* 10. *Roy. lugdb.* 310. *Dalib. parif.* 10.
Horminum pratense, foliis ferratis. *Bauh. pin.* 238.
Horminum sylvestre. *Gamer. epit.* 629.
Salvia agrestis foliis cordatis: summis amplexicaulibus, corollarum galea labium æquante. *Amæn. acad.* 3. p. 399.
Horminum pratense niveum, foliis incanis. *Bauh. pin.* 238.
Habitat in Europæ pratis. 24
13. **SALVIA** foliis cordatis obtusis crenatis subtomentosis, corollis calyce angustioribus. dominicus.
Habitat in Domingo.
14. **SALVIA** foliis ferratis sinuatis læviusculis, corollis varbenacæ.
Caly-

calyce angustioribus. *Virid. cliff.* 17. *Gron. virg.*

Roy. lugdb. 309. *Dalib. paris.* 9. *Sauv. monsp.* 278.

Salvia foliis pinnatim incisis glabris. *Hort. cliff.* 12.

Horminum sylvestri, *lavendulae flore.* *Bauh. pin.* 23

Raj. hist. 545.

Horminum sylvestri minus, inciso folio, flore azure

Barr. ic. 208.

Horminum, *verbenacae laciniis*, angustifolium. *Tr*

umf. obs. 66. t. 66.

Habitat in Europae & Orientis pascuis. 2

clandestina. 15. *SALVIA* foliis serratis pinnatifidis rugosissimis, sp
ca obtusa, corollis calyce angustioribus.

Horminum sylvestri, inciso folio, caesio flore, ital

cum. *Barr. rar.* 24. t. 220.

Habitat in Italia. ♂

Caules tetragoni, obtusi, villosi, adscendentes, spitha

mæi: Ramis superne saepius duobus. Folia oblongu

pinnato-sinuata, rugosissima, crenata, obtusa, petiolata

in caule 2. f. 3. paribus. Spica truncata verticillis re

motis. Bractæae cordatae, triflorae. Calyces pilis gla

tinosis, labio superiore plicato. Corolla violacea

vix calyce duplo longior; labii inferioris medio lob

albo.

pyrenaica. 16. *SALVIA* foliis obtusis erosis, staminibus coroll
duplo longioribus. *Roy. lugdb.* 309.

Horminum pyrenæicum glutinosum anguriae folio. *Herm*

parad. 187. t. 187.

Habitat in Pyrenæis.

sermas. 17. *SALVIA* foliis cordato-oblongis erosis staminibus
corollam æquantibus.

Horminum sylvestri majus, flore albo, integris foliis

Barr. ic. 187. bona.

Habitat in Syria. 2

Caules pedales, villosi. Folia cordata, oblonga, tomen

tosa, rugosa, margine erosa, grato gravi odore. Bra

ctæae cordatae, villosae, piloso-viscidae. Corollae albæ

Stamina longitudine corollae, Antheris luteis. Calyces

bilabiari.

syriaca. 18. *SALVIA* foliis cordatis dentatis: inferioribus re
pandis, bracteis glabris acutis cordatis, calycibus

tomentosis.

Horminum syriacum. *Bauh. pin.* 238. *prodr.* 114. t. 114

fla-

Habitat in Oriente, Palæstina. Hasselquist.

Statua S. pratensis. Caules obtuse angulati. Folia cordata, rugosissima, subtomentosa, repanda, dentata. obtuse crenata. Panicula brachiata, virgata. Bracteæ calyce breviores, cordatæ. Calyces quinquesidi, æquales, acuminati, tomentosi. Corollæ albæ. Stylus galea duplo longior.

9. SALVIA foliis ovatis utrinque acuminatis ferratis. mexicana.

Hort. cliff. 13. Roy. lugdb. 308.

Sclarea mexicana altissima, facie heliotropii. Dill. elh. 339. t. 254 f. 330.

Habitat in Mexici humentibus. b.

1. SALVIA foliis ovatis, petiolis utrinque mucronatis: spicis imbricatis, calycibus trifidis. hispanica.

Kniph. orig. t. 2.

Horminum sylvestre, lavendulæ flore. Bauh. pin. 239?

Sclarea hispanica. Tabern. hist. 764. ic. 374.

Habitat in Italia. D. Rathgeb; in Hispania. Læfing. ☉

Caulis sesquipedalis, tetragonus, obtusus, quadrifurcatus, superne pilis reflexis albis vestitus. Folia ovata, acuta, rugosa, serrata, basi acuta; petiolis basi utrinque obtuso mucrone prominentibus. Spica tetragona, imbricata. Bracteis ovatis, longitudine calycum, ciliatis. Calyces sub singula squama sæpe 5. ore tridentati, acuti, dente superiore solitario; inferioribus duobus. Corolla cærulea: limbo longitudine calycis: galea brevior, subvillosa; labio inferiore trifido, obtuso, integerrimo, basi maculis 2, pallidis.

2. SALVIA foliis cordatis acute crenatis: summis sessilibus, verticillis subnudis remotissimis Roy. lugdb. 15. indica.

Sclarea indica, floribus variegatis. Tournef. inst. 179.

Habitat in India.

3. SALVIA foliis cordatis crenato-dentatis, verticillis subnudis, stylo corollarum labio inferiore incumbentibus. Hort. upf. 11. * verticillata.

*Hort. upf. 11. **

Salvia foliis cordato-sagittatis dentatis. Hort. cliff. 495.

Roy. lugdb. 309.

Horminum sylvestre latifolium verticillatum. Bauh. pin. 238.

Horminum sylvestre tertium. Clus. hist. 2. p. 29.

Habitat in Austriæ, Misniæ cultis ☉ ruderatis. ☉

4. SALVIA foliis cordato-sagittatis serratis acutis. Hort. glutinosa

cliff. 13. Hort. upf. 11. Roy. lugdb. 308. Sauv. monsp. 146.

Horminum luteum glutinosum. *Bauh. pin.* 238.

Horminum sylvestre secundum. *Clus. hist.* 2. p. 29.

Habitat in Europæ lufosis. 24

- canariensis. 24. SALVIA foliis hastato-triangularibus oblongis cre-
natis obtulis. *Hort. cliff.* 13. *Hort. upf.* 10. *Roy*
lugdb. 308.

Horminum canariense tomentosum, hastato folio. *Mori*
hist. 3. p. 394. f. 11. t. 13. f. 17.

Habitat in Canariis. ♀

- africana. 25. SALVIA foliis subrotundis serratis: basi truncati
dentatis. *Hort. cliff.* 13. *Roy. lugdb.* 308.

Salvia africana frutescens, folio scorodonixæ, flore vio-
laceo. *Comm. hort.* 2. p. 181. t. 91.

Horminum hastatis amplioribus foliis, caulibus & pe-
diculis araneosa lanugine. *Pluk. alm.* 185. t. 301. f. 1

Habitat in Cap. b. spei, locis argillofis. ♀

- aurea. 26. SALVIA foliis subrotundis integerrimis: basi trun-
catis dentatis. *Hort. cliff.* 13. *Roy. lugdb.* 308.

Salvia africana frutescens, folio subrotundo glauc-
flore magno aureo. *Comm. hort.* 2. p. 183. t. 92.

Habitat ad Cap. b. spei juxta rivulos. ♀

- Sclarea, 27. SALVIA foliis rugosis cordatis oblongis villosis
serratis, bracteis floralibus calyce longioribus con-
cavis acuminatis. *Hort. cliff.* 12. *Hort. upf.* 10. *M.*
med. 15. *Roy. lugdb.* 309. *Dalib. paris.* 9.

Salvia foliis cordato-ovatis obscure undulatis, foliis
floralibus lanceolato-concavis. *Guett. stamp.* 263.

Horminum Sclarea dictum. *Bauh. pin.* 228.

Orvala. *Dod. pempt.* 292.

Habitat in Syria, Italia. ♂

- argentea. 28. SALVIA foliis oblongis dentato-angulatis lanatis
verticillis summis sterilibus, bracteis concavis.

Sclarea ficula, folio argenteo subrotundo. *Boerh. lugdb.*
1. p. 163.

Æthiopsis tota argentea cretica lanuginosa. *Cup. cat.*

Habitat in Creta. ♂

Media inter S. Sclaream & Æthiopem. Folia erosa
in sterili herba maxime tomentosa. Panicula mini-
brachiata, pubescens, viscosa, ramorum summita-
bus sterilibus, quasi spinosis. Bracteæ concave, mi-
nicæ. Corolla alba galea purpurascenti-pubescens
labio flavicante. Stylus corolla longior.

29. SALVIA foliis oblongis erosis lanatis, verticillis lanatis, bracteis recurvatis subspinosis. Æthiopia
 Salvia foliis lanceolatis sinuato-dentatis: floralibus verticillos comprimentibus. *Hort. cliff.* 13. *Roy. lugdb.* 308.
 Æthiopia foliis sinuosis. *Bauh. pin.* 241.
30. Æthiopia laciniatis foliis. *Barr. rar.* 24. t. 188.
31. Marum ægypticum. *Vest. alp.* 212. t. 212.
Habitat in Illyria, Græcia, Africa. ♂
Labium inferius antice coheret & saccum format.
32. SALVIA foliis rugosis pinnatifidis lanatis: verticillis summis sterilibus. ceratophylla
 Salvia foliis simplicibus dentato-pinnatis asperis. *Hort. cliff.* 13. *Roy. lugdb.* 308.
 Salvia foliis simplicibus dentato-pinnatis rugosis verrucosis. *Hort. upf.* 10.
 Horminum rugoso verrucosoque folio cornu cervi exprimente. *Pluk. alm.* 186. t. 194. f. 5. *Herm. parad.* 186. *Morif. hist.* 3. p. 393. f. 11. t. 13. f. 6.
Habitat in Persia. ♂
33. SALVIA foliis compositis pinnatis. *Hort. cliff.* 13. pinnata.
Roy. lugdb. 309.
 Salvia orientalis latifolia hirsutissima viscosa pinnata, flore & calyce purpureis, inodora. *Boerh. lugdb.* 1. p. 167. t. 167.
 Horminum arabicum, alatis foliis, flore rubello. *Pluk. alm.* 186. t. 164. f. 6.
Habitat in Oriente & Arabia.
34. SALVIA foliis cordatis inæqualiter basi excisis, caule subnudo, spicis ante florescentiam cernuis. nutans.
 Salvia foliis cordatis obtuse crenatis, spicis florum nutantibus. *Act. petrop.* 1747. p. 378. t. 14.
Habitat in Imperio Rutheno. 2
- COLLINSONIA.**
35. COLLINSONIA. *Hort. cliff.* 14. t. 5. *Cold. noveb.* 8. canadensis.
Kalm. it. 2. p. 317.
Habitat in Virginia, Canadæ sylvis. 2
- MORINA.**
36. MORINA. *Hort. cliff.* 14. *Roy. lugdb.* 236.
 Morina orientalis, carlinæ folio, *Tournef. cor.* 48. itin. persica.
 3. p. 132. t. 132.
Habitat in Persia ad Hispaham. 2

DIGYNIA.

ANTHOXANTHUM.

- odoratum. 1. ANTHOXANTHUM spica ovato-oblonga, flosculis subpedunculatis arista longioribus. Anthoxanthum flosculis diandris. *Hort. cliff.* 25. *Roy. Lugdb.* 58. Anthoxanthum. *Fl. suec.* 29. 33. *Dalib. paris.* 10. Gramen pratense, spica flavescente. *Bauh. pin.* 2. *Scheuchz. gram.* 88. *Habitat in Europæ pratis.* 2.
- indicum. 2. ANTHOXANTHUM spica lineari, flosculis sessilibus arista brevioribus. *Fl. zeyl.* 25. * *Habitat in India.*
- paniculatum. 3. ANTHOXANTHUM floribus paniculatis. *Amman acad.* 1. p. 145. Gramen sparteum, panicula flavescente. *Rubd. elys.* 1. f. 14. *Habitat in Europa australiore: ut in Horto Dei Monspelienfi.* Gramen in vivo ulterius examinandum iis, quibus ad est. *Facies est Anth. odorati. Calyces quadriflori Flores mutici.*

TRIGYNIA.

PIPER.

- nigrum. 1. PIPER foliis ovatis subseptemnerviis glabris, petiolis simplicissimis. *Fl. zeyl.* 26. * *Mat. med.* 26. Piper rotundum nigrum. *Bauh. pin.* 411. *Pluk. alt.* 297. t. 437. f. 1. *Moris. hist.* 3. p. 602. f. 15. t. 1. f. 1. Malago codi. *Rheed. mal.* 7. p. 23. t. 12. *Habitat in India.* 5
- Betele. 2. PIPER foliis ovatis oblongiusculis acuminatis septinerviis, petiolis bidentatis. *Fl. zeyl.* 27. * Piper qui Saururus foliis septinerviis oblongo-acuminatis. *Burm. zeyl.* 193. t. 82. f. 2. Betela codi. *Rheed. mal.* 7. p. 29. t. 15. *Habitat in India.* 5

- PIPER foliis ovatis acutiusculis subtus scabris: nervis quinque subtus elevatis. *Fl. zeyl.* 26. *
- Sirium. *Rumph. amb.* 5. p. 336. t. 116. f. 2.
- Amalago. *Rheed. mal.* 7. p. - - - t. 16.
- Habitat in India utraque.*
- PIPER foliis cordatis subseptinerviis venosis. *Fl. zeyl.* 29. *
- Siriboa. *Rumph. amb.* 5. p. 340. t. 117. f. 2.
- Betela, quem Sirii-boa vocant. *Bont. jav.* 91. t. 91.
- Habitat in India.*
- PIPER foliis cordatis petiolatis sessilibusque. *Fl. zeyl.* 30. * *Mat. med.* 20.
- Piper longum orientale. *Bauh. pin.* 412.
- Piper longum. *Rumph. amb.* 5. p. 333. t. 116. f. 2.
- Piper longum, pistolochiæ foliis absque pediculis, maderaspatanum. *Pluk. alm.* 297. t. 104. f. 4.
- Cattu-tirpali. *Rheed. mal.* 7. p. 27. t. 14.
- Habitat in India.*
- PIPER foliis lanceolato-ovatis quinquenerviis rugosis. *Amalago.*
- Piper longum arboreum altius, folio nervoso minore, spica gracili & brevior. *Sloan. hist.* 1. p. 134. t. 87. f. 1.
- Piper frutex, spica longa gracili. *Pluk. alm.* 297. t. 215. f. 2.
- Piper longum. *Rumph. amb.* 5. p. 233. t. 116. f. 1.
- Saururus foliis lanceolato-ovatis quinquenerviis rugosis. *Hort. cliff.* 140.
- Habitat in Jamaica.*
- PIPER foliis cordatis novem-nerviis reticulatis. *decumanum.*
- Saururus frutescens foliis plantagineis, fructu breviori. *Plum. amer.* 59. t. 76.
- Saururus decumanum. *Rumph. amb.* 5. p. 45. t. 27.
- Habitat in Indiis. †*
- Saururus nimis P. reticulato, ut fere; varietas.
- PIPER foliis cordatis septem-nerviis reticulatis. *reticulatum.*
- Saururus botryoides major arborefcens, foliis plantagineis. *Plum. amer.* 57. t. 75.
- Saururus laborandi *Marcgr. bras.* 37. *Pis. bras.* 97.
- Habitat in Martinica, Brasilia.*
- PIPER foliis ovato-lanceolatis: nervis alternis, spicis uncinatis. *aduncum.*
- Piper longum, folio nervoso pallide viridi, humilior. *Sloan. hist.* 1. p. 135. t. 87. f. 2.

Saururus foliis ovato lanceolatis : nervis alternis. *Hort. cliff.* 140. *Roy. lugdb.* 8.

Saururus arborescens, fructu adunco. *Plum. amer.* 58. t. 77.

Habitat in Jamaica.

pellucidum. 10. PIPER foliis cordatis petiolatis, caule herbaceo.
Piper foliis cordatis, caule procumbente. *Hort. cliff.* 6 t. 4. * *Roy. lugdb.* 8.

Saururus minor procumbens botrytis, folio cordato. *Plum. amer.* 54. t. 72.

Habitat in America calidiore. ☉

acuminatum 11. PIPER foliis lanceolato-ovatis nervosis carnofis.
Saururus alius humilis, folio carnofo & acuminato.
Plum. amer. 54. t. 71.

Habitat in America calidiore.

obtusifolium. 12. PIPER foliis obovatis enerviis.
Saururus humilis, folio carnofo subrotundo. *Plum. amer.* 53. t. 70.

Habitat in America calidiore.

rotundifolium. 13. PIPER foliis orbiculatis folitariis carnofis.
Saururus repens, folio orbiculari nummulariæ fac.
Plum. amer. 52. t. 69.

Piper longum minimum herbaceum scandens rotundifolium. *Sloan. jam.* 45. *hist.* 1. p. 137.

Habitat in America calidiore.

maculosum. 14. PIPER foliis peltatis ovatis.
Saururus hederaceus, caulibus maculosis, maj.
Plum. amer. 60. t. 66.

Habitat in Domingo.

peltatum. 15. PIPER foliis peltatis orbiculato-cordatis obtusifolius
pandis, spicis umbellatis.
Saururus arborescens, foliis amplis rotundis & umbellatis. *Plum. amer.* 56. t. 74.

Lomba. Rumph. amb. 6. p. 133. t. 59. f. 1.

Habitat in Indiis.

distachyon. 16. PIPER foliis ovatis, spicis conjugatis.
Saururus hederaceus, caulibus maculosis, min.
Plum. amer. 51. t. 67.

Habitat in America Gallia æquinoctiali.

PIPER foliis cordatis subrotundis acutis venosis, umbellaturâ
spicis umbellatis.

Saururus arborefcens, foliis amplis cordatis non um-
bolicatis. *Plum. amer.* 53. t. 73.

Habitat in Domingo.

PIPER foliis ternis subrotundis.

trifolium.

Saururus hederaceus triphyllus, folio rotundo. *Plum.*
amer. 52. t. 68.

Habitat in Americæ Gallia æquinoctiali.

PIPER foliis quaternis cuneiformibus sessilibus.

quadrifo-
lium.

Saururus repens tetraphyllus, folio crassiore. *Plum. ic.*
218 t. 242. f. 2.


Habitat in America meridionali.

PIPER foliis verticillatis ovatis trinerviis. *Amæn.*
acad. 5. p. 391. *

verticilla-
tum.

Saururus erectus minor, foliis orbiculatis verticillatis
tumentibus, spicis terminalibus. *Brown. jam.* 204.

Habitat in Jamaica. ☉



Classis III.

TRIANDRIA

MONOGYNIA.

VALERIANA.

- rubra.* 1. VALERIANA floribus monandris caudatis, foliis lanceolatis integerrimis. *Hort. cliff.* 15. *Hort.* 14. *Roy. lugdb.* 235. *Dalib. parif.* 12.
 Valeriana rubra. *Bauh. pin.* 165.
 Valeriana marina latifolia major rubra. *Morif. hist.* p. 102. f. 7. t. 14. f. 15.
- β. Valeriana rubra angustifolia. *Bauh. pin.* 165. *prodr.* *Bauh. hist.* 3. p. 211.
Habitat in Gallie, Helvetiæ, Italiæ, Orientis rudetis. 2.
- calcitrapa.* 2. VALERIANA floribus monandris, foliis pinnatis, *Hort. upf.* 14.
 Valeriana foliis pinnato-laciniatis, floribus monandris. *Virid. cliff.* 4. *Hort. cliff.* 16. *Roy. lugdb.* 235. *Samb. mon.p.* 275.
 Valeriana foliis calcitrapæ. *Bauh. pin.* 164. *Morif. hist.* 3. p. 101. f. 7. t. 14. f. 7.
 Valeriana sylvestris, foliis tenuissime divisis. *Bauh. pin.* 165.
 Valeriana annua s. æstiva. *Clus. hist.* 2. p. 54.
Habitat in Lusitania, oriente. ☉
- cornucopia* 3. VALERIANA floribus diandris ringentibus, foliis ovatis sessilibus. *Hort. cliff.* 15. *Hort. upf.* 13. *Roy. lugdb.* 235.
 Valeriana peregrina purpurea albave. *Bauh. pin.* 164. *prodr.* 87.
 Valeriana indica. *Clus. hist.* 2. p. 54.
 Pseudo-Valeriana cornucopioides annua purpurea. *Morif. hist.* 3. p. 104. f. 7. t. 16. f. 27.
Habitat in Americæ, Mauritanix, Siciliæ, Hispaniarvis. ☉
- dioica.* 4. VALERIANA floribus triandris dioicis, foliis pinnatis integerrimis.

- Valeriana dipica.* *It. xl.* 46. *Fl. suec.* 31. 35. *Dalib. paris.* 11.
- Valeriana*, foliis caulinis pinnatis, seu distincta. *Hort. cliff.* 16.
- Valeriana*, foliis caulinis pinnatis, polygama. *Vir. cliff.* 5. *Roy. lugdb.* 235.
- Valeriana palustris minor.* *Bauh. pin.* 164.
- Valeriana palustris inodora* parum laciniata. *Bauh. pin.* 86.
- Valeriana alpina minor.* *Bauh. pin.* 165. *prodr.* 87.
- Valeriana pratensis minor.* *Morif. umb. t. 10. d. e.*
- Habitat in Europæ & Orientis campis uliginosis.* 21
- VALERIANA** floribus triandris, foliis omnibus *officinalis.* pinnatis. *Mat. med.* 21. *Hort. cliff.* 15. *Fl. suec.* 30. 34. *Roy. lugdb.* 234. *Dalib. paris.* 11.
- Valeriana palustris major.* *Bauh. pin.* 164. *prodr.* 86.
- Valeriana sylvestris major.* *Bauh. pin.* 164. *Fl. lap.* 13.
- Valeriana sylvestris.* *Dod. pempt.* 349.
- Habitat in Europæ nemoribus paludosis.* 21
- VALERIANA** floribus triandris, foliis caulinis pin- *Phu.* natis; radicalibus indivisis. *Hort. ups.* 13. *Mat. med.* 22.
- Valeriana foliis infimis integris; proximis laciniatis; caulinis pinnatis.* *Hort. cliff.* 15. *Roy. lugdb.* 234.
- Valeriana hortensis.* *Bauh. pin.* 164.
- Habitat in Alsatia.* 21
- Caule non sulcato & foliolis exterioribus majoribus a V. officinali etiam differt.*
- VALERIANA** floribus triandris, foliis dentatis; radicalibus; cordatis; caulibus ternatis ovato-oblongis. *tripteris.*
- Valeriana floribus triandris, foliis radicalibus cordatis, foliis laciniatis.* *Sauv. monsp.* 276.
- Valeriana alpina prima.* *Bauh. pin.* 165. *prodr.* 86. t. 86.
- Valeriana alpina altera.* *Bauh. pin.* 165.
- Valeriana alpina minor, planta palmaris.* *Pluk. alm.* 30. t. 231. f. 7.
- Valeriana minima, planta uncialis.* *Pluk. alm.* 380. t. 231. f. 8.
- Habitat in alpibus Helvetiæ.*
- Fructus propria sunt diphylla, setacea.* 21
- VALERIANA** floribus triandris, foliis ovato-oblongis; subdentatis, caule simplici. *montana.*

- Valeriana foliis omnibus integris ex ovato-acumina-
leviter dentatis. *Hall. helv.* 664. *it.* 8.
- Valeriana montana, subrotundo folio. *Bauh. pin.*
- Valeriana alpina, scrophulariæ folio. *Bauh. pin.*
prodr. 87. *
- Nardo celticæ similis inodora. *Bauh. pin.* 165.
Habitat in alpihus Helveticis, Rhæticiis, Pyrenæis
- celtica, 9. VALERIANA floribus triandris, foliis ovato-
longis obtusis integerrimis. *Niat. med.* 23.
Valeriana foliis ovatis obtusis minime dentatis.
helv. 664.
Nardus ex apulia. *Bauh. pin.* 165.
Nardus celtica dioscoridis. *Bauh. pin.* 165.
Nardus celtica altera. *Bauh. pin.* 166.
Nardus celtica. *Bauh. hist.* 3. p. 205.
Spica celtica fastigio floſculorum ordine differet.
Cam. epit. 14.
Habitat in alpihus Helvetiæ, Valesiæ. 24
- tuberosa, 10. VALERIANA floribus triandris, foliis lanceo-
integerrimis: caulinis basi pinnatis.
Nardus montana, radice olivari. *Bauh. pin.* 165.
β. Nardus montana, radice oblonga. *Bauh. pin.* 166.
Nardus montana, longius radicata. *Cam. epit.* 16.
Habitat in Dalmatia, Sicilia, Galloprovincia. 24
- saxatilis, 11. VALERIANA floribus triandris, foliis subdent-
radicalibus ovatis, caulinis linearilanceolatis.
Valeriana alpina nardo celticæ similis. *Bauh. pin.*
Valeriana sylvestris alpina 2. saxatilis. *Clus. hist.*
56. *bona.*
Valeriana alpina nardo celticæ similis inodora.
alm. 380. *t.* 232. *f.* 2.
Nardo Celticæ similis inodora. *Bauh. pin.* 165.
38. *Burf. VIII.* 122.
Habitat in alpihus Siriæ, Auftriæ, Baldi, Monti
ni Italiæ. 24
- pyrenaica, 12. VALERIANA floribus triandris, foliis cau-
cordatis serratis petiolatis: summis ternatis.
cliff. 15. *Roy. lugdb.* 235. *Monnier obs.* 235.
Valeriana maxima pyrenaica, cacaliæ folio. *Tournef.*
inst. 131.
Valeriana canadensis. *Riv. mon.* 6.

Valeriana orientalis, aliarum folio, flore albo. *Buxb. cent. 2. p. 19. t. 11.*

Habitat in Pyrenæis ? 4

VALERIANA floribus triandris, foliis ternatis, caule scandente. *Læfl. it. 235. †*

Habitat in Cumana.

scandens.

VALERIANA floribus triandris, foliis omnibus cordatis repando-lobatis.

Chinensis.

Habitat in China. Osbeck.

Caules herbacei, erecti, plus quam pedales, ramis floriferis oppositis. Folia opposita, petiolata, glabra, cordata, acuta, lobis lateralibus utrinque binis obtusis. Rami & caules terminati umbellulis involucello cinctis. Semina nuda.

VALERIANA floribus triandris regularibus, foliis dentatis, fructibus linearibus tridentatis: extimo majore recurvo.

echinata.

Valeriana foliis dentato-ferratis, pedunculis conicis, seminibus tridentatis. Sauv. monsp. 130.

Valerianella echinata. Bauh. pin. 165.

Valerianella cornucopioides echinata. Colum. ecphr. 1. p. 1. 204. t. 206.

Habitat in Italia & Monspelii umbrosis. Sauvages. ☉

*Caulis dichotomus. Folia lanceolata, sessilia, obtusa, dentata. Flores e dichotomia, solitarii, sessiles. Fructus linearis, apice tridentatus: dente exteriori majore recurvo. Corolla infundibuliformis, regularis, quinquefida, alba. Stigma trifidum. Summi flores in spicas dichotomas, coadunatas, obtusas, bracteis & pedunculis incrassatas digesti; tamquam ex *V. Locusta* matre & *V. cornucopioides* patre prognata esset.*

VALERIANA floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. *Fl. sec. 32. 36. Hort. ups. 14. Dab. paris. 12.*

Locusta.

Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis integris. Vir. cliff. 5.

Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis integris, fructu simplici. Hort. cliff. 16. Roy. lugdb. 235.

olitoria.

Valeriana campestris inodora major. Bauh. pin. 165.

Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis ferratis, calycibus inflatis. Hort. cliff. 16. Roy. lugdb. 235.

mexicana.

- Valeriana cretica, fructu vesicario. *Tournef. cor-Boerh. lugdb. 1. p. 75. t. 75.*
- coronata.* γ. Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis dentatis, fructu sexdentato. *Hort. cliff. 16. Roy. lugdb. 235.*
- Valeriana semine stellato. *Bauh. pin. 165.*
- Valerianella altera tenuifolia semine scabiosæ stellato. *Column. ecphr. 1. p. 207. t. 209.*
- dentata.* δ. Valeriana caule dichotomo, foliis oblongis subferratis, seminis corona tridentata. *Hall. helv. 656. lib. parif. 12.*
- radiata.* ε. Valeriana caule dichotomo, capitulis terminalibus involucro cinctis. *Gron. virg. 10.*
- Valeriana marilandica, foliis oblongis obtusis. *suppl. 3. p. 244.*
- descoidea.* ζ. Pseudo-Valeriana annua, semine coronato, marilandica. *Morif. hist. 3. p. 104. f. 7. t. 16. f. 29.*
- Habitat a. in Europæ, b. Cretæ, γ. Lusitaniæ, δ. Europæ australioris, ε. Marilandicæ arvis.* ☉
- mixta.* 17. VALERIANA floribus triandris, caule quadrifido, foliis imis bipinnatifidis, seminis pappo plumoso. *Sauv. monsp. 275. †*
- Valerianella semine umbilicato hirsuto minore. *M. umb.*
- Habitat Monspeli.*
- fibrica.* 18. VALERIANA floribus tetrandris æqualibus, foliis bipinnatifidis, seminibus paleæ ovali adnatis. *H. upf. 13.*
- Valeriana lutea humilis. *Amm. ruth. 18. n. 25. t. 2.*
- β. Anonymus cheusanensis, sideritidis folio, fructu samaris haud absimili. *Pluck. alm. 16. t. 443. f. 1.*
- Habitat in Sibiricæ campis.* ☉

O L A X.

- zeylanica.* 1. OLAX. *Fl. zeyl. 34. * Amæn. acad. 1. p. 387.*
- Arbor stercorearia zeylanica glandifera. *Burm. zeyl. 1. p. 100. t. 10.*
- Habitat in Zeylona.* †

TAMARINDUS.

- indica.* 1. TAMARINDUS. *Hort. cliff. 18. Mat. med. Hort. upf. 15. Fl. zeyl. 14. Roy. lugdb. 465. R. amb. 2. p. 90. t. 23. Læff. it. 210.*
- Siliqua arabica, quæ Tamarindus. *Bauh. pin. 405.*
- Balam

Balam-puli. *Rheed. mal.* 1. p. 39. t. 23.

Habitat in India, America, Ægypto, Arabia. †

RUMPHIA.

RUMPHIA.

Myxa pyriformis, officulo trispermo. *Raj. hist.* 1556. amboinenfis

Tsiem-tani. *Rheed. mal.* 4. p. 25. t. 11.

Habitat in India. †

CNEORUM.

CNEORUM. *Hort. cliff.* 18. *Roy. lugdb.* 119.

tricoccum.

Chamælea tricoccus. *Bauh. pin.* 462.

Chamælea. *Cam epit.* 973.

Habitat in Hispaniæ, Narbonæ glareosis. †

CAMOCLADIA.

CAMOCLADIA foliolis integris. *Jacq. amer.* 12. integrifolia.

Camocladia caudice simplici, floribus confertis sessilibus, racemis alaribus. *Brow. jam.* 124

Prunus racemosa, caudice non ramoso, alato fraxini folio non crenato, fructu rubro subdulci. *Sloan. jam.*

184. *hist.* 2. p. 131. t. 222. f. 1. *Raj. dendr.* 44.

Habitat in America calidiore. †

CAMOCLADIA foliolis spinoso - dentatis. *Jacq.* dentata.

amer. 12.

Habitat in America meridionali. †

MELOTHRIA.

MELOTHRIA. *Hort. cliff.* 490. * *Hort. upf.* 15.

pendula.

Gron. virg. 10. *Roy. lugdb.* 528.

Cucumis parva repens virginiana, fructu minimo.

Pluk. alm. 123. t. 85. f. 5

Cucumis minima, fructu ovali nigro lævi. *Sloan. hist.*

1. p. 227. t. 142. f. 1.

Bryonia, oliuæ fructu, minor. *Plum. spec.* 3. ic. 66.

f. 2.

Habitat in Canada, Virginia, Jamaica. ☉

meis plantis horti nunquam flores masculi.

ORTEGIA.

ORTEGIA. *Læfl. it.* 112 *

hispanica.

Ortegia linitolia aspera. *Bauh. pin.* 333. *Raj. hist.* 1033.

Juncaria salmantica. *Clus. hist.* 1. p. 174.

Habitat in Castilia, Bætica, Salmantica.

Linnei spec. plant. P. 1.

D

1. LOEF-

Habitat ad Cap. b. spei. 2

Flores albi filamentis & pistillis violaceis. Stylum inter tripartitum stamina eriguntur, quasi Styli exteriores essent. Folia angusta, levia. Spicæ multifloræ, præter terminalem, etiam nonnullæ inferius, alternæ.

scillaridis.

7. IXIA foliis ensiformibus striatis, spica elongata.

Habitat ad Cap. b. spei. 2

Flores violaceæ ut in *Scilla amæna*, antheris flavis, alternis, remotis.

elocata.

8. IXIA foliis ensiformibus, floribus alternis, petalis basi hyalina macula.

Ixia foliis gladiatis glabris, floribus corymbosis terminalibus. *Mill. ic.* 156. f. 1.

Sisyrinchium majus afric. flore luteo macula notata *Old. afr.* 32.

Habitat ad Cap. b. spei. 2

Flores crocei in spica secunda rariore. Petala obovata basi hyalina, & ad unguem macula oblonga flava.

chinensis.

9. IXIA foliis ensiformibus, floribus remotis, panicula dichotoma, floribus pedunculatis. *Hort. upf.* 16.

Bermudiana radice carnosa, floribus maculatis, semibus pulpa obductis. *Amm. act. petrop. XI. p.* 308. t. 7.

Bermudiana iridis folio majori, flore croceo eleganter punctato. *Kraus. hort.* 25. t. 25.

Balemcanda - Schularmandi. *Rheed. mal.* 11. p. 71. t. 37.

Habitat in India. 2

Flores flavi maculis sanguineis. Stylus inclinatus.

GLADIOLUS.

communis. 1. GLADIOLUS foliis ensiformibus, floribus distantibus.

Gladiolus foliis ensiformibus. *Hort. cliff.* 20. *Hort. upf.* 16.

Gladiolus caule simplicissimo, foliis ensiformibus. *Roij. lugdb.* 19.

Gladiolus. *Riv. mon.* 163.

Habitat in Europa australi. 2

imbricatus. 2. GLADIOLUS foliis ensiformibus, floribus imbricatis.

Habitat in Russia citeriore. 2.

Flores parvi versus unum latus imbricati.

3. GLA-

4. **GLADIOLUS** foliis linearibus, caule simplicissimo, floribus spicatis. *Roy. lugdb.* 19. *Habitat in Africa.* 2. spicatus.
5. **GLADIOLUS** foliis ensiformibus, petalis lateralibus latissimis. *Amæn. acad.* 6. *afric.* 2. * *Sisyrinchium viperarum.* *Pluk. phyt.* 224. f. 8. *Habitat ad Cap. b. spei.* 2. alatus.
6. **GLADIOLUS** foliis ensiformibus plicatis villosis, scapo laterali, corollis regularibus. *Ixia plicata.* *Amæn. acad.* 4. p. 300. * *absque synonymo.* *Mill. ic.* 155. f. 1. *Sisyrinchium latifolium*, floribus patentibus vix difformibus. *Breyn. prod.* 3. p. 22. t. 9. f. 2. *Habitat in Æthiopia.* 2. *Bulbus tunicatus.* Folia ensiformia, villosa, secundum nervos plicata. Scapus lateralis floribus 2. f. 3. violaceo-albis regularibus. Bractæ ternæ, angustæ: exteriore majore. plicatus.
7. **GLADIOLUS** foliis lineari-cruciatis, corollis campanulatis. *Gladiolus bifolius & biflorus*, foliis quadrangulis. *Trew. chret.* t. 39. *Habitat in Æthiopia.* 2. Folia singularia, subensiformia, sed utroque latere carinata carina elevata, obtusissima, ut fere quadrangulo-cruciata; variat a caule bifloro ad multiflorum & tum foliis rite ensiformibus. Corolla colore tristi, campanulata, sed æstivatione omnino Gladioli. tristis.
8. **GLADIOLUS** foliis linearibus, floribus distantibus, corollarum tubo limbis longiore. *Mill. ic.* 142. f. 2. *Gladiolus caule simplicissimo*, foliis linearibus, floribus alternis. *Roy. lugdb.* 19. *Gladiolus foliis linearibus.* *Hort. cliff.* 20. * t. 6. *Habitat in Africa.* 2. angustus.
9. **GLADIOLUS** caule ramoso, foliis linearibus. *Roy. lugdb.* 19. *Habitat in Africa.* 2. ramosus.
10. **GLADIOLUS** caule ramoso, capitulis pedunculatis, radice tuberosa. *Habitat in Africa.* 2. *Planta est maxima; floribus cæruleis.* capitatus.

- alopeuroi- 10. **GLADIOLUS** foliis linearibus, spica distica im-
des. bricata, *Amen. acad.* 4. 301. *
Habitat in Æthiopia.
*Spica ut in Plantagine obtecta floribus parvis numerosis
simis, sed disticha.*

ANTHOLYZA.

- ringens. 1. **ANTHOLYZA** corollæ labiis divaricatis fauce con-
pressa.
Antholyza stamine unico declinato. Sp. pl. 1. p. 37.
*Gladiolo æthiopico similis planta angustifolia. Comm
hort. 1. t. 41. Rudb. elyf. 2. p. 237. f. 15.*
*Gladiolus floridus rictum referens coccineus: suprem
lacinia erecta & fistulosa. Breyn. ic. 21. t. 8. f. 1.*
Habitat in Æthiopia. 2.
- Cunonia. 3. **ANTHOLYZA** corollis rectis: labii quinquepartit
lobis duobus extimis latioribus adscendentibus. *Mill
ic. 113.*
*Cunonia floribus sessilibus, spathis maximis. Butta
cun. 211. t. 1.*
Habitat in Persia. 2.
*Corollæ Labium superius longissimum, obtusum, con
volutum; inferius 5-partitum; Lacinis 3. interme
diis minutissimis; lateralibus vero latis, labio supe
riore dimidio brevioribus. Spica longa, disticha.*
- æthiopica. 3. **ANTHOLYZA** corollis incurvatis; labii quinque
partiti lobis duobus alternis patulis majoribus lanceo
latis.
*Gladiolus æthiopicus, flore coccineo. Corn. canad. 79
t. 79. Moris. hist. 2. p. 421. f. 4. t. 23. f. 1. Rudb
elyf. 2. p. 236. f. 14.*
*Hyacinthus africanus, foliis colchici floribus coccineis
Pluk phyt. 195. f. 2.*
Habitat in Æthiopia. 2.
*Corolla tubulosa, coccinea: Labio superiore maximo,
lanceolato; inferiore 5-partito: labiis lanceolatis bre
vibus: tribus alternis brevissimis. Hæc cum antec
dente Gladiolis valde affinis.*
- Meriana. 4. **ANTHOLYZA** floribus infundibuliformibus subæ
qualibus.
Meriana flore rubello. Trew. chret. t. 40.
Habitat ad Cap. b. spei? 2.

Flores rubri: corolla Polianthis, supera, æstivatione
Gladioli. Folia ensiformia.

I R I S.

* *Barbatæ nectariis petalorum reflexorum*

1. IRIS corolla barbata, caulis foliis longiore unifloro. fusiana.
Hort. cliff. 18. *Roy. lugdb.* 17.

Iris fusiana, flore maximo ex albo nigricante. *Bauh.*
pin. 31. *theatr.* 579. *Morif. hist.* 2. p. 351. f. 4. t. 6.
f. 6.

Iris latifolia major. *Clus. hist.* 1. p. 217.

Habitat in Oriente; venit Constantinopoli in Belgium
1573. 24

Caulis teres; Germen trigono-teretiufculum; Petala 3
interiora majora reflexa.

2. IRIS corollis barbatis, caule foliis altiore subbifloro, florentina.
floribus sessilibus. *Mill. ic.* 154.

Iris alba florentina. *Bauh. pin.* 31.

Iris flore alba germanica. *Bauh. pin.* 31.

Iris flore albo. *Raj. hist.* 1180.

Habitat in Europa australi-Carniola. 24

Simillima J. Germanicæ ut vix differat, sed Corolla al-
ba petalis integris: inferioribus marginum basi reflex-
is; superioribus magis erectis. Stigmata magis ere-
cta & parum serrata.

3. IRIS corollis barbatis, caule foliis longiore multifloro germanica.
floribus inferioribus pedunculatis. *Hort. cliff.* 18.

Hort. ups. 16. *Nat. med.* 24. *Roy. lugd.* 17.

Iris vulgaris germanica s. sylvestris. *Bauh. pin.* 30.

Habitat in Germaniæ editis. 24

Petala inferiora plana; interiora integerrima, nec emar-
ginata.

4. IRIS corollis barbatis, caule foliis altiore multifloro, sambucina.
petalis deflexis planis: erectis emarginatis.

Iris latifolia germanica, sambuci odore. *Bauh. pin.* 31.

Iris major latifolia VIII. *Clus. hist.* 1. p. 219.

Habitat in Europa australi. 24

Simillimæ J. Germanicæ, sed deflexa petala saturatius
violacea, plana quidem at subemarginata. Erecta
pallide, saturatius tamen, cærulea & emarginata.
Stigmata serrata, acutufcula, carinæ cærulescente.

squalens.

5. IRIS corollis barbatis, caule foliis altiore multifloro petalis deflexis replicatis; erectis emarginatis. Iris folio lato rugoso, petalis repandis ex purpureo siccido pallido & luteo variis, erectis vero squalide tescentibus. *Boerh. lugdb. 2. p. 125.*

Habitat in Europa australi. 2.

Simillima I. germanicæ, sed Petala deflexa in medio plicata, saturatius violacea venis albis flavescentibus in medio cæruleis. Erecta petala, uti Stigmata squalide flava, valde emarginata.

aphylla.

6. IRIS corollis barbatis, scapo nudo longitudine foliorum multifloro. *Roy. lugdb. 17.*

Iris latifolia, caule aphylo. Bauh. pin. 32.

Habitat in - - - - 2.

variegata.

7. IRIS corollis barbatis, caule subfolioso longitudine foliorum multifloro. *Roy. lugdb. 17, Hort. upf. 16.*
Iris corollis barbatis, foliis altitudine caulis multifloro. *Hort. cliff. 19.*

Iris latifolia panonica, colore multiplici. Bauh. pin. 32.

Iris lutea variegata. Lob. hist. 34. Ehret, pict. t. 10. f. 10.

Habitat in Hungaria. 2.

biflora.

8. IRIS corollis barbatis, caule foliis brevioribus trifloro. *Hort. upf. 17.*

Iris corollis barbatis, foliis caulem multiflorum superantibus. Hort. cliff. 19. Roy. lugdb. 17.

Iris latifolia biflora. Besl. syst. vern. 114.

Chamæiris major saturate purpurea biflora. Bauh. pin. 33.

Habitat in Lusitanicæ rupibus. 2.

pamila.

9. IRIS corollis barbatis, caule foliis brevioribus unifloro. Iris corollis barbatis, foliis caulem uniflorum superantibus. *Hort. cliff. 19. Roy. lugdb. 17.*

Chamæiris minor, flore purpureo. Bauh. pin. 33.

Chamæiris latifolia minor. 1. 2. Clus. hist. 1. p. 225.

β. Chamæiris minor, flore purpureo cæruleo. Bauh. pin. 33.

γ. Chamæiris minor, flore rubello. Bauh. pin. 33.

δ. Chamæiris flore pallido & albo. Bauh. pin. 33.

ε. Chamæiris minor, flore variegato. Bauh. pin. 34.

Habitat in Austriæ, Pannonicæ collibus apricis. 2.

* * Imberbes : petalis deflexis lævibus.

Pseud-Aco-

10. IRIS corollis imberbibus; petalis interioribus stigmatibus.

rus.

mi-

minoribus, foliis ensiformibus. *Hort. cliff.* 19. *Fl. succ.* 33. 37. *Mat. med.* 25.

Acorus adulterinus. *Bauh. pin.* 34. *theatr.* 634.

Acorum falsum. *Cam. epit.* 6.

Habitat in Europa ad ripas paludum, fossarum. 24

Petala exteriora utrinque ad filamenta dentem exe-
runt. Germen trigonum angulis sulco bifidis.

IRIS corollis imberbibus, petalis interioribus paten- foetidissima.
tissimis, caule uniangulato, foliis ensiformibus. *Hort.*

cliff. 19. *Roy. lugdb.* 18. *Dalib. paris.* 13. *Sauv.*
monsp. 41.

Gladiolus foetidus. *Bauh. pin.* 30.

Spathula foetida, Xyris. *Bauh. hist.* 2. p. 731. *Dod.*
pempt. 247

Habitat in Gallia, Anglia, Hetruria. 24

Caulis teres, hinc angulatus, longitudine foliorum,
obtectus Foliis foetidissimis. Germen trigonum an-
gulis sulco bifidis. Corolla caerulecenti-tristis in-
gratissimi coloris, nec noctu odora. Petala exteriora
angue subtus plieis rugoso; Petala interiora stigmatum
majora, patentia.

IRIS corollis imberbibus, germinibus trigonis, caule sibirica.
tereti, foliis linearibus. *Hort. cliff.* 19. *Hort. upf.* 17.

Roy. lugdb. 78. *Hall. helv.* 280. *Gmel. sibir.* 1. p. 28.

Iris pratensis angustifolia non foetida altior. *Bauh. pin.*
32. theatr. 597.

Iris angustifolia 2. Clus. hist. 1. p. 227.

Habitat in Austriae, Helvetiae, Sibiriae pratis. 24

Spatha in I. sibirica & versicolore aridae s. scariosae
sunt. Huic caulis foliis altior; petala interiora erecta.

Germen trigonum angulis non sulcatum.

IRIS corollis imberbibus, germinibus subtrigonis, versicolor.
caule tereti flexuoso, foliis ensiformibus.

Iris americana versicolor, stylo crenato. *Dill. elth.*
188. t. 155. f. 188.

Iris americana versicolor, stylo non crenato. *Dill.*
elth. 187. t. 155. f. 187.

Iris latifolia virginiana, florum petalis repandis purpu-
reis. *Ehret. pict.* t. 6. f. 2.

Habitat in Virginia, Marilandia, Pensylvania. 24.

Caulis foliis non altior. Folia ad alterum latus incli-
nantia. Petala interiora longitudine stigmatum. Sti-
gmata linearia.

- virginica. 14. IRIS corollis imberbibus, germinibus trigonis, caule ancipiti. *Gron. virg.* 11.
Habitat in Virginia. 24
- martinicensis. 15. IRIS corollis imberbibus, germinibus trigonis, pediculis basi foveolis glandulosis. *Jacqu. amer.* 12.
Xiphion flore e luteo nigricante. *Plum. spec.* 8.
260. t. 261. f. 1.
Habitat in Martinica. 24
- spuria. 16. IRIS corollis imberbibus, germinibus sexangulis, caule tereti, foliis sublinearibus. *Hort. cliff.*
Hort. upf. 17. *Roy. lugdb.* 16.
Iris pratensis angustifolia, folio foetido. *Bauh. pin.*
Iris angustifolia 1. *Clus. hist.* 1. p. 228.
Habitat in Germaniæ pratis. 24
- graminea. 17. IRIS corollis imberbibus, germinibus sexangulis, caule ancipiti, foliis linearibus. *Hort. cliff.*
Hort. upf. 17. *Roy. lugdb.* 18.
Iris angustifolia prunum redolens minor. *Bauh. pin.*
Iris angustifolia 3. *Clus. hist.* 1. p. 230.
Habitat in Austria ad radices montium. 24
- verna. 18. IRIS corollis imberbibus, caule unifloro foliis brevibus, radice fibrosa. *Gron. virg.* 10.
Iris virginiana pumila s. Chamæiris verna angustifolia, flore purpureo-cæruleo odorato. *Pluk. alm.* 196.
196. f. 6.
Habitat in Virginia. 24
- tuberosa. 19. IRIS corollis imberbibus, foliis tetragonis. *Hort. cliff.* 6. *Hort. cliff.* 20. *Mat. med.* 25. *Roy. lugdb.*
Iris tuberosa, folio anguloso. *Bauh. pin.* 40. *Mart. hist.* 2. p. 348. t. 5. f. 1.
Hermodyctylus folio quadrangulo. *Tournef. cor.* 50.
Habitat in Arabia & Oriente. 24
- Xiphium. 20. IRIS corollis imberbibus, floribus binis, foliis fusco-latis canaliculatis caule brevioribus. *Hort. upf.* 17.
Iris foliis margine conniventibus, corollis imberbibus. *Hort. cliff.* 20
Iris caulescens, foliis margine conniventibus, corollis imberbibus. *Roy. lugdb.* 18.
Iris bulbosa latifolia, caule donata. *Bauh. pin.* 38.
13. Iris bulbosa cæruleo-violacea. *Bauh. pin.* 40.
Habitat in Hispania 24

S corolla imberbi : petalis interioribus patentiffimis ferratis, foliis subulato-canalicultatis caule longioribus.

perfica.

S acaulis, foliis margine conniventibus, corollis imberbibus. *Roy. lugdb.* 18.

S perfica martia. *Rudb. elys.* 2. p. 10. f. 9.

S perfica bulbosa variegata præcox. *Dodart. mem.* 83.

Xiphion perficum præcox, flore variegato. *Tournef. inf.* 363.

Habitat in Persia. 2.

Bulbus exserit Gemmam e duobus paribus squamarum, intra quæ folia & flos unicus spatha simplici. Petala interiora brevissima.

IRI S corollis imberbibus, foliis canaliculatis, bulbis geminis superimpositis.

Sisyrinchium.

Sisyrinchium majus. *Bauh. pin.* 40. *Clus. hist.* 1. p. 216.

Sisyrinchium medium. *Bauh. pin.* 41.

Sisyrinchium minus. *Clus. hist.* 1. p. 216.

Habitat in Hispania, Lusitania. 2.

Flore est petalorum purpureo macula lutea loco barbe; bulbis (non tunicatis simplicibus ut in bulbosis Xiphiis 20. 21., sed) ex gemino bulbo altero alteri imposito, ut in Gladiolo, Croco.

MORÆA.

MORÆA foliis canaliculatis. *Mill. dict.*

vegeta.

Habitat in Africa. 2.

MORÆA foliis subulatis. *Mill. dict.*

juncea.

Habitat in Africa. 2.

WACHENDORFIA.

WACHENDORFIA scapo simplici.

thyrsiflora.

Wachendorfia foliis laceolatis quinquenerviis canaliculo-plicatis, floribus in thyrsum collectis. *Burm.*

monogr. 2. f. 2.

Habitat ad Cap. b. Spei. 2.

WACHENDORFIA scapo polytachyo.

paniculara.

Wachendorfia foliis ensiformibus trinerviis, floribus paniculatis. *Burm. monopr.* 4. f. 1.

Sisyrinchium ramosum æthiopicum. *Breyn. cent.* 85. t.

37? *Rudb. elys.* 2. p. 13. f. 10?

Aspho-

Asphodelus latifolius, floribus patulis. *Breyn. prod.*
p. 22. t. 9. f. 1.
Habitat ad Cap. b. spei. 2

COMMELINA.

* *Dipetala distæ.*

- communis. 1. **COMMELINA** corollis inæqualibus, foliis ovato-lanceolatis acutis, caule repente glabro. *upf. 18.*
Commelina foliis ovato-lanceolatis, caule procul-
te glabro, petalis duobus majoribus, Virid. c.
Hort. cliff. 21. Roy. lugdb. 17. Gron. virg. 130.
Commelina procumbens annua, saponariæ folio.
elth. 93. t. 78. f. 89.
Habitat in America. ☉
Confer Plantam Kæmpf. jap. t. 889. cum Tinctura
paranda. Caulis ramosus. Foliorum margines
imberbes.
- africana. 2. **COMMELINA** corollis inæqualibus, foliis lanceolatis glabris, caule decumbente.
Commelina radice perenni, foliis lanceolatis,
repente glabro, petalis duobus majoribus.
ultr. 323.
Commelina procumbens, flore luteo. Roy. lugdb.
Habitat in Æthiopia. 21.
Differt a prima petalis istis majoribus reniformibus
tertio ovato filamentis longioribus æquali, vagin-
liorum ciliatis, involucre non reticulato. Vagin-
liorum subciliatæ vagina alia minima intra exteri-
- benghalensis. 3. **COMMELINA** corollis inæqualibus, foliis ovatis obtusis, caule repente.
Ephemerum benghalense serpens, folio subrotundo
brevi, phalangoides. Pluk. alm. 130. t. 27. f. 3.
Habitat in Benghala.
- erecta. 4. **COMMELINA** corollis inæqualibus, foliis ovato-lanceolatis, caule erecto scabro simplicissimo. *upf. 18.*
Commelina foliis ovato lanceolatis, caule erecto
scabro, petalis duobus majoribus. Virid. cliff.
Hort. cliff. 495. Gron. virg. 11. Roy. lugdb. 38.

Commelina erecta, ampliore subcæruleo flore. *Dill. elth.* 94 p. 77. t. 88.
Habitat in Virginia. 24

* * *Tripetala* : *Zanonie* Pl.

COMMELINA corollis subæqualibus, foliis lanceolatis subpetiolatis ore barbatis, caulibus erectis. virginica.

Ephemerum phalangoides virginianum majus erectum.

Pluk. alm. 135. t. 174. f. 4.

Habitat in Virginia. 24

Caulis erecti, simplices, læves, bipedales. Folia subpetiolata, lanceolata, supra retrorsum scabra: vaginis nervosis, subpubescentibus; ore ciliatis s. barbatis pilis ferrugineis. Spathæ terminales, subcordatæ. Flores cærulei, Petalis cordatis, integerrimis: inferiore brevius pedicellato.

COMMELINA corollis æqualibus, foliis sessilibus, ovato-lanceolatis subciliatis. *Hort. upf.* 18. tuberosa.

Commelina foliis ovato-lanceolatis, petalis tribus majoribus æqualibus. *Hort. cliff.* 21. *Roy. lugdb.* 38.

Commelina radice anacampserotides. *Dill. elth.* 94. t. 79. f. 90.

Habitat in Mexico. 24

COMMELINA corollis æqualibus, pedunculis incrassatis, foliis lanceolatis: vaginis laxis margine hirsutis, bracteis geminis. Zanonie.

Zanonie graminea perfoliata. *Plum. gen.* 38.

Triclymenum rectum herbaceum, gentianæ folio, folii pediculo caulem ambiente. *Sloan. jam.* 115. *hist.*

Fl. p. 243. t. 147. f. 1.

Habitat in Americæ Gallia æquinoctiali.

Florum vagina latissimæ & a caule distantes, margine hirsutæ. Bractæ duæ lanceolatæ oppositæ.

COMMELINA corollis æqualibus, pedunculis capillaribus, foliis lineari-lanceolatis, involucro nullo. *Fl. Zeyl.* 31. nudiflora.

Ephemerum phalangoides maderaspathense minimum, foliis perangustis, perfoliatum. *Pluk. alm.* 135. t.

27. f. 4.

Habitat in India.

COMMELINA corollis æqualibus, floribus sessilibus, foliis linearibus. axillaris.

Ephemerum phalangoides maderaspatanum minim
secundum caulem quasi ex utriculis floridum. *F*
alm. 135. t. 174. f. 3.

Ephemerum malabaricum, flore tripetalo in folio
alis sessili. *Raj. suppl.* 567.

Nir-pulli. *Rheed. mal.* 10. p. 28. t. 113.
Habitat in India.

cristata. 10. **COMMELINA** corollis æqualibus, involucris
catim imbricatis. *Fl. zeyl.* 32.

Ephemerum zeylanicum procumbens inflatum. *H*
parad. 148. *Raj. hist.* 566.

Habitat in Zeylona.

CALLISIA.

repens. **CALLISIA**, *Loefl. it.* 305. *

Hapalanthus repens. *Jacq. amer.* 12.

Habitat in Americæ meridionalis udis depressis
brofis. ☉

Affinis Commeline sed Nectariis destituta.

XYRIS.

indica. 1. **XYRIS.**

Xyris foliis gladiatis. *Gron. virg.* 11. *Flor. zeyl.*

Gladiolo lacustri accedens malabarica, e capitulo
tryoideo florifera. *Pluk. alm.* 170. t. 416. f. 4.

Gramen junceum brasilianum, capite ovali squa-
so florido. *Morif. hist.* 3. p. 229. f. 8. t. 9. 1.

Jupicai Pis. bras. 238.

Katsjiletri-pullo. *Rheed. mal.* 9. p. 139. t. 7.

Habitat in Indiis.

SCHOENUS.

* *Culmo tereti.*

Mariscus. 1. **SCHOENUS** culmo tereti, foliis margine dorso
* aculeatis. *Fl. svec.* 35. 38. *it. gotl.* 170. * *Dalib.*

14.

Pseudo-cyperus palustris, foliis & carina fern-
Scheuchz. gram. 375.

Cyperus longus inodorus germanicus. *Bauh. pin.* 1.

Cyperus longus inodorus major, foliis & carina-
ratis. *Morif. hist.* 3. p. 237. f. 8. t. 11. f. 24.

Habitat in Europæ paludibus. 24.

SCHOENUS culmo tereti ramofo, capitulis terminalibus, involucro triphylo breviffimo rigido patente *Loef. it. 114.* * aculeatus.

Gramen album, capitulis aculeatis, italicum. *Bauh. pin. 7. theatr. 108. Scheuch. gram. 85. Morif. hift. 3. p. 195. f. 8. t. 5. f. 3.*

Gramen fpicatum, fpicis in capitulum foliatum congestis. *Tournef. infl. 517.*

Gramen aculeatum. *Cam. epit. 745.*

Habitat in Italia, Narbona, Lufitania, Archipelagi infulis. 2.

SCHOENUS culmo tereti nudo, fpicis fasciculatis mucronatus. divaricatis, involucro triphylo fubulato.

Melanofchoenus maritimus humilis, cyperi effigie. *Mich. gen. 46.*

Cyperus culmo tereti, foliis tribus patulis fofculisque aggestis terminato. *Sauv. monf. 9.*

Cyperus maritimus, capite glomerato. *Tournef. infl. 46. Scheuchz. gram. 367.*

Gramen Cyperoides maritimum. *Bauh. pin. 6. theatr. 91.*

Gramen junceum maritimum, capite squamoflo foliaceo. *Morif. hift. 3. p. 227. f. 8. t. 9. f. 6.*

Habitat in Tyrreni, Smyrnæ, Hifpaniæ, G. Narbonenfis maritimis arenofis. 2.

Folia etiam involucris apice pungunt. Spicæ oblongæ, fefiles, apicibus diftantes; Involucrum triphyllum, intermedium diphyllum.

SCHOENUS culmo tereti, fpathis alternis mucronatis paniculas involventibus, fpicis alternis patentibus. fpathaceus

Cyperus ferrugineus. *Sp. pl. 44.*

Cyperus racemis fimplicibus lateralibus folitariis diftichis, fpicis alternis patentibus. *Gron. virg. 131.*

Gramen junceum elatius, caule articulato, virginianum, cyperi paniculis inter folia prope fummitem prodeuntibus. *Pluk. alm. 179. t. 301. f. 1.*

Gramen fluviale geniculatum, panicula foliacea, loculis tenuibus oblongis, virginianum. *Morif. hift. 2. p. 183. f. 8. t. 3. f. 17.*

Habitat in Virginia, Cap. b. fpei. 2.

Magnitudo Sa. chari. Spathæ magnæ, monophyllæ, alternæ, deciduæ, racemos floriferos involvunt.

nigricans. 5. **SCHOENUS** culmo tereti nudo, capitulo involucri diphylli valvula altera subulata longisve 36. 39. * *It. gotl.* 234. *Dalib. paris.* 113. *Scirpus flosculus spicatis Afl. stockh.* 1741. p. 18. *Juncus lævis minor, panicula glomerata nigr.* *Morif. hist.* 3. p. 233. f. 8. t. 10. f. 28. *Juncus lithospermi femine. Magn. monf.* 145. t. *Junco affinis capitulo glomerato nigricante. S gram.* 349.

Habitat in Europæ paludibus æstate exsiccatis. 2.

ferrugineus. 6. **SCHOENUS** culmo tereti nudo, spica duplici involucri valvula majore spicam æquante. *F.* 37. 40. *

Gramen Cyperoides minimum, caryophylli per capitulo simplici squamato. Morif. hist. 3. p. 8. t. 12. f. 40.

Juncello accedens graminifolia plantula, capitulum meriæ prolifera. Raj. angl. 4. p. 32.

Habitat in Gotlandiæ, Angliæ paludibus. 2.

capensis. 7. **SCHOENUS** culmo tereti ramosissimo vaginatis ovatis nudis dichotomis pendulis. *Amæn.* 4. p. 264. *

Canna Capitata b. spei, spicis juliformibus. S gram. 352.

Juncus e Cap. b. spei, paniculis fuscis juliformibus Brey. cent. t. 91. *Pet. gaz.* t. 7. f. 5. *mus.* 424.

Juncus afric. liguloso calamo ad nodos involucri gris convoluto, panicula arundinacea. Pluk. 109.

Habitat ad Cap. b. spei. b

Culmi tenaces referunt Theſii juncei caules.

* * *Culmo triquetro.*

coloratus. 8. **SCHOENUS** culmo triquetro, capitulo subrotundo involucri longissimo plano variegato.

Schoenus florum capitulis involucri longissimo involucri. Hort. cliff. 495.

Gramen Cyperoides spica compacta alba, foliis spicam partim albis partim viridibus. Sloan. 1. p. 119. t. 8. f. 1.

Gramen capitatum. Rumph. amb. 6. p. 8. t. 3. f. 2.

β. *Scirpus glomeratus culmo triquetro folioso, capitulo glomerato involucri folioso. Spec. pl.* 1. p. 52.

Cyperus culmo triquetro folioso, capitulo glomerato triphylo, spicis teretibus. Gron. vi. g. 131.

Pee motteuga. Rheed. mal. 2. p. 99. t. 53.

Habitat in Indiis.

Culmus triquetus, Involucrum nutans, longitudine culmi. Spiculæ plurimæ, ovato-oblongæ, sessiles, in capitulum subrotundum congestæ.

SCHOENUS culmo triquetro folioso, panicula villosa, feminibus globosis nitidis, foliis trifariam aculeolatis.

lithospermus.

*Schoenus secans. Amzn. acad. 5. p. 391. * Syst. nat. 2. p. 865.*

Scirpus lithospermus. Sp. p. 1. p. 51.

Cyperus maximus, americanus, lithospermi semine.

Morif. hist. 3. p. 237. f. 8. t. 11. f. 16.

Gramen Cyperoides sylvaticum maximum geniculatum asperius, semine milii solis. Sloan. jam. 36. hist. 1. p. 118. t. 77. f. 1.

Calamagrostis. Rumph. amb. 6. p. 16. t. 6. f. 2.

Men-pullu. Rheed. mal. 12. p. 89. t. 48.

Habitat in Indiis. 2.

Distinctissimus a reliquis seminibus globosis, margaritæ colore nitidissimis. Folia longissima, pollice latiora, margine carinaque aculeis minutissimis secantia.

SCHOENUS culmo subtriquetro nudo, spica disticha, involucrio monophyllo.

compressus.

Cyperella montana spicata, radice repente, caulero-tundo triquetro, spica fusca compressa disticha, semine cinereo. Mich. gen. 53.

Gramen Cyperoides spica simplici compressa disticha.

Fluk. alm. 173. t. 34. f. 9. Sheuch. gram. 490. Raj.

hist. 1910. Morif. hist. 3. p. 245.

Habitat in Anglia, Helvetia, Italia.

SCHOENUS culmo triquetro folioso, floribus fasciculatis, foliis planis, pedunculis lateralibus geminis.

glomeratus.

Schoenus culmo triquetro, pedunculis geminis lateralibus, floribus conglomeratis. Gron. virg. 131.

Habitat in Virginia.

SCHOENUS culmo subtriquetro folioso, floribus fasciculatis, foliis setaceis. *F. suec. 34. 41. Dalib. p. ris. 14.*

albus.

Schoenus flosculus fasciculatis. Hort. cliff. 22. Roy. lugdb. 48.

Cyperus palustris hirsutus minor, paniculis albis. Mart. rjf. hist. 3. f. 8. t. 9. f. 39. Fl. lapp. 17.

Cyperella palustris, capitulis umbellatis primum albis deinde fulvis. Mich. gen. 53.

Gramen luzulæ accedens glabrum, in palustribus proveniens, paniculatum. Pluk. alm. 178. t. 34. f. 11.

Gramen Cyperoides palustre leucanthemum. Scheuch. gram. 503.

Habitat in Europæ borealis paludibus turfosis. 24

CYPERUS.

* *Culmo tereti.*

articulatus. 1. **CYPERUS** culmo tereti nudo articulado.
Cyperus culmo nudo articulado. Roy. lugdb. 51.
Juncus Cyperoides creberrime geniculatus medulla cæta aquaticus, radice rubra tuberosa odorata. Sloan. Jam. 36. hist. 1. p. 121. t. 81. f. 1.

Habitat in Jamaicæ rivulis. 24

minimus. 2. **CYPERUS** culmo tereti nudo, spicis sub apice.
Cyperus culmo tereti, spicas sub apice ferente. Roy. cliff. 21. Roy. lugdb. 49.

Gramen junceum perpusillum, capillaceis foliis, ætæpicum. Pluk. alm. 179. t. 300. f. 5.

Gramen Cyperoides minimum, spicis pluribus comæctis ex oblongo-rotundis. Sloan. Jam. 36. hist. 1.

120. t. 79. f. 3. Raj. hist. 3. p. 625.

Habitat in Jamaica, Africa.

* * *Culmo triquetro.*

squarrosus. 3. **CYPERUS** culmo triquetro folioso, umbella fo-
*sa glomerata, spicis striatis squarrosis. Amæn. ac 4. p. 303. **

Gramen Cyperoides maderasp. minimum ischæmi paniculis cum aristas. Pluk. amalt. 114. t. 397. f. 2.

Habitat in Asia.

haspan. 4. **CYPERUS** culmo triquetro folioso, umbella sup-
*decomposita, spiculis umbellato-fessilibus Flor. 26 37. **

*Gramen Cyperoides maderaspatanum, panicula ma-
sparsa & speciosa. Pluk. alm. 179. t. 192. f. 2.*

Habitat in India, Aethiopia. 24

- CYPERUS** culmo triquetro folioso, umbella foliosa supradecomposita, pedunculis nudis, spicis alternis. *longus.*
Roy. lugdb. 50. Mat. med. 29. Dalib. parif. 14.
- Cyperus odoratus** radice longa f. *Cyperus officinarum*
Bauh. pin. 14. Scheuch. gram. 378. Morif. hist. 3.
pag. 237. f. 8. t. II. f. 13.
Habitat in Italix, Gallix paludibus. 24
- CYPERUS** culmo triquetro subnudo umbella decomposita: spicis alternis linearibus. *rotundus.*
Fl. zeyl. 36.
Mat. med. 30.
- Cyperus orientalis**, radice olivarii, spicis longis e spadiceo purpurascens. *Scheuch. gram. 391.*
Habitat in India.
- CYPERUS** culmo triquetro nudo, umbella foliosa, radicum tuberibus ovatis: zonis imbricatis. *esculentus.*
Ray. lugdb. 51.
- Cyperus rotundus** esculentus angustifolius. *Bauh. pin. 14. theatr. 222. Scheuch. gram. 382. Morif. hist. 3. p. 236. f. 8. t. II. f. 10.*
- Cyperus rotundus.** *Lob. ic. 75. Dod. pempt. 338.*
Thrasf. Bauh. hist. 2. p. 504.
Habitat Montpelii, inque Italia, Oriente. 24
- CYPERUS** culmo triquetro subnudo, umbella diphylla simplici trifida, spicis cuspidatis intermedia sessili. *diformis.*
*Amæn. acad. 4. p. 302. **
- Gramen Cyperoides elegans** vasumbo curry malabarorum. *Pluk. am. alt. t. 317. f. 5.*
Habitat in India.
- CYPERUS** culmo triquetro seminudo, umbella foliosa decomposita, spiculis alternis, granis distinctis. *Iria.*
Gramen Cyperoides Indiæ orientalis elatius, panicula sparsa pallescente. Pluk. alm. 179. t. 191. f. 7.
Iria f. Balari. Rheed. mal. 12. p. 105. t. 56.
Habitat in India. Osbeck.
- Pedunculi in umbella plurimi, apice umbelluliferi; umbella ex tribus quatuorve radiis, qui alternatim spiculas gerunt ex granis triquetris, obtusissimis, vix manifesta palea vestitis, parum distantibus.*
- CYPERUS** culmo triquetro nudo, umbella foliosa supradecomposita, spicis digitalibus imbricatis: spiculis subulatis. *elatius.*
*Amæn. acad. 4. p. 301. **
Habitat in India.

- elegans.** 11. **CYPERUS** culmo triquetro nudo, umbella fo-
sa, pedunculis nudis proliferis, spicis confertis
cronibus patulis. *Roy. lugdb.* 51.
Cyperus panicula maxime sparsa ferruginea compre-
elegantissima. *Sloan. jam.* 35. *hist.* 1. p. 117. t. 75.
1. *Raj. suppl.* 623.
Habitat in Jamaicæ paludosis maritimis.
- glomeratus** 12. **CYPERUS** culmo triquetro nudo, umbella t
phylla supradecomposita, spicis glomerato-rotun-
tis: spiculis subulatis. *Amoen. acad.* 4 p. 301. *
Cyperus aquaticus italicus procerior, locustis tenu-
mis in racemum dense congestis. *Mich. gen.* 4
Segu. veron. 3. p. 68. t. 2. f. 2.
Cyperus capitulis glomeratim congestis, seminibus
ristatis. *Mont. gram.* 14. t. 1. f. 1.
Habitat in Italiæ paludosis ex India 2. *Seguier.*
- odoratus.** 13. **CYPERUS** culmo triquetro nudo, umbella deco-
posita simpliciter foliosa, pedicellis distiche spica-
Cyperus culmo triquetro nudo, umbella duplicata
liosa, pedunculis propriis distiche spicatis. *Raj.*
lugdb. 50. *Gron. virg.* 131.
Cyperus longus odoratus, panicula sparsa, spicis su-
gossioribus viridibus. *Sloan. jam.* 35. *hist.* 1. p. 116.
74. f. 1. 3. i. 8. f. 1.
Habitat in America ad fluviorum ripas.
- compressus.** 14. **CYPERUS** culmo triquetro nudo, umbella u
versali triphylla, glumis mucronatis latere me-
branaceis.
Cyperus culmo triquetro nudo, panicula foliosa,
dunculis simplicibus, spicis alternis subulatis di-
chis. *Roy. lugdb.* 51. *Gron. virg.* 131.
Cyperus rotundus gramineus fere inodorus, panicula
sparsa compressa viridi. *Sloan. jam.* 35. *hist.* 1. p. 116.
t. 76. f. 1. *Raj. suppl.* 623.
Habitat in Americæ septentrionalis pratis arenosis.
Dignoscitur Panicula 3. *spicis viridibus; Glumis*
mucronatis, non patulis, at marginibus lateralibus
membranaceis. Umbellæ partiales nudæ, universa
glomerata.
- flavescens.** 15. **CYPERUS** culmo triquetro nudo, umbella tripl
la, pedunculis simplicibus inæqualibus, spicis ce-
fertis lanceolatis

Cyperus culmo triquetro nudo, panicula foliosa supradecomposita, spicis confertis distiche compressis.

Dalib. parif. 14

Cyperus minimus, panicula sparsa flavescente. T.

Scheuch. gram. 385. Hall. helv. 246.

Cyperus minor pulcher, panicula lata compressa subflavescente. Morif. hist. 3. p. 239. f. 8. t. 11. f. 37.

Gramen Cyperoides minus, panicula sparsa subtilava.

Bauh. pin. 6. theatr. 88. t. 88.

Habitat in Germaniæ, Helvetiæ, Galliæ, Italiæ paludosis.

CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella trifida, pedunculis simplicibus inæqualibus, spicis confertis linearibus.

fuscus,

Cyperus culmo triquetro nudo, panicula diphylla supradecomposita, spicis strigosioribus confertis distiche compressis. Dalib. parif. 15.

Cyperus minimus, panicula sparsa nigricante. T.

Scheuch. gram. 484.

Cyperus minor pulcher, panicula compressa nigricante. Morif. hist. 3. p. 239. f. 8. t. 9. f. 38.

Gramen Cyperoides minus, panicula sparsa nigricante.

Bauh. pin. 6.

Habitat in Galliæ, Germaniæ, Helvetiæ pratis humidis.

Differt a C. flavescente vix manifeste, spiculis angustioribus fuscis & foliis magis scabris.

CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella diphylla composita, spiculis alternis digitatis lanceolatis: glumis mucronatis. Amæn. acad. 4. p. 302. *

pumilus.

Gramen Cyperoides pumilum elegans e maderaspatan.

Pluk. alm. 179. t. 191. f. 8.

Habitat in India.

CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella simplici, spiculis linearibus confertissimis horizontalibus.

strigosus.

Cyperus rotundus, panicula sparsa, spicis strigosis ferrugineis. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 116. t. 74. f. 2. 3.

Habitat in paludibus Jamaicæ, Virginie.

Radix subrotunda. Umbellæ radii simplices, erectiusculi, instructi spiculis linearibus, longiusculis, ferrugineis, confertissimis, numerosissimis, horizontaliter a pedunculo communij patentibus vel etiam deorsum flexis.

- ligularis 19. **CYPERUS** culmo triquetro, umbellæ spiculis capitatis oblongis sessilibus, involucris longissimis serrato-asperis. *Amæn. acad.* 5. p. 391. *
Cyperus maximus, panicula minus sparsa ferruginea capitulis compactis crassioribus. *Sloan. jam.* 35. hij 1. p. 36. t. 9.
Habitat in Jamaica.
- Papyrus. 20. **CYPERUS** culmo triquetro nudo, umbella simplici folioli, pedunculis simplicissimis vaginatis distichis spicatis. *Roy. lugdb.* 50.
Cyperus omnium maximus Papyrus dictus. (*Monogram.* 14.), locustis minimis. *Mich. gen.* 44. t. 19.
Cyperus enodis nudus, culmis e vaginis brevibus prodeuntibus, spicis tenuioribus. *Scheuch. gram.* 36. t. 8 f. 14.
Cyperus niloticus vel syriacus maximus papyraceus *Morif. hist.* 3. p. 239. f. 8. t. 11. f. 41.
Papyrus syriaca & siciliana. *Bauh. pin.* 19. theatr. 33.
Habitat in Calabria, Sicilia, Syria, Ægypto.

SCIRPUS.

* * *Spica unica.*

- articulatus. 1. **SCIRPUS** culmo tereti nudiusculo semigeniculate capitulo glomerato laterali.
Tieli. Rheed. mal. 12. p. 135. t. 71.
Habitat in Malabarix aquosis arenosis.
Culmus cavus, geniculis cinctus, at non undique, Spicæ laterales in capitulum semiverticillatum collectæ.
- palustris. 2. **SCIRPUS** culmo tereti nudo, spica subovata terminali. *Fl. svec.* 41. 42. *Dalib. parif.* 15.
Scirpus culmo nudo, spica terminali subovata. *Roy. lugdb.* 48.
Scirpus equifeti capitulo majore. *T. Scheuchz. gram.* 360. *Fl. lapp.* 19.
Juncus palustris, capitulo equifeti, major. *Bauh. pin.* 12.
Juncellus cyperoides capitulo simplici, *Læs. pruss.* 131. t. 36.
Habitat in Europæ fossis & inundatis.
- tatus. 3. **SCIRPUS** culmo tereti nudo setiformi, spica fulgubosa terminali.

Scirpus culmo fetaceo nudo, spica subglobosa. *Gron. virg.* 12.

Habitat in Virginia.

SCIRPUS culmo triquetro nudo, spica cylindrica terminali. *Amzn. acad.* 5. p. 391. *

mutatus.

Habitat in Jamaica. 2

Simillimus *S. geniculato*, sed Culmus triqueter, molliusculus, nec articulatus.

SCIRPUS culmo tereti nudo, spica oblonga terminali. geniculatus.

Scirpus culmo nudo, spica terminali subrotunda. *Hort. cliff.* 21. * *Roy. lugdb.* 48.

Juncus aquaticus geniculatus, capitulis equifeto major & minor. *Sloan. jam.* 37. *hist.* 1. p. 122. t. 75. f. 2. & t. 81. f. 3. *Raj. suppl.* 628.

Habitat in Jamaica.

SCIRPUS culmo striato nudo, spica bivalvi terminali longitudine calycis, radicibus squamula interstinctis. *Fl. svec.* 42. 43. *Dalib. paris.* 17.

cespitosus.

Scirpus folio culmi unico. *Fl. lapp.* 20. *Roy. lugdb.* 49.

Scirpus montanus, capitulo brevior, *Scheuch. gram.* 363. t. 7. f. 18. *Pluk. phyt.* 40. f. 6. *Raj. angl.* 4. p. 32.

Juncus parvus palustris, cum parvis capitulis equifeti. *Raj. hist.* 1306. *Pluk. phyt.* 40. f. 6.

Gramen junceum, foliis & spica junci, minus. *Bauh. pin.* 6.

Habitat in Europæ paludibus cespitosis sylvaticis. 2

SCIRPUS culmo tereti nudo setiformi, spica ovata terminali bivalvi, seminibus nudis. *Fl. svec.* 43. 44. *Dalib. paris.* 17.

acicularis.

Scirpus magnitudine aciculæ. *Fl. lapp.* 21. *Roy. lugdb.* 49.

Juncus minimus, spica brevior squamosa spadicea. *Scheuch. gram.* 364. t. 7. f. 4.

Juncellus minimus, capitulis equifeti. *Pluk. alm.* 201. t. 40. f. 7. *Morif. hist.* 3. p. 234. f. 8, t. 10. f. 37.

Habitat in Europa sub aquis purioribus.

SCIRPUS culmis teretibus nudis alternis, caule folioso flaccido.

fluitans

Scirpus foliis linearibus planis alternatim fasciculatis, spica terminali. *Guett. stamp.* 141.

Scirpus caule folioso flaccido, scapis alternis capitatis

Roy. lugdb. 49. Sauv. monsp. 9.

Scirpus equiseti capitulo minori. T. Scheuch. gram.
365. t. 7. f. 20.

Juncellus, capitulis equiseti, minor fruticans. Bauh. pin.
prodr. 23. theatr. 187.

Gramen junceum clavatum minimum. Raj. hist. 1316
Moris. hist. 3. p. 230. f. 8. t. 10. f. 31. Pluk. alm.
180. t. 35. f. 1.

Habitat in Angliæ, Galliæ udis.

* * *Culmo tereti polystachio.*

lacustris.

9. **SCIRPUS** culmo tereti nudo, spicis ovatis pluribus
pedunculatis terminalibus. *Fl. suec. 40. 46. Dalech.*
paris. 16.

Scirpus spicis copiosis. Roy. lugdb. 48.

Juncus maximus si Scirpus major. Bauh. pin. 12. theatr.
art. 178.

Habitat in Europæ aquis puris stagnantibus & fluvii-
tilibus.

Holoscœnus

10. **SCIRPUS** culmo tereti nudo, spicis subglobosis glomeratis
pedunculatis, involucreo diphylo inæqualiter mucronato.

Scirpus panicula solum foliosa, spicis globosis pedunculatis
lateralibus. Sauv. monsp. 8.

Juncus acutus maritimus, capitulis rotundis. Bauh. pin.
11. theatr. 17.

Scirpoides maritimum, capitulis sparsis glomeratis.
Scheuch. gram. 371.

Holoscœnus. Dalech. hist. 8. 987.

Habitat in Europa australi.

romanus.

11. **SCIRPUS** culmo tereti nudo, capitulo laterali composito
globato, bractea reflexa,

Scirpus capitulo singulari, radice tomentosa. Barr. rar. 1249.
t. 255. f. 3.

Scirpoides acutum maritimum, capitulo glomerato solitario.
Scheuch. gram. 373. Mich. gen. 52.

12. *Juncus minor acutus maritimus proflifer ex uno capitulo multa.*
Pluk. alm. 200. t. 40. f. 5.

Habitat in Galloprovincia & Romæ. 24

*Huic Calami filii crassitie; præcedentis vero crassitie
sicut in S. lacustri & apice pungentes.*

setaceus.

SCIRPUS culmo nudo setaceo, spicis lateralibus
subsolitariis sessilibus. *It. scan.* 227. * *Fl. suec.* 2.
n. 45.

Scirpus culmo nudo setaceo, spicis pedunculatis. *Roy.*
lugdb. 49.

Scirpus omnium minimus, capitulo brevior. *T.*
Scheuch. gram. 358.

Juncus inutilis s. Chamæschœnus. *Bauh. pin.* 12. *prod.*
22.

Juncellus omnium minimus. *Morif. hist.* 3. p. 232. f. 8.
t. 10. f. 23.

Gramen junceum minimum, capite squamoso. *Bauh.*
pin. 6. *prodr.* 13.

Habitat in Europæ litoribus maritimis.

SCIRPUS culmo tereti nudo, spicis sessilibus in me-
dio culmo glomeratis. *Dalib. paris.* 16. †

supinus.

Scirpus supinus minimus, capitulis conglobatis, foliis
rotundo-teretibus. *Tournef. inst.* 528.

Habitat Parisiis.

SCIRPUS culmo nudo capillari, spicis peduncula-
tis sessilibusque lateralibus.

capillaris.

Scirpus culmo tereti usculo femi nudo, spicis capitatis
sessilibus, involucro diphylo setaceo. *Flor. zeyl.* 39.

Cyperus culmo tereti spicas infra apicem ferente. *Hort.*
cl. f. 21.

Gramen junceum perpusillum, capillaceis foliis, æthio-
picum. *Pluk. alm.* 179. t. 300. f. 5.

Gramen pusillum, junci capitulis minimis, ad basin fo-
liolis binis acutis. *Burm. zeyl.* 108. t. 47. f. 2.

Habitat in Virginia, Æthiopia, Zeylona.

*** Culmo triquetro, panicula nuda.

SCIRPUS culmo triquetro nudo acuminato latera-
li, spicis conglomeratis.

mucronatus

Tripo-Cyperus maritimus. *Mich. gen.* 47. *ord. c.* 2. 3.

Juncus acutus maritimus, caule triangulo. *Bauh. pin.*
11. *prodr.* 22. *Morif. hist.* 3. p. 232. f. 8. t. 10. f. 20.

Juncus acutus maritimus, caule triquetro rigido & mol-
li. *Pluk. alm.* 200. t. 40. f. 1. 3.

Habitat in Angliæ, Italiæ, Helvetiæ, Virginiæ stagnis
maritimis.

- dichotomus. 16. SCIRPUS culmo triquetro nudo, umbella decor-
posita, spicis dichotomiæ sessilibus. *Flor. zeyl.* 40.
Gramen Cyperoides maderaspatanum, juncelli ges-
capitulis sparsis. *Pluk. alm.* 179. t. 119. f. 3.
Habitat in India.
- echinatus. 17. SCIRPUS culmo triquetro nudo, umbella simpli-
spicis ovatis. *Fl. zeyl.* 38. *
Cyperus floribus capitatis erectis pedunculatis. *Gr-
virg.* 12.
Gramen Cyperoides americanum, spicis grandiorib-
oblongo-rotundis, sparganii in modum echinatis,
summum caulem pediculis longis innitentibus. *Pl-
aln.* 179. t. 91. f. 4.
Habitat in India utraque.
- retrofractus. 18. SCIRPUS culmo triquetro, umbella simplici : **f**
carum flosculis retrofractis.
Cyperus genus indianum, panicula speciosa, spic-
propendentibus atris. *Pluk. phyt.* 415. f. 4.
Habitat in Virginia. 24
- ferrugineus. 19. SCIRPUS culmo triquetro subnudo, involu-
longitudine paniculæ ciliatis.
Cyperus culmo triquetro nudo, panicula diphylla,
dunculis quibusdam subdivisis, spicis ovatis foli-
riis. *Roy. lugdb.* 50.
Gramen Cyperoides majus, spicis ex oblongo-rot-
dis compactis ferrugineis. *Sloan. jam.* 36. *hist.* 1.
36. t. 77. f. 2.
Habitat in Jamaica paludibus maritimis.
- ladiceus. 20. SCIRPUS culmo triquetro nudo, umbella sub-
da, spicis oblongis sessilibus terminalibusque.
SCIRPUS culmo triquetro nudo, panicula laxa, sp-
alternis subsessilibus, pedunculis longis terminalib-
Gron. virg. 132.
Gramen Cyperoides majus aquaticum, paniculis pl-
mis juncéis sparsis, spicis ex oblongo rotundis l-
diceis. *Sloan. jam.* 36. *hist.* 1. p. 118. t. 76. f. 2.
Habitat in Jamaicae fluviiis.
* * * * Culmo triquetro, Panicula foliacea.
- maritimus. 21. SCIRPUS culmo triquetro, panicula conglot-
foliacea, spicularum squamis trifidis: intermedia
bulata. *Fl. succ.* 39. 47. *Dalib. paris.* 15.

Cyperus culmo triquetro, panicula foliacea, pedunculis simplicissimis, spicis confertis. Roy. lugdb. 50.

Cyperus panicula subfessili, capitulis subovatis. Guett. stamp. 2. p. 114.

Cyperus rotundus inodorus germanicus. Bauh. pin. 14. theatr. 215.

Cyperus rotundus inodorus anglicus. Bauh. pin. 14.

Cyperus panicula compacta e spicis teretibus crassioribus composita Scheuch. hist. 400.

Gramen Cyperoides panicula sparsa majus. Bauh. pin. 6.

Scirpo-Cyperus palustris, radice repente nodosa inodora, panicula sparsa, capitulis majoribus. Mich. gen. 48.

Habitat in Europæ litoribus maritimis. 2

Atome partium fructificationis conjunctionem. β. γ. δ. ε. suffit.

SCIRPUS culmo triquetro nudo, umbella supradecomposita, spicis intermediis sessilibus, involu-
cro setaceo.

miliaceus.

Habitat in India.

Culmi plurimi, nudi, simplices, triquetri, læves, semipedales. Folia graminea, basin culmi obvestientia, lævia.

Umbella laxa, supradecomposita, diffusa. Involucra universal: a partialiaque foliaceo-setacea, umbella breviora. Spicæ pedunculatæ, at solitariæ, sessiles in ramificationibus umbellæ; omnes ovatæ, minutissimæ ut semina milii.

SCIRPUS culmo triquetro nudo, umbella foliosa prolifera, spiculis subrotundis.

lucula.

Habitat in India.

Culmus plus quam pedalis, nudus, triqueter, lævis. Involucrum universale polyphyllum: foliis ensiformibus, umbella longioribus. Partialia vix ulla, nisi seta brevissima. Umbellæ pedunculi intermedii brevissimi; omnes terminati capitello, iterum prolifero. Capitella subrotunda, glomerata ex spiculis subrotundis.

SCIRPUS culmo triquetro folioso, umbella foliacea, pedunculis nudis supradecompositis, spicis confertis. *Fl. svec. 38. 48. Dalib. parif. 15. Raj. angl. 1. p. 33.*

sylvaticus.

Cyperus culmo triquetro, panicula foliosa, pedunculis

- lis nudis supradecompositis, spicis confertis. *Jugd.* 49.
- Gramen cyperoides miliaceum. *Bauh. pin.* 6.
- Gramen arundinaceum, foliis acutissimis, panicula triplici, cyperi facie. *Læf. pruss.* 119. t. 33.
- Habitat in Europæ sylvis humentibus.* 24.
- corymbosus. 25. SCIRPUS culmo triquetro folioso, corymbis lateralibus simplicibus: terminali prolifero, spicis subulatis. *Amæn. acad.* 4. p. 303. *
- Habitat in India.*
- melichianus 26. SCIRPUS culmo triquetro, capitulo globoso, involucri polyphylo longo.
- Cyperus italicus omnium minimus.* *Till. pis.* 51. 20. f. 5.
- Habitat in Italia varius.*
- * * * * *Culmo triquetro, capitulo terminali.*
- cephalotes. 27. SCIRPUS culmo triquetro nudo capitulo ovato squarroso, involucri triphylo longo.
- Bobartia spicis capitatis involucri majori folioso. Etis.* *Brown. jam.* 129. ?
- Habitat in India.*
- Culmus altus, triqueter; levis, striatus. Capitulum ovatum, terminale, pedicellis non conspicuis. Calices imbricati, acuminati squarrosi s. recurvati. Involucrum universale longissimum. 3. f. 4. phyllis reflexum; margine scabrum.*

ERIOPHORUM.

- vaginatum. 1. ERIOPHORUM culmis vaginatis teretibus, spicis scariofa. *Fl. suec.* 45. 50. * *Dalib. paris.* 18.
- Eriophorum spica erecta, caule tereti.* *Fl. lapp.* 23. *Rugdb.* 51.
- Gramen tomentosum alpinum & minus. *Bauh. pin. prodr.* 10. *Burf.* 1: 43.
- Juncus alpinus capitulo lanuginoso s. Schoenolagurus.* *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 23. *theatr.* 188. *Scheuch. gra.* 302. t. 7. f. 1.
- Habitat in Europæ frigidis sterilibus.* 24.
- polystachion. 2. ERIOPHORUM culmis teretibus, foliis planis, spicis pedunculatis. *Fl. suec.* 44. 49. *Dalib. paris.* 18.
- Erio-

Triophorum spicis pendulis. *Fl. lapp.* 28. *Hort. cliff.* 22.
Roy. lugab. 51.

Stamen pratense tomentosum, panicula sparsa. *Bauh.*
pin. 4.

Habitat in Europæ uliginosis turfosis. 24

TRIOPHORUM culmis foliosis teretibus, foliis planis, spica erecta. virginicum.

Triophorum spica compacta erecta foliacea, caule compresso. *Gron. virg.* 132.

Stamen tomentosum virginianum, panicula magis compacta aureo colore perfusa. *Pluk. alm.* 179. t. 299.

f. 4

Stamen tomentosum, capitulo ampliore fusco & foliaceo. *Morif. hist.* 3. p. 224. f. 8. t. 9. f. 2.

Habitat in Virginia. 24

TRIOPHORUM culmis teretibus foliosis, panicula supradecomposita prolifera, spiculis subternis. cyperinum.

Stipus paniculatus, foliis floralibus paniculam superantibus. *Gron. virg.* 12.

Stipus miliaceus ex provincia mariana, panicula villosa aurea. *Pluk. mant.* 62. t. 419. f. 3.

Stipus miliaceus marilandicus, spicis feminiferis majoribus confertis rubentibus lanuginosis. *Raj. suppl.* 620.

Habitat in America septentrionali.

Stipus omnino Cyperi, sed Spiculæ Scirpi, nisi Semina maturefcentia producerent Lanam gilvam j. terream, vix spiculis longiorem.

TRIOPHORUM culmis nudis triquetris, spica pappo alpinum.

Triophorum spica erecta, caule triquetro. *Fl. lapp.* 24.

Triophorum prostratum juncea alpina, capitulo parvo: tomento rare. *Scheuch. gram.* 305. t. 7. f. 4.

Triophorum alpinus bombycinus. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 6.

Habitat in Europæ alpibus, locisque affinis. 24

N A R D U S.

Nardus spica fetacea recta. *Fl. succ.* 47. 52. *Dalib.* 18.

Nardus spica lineari. *Fl. lapp.* 40. *Hort. cliff.* 42.

Nardus in parteum juncifolium. *Bauh. pin.* 5. *Scheuch.* n. 90.

Nardus in parteum hollandicum, capillaceo folio, & minus

stricta.

- nus. *Bauh. pin. 5. prodr. 11. Morif. hist. 3. p. f. 8. t. 7. f. 8.*
Habitat in Europæ asperis, sterilibus, duris, 24
- gangitidis. 2. NARDUS spica recurva.
Nardus spuria narbonensis. Bauh. pin. 13.
Nardus gangitidis spuria narbonensis. Lob. ic. 84. 1
hist. 3. p. 257. f. 8. t. 13. f. ult. Raj. hist. 1911.
Habitat in G. Narbonensi.
- aristatus. 3. NARDUS calycibus aristatis. *Gouan.*
Gramen exile arundinaceum minimum, acumine
xo. Bocc. mus. 2. p. 74. t. 57. Scheuch. gram. 1
Gramen junceum nodosum minimum capillare.
rar. 106. t. 117. f. 1.
Habitat Romæ.
- ciliaris. 4. NARDUS spica incurva ciliata.
Habitat in India.
Folia gramea, plana. Culmus spitamæus. Spica
diata f. altero latere tantum Flosculis alternis, et
12. ad 15. valvula anteriore ovato-oblonga, mu
marginè ciliata pilis scabris, nunc erosis. Calyx
prie nullus, sed ad alterum latus flosculorum seta
vior ipsa gluma.

LYGEUM.

- Spartum. 1. LYGEUM. *Læfl. it. 285. t. 2. **
Spartum herba, alterum. Clus. hist. 2. p. 220. f. 2.
Gramen Spartheum secundum, panicula brevi foll
inclusa. Bauh. pin. 5.
Habitat in Hispaniæ campis argilosis. 24

DIGYNIA.

BOBARTIA.

- indica. 1. BOBARTIA.
Bobartia spicis capitatis, involucre folioso. Fl. zeyl.
*Amæn. acad. 1. p. 338. **
Scirpus maderaspatanus, capitulo squamoso subrotto
Scheuch. gram. 369.
Habitat in India.
Refert ita Schœnum mucronatum, ut ejus figura p
jus ubique venditari possit.

COR-

CORNUCOPIÆ.

CORNUCOPIÆ. *Hort. cliff.* 490. *Roy. lugdb.* 52. cucullatum.
Hasseltq. it. 452.

Juncus clavatus vaginatus polycephalus. Pet. gaz. t.
73. f. 5.

Gramen orientale vernum in udis proveniens, capitulo inflexo. *Scheuch. gram.* 117.

Habitat Smyrnæ. D. Hasseltqvist.

SACCHARUM.

SACCHARUM floribus paniculatis. *Hort. cliff.* 26. officinarum.
Mat. med. 33. *Roy. lugdb.* 52.

Arundo saccharifera Bauh. pin. 18. *Sloan. jam.* 31. *hist.*
1. p. 108. t. 66. Rumph. amb. 5. *p. 186. t. 74. f. 1.*

Habitat in Indiæ utriusque locis inundatis.

SACCHARUM floribus spicatis, foliis undatis. spicatum.

Alopecurus malabarica, foliis undulatis, spica præternui. Scheuch. gram. 91.

Gramen paniculatum brevifolium crispum, spica purpureo-sericea maderaspatanum. *Pluk. alm.* 177. *t. 119. f. 1. Moris. hist.* 3. *p. 191. n. 7.*

Tjeria kuren-pullu. Rheed. mal. 12. *p. 117. t. 62. Moris. hist.* 3. *p. 191. n. 5.*

Habitat in Indiæ petrosis.

PHALARIS.

PHALARIS panicula subovata spiciformi: glumis carinatis. *Hort. upf.* 19. canariensis.

Phalaris radice annua. Hort. cliff. 23. *Roy. lugdb.* 63. *Dalib. paris.* 20.

Phalaris major, semine albo. Bauh. pin. 28. *Moris. hist.* 3. *p. 186. f. 8. t. 3. f. 1.*

PHALARIS panicula cylindrica: glumis carinatis. bulbosa.
Amæn. acad. 4. *p. 264. **

Phalaris radice perenni. Roy. lugdb. 63.

Phalaris bulbosa, semine albo. Raj. hist. 1249. *Scheuch. gram.* 53.

Habitat in Oriente.

PHALARIS panicula ovato-oblonga spiciformi; glumis carinatis lanceolatis. *Amæn. acad.* 4. *p. 264. ** aquatica.

Gramen typhinum phalaroides majus bulbosum aquaticum. *Barr. rar.* 1200. *t. 700. f. 1.*

Gra-

Gramen phalaroides hirsutum, spica longissima.

cent. 4. p. 32. t. 53.

Habitat ad Tyberim ☉ in Ægypto. 2

striculata.

4. PHALARIS panicula spicata, petalis arista ar
ta, vagina supremi folii spathiformi.

Gramen pratense, spica purpurea ex utriculo pro
te, f. Gramen folio spicam amplexante. Bau

3. theatr. 44.

Habitat in Italia.

phleoides.

5. PHALARIS panicula cylindrica spiciformi.

Phalaris spica cylindrica. Fl. suec. 49. 54. Da
rif. 19.

Gramen typhoides asperum primum. Bauh.

Scheuch. gram. 61. Hall. helv. 232.

Habitat in Europæ vrsuris.

arundinacea

6. PHALARIS panicula oblonga ventricosa.

Phalaris panicula oblonga. Fl. suec. 48. 53. Da
rif. 19.

Arundo foliis planis, panicula spicata, spiculis
tis. Hort. cliff. 26. Roy. lugdb. 66.

Gramen aquaticum paniculatum, phalaridis
T. Scheuch. gram. 126.

Gramen arundinaceum spicatum. Bauh. pin. 6.
94.

Gramen aquaticum paniculatum latifolium.
pin. 3.

Gramen arundinaceum, acerosa glumæ, jerse
Raj. ang. 3. p. 400. Moris. hist. 3. p. 203. f.
f. 41.

picata.

- β. Gramen paniculatum, folio variegato. Bauh.

Habitat in Europæ subhumidis ad ripas lacuum.

cruciformis

7. PHALARIS panicula lineari secunda, calycit
floris.

Dactylis spicis numerosis alternis culmo adpressi
gitudine internodiorum, calycibus bifloris. Roy
57. Gmel. sibir. 1. p. 130. t. 29.

Gramen palustre, locustis erucæformibus Bar
1158. t. 2.

Habitat in Sibiria, Russia, Europa australi.

Paspalum refert, sed valvulæ floris modo co
dehiscunt.

PHALARIS panicula effusa, glumarum carinis ciliatis. oryzoides.

Oryza glumis carina hispidis. *Gron. virg.* 153.

Gramini tremulo affine paniculatum elegans majus.

Sloan. jam. 34. *hist.* 1. p. 113. t. 71. f. 1.

Gramen palustre, panicula speciosa. *Bauh. pin.* 3. *prodr.* 7.

Gramen paniculatum aquaticum asperum, locustis planis & orbiculatis. *Pont. comp.* 57.

Gramen milaceum palustre serotinum, paniculis ex locustis compressis compositis. *Mont. prodr.* 51. *Segu. ver.* 1. p. 351.

Habitat in Virginiae paludibus nemorosis, hodie in Italiae agris *Oryzae*.

PASPALUM.

PASPALUM spicis alternis: rachi membranacea. dissectum.

Panicum dissectum. *Sp. pl.* 1. p. 57.

Gramen paniceum spica simplici ad caulem intervallata binis granorum ordinibus uno versu constante, americanum. *Pluk. mant.* 94. t. 350. f. 2.

Habitat in America calidiore. ☉

Gramen prostratum foliorum vaginis fere spathaceis.

Spicae paucae rachi membranacea dilatata ad latitudinem spicae ipsius distichae & secundae. Flores orbiculati.

PASPALUM spiculis paniculatis alternis basi villosis. virgatum.

Gramen *Dactylon* majus, panicula longa, spicis plurimis nudis crassis. *Sloan. jam.* 34. *hist.* 1. p. 112. t. 69. f. 2.

Habitat in Jamaica.

Precedenti duplo vel quadruplo majus. Spiculae basi villosae ad decem usque, alternae, paniculam constituent, secundae, ordine non duplici, sed quadruplici florum.

PASPALUM spicis paniculatis verticillato-aggregatis. paniculatum.

Gramen miliaceum, panicula viridi l. purpurea. *Sloan. jam.* 34. *hist.* 1. p. 115. t. 72. f. 2.

Habitat in Jamaica.

Effusius hoc est, panicula quasi verticillata spiculis innumeris, linearibus, secundis, filiformibus, an-
nui *Spec. plant. pars 1.* F gu-

gustissimis: floribus duplici ordine digestis, aculeis.

distichum.

4. PASPALUM spicis duabus: altera subseffili, floral acuminatis. *Amæn acad. 5. p. 391. **

Habitat in Jamaica.

Gramen pedale. Foliis involuto - subulatis. Culm terminatus spicis duabus, erectis, approximatis, cundis: floribus alternis, acuminatis; omnibus Stamina tria.

PANICUM.

* *Spicata.*

alopecuroidem.

1. PANICUM spica tereti, involucris setaceis basi liatis fasciculatis unifloris flosculo quadruplo longioribus.

Gramen geniculatum brevifolium crispum, spica pureo-fericea. Pluk. alm. 177. t. 119. f. 1.?

Gramen indicum alopecuroides holofericeum maj spica longa pappescente. Pluk. alm. 177. t. 92. f.

Habitat in Jamaica.

Spica longa, ferruginea; flosculi sparsi, pedunculis vibus, cincti setis longis, erectis. Scapus infra spicam parum villosus. Pedicelli omnes uniflori.

polystachyon.

2. PANICUM spicis teretibus, involucellis unifloris fasciculato-setosis, culmis erectis superne ramulosis. *Gramen caricosum alterum. Rumph. amb. 6. p. t. 7. f. 2. B.*

Habitat in India. ♂.

Similis spicis Panico glauco, sed dimidio minoribus pistillis sanguineis. Culmus ramosus, pedalis ad pedalem, valde ramosus. Folia pilosa, superne opposita.

verticillatum.

3. PANICUM spica verticillata, racemulis quaternis involucellis unifloris bifetis, culmis diffusis.

Gramen paniceum, spica aspera. Bauh. pin. 8. tab. 139. t. 139. Scheuch gram. 67.

Habitat in Europa australi & Oriente.

Simillimum P. viridi, sed spica racemis longioribus. f. 4. deorsum secundis. Flores virides, pistilla purpurascensibus. Seta 1. f. 2. scabra, ad singula florem, eoque longior. Pedicelli a casu florum minati cotyla truncata, concava, alba. Spicæ

ca.

chis angulis 3. f. 4. bifidis. Culmi læves, diffusi, bipedales. Folia nulla.

PANICUM spica tereti, involuclis bifloris fasciculato-setosis, seminibus undulato rugosis. *Fl. zeyl. 44.* glaucum.

Panicum spica simplici, aristis aggregatis flosculo subjectis. *Gron. virg. 134.*

Habitat in Indiis & Italia. ☉

Setæ in spica longitudine floscolorum. Foliorum vagina oris pilosæ. Dum spica recens prodit. Flosculi in series dispositi observantur. Semina striis undulatis notata.

PANICUM spica tereti, involuclis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus nervosis. viride.

Gramen paniceum s. *Panicum sylvestre*, spica simplici. *Bauh. pin. 8. Scheuch. gram. 46.*

Habitat in Europa australi. ☉

PANICUM spica composita, spiculis glomeratis fetis immixtis, pedunculis hirsutis. italicum.

Panicum spica composita, aristis flosculo brevioribus. *Vir. cliff. 7. Hort. ups. 19. Roy. lugdb. 54. Gron. virg. 134.*

Panicum italicum s. *panicula majore. Bauh. pin. 27. theatr. 519.*

Panicum. Rumph. amb. 5. p. 202. t. 75. f. 2.

Habitat in Indiis. ☉

PANICUM spica composita: spiculis adpressis alternis, calycibus geminis, valvulis omnibus aristatis; arista extrema longissima. *Amæn. acad. 5. p. 391. ** hirtellum.

Panicum sylvestre, panicula rariori, spicillis longioribus uno versu floridis. *Brown. jam. 133.*

Habitat in Indiis, etiam ibi colitur.

PANICUM spicis alternis conjugatisque, spiculis subdivisiis, glumis aritatis hispidis, rachi quinqueangulari. *Fl. suec. 2. n. 55.* crus galli.

Panicum spicis alternis remotis declinatis compositis. *Vir. cliff. 7. Roy. lugdb. 55. Valib. parif. 22.*

Panicum spicis alternis remotis laxis. *Hort. cliff. 27.*

Gramen paniceum, spica divisa. *Bauh. pin. 8. Scheuch. gram. 49. Morif. hist. 3. p. 189. f. 8. t. 4. f. 15.*

Dens caninus secundus. Bauh. hist. 2. p. 134.

Gramen paniceum, spica divisa, aristis longis armata. *Bauh. pin. 8.*

Habitat in Europæ, Virginæ cultis. ☉

Varietas β . *aristis decies glumis longioribus manifesta communi planta, cui vix sesquialongiores aristæ, disse-*

erus corvi. 9. PANICUM spicis alternis secundis spiculis subdivis, glumis subaristatis hispidis, rachi trigona.

Habitat in Indiis. ☉

Simillimum P. crus galli, sed minus, tenerius. Panicula magis nutans rachi trigona, nec pentagona. Spicæ secundæ, nec undique rachi incumbentes.

colonum. 10. PANICUM spicis alternis secundis muticis ovalis scabris, rachi teretiuscula.

Gramen paniceum minus, spica divulsa insulæ barba densis. *Pluk. alm. 174. t. 189. f. 5.*

Gramen paniceum minimum humistratum, spica divmutica, foliis variegatis. *Sloan. jam. 30. hist. 1. p. 10 t. 64. f. 3. Raj. suppl. 600. Ehret. pict. t. 3. f. 3.*

Gramen aciculatum *Rumph. amb. 6. p. 13. t. 5. f. 3.*

Habitat in Indiæ cultis. ☉

Culmi spithamæi, teretes, ascendentes. Folia levè sæpe ferrugineo-maculata, fauce purpurascencia atque ligula. Spica simplex, secunda, rachi teretibus debili. Spiculæ alternæ, plurimæ, subsessiles, secundæ, ovatæ s. oblongiusculæ absque fasciculis lousis. Flosculi substriati. Antheræ purpurascence Pistilla alba, mox purpurascencia.

compositum. 11. PANICUM spica composita, spiculis linearibus secundis, flosculis geminis remotis, calycibus aristatis. *Fl. Zeyl. 42. **

Habitat in Zeylona.

dimidiatum. 12. PANICUM spica dimidiato-secunda, rachi linearibus membranacea extrorsum flosculis aggregatis.

Gramen bermudense frumentaceum, foliis brevibus obtusis, spica crassiuscula compressa antrorsum gemino versus granifera. *Pluk. phyt. 244. f. 6.*

Habitat in India.

Folia latissima, obtusiuscula vaginis latis. Spica e scapi apice membranaceo, plana, cui ad alterum tantum latus Flores alternatim divergentes, ternæ. Structura Paspali, sed fructificatio diversa.

sanguinale. 13. PANICUM spicis digitatis basi interiore nodosis flosculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis.

Pa-

anicum spicis alternis oppositisque linearibus patentissimis muticis, flosculis alternatim binis: altero pedunculato. *Roy. lugdb.* 55. *Gron. virg.* 154. *Dalib. parif.* 22.

Gramen dactylon majus repens, foliis hirsutissimis. *Buxb. cent.* 5. p. 34. t. 65.

Gramen dactylon, folio latiore. *Bauh. pin.* 8. *theatr.* 114. *Scheuch. gram.* 101.

Gramen dactylon majus, panicula longa e spicis plurimis gracilioribus purpureis & viridibus mollibus constante. *Sloan. jam.* 3. *hist.* 1. p. 113. t. 70. f. 2-

Habitat in America, Europa australi, Hollandia, Media. ☉

PANICUM spicis digitatis patentibus basi interiore villosis, floribus solitariis, sarmentis repentibus.

Dactylon.

Panicum Dactylon, folio arundinaceo, majus aculeatum. *Bauh. pin.* 7.

Panicum Dactylon radice repente s. officinarum. *Scheuch. gram.* 104.

Gramen legitimum. *Clus. hist.* 2. p. 217.

Habitat in Europa australi, Oriente. 24

PANICUM spicis subdigitatis approximatis erectis filiformibus: rachi flexuosa, dentibus bifloris: altero sessili.

filiforme.

Habitat in America septentrionali. *Kalm.*

Folia lanceolata. Culmi pedales filiformes, superne nudis erecti. Spica filiformis, rara, flexuosa rachi alternatim utrinque ad dentes Flosculi 2, altero sessili, altero pedicellato; spicæ tenues, primum valde approximate quasi in unum, quamvis alterne.

PANICUM spicis digitatis subquaternis linearibus, flosculis solitariis secundis muticis.

lineare.

Habitat in Indiis.

Culmi prostrati, leves, ramosi. Spiculæ lineares, rectæ, angustæ. Flores subterni. Calycis squama exterior brevior, patens, rachi adherens.

* * Paniculata.

PANICUM paniculis simplicibus, culmo ramoso dichotomo. *Gron. virg.* 133. *

dichotomum.

Habitat in Virginia.

Statura refert arbusculam inferne simplicem, superne fasciculatam.

- grossarium. 18. PANICUM panicula ramis simplicibus, floribus geminis: pedicello altero brevissimo, altero longitudine floris. *Amæn. acad. 5. p. 392. **
Habitat in Jamaica.
- clandestinum. 19. PANICUM racemis occultatis intra foliorum vaginas.
Gramen cyperoides polystachyon, spicis ad nodos et foliorum alis prodeuntibus. *Sloan. jam. 36. hist. p. 120. t. 80.*
Habitat in Jamaica, Pennsylvania. Kalm. 24.
Culmi dichotomi, ramosi. Folia ovato-lanceolata, geminis punctatis, pillofis, intra quas Racemi fructificationum omnino occultantur, ut extus ne vestigia earum appareat; ceterum valde affine P. latifolio.
- capillare. 20. PANICUM panicula capillari erecta patente, calice hirto. *Gron. virg. 13.*
Panicum miliaceum viride, foliis latis brevibus, panicula capillacea. *Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 115. t. 7. f. 3.*
Miliun indicum, panicula sparsa erecta. *Tournef. in 515.*
Habitat in Virginia, Jamaica. ☉
Simile Poæ capillari, sed totum hirsutum.
- patens. 21. PANICUM panicula oblonga patente, calycibus bifloris, foliis lineari-lanceolatis.
Tsiama-pullu. *Rheed. mal. 12. p. 75. t. 41.*
Habitat in India: similis e Lusitania.
- divaricatum. 22. PANICUM paniculis brevibus muticis, culmo ramosissimo divaricatissimo, pedicellis bifloris: altero longiore. *Amæn. acad. 5. p. 392. **
Habitat in Jamaica.
- miliaccum. 23. PANICUM panicula laxa flaccida, foliorum vaginis pubescentibus. *Hort. cliff. 27. Hort. ups. 20. Mat. med. 34. Roy. lugdb. 55. Dalib. paris. 22.*
Miliun semine luteo & albo. *Bauh. pin. 26. theatr. 502*
Habitat in India.
- latifolium. 24. PANICUM panicula racemis lateralibus simplicibus, foliis ovato-lanceolatis collo pilosis.
Gramen virginianum, lato brevique folio, paniculari rariore. *Morif. hist. 3. p. 196. f. 8. t. 5. f. 4.*

Gramen miliaceum sylvaticum, maximum, semine albo. *Sloan. jam. 34. hist. 1. p. 114. t. 71. f. 3.*

Habitat in America.

Folia latitudine *Commelinæ*, ad fauces amplexicaulia, extus collo circum fauces villosa, etiam basi foliorum margine pilosa. Panicula valde mediocris ex racemis lateralibus, non subdivisis, sed pedicellos proprios, nec subdivisos proferentes. Flores mutici, masculi.

5. PANICUM paniculatum, foliorum vaginis longi- brevifolium
tudinaliter ciliatis.

Panicum miliaceum, latiore folio, maderaspatanum.

Pluk. alm. 176. t. 189. f. 4.

Habitat in India.

Gramen pedale vel bipedale. Folia ovata, amplexicaulia. Panicula tenuissima, folio supremo & majore compresso. Variat foliis angustis & lanceolatis.

6. PANICUM paniculatum ramosissimum, foliis ovato- arborescens.
oblongis acuminatis. *Fl. zeyl. 43.*

Panicum panicula laxa sparsa, foliorum vaginis glabris. *Hort. cliff. 27.*

Habitat in India. b

Altitudine certat cum altissimis arboribus. Culmus vix penna anserina latior.

7. PANICUM panicula virgata, foliis divaricatis. repens.

Habitat in Hispania? inde missum a Claud. Alstræmer. 24

Culmi repentes pedales adscendentes. Folia inferiora latiora, undique caulem vaginis vestientia, patentissima & fere reflexo-divaricata, mucronata vaginis subpubescentibus: Superiora folia angustiora, longiora, erecta. Panicula constans tribus quatuorve racemis erectis, vix ramosis, quibus Flores alterni, remotiusculi, ovati; valvula calycina exteriore brevissima obtusa.

8. PANICUM panicula virgata, glumis acuminatis virgatum.
lævibus: extima dehiscente.

Panicum paniculatum, glumis acutis. *Gron. virg. 133.*

Habitat in Virginia.

PHLEUM.

1. PHLEUM spica cylindrica longissima culmo recto.

F 4

Fl.

pratense

- Fl. lapp.* 26. *Fl. svec.* 50. 56. *Hort. cliff.* 22. *Ro lugdb.* 53. *Dalib. paris.* 20.
- Gramen typhoides asperum primum. *Bauh. pin.* 4.
 Gramen typhoides maximum, spica longissima. *Bauh. pin.* 4. *Scheuch. gram.* 60. *Morif. hist.* 3. p. 188. f. t. 4. f. 1. *Vaill. paris.* 83.
Habitat in Europæ versuris ☉ *pratis.* 24
- nodosum. 2. PHLEUM spica cylindrica basi sterili, culmo adscendente, radice bulbifera.
 Gramen typhoides asperum alterum. *Bauh. pin.* 4. *theatr.* 52. *Scheuch. gram.* 62.
 Gramen nodosum, spica parva. *Bauh. pin.* 2. *prodr. theatr.* 20.
 Gramen typhinum supinum tuberosum, spica aspera. *Bar. ic.* 53.
Habitat in Gallia, Helvetia, Italia. 24
Simillimum P. pratensi, sed Radix bulbosa. Culmus non rectus, sed adscendens, foliorum vaginis tectus. Folia bifaria, obliqua, lævia exceptis marginibus scabris.
- alpinum. 3. PHLEUM spica ovato-cylindracea. *Fl. lapp.* 25. *F. svec.* 51. 57. *Dalib. paris.* 20.
 Gramen typhoides alpinum, spica brevis densa & velut villosa. *Scheuch. gram.* 64. t. 3. *prodr.* 3.
Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis aliisque. 2
- arenarium. 4. PHLEUM spica ovata ciliata, caule ramoso. *F. svec.* 2. n. 58. *Hort. cliff.* 23. *it. scan.* 109. *Roy. lugdb.* 54
 Gramen typhinum maritimum minus. *R. Pluk. alm.* 177. t. 33. f. 8. *Scheuch. gram.* 63.
Habitat in Europæ locis arenosis. ☉
Spica vix absolute e vagina Foliū exit.
- chænoides. 5. PHLEUM spicis ovatis obvolutis, foliis brevissimis mucronatis amplexicaulibus.
 Gramen maritimum typhinum, brevi & crassiori spica ad singula genicula prodeunte. f. secundum. *Scheuch. gram.* 86.
Habitat in Italia, Smyrnæ, inque Hispania. Læsting.
Habitus Schæni aculeati foliis floralibus amplexicaulibus, brevibus, mucronatis.

ALOPECURUS.

- pratensis. 1. ALOPECURUS culmo spicato erecto, glumis villosis.

- lofis. *Roy. lugdb. 54. Fl. svec. 52. 59. Dalib. parif. 21.*
- Gramen phalaroides majus s. italicum. *Bauh. pin. 4. thair. 55. Morif. hist. 3. f. 8. t. 4. f. 8.*
- Gramen spicatum, spica cylindrica tenuissima longiore. *Scheuch. gram. 69.*
- Gramen alopecuro simile glabrum, cum pilis longiusculis in spica; Onocordon. *Bauh. hist. 2. p. 475.*
- Habitat in Europæ pratis. 24.*
- ALOPECURUS** culmo spicato erecto, glumis nudis. agrestis.
- Gramen typhoides, spica angustiore. *Bauh. pin. 4. theatr. 53.*
- Gramen typhinum, plantaginis spica, aristis geniculatis. *Barr. ic. 699. f. 2.*
- Gramen spicatum, spica cylindracea tenuissima longiore. *Scheuch. gram. 69.*
- Habitat in Europa australi. 24.*
- ALOPECURUS** culmum spicato infracto. *Fl. svec. geniculatus. 53. 60. Dalib. parif. 20.*
- Alopecurus culmo infracto, aristis gluma longioribus. *Roy. lugdb. 54.*
- Alopecurus aristis gluma longioribus. *Fl. lapp. 37.*
- Gramen aquaticum geniculatum spicatum. *Bauh. pin. 3. Scheuch. gram. 72.*
- Alopecurus aristis gluma æqualibus. *Fl. lapp. 38.*
- Habitat in Europæ uliginosis. 24.*
- ALOPECURUS** panicula subspicata, glumis scabris, monspellen-sis
corollis aristatis.
- Alopecurus panicula villosa oblonga folio involuta. *Sauv. monsp. 37.*
- Gramen alopecurum majus, spica prescente divulsa pilis longioribus. *Barr. ic. 115. f. 2. Scheuch. gram. 155.*
- Gramen alopecuroides anglo-britannicum maximum. *Bauh. pin. 4.*
- Alopecurus altera maxima anglica paludosa. *Morif. hist. 3. p. 191. f. 8. t. 4. f. 3.*
- Habitat in Angliæ, Galliæ humentibus. ☉*
- Smilis A. paniceo, sed triplo major. Culmi & Folia rigida. Glumæ scabræ, ore levi, utraque valvula aristata; Corollæ valvula arista brevior.*

TRIANDRIA DIGYNIA.

- panicus.** 5. **ALOPECURUS** panicula subspicata, glumis vill
corollis aristatis.
Cynofurus panicus. *Sp. pl.* 1. p. 73. *Fl. svec.* 54.
Gramen alopecurum minus, spica longiore. *Bauh.*
4. *theatr.* 57. *Scheuch. gram.* 154.
Gramen alopecurum minus, spica virefcente div
Barr. ic. 115. f. 1.
Habitat in Europæ cultis aridis. ☉
Simillimus priori, sed palmaris, mollis. Glumæ 1
scentes ore villoso; Corollæ arista calycinis etiam
vior.
- hordeiformis.** 6. **ALOPECURUS** racemo simplici, flosculis a
circumvallatis.
Habitat in India.
Habitus omnino Hordei murini. Culmus pedalis. F
plano-canaliculata, nervosa, culmo sæpius long.
Spica racemosa, longa. Flores numerosi; pedicell
rum brevissimi, simplicissimi. Calyces obvallati
aristiformibus, numerosis, floribus triplo longior
gluma bivalvi, altera minore. Corolla bivalvis
mis oblongis, acuminatis. Pistillum flore longius.
mina tria.

MILIUM.

- effusum.** 1. **MILIUM** floribus paniculatis dispersis muticis
svec. 55. 61. *Dalib. paris.* 23.
Milium glumis diphyllis. Hort. cliff. 27.
Gramen sylvaticum, panicula miliacea sparsa. 1
pin. 8. *theatr.* 131. *Scheuch. gram.* 133. *Morif.*
3. f. 8. t. 5. f. 10.
Habitat in Europæ nemoribus umbrosis. 24
- confertum.** 2. **MILIUM** floribus paniculatis confertis. *Roy. lugd.*
Gramen paniculatum alpinum latifolium, panicula
liacea sparsa. *Scheuch. gram.* 134. *Hall. helv.*
Habitat in Helvetiæ sylvis.
- paradoxum.** 3. **MILIUM** floribus paniculatis aristatis.
Agrostis paradoxá. Sp. pl. 1. p. 62.
Gramen avenaceum paniculatum galloprovinci
aquilegiæ femine. *T. Morif. hist.* 3. p. 214.
alm. 174. t. 32. f. 2.
Habitat in Gallia meridionali.
Gramen sesquipedale. Panicula alba. Calyx laxus.

men nudum, nigrum, nitidum, ovatum, apice aristata caduca.

MILIUM panicula subspicata, floribus aristatis.

lendigerum.

Gramen serotinum arvense, panicula pyramidalis.

Raj. hist. 1288, Scheuch. gram. 148.

Gramen foliaceum, panicula ramosa lutea. *Magn. monsp.*

297. *Morif. hist. 3. p. 182. f. 8. t. 3. f. 12.*

Gramen alopecuro accedens ex culmi geniculis spicas

in petiolis longiusculis promens. *Pluk. alm. 177. t. 33. f. 6.*

Habitat in Montpellier. Gouan. ☉

MILIUM paniculae ramis simplicissimis, floribus

punctatum.

alternis secundis geminis. *Amæn. acad. 5. p. 392. **

Habitat in Jamaica.

AGROSTIS.

* *Aristata.*

AGROSTIS petalo exteriori exferente aristam re-

spica venti-

ctam strictam longissimam. *Roy. lugdb. 59. Fl. svec.*

58. 62.

Gramen segetum altissimum, panicula sparsa. C. B.

Scheuch. gram. 144.

Gramen capillatum. *Bauh. hist. 3. p. 462.*

Habitat in Europa inter segetes. ☉

AGROSTIS petalo exteriori arista terminali recta

miliacea.

stricta mediocri.

Agrostis miliacea. Roy. lugdb. 59. Sp. pl. 1. p. 61. n. 2.

Habitat in Hispania. Læsting; in Sibiria. Gmelin. 24.

similis A. Spicæ venti, sed arista flosculis longitudi-

næ tantum æqualis. Culmi e radice plures. Panicula

minus ampla. Cultura etiam diversissima perstitit.

AGROSTIS panicula oblonga, petalo exteriori basi

arundinaecea

villosa, arista torta calyce longiore. *Fl. svec. 59. 63. **

Agrostis culmo enodi, panicula contracta. Fl. lapp. 44.

Gramen miliaceum sylvestre, glumis oblongis. *Pet.*

gram. 121. Raj. angl. 3. p. 404.

Gramen avenaceum, panicula acerosa, femine pappo-

so. *Dill. app. 48.*

Gramen avenaceum montanum, panicula angul
dilutissimo fusco albicante & papposa. *Scheuch. g*
507.

Habitat in Europæ monticulis silvosis glareosis ju
retis. 24.

Calamagro-
flis.

4. AGROSTIS panicula incrassata, petalo exterior
to lanato apice aristato, caule ramoso.

Gramen arundinaceum, panicula densa viridi-ai
tea splendente aristata. *Scheuch. gram. 146.*
hebr. 222. Segu. veron. 3. p. 163.

Habitat in Helvetiæ, Veronæ alpinis. 24

Similis A. arundinacæ sed corolla tota valde hirsuta.
fla recta non e basi, sed apice petali. Culmi ra
Panicula densa.

interrupta.

5. AGROSTIS petalo aristato, panicula attenuata
arctata interrupta. †

Gramen arvense paniculatum, spica interrupta. *Sch*
gram. 146.

Gramen capillatum, paniculis interruptæ angust
bus. *Vaill. 88. t. 71. f. 4.*

Habitat in Gallia, Italia.

rubra.

6. AGROSTIS paniculæ parte florente potentiss
petalo exteriore glabro terminato arista tortilli
curva. *Fl. succ. 60. 64. Dalib. parif. 24. non f*
nyma.

Agrostis panicula inferiore verticillatim laxa, sup
re contracta. *Fl. lapp. 46.*

Gramen alopecuro accedens. *Pluk. alm. 277. t*
f. 6.

Habitat in Svecia vulgaris. 24

Paniculæ verticilli florentes horizontales, nondum
rentes contracti quasi in spicam, destorata tota rube

canina.

7. AGROSTIS calycibus coloratis, petalorum
dorsalis recurva, culmis prostratis subramosis
svec. 1138. 65.

Gramen supinum caninum paniculatum, folio vari
Bauh. pin. 1. theatr. 12.

Gramen paniculatum supinum ad infima culmo
genicula foliorum capillarium geniculis fascicu
donatum. *Scheuch. gram. 141.*

Gramen caninum supinum paniculatum folio vari
Bauh. pin. 1.

Habitat in Europæ pascuis humidiusculis. 2.

Remota purpurascente lucens facilius observatur, quam proxima.

* * *Mutica.*

AGROSTIS paniculæ ramulis divaricatis muticis. culmo ramofo repente, calycibus æqualibus. *Fl. fvec. 2. n. 66.*

Stolonifera.

Agrostis culmo repente foliis radicalibus breviorē, folii suprema vagina ventricosa, flosculis muticis. *Roy. lugb. 59. Fl. fvec. 1. n. 61.*

Agrostis culmo repente, vagina supremi folii ventricosa. *Roy. lugdb. 59. Dalib. paris. 23.*

Gramen canianum lupinum minus. *Vaill. paris. 86. Scheuch. gram. 128.*

Gramen radice repente, panicula densa spicata spadiceo-viridi, locustis exiguis muticis. *Scheuch. gram. 130.*

Habitat in Europa. 3. in arena mobilis. 2.

AGROSTIS panicula capillari patente, calycibus subulatis æqualibus hispidiusculis coloratis, flosculis muticis. *Roy. lugdb. 59. Dalib. paris. 23.*

capillaris.

Agrostis panicula tenuissima. *Fl. lapp. 45.*

Agrostis panicula capillari patente, spiculis coloratis muticis. *Scop. carn. 188.*

Gramen montanum, panicula spadicea delicatiorē. *Bauh. pin. 3. prodr. 12. Scheuch. gram. 129.*

Habitat in Europæ pratis.

Panicula vere capillaris, tenuissimisque pedicellis singularis.

AGROSTIS panicula laxa, calycibus muticis æqualibus. *Roy. lugdb. 50.*

alba.

Gramen miliaceum majus, panicula spadicea & viridi. *Pet. gram. 118. 119. Raj. angl. 3. p. 404.*

Habitat in Europæ nemoribus.

AGROSTIS panicula mutica filiformi.

minima.

Gramen panicula spicata, floribus solitariis alternis. *Guett. stanp. 155. Dalib. paris. 155.*

Gramen spartum, capillaceo folio, minimum. *Dill. lapp. 173.*

Gramen minimum, paniculis elegantissimis. *Bauh. pin. 2. Scheuch. gram. 40. Morif. hist. 3. p. 200. f. 8. t.*

2. f. 10.

Gra-

Gramen minimum. *Bauh. hist.* 2. p. 465. Dale
425.

Habitat in Gallia, Germania.

virginica. 12. AGROSTIS panicula contracta mutica, f
voluto-subulatis rigidis exstantibus. *Clayt. vi*
Habitat in Virginia.

indica. 13. AGROSTIS panicula contracta mutica,
lateralibus erectis alternis.

Gramen pratense, panicula & foliis angustissimis
brevibus muticis, locustis minimis. *Sloan. j*
hist. 1. p. 115. t. 73. f. 1.

Habitat in India.

Culmus erectus. Folia plana angusta. Panic
longa e racemis lateralibus, alternis, rachi
matis; glumis brevissimis, acutis.

* * * *Cruciatae.*

radiata. 14. AGROSTIS spicis subquinis cruciatis basi
valvulis petaloideis aristatis. *Amæn. acad.* 5. p

Gramen cruciatum asurgens, spicis subhirsutis
oribus & longioribus deorsum frugiferis.
jam. 137.

Gramen Dactylon spicis gracilioribus plei
quatuor cruciformiter dispositis. *Sloan. jam.* 2
1. p. III. t. 68. f. 3.

Habitat in Indiis.

eruciata. 15. AGROSTIS spicis quaternis cruciatis basi
valvulis petaloideis aristatis.

Gramen Dactylon bicorne minimum aristis lor
matum. *Sloan. jam.* 34. *hist.* 1. p. 112. t. 6
Habitat in Jamaica.

AIRA.

* *Mutica.*

indica. 1. AIRIA spica subovata secunda, flosculis obtu
ticis, foliis planis.

Habitat in India.

Gramen procumbens, digiti longitudine. Folia
Spica secunda, conglomerata, ovato-oblonga.
obtusæ, muticæ.

crifata. 2. AIRA panicula spicata, calycibus subtrifloribus

longioribus, petalis subaristatis inæqualibus.
lugdb. 61. Dalib. parif. 27.

, spica cristata subhirsutum. *Bauh. pin. 13.*

8. *Morif. hist. 3. p. 194. f. 8. t. 4. f. 7.*

h. gram. 166.

in Angliæ, Galliæ, Helvetiæ *ficcioribus.*

foliis planis, panicula coarctata, floribus pedatis muticis convoluto-subulatis. *Fl. svec. 71.*

Dalib. parif. 26.

ulibus subulatis, panicula rara contracta. *Fl. lapp.*

oy. lugdb. 61.

arundinaceum enode minus sylvaticum. *Bauh.*

theatr. 97. Scheuch. gram. 209.

pratense serotinum, panicula rara purpura-

8. Morif. hist. 3. p. 201. f. 8. t. 5. f. 22.

in Europæ pascuis aquosis. 24

obsculis quatuor in fertiliori solo.

panicula oblonga secunda mutica imbricata, arundinacea.

planis.

orientale paniculatum, portulacæ semine.

cor. 39.

et in Oriente.

panicula laxa subfastigiata ramosissima, floscu-

liticis. *Læfl. it. 117.**

en paniculatum arvense minimum. *Buxb. cent.*

35. t. 67.?

in Hispania. *Læfling. O*

tantum a *Buxbaumiano*, quod longe minus, vix

in transversum altum.

foliis planis, panicula patente, floribus muti-

vibus calyce longioribus. *Fl. svec. 66. 68. Da-*

ris. 26.

mo inferiore repente, flosculis muticis calyce

tribus: altero pedunculato. *Roy. lugdb. 60.*

aquaticum miliaceum. *Scheuch. gram. 176. Vaill.*

89. t. 17. f. 7.

caninum supinum paniculatum dulce. *Bauh. pin. 1.*

in Europæ pascuis aquosis. 24

* * *Aristata.*

foliis planis, panicula spicata, flosculis medio-

is: arista reflexa laxiore. *Fl. svec. 65. 69.**

Aira

curvata.

arundinacea.

minuta.

aquatica.

spicata.

Aira panicula spicata, pedicellis flosculo brev.
Fl. lapp. 47.

Gramen avenaceum paniculatum alpinum hum-
cultis in spicam collectis varicoloribus :
Scheuch. gram. 221. *prodr.* 24. t. 6.

Habitat in Lapponiæ alpibus. 24.

cespitosa.

8. *AIRA* foliis planis, panicula patente, petalis
lofis aristatisque : arista recta brevi. *Fl. svec.*

Aira panicula patentissima, flosculis subaristat
ibus basi villosis, foliis planis: *Mor. act.*

1742. p. 30.

Aira panicula longissima tenui. *Fl. lap.* 50.

Gramen fegetum, panicula arundinacea. *Bauh.*
theatr. 35. *Scheuch. gram.* 244.

Gramen pratense paniculatum, locustis parvis
dentibus non aristatis. *T. Vuill. parif.* 26.

Gramen agrorum, latiore arundinacea comosa
la. *Morif. hist.* 3. f. 8. t. 5. f. 17.

Habitat in Europæ pratis cultis & fertilibus. 24.

flexuosa.

9. *AIRA* foliis setaceis, culmis subnudis, panic
varicata, pedunculis flexuosis. *Fl. svec.* 64.
lib. parif. 26.

Aira panicula rara, calycibus albis. *Fl. lapp.* 2

Gramen alpinum nemorosum paniculatum, fo
gustissimis, locustis, splendentibus aristatis. *S*
gram. 218. t. 6. f. 1.

Gramen nemorosum, paniculis albis, capillaceo
Bauh. pin. 7. *prodr.* 14. *Morif. hist.* 3. p. 30
t. 7. f. 2.

Habitat in Europæ petris, rupibus. 24.

montana

10. *AIRA* foliis setaceis, panicula angustata, fi
basi pilosis aristatis: arista tortili longiore. *F*
68. 72.

Aira panicula rara, calycibus fuscis. *Fl. lap.* 45

Gramen avenaceum paniculatum alpinum, fol
pillaceis brevibus, locustis purpureo-argen
aristatis. *Scheuch. gram.* 216. t. 4. f. 4.

Gramen avenaceum capillaceum, minoribus g
Bauh. pin. 10.

Habitat in Europæ alpinis. 24

alpina.

11. *AIRA* foliis subulatis, panicula densa, floscul
pilosis aristatis: arista brevi. *Fl. svec.* 69. 73.

Gramen avenaceum capillaceum, minoribus glumis argenteis vix aristatis, foliis angustioribus Scheuch. gram. 222.

Habitat in alpibus Lapponicis, Germania.

AIRA foliis setaceis: summo spathaceo paniculam canescens. inferne obvolvete. Roy. lugdb. 60. Fl. suec. 73. 74. Dalib. parif. 25.

Aira foliis setaceis, arista a basi glumarum calycem equante. Hort. cliff. 495.

Gramen foliis junceis, radice jubata. Bauh. pin. 5. Scheuch. gram. 243.

Gramen spartheum variegatum. Bauh. pin. 5.

Habitat in Scania & australioris Europæ arvis arenosis. ☉

Arista in medio cincta denticulis, infra crassior fusca, supra tenuior subclavata albidula. Panicula ante florescentiam spicata.

AIRA foliis setaceis: vaginis angulatis, floribus paniculato-spicatis, flosculis basi aristatis. It. scan. præcox. 226. * Fl. suec. 2. n. 75.

Gramen minimum, spica brevi habitiore, nostrum. Scheuch. gram. 219.

Gramen parvum præcox, panicula laxa canescente. Raj. ang. 3. p. 407. t. 22. f. 2. Fluk. alm. 177. t. 33. f. 9.

Habitat in Europæ australioris campis arenosis inundatis. ☉

AIRA foliis setaceis, panicula divaricata, floribus aristatis distantibus. caryophyll. lea.

Aira foliis subulatis, aristis a basi flosculorum tortilibus, flosculo altero pedunculato. Roy. lugdb. 60. Dalib. parif. 26.

Gramen phalaroides, sparsa panicula, minimum angustifolium. Barr. rar. 1218. t. 44. f. 1.

Gramen paniculatum, locustis purpureo argenteis, annuum. Raj. angl. 3. p. 407. Morij. hist. 3. p. 200. f. 8. t. 5. f. 11.

Gramen paniculatum minimum molle. Magn. monsp. 296. Scheuch. gram. 215

Caryophyllus arvensis glaber minimus. Bauh. prodr. 105.

Habitat in Angliæ, Germaniæ, Galliæ glareosis. ☉

M E L I C A.

MELICA flosculi inferioris petalo exteriori ciliato. ciliata. It. goti. 297. Fl. suec. 56. 77.

Linnei Spec. plant. pars. I. G

Me.

Melica floribus horizontaliter patentibus. *Roy. lugdb.* 57

Gramen avenaceum montanum lanuginosum. *Bauh. pin.* 10. *prodr.* 20.

Gramen avenaceum, spica simplici, locustis densissimis candicantibus & lanuginosis. *Scheuch. gram.* 174

Habitat in Europæ collibus sterilibus saxosis. 4

autans.

2. MELICA petalis imberbibus, panicula nutante simplici
Melica petalis imberbibus. *Fl. suec.* 57. 76. *Dalib. parif.* 23.

Melica floribus sub culmo pendulis. *Fl. lapp.* 36. *Roy. lugdb.* 57.

Gramen montanum avenaceum, locustis rubris. *Bauh. pin.* 10. *prodr.* 20.

Gramen montanum avenaceum spicatum. *Bauh. pin.* 10.

Gramen avenaceum, locustis rarioribus. *Bauh. pin.* 10. *prodr.* 20.

Habitat in Europæ frigidioris rupibus. 4

altissima.

3. MELICA petalis imberbibus, panicula ramosissima
Hort. ups. 20.

Melica flosculis glabris: summo urceolari. *Gmel. bot. 1. p.* 98. *t.* 20.

Gramen avenaceum, locustis rarioribus muticis, vixianum majus. *Morif. hist.* 3. *p.* 216. *f.* 8. *t.* 7. *f.* 57

Habitat in Sibiria, Canada. 4

P O A.

aquatica.

1. POA panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus. *Fl. suec.* 73. 78. *Dalib. parif.* 29

Poa panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus muticis compressis. *Afl. Stockh.* 1741. *p.* 185.

Poa panicula contracta, spicis ovatis teretiufculis. *Hort. cliff.* 494. *Roy. lugdb.* 61.

Gramen palustre paniculatum altissimum. *Bauh. pin. theatr.* 38. *Scheuch. gram.* 191.

Gramen aquaticum paniculatum latifolium. *Bauh. pin. 3. Morif. hist.* 3. *p.* 201. *f.* 8. *t.* 6 *f.* 25.

Habitat in Europa ad ripas piscinarum, fluviorum. 4

palustris.

2. POA panicula diffusa, spiculis subtrifloris, foliis fuscis scabris †

Gramen paniculatum aquaticum angustifolium, panicula speciosa. *Scheuch. gram.* 184.

Gramen palustre, panicula speciosa. *Bauh. pin. 3. prodr.*

7 Moris. hist. 3. p. 2. t. 1. f. 8. t. 6. f. 27.

Habitat in Helvetiæ, Italiæ paludibus.

Dignoscitur, dum runcantur agri oryzacei, tenelli foliis glaucis, adultior spinulis foliorum. *Segu. veron.*

1. p. 351.

POA panicula diffusa ramosissima, spiculis sexfloris alpina. cordatis. *Fl. succ. 79. Dalib. paris. 28.*

Gramen alpinum paniculatum majus, panicula speciosa variegata. *Scheuch. gram. 186. Hall. h. l. v. 214*

Gramen alpinum latifolium, panicula laxa foliacea, foliolis in panicula paucioribus & magis crispis. *Scheuch. gram. 212.*

gram. 212.

Habitat in alpibus Lapponicis, Helveticis. 24

An hæc α . β . sequentis tantum varietas?

POA panicula subdiffusa, spiculis trifloris basi pubescentibus, culmo erecto tereti. *Fl. succ. 78. 80. Dalib. paris. 28.*

Fl. succ. 78. 80. Dalib. paris. 28.

Gramen pratense paniculatum medium. *Bauh. pin. 2. Scheuch. gram. 180.*

Scheuch. gram. 180.

Habitat in Europæ pascuis. 24

POA panicula diffusa, spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tereti. *Fl. succ. 77. 81. Dalib. paris. 28.*

Fl. succ. 77. 81. Dalib. paris. 28.

Poa spiculis ovato-oblongis, foliis subulatis *Fl. lapp. 52.*

Gramen pratense paniculatum majus, angustiore folio. *Bauh. pin. 2. prodr. 5. Scheuch. gram. 178.*

Bauh. pin. 2. prodr. 5. Scheuch. gram. 178.

Habitat in Europa ad agrorum versuras. 24

POA panicula diffusa, spiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti. *Fl. succ. 76. 82. Dalib. paris. 27.*

POA spiculis ovatis compressis muticis. *Fl. lapp. 51. Hort. cliff. 27. Roy. lugab. 61.*

Gramen pratense paniculatum majus (latiore folio. *Bauh. pin. 2.) Scheuch. gram. 177.*

Habitat in Europæ pratis fertilissimis.

Limites pro speciebus 3. 4. 5. 6. rite discernendis vix dum perspicue dati sunt.

POA panicula diffusa angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso. *Fl. succ. 75. 83. Dalib. paris. 28.*

Gramen pratense paniculatum minus. *Bauh. pin. 2. theat. 31.*

theatr. 31.

- Gramen pratense minus vulgatissimum. *Raj. hist.* 1285.
 β. Gramen pratense paniculatum minus rubrum. *Tourne
 inst.* 522.

Habitat in Europa ad vias. ☉

stava.

8. POA panicula diffusa, spiculis ovato-oblongis nitidi
Gron. virg. 13.

Gramen pratense majus virginianum. *Pet. mus.* 239.

Habitat in Virginia.

pilosa.

9. POA panicula patente stricta: ramificationibus prima
 riis pilosis.

Gramen, paniculis elegantissimis, majus, locustis pur
 pureo-spadiceis minoribus. *Scheuch. gram.* 193.

Habitat in Italia.

amabilis.

10. POA panicula patente, spiculis octifloris linearibus
Fl. zeyl. 46. *

Habitat in India.

Eragrostis.

11. POA panicula patente, pedicellis flexuosis, spiculis
 ferratis decemfloris.

Gramen, paniculis elegantissimis, minimum. *Scheuch
 gram.* 192.

Gramen Phalaroides, sparsa brizæ panicula, minu
Barr. ic. t. 44. f. 2.

Habitat in Italia supra muros. D. Bæck.

*Affinis Brizæ Eragrosti; statura Poæ annuæ. Cul
 decumbentes. Folia pilosa.*

capillaris.

12. POA panicula laxa patentissima capillari, foliis pil
 sis, culmo ramosissimo.

Poa culmo subcompresso, panicula tenuissima, spic
 lis trifloris minimis, flosculis basi pubescentibus. *Kal
 it. 3 p. 291.*

Poa panicula laxa erecta stricta, spiculis erectis oblo
 ngis. *Gron. virg.* 136.

Gramen paniculatum virginianum, locustis minime
Morif. hist. 3. p. 202. f. 8. t. 6. f. 33.

Habitat in Virginia, Canada. P. Kaln.

*Panicula capillacea, strictissima, patentissima, ramo
 sima. Spicula ex flosculis 4. 5. f. 6 minima. Folia
 ad basin pilis longis raris. Culmus ramosus.*

malabarica.

13. POA paniculæ ramis simplicissimis, floribus sessilibus
 leminibus distantibus, culmo repente.

Habitat in Indiæ arenosis.

chinensis.

14. POA paniculæ ramis simplicissimis, floribus sessilibus
 bus, feminibus imbricatis, culmo erecto.

Habitat in India. Osbeck.

Rami paniculae simplicissimi, ut in antecedente, magis conferti, Flores minores; Flosculi 4, nec septem.

5. POA panicula oblonga capillari subverticillata, flo- tenella.
sculis sexfloris minutissimis.

Gramen paniculatum ex oris malabaricis, panicula de-
licatiore. *Pluk. alm. 176. t. 300. f. 2.*

Gramen paniculatum, locustis tenuissimis subrotundis.
Burm. zeyl. 110. t. 47. f. 3.

Gramen fumi. *Rumph. amb. 6. t. 4. f. 3.*

Tiama-pullu. *Rheed. mal. 12. p. 75. t. 4.*

Habitat in India.

Gramen bipedale, Foliis longis. Panicula angustata, ra-
mulis confertissimis, subramosis ut fere verticillata ap-
pareat; Flores tam parvi, ut nudis oculis vix flo-
sculi numerentur ante maturitatem.

6. POA panicula lanceolata subramosa, floribus alter- rigida.
nis secundis. *Amæn. acad. 4. p. 265. + Roy. lugdb. 62. Guett. stamp. 62.*

Gramen exile duriusculum in muris & aridis proveniens.
Raj. angl. 3. p. 410.

Gramen arvense, filicina duriore panicula. *Barr. ic. 49.*

Gramen Loliaceum murorum duriusculum, spica ere-
cta rigida. *Morif. hist. 3. p. 182. f. 8. t. 2. f. 9.*

Gramen panicula multiplici. *Bauh. pin. 3. prodr. 6.*

Habitat in Galix, Anglix siccis. ☉

7. POA panicula secunda coarctata, culmo obliquo compressa.
compresso. *Fl. svec. 74. 84. It. gotl. 178. Dalib. paris. 28.*

Poa spiculis ovatis compressis muticis, panicula secun-
da coarctata. *Aët. stockh. 1741. p. 184.*

Gramen murorum, radice repente. *Bauh. pin. 2. prodr. 2.*

Gramen paniculatum, radice repente, culmo com-
presso. *Vaill. paris. 91. t. 18. f. 5.*

Gramen paniculatum, radice repente, culmo compresso,
locustis distichis pulchellis. *Scheuchz. gram 198.*

Habitat in Europæ & Americæ septentrionalis siccis,
muris, testis. 24

Americana flosculis sepius ternis, Europæa vero senis,
habitus tamen idem & structura.

nemoralis.

18. POA panicula attenuata, spiculis sub-bifloris munatis scabris, culmo incurvo. *Fl. fvec. 2. n. 3.*
 Gramen sylvaticum, panicula tenui e raris locis composita. *Dill. spec. 57.*
 Gramen paniculatum angustifolium alpinum, locis rarioribus & angustioribus non aristatis. *Sci gram. 164. t. 2.*
 Gramen nemorosum, panicula laxa, radice rep. *Vaill. parif. 90.*
 Gramen loliaceum alpinum, paniculis ex raro & exiguis locustis compositum. *Mont. gram. 3.*
 β. Gramen cirrhosa & villosa spongia ad singula gen. donatum, paniculatum minimum alpinum. *Mus. 2. p. 70. t. 59.*

Habitat in Europa ad radices montium umbras. 2.

bulbosa.

19. POA panicula secunda patentiuscula, spiculis drifloris.

Poa culmorum basi tuberosa. *Guett. stamp. 1. p. Dalib. parif. 29.*

- α. Gramen xerampelinum, miliacea prætenui ramis sparsa panicula f. Xerampelino congener arvenstivum, Gramen minutissimo semine. *Lob. 14. Scheuch. gram. 185.*
 β. Gramen arvense, panicula crispa. *Bauh. pin. 3. ic. 703.*

Gramen arvense angustifolium. panicula densa folioliis in panicula angustissimis. *Scheuch. gram. 1.*

- γ. Gramen vernum, radice ascalonica. *Vaill. parif. 17. f. 8.*

Habitat in Gallia, Hispania, Oriente, Nycopia S. In α. culmi semper inclinati; in γ. Glumæ inæqualiæ latæ planæ, aliæ contractæ longiores.

ciliaris,

20. POA panicula glomerata, glumarum valvulis rioribus piloso-ciliatis. *Amæn. acad. 5. p. 2.*
 Briza tenuissima, paniculis quasi lanuginosis, pediculis brevibus & tenuissimis. *Brown. Jam. 135.*
 Gramen pratense, panicula & foliis angustissimis ciliatis brevibus muticis, locustis minimis. *Sloa. 35. hist. 1. p. 114. t. 73. f. 1.*
Habitat in Jamaica.

BRIZA.

minor.

1. BRIZA spiculis triangulis, calyce flosculis (7) minore.
Hort. cliff. 23. Roy. lugdb. 63.

Gramen tremulum minus, panicula parva. Bauh. pin. 2. prodr. 4.

Habitat in Helvetia, Italia. ☉

BRIZA spiculis ovatis, calyce flosculis (7) æquali. *virens.*

Gramen paniculatum minus, locustis magnis tremulis.

Tournef. inst. 523.

Habitat in Oriente, Hispania. ☉ Alstræmer.

Smillima B. mediæ, sed Folia duplo latiora, planiora, decurrentia per ligulam acutam. Panicula similima, copiosior, viridis nec purpurascens, ramulis magis ramosis, divaricatissimis, nodis callosis eos basi deprimentibus. Flores paullo minores, dum comprimuntur facile decidui.

BRIZA spiculis ovatis, calyce flosculis (7) brevior. *media.*

Hort. cliff. 23. Fl. svec. 80, 86. Roy. lugdb. 63.

Gramen tremulum majus. Bauh. pin. 2. Scheuch. gram. 204.

Habitat in Europæ pratis siccioribus. 2.

BRIZA spiculis cordatis, flosculis septendecim. *Hort. maxima.*

cliff. 23. Hort. upf. 20. Roy. lugdb. 63.

Gramen tremulum maximum. Bauh. pin. 2. Scheuch. gram. 202.

Habitat in Italia, Lusitania.

BRIZA spiculis lanceolatis, flosculis [viginti. *Eragrostis.*

Briza panicula spicata, spiculis lanceolatis. Guett. stamp. 1. p. 163.

Uniola calycibus diphyllis, spiculis ovato-lanceolatis.

Gron. virg. 136.

Gramen paniculis elegantissimis. Bauh. pin. 2. Scheuch.

gram. 194. Morif. hist. 3. p. 204. f. 8. 4. 6. f. 52.

Gramen Erantheum f. Eragrostis Barr. rar. t. 43.

Habitat in Europa australi ad agrorum versuras.

UNIOLA.

UNIOLA paniculata, spiculis ovatis. *paniculata.*

Uniola calycibus polyphyllis. Gron. virg. 136.

Uniola. Hort. cliff. 23. Roy. lugdb. 63.

Gramen myloicophorum oxyphyllon carolinianum.

Pluk. alm. 173. t. 32. f. 6. Cartejb. car. 1. p. 32. t. 32.

Habitat in Carolina.

- bipennata. 2. **UNIOLA** panicula subspicata, racemis pinnatis subtus imbricatis.
 Briza bipinnata. *Syst. nat.* 10. p. 875. *Amæn. acc.* 4. p. 450.
Habitat in Ægypto. Hasselquist.
 Gramen omnium speciosissimum. Culmi magnitudinis Tritici simplices. Racemus simplex, pedalis et pedunculis alternis, simplicissimis, æqualibus, utriusque longitudinaliter a basi ad apicem pinnatis. Floribus sessilibus, approximatis, compressis, æqualibus, compressis, planatis more Cyperi. Glumæ compressæ, carinatae acutiuscule, ovatae.
- mucronata. 3. **UNIOLA** spica disticha, spiculis ovatis, calycibus subaristatis.
Habitat in India. Burmannus.
 Culmus pedalis, lævis. Folia angusta, glabra vaginatis. Spica disticha ex floribus 11. s. 12, alternis, distichis, subsessilibus, ovatis, glabris, septem floris. Calyx mucronatus fere in aristas.
- spicata. 4. **UNIOLA** subspicata, foliis involutis rigidis.
 Gramen parvum, maritimum spicatum, foliis angustis rigidis. *Clayt.* 507.
Habitat in Americæ borealis maritimis.
 Culmus spithamæus, foliis alternis rigidis involuto-mucronatis. Panicula minima, coarctata, ut vix figuræ pedicellorum, secunda; Calyx 3 glumæ carinatae spiculis quatuor.

DACTYLIS.

- cynosuroides. 1. **DACTYLIS** spicis sparsis secundis scabris numerosis.
Læfl. it. 115. *
 Gramen maritimum, spica crassa dactyloide terminali, odore rancido, culmo albo. *Gron. virg.* 135.
 Dactylis spicis alternis secundis incisus erectis approximatis, calycibus unifloris subulatis. *Gron. virg.* 134.
 Spartum effexiense, spica gemina. *Raj. angl.* 3. 1393.
Habitat in Virginia, Canada, nunc in Lusitania, Angliæ.
 Culmus bipedalis, arundinaceus. Folia in culmo sexnervi, lata, culmo longiora, levissima, margine scabra in curva, pagina interiore glauciora. Spicæ sex s. plurimæ, secundæ, divergentes, paleaceæ; flosculis imbricatis latere postico scabris. Calycibus unifloris caudicibus

vina scabris, mucronatis, flosculo longioribus, sessilibus, secundis. Pistillis villosis longioribus.

DACTYLIS panicula secunda glomerata. *Fl. suec. glomerata.*
I. n. 87.

Cynosurus panicula secunda glomerata. *Fl. suec. 2.*
n. 85.

Poa flosculis confertis uno versu dispositis. *Hort. cliff.*
28. *Roy. lugdb. 62.*

Gramen spicatum, folio aspero. *Bauh. pin. 3. prodr.*
9. *Scheuch. gram. 299. Moris. hist. 3. f. 8. t. 6. f. 38.*

Habitat in Europæ cultis ruderatis. 24

CYNOSURUS.

CYNOSURUS bracteis pinnatifidis. *Hort. cliff. 493. cristatus.*
Fl. suec. 81. 88. Roy. lugdb. 64.

Gramen pratense cristatum, f. spica cristata lævi. *Bauh.*
pin. 2. prodr. 8. Scheuch. gram. 79.

Gramen cristatum. *Bauh. pin. 2. p. 468.*

Habitat in Europæ pratis. 24

CYNOSURUS bracteis pinnato - paleaceis aristatis. *echinatus.*
Roy. lugdb. 64.

Gramen alopecuroides, spica aspera. *Bauh. pin. 4.*
Scheuch. gram. 80.

Gramen alopecurum; spica aspera. *Bar. rar. t. 123.*

Habitat in Europa australiori, Oriente.

CYNOSURUS spica secunda, calycis gluma interiore spiculis subjecta. *Læfl. it. 41.*

Habitat in Hispania. O

Gramen vix *spithamæum*. *Foliorum vaginæ tumidiu-*
scule, folio ipso parvo. Spica secunda, arcte imbricata,
oblonga, ex floribus secundis, sessilibus, duplici serie,
compresso-carinatis: calycina valvula exteriori com-
pressa, majore; flores singuli constant flosculis 5.

CYNOSURUS spiculis alternis secundis sessilibus duris.
rigidis obtusis appressis.

Gramen arvense, polypodii panicula crassiore. *Bar.*
rar. 1213. t. 50.

Habitat in Europa australi.

Spica lanceolata, obtusa: spiculis appressis, secundis,
duplici serie imbricatis rachi rigida. Generis dubii
gramen.

- cæruleus.** 5. **CYNOSURUS** bracteis integris. *Hort. eliff. Fl. fvec. 82. 89. Roy. lugdb. 64.*
 Gramen glumis variis. *Bauh. pin. 10. prodr. 21. Sc gram. 83.*
Sesleria. Scop. carn. 189.
Habitat in Europæ pascuis uliginosis. Halæ ad nas. 24
- virgatus.** 6. **CYNOSURUS** panicula ramis simplicibus, sessilibus subseffloris: ultimo sterili; infimis fistatis. *Amæn. acad. 5. p. 393. **
 Gramen loliaceum panicula e spicis simplicibus tribus, spicillis minimis compressis distichis alii *Brown. j m. 137.*
 Gramen Dactylon panicula longa e spicis pluribus gracilioribus mollibus constante. *Sloan. jam. 3. 1. p. 113. t. 70. f. 2.*
Habitat in Jamaica.
- ægyptius.** 7. **CYNOSURUS** spicis quaternis obtusis pater dimidiatis, calycibus mucronatis, caule repleto
 Cynosurus spicis quaternis terminalibus horizontalibus
Roy. lugdb. 64.
 Gramen ischæmum malabaricum speciosius, longius mucronatis foliis. *Pluk. alm. 175. t. 300.*
 Gramen Dactylon ægyptiacum. *Bauh. pin. 7. theatt Roy. lugdb. 109. Morif. hist. 3. p. 184. f. 8. t. 1. Scheuch. gram. 109.*
Habitat in Africa, Asia, America.
- indicus.** 8. **CYNOSURUS** spicis digitatis linearibus, culmis compressis declinatis basi nodosis, foliis alternis.
 Cynosurus spicis aggregatis terminalibus deorsum fistatis. *Roy. lugdb. 65.*
 Gramen Dactylodes spicis deorsum aristatis. *Zeyl. 106. t. 47. f. 1.*
 Gramen vaccinum femina. *Rumph. amb. 6. p. 4. f. 2.*
 Kavara-pullu. *Rheed. mal. 12. p. 131. t. 69.*
Habitat in Indiis. ☉
A casu seminum remanent Spicæ pectinatæ glumis calycum quarum laterales patent carina scabra.
- obracanus.** 9. **CYNOSURUS** spicis digitatis incurvatis, caule erecto compresso, foliis suboppositis.

Gramen Dactylon ægyptiacum. *Bauh. pin. 7. theatr.*
110.

Gramen Dactylon americanum minus. *Scheuch. gram.*
107.

Gramen Dactylon orientale majus frumentaceum, fe-
mine napi. *Pluk. alm. p. 174. t. 91. f. 2. Raj.*
suppl. 606.

Panicum gramineum f. Naatsjoni. *Rumph. amb. 5. p.*
203. t. 76. f. 2.

Joem & Sabil. *Vest. ægypt. 52. t. 53.*

Hitti-Pullu. *Rheed. mal. 12. p. 149. t. 78.*

Habitat in India. ☉

Sulmi quadripedales, erecti, compressi, foliorum peti-
olis obtecti. Folia longiora, bifaria, margine & pa-
gina superiore, imprimis versus fauces, pilis raris
longis villosa. Vaginis oppositis, compressis, am-
plexicaulibus. Spicæ cruciatæ 4. f. 6. terminales,
raro unica inferiore, lineares, strictæ, erectiusculæ,
digiti longitudine, bifariam subtus floribus imbricatæ,
supra nudæ pedunculo carinato. Maturescentes spicæ
latiores evadunt, sæpe pedunculo plano membranaceo f.
explanato incurvantur. Semina subglobosa, magna,
quadruplici serie tumentia, nuda.

CYNOSURUS paniculæ spiculis sterilibus pendu-
lis ternatis, floribus aristatis. aureus.

Gramen barcinonense, panicula tensa aurea. *Tournef.*
inst. 523. Shaw. afric. 232. f. 232.

Gramen panicula pendula aurea. *Bauh. pin. 3. theatr.*
33. *Scheuch. gram. 149.*

Gramen sciurum f. alopecurum minus, he eromalla
panicula. *Barr. rar. 1180. t. 4.*

Habitat in Europa australi, inter saxa & rupes, & in
Oriente. ☉

Paniculæ ternatæ, steriles; Calyce bivalvi, lineari, a-
guminato, involvente Glumas plurimas, solitarias,
alternas ovatas, obtusas, concavas, absque valvula
minore, staminibus aut pistillis; nequeunt commode dici
flores, sed potius pro involucris haberi; Flores bini ad
basin spicularum, Calyce lineari, longitudine flosculorum,
bifloro; Flosculo inferiori sessili: Gluma exteriore ova-
ta, infra apicem arista longa recta; interiore angustis-
sima. Flosculus alter, pedunculo longitudine flosculi
prioris, minor, simillimus; tertii flosculi solum rudi-
mentum apparet.

TRANDERA DIGYNIA.

FESTUCA

Festuca juncea

1. FESTUCA panicula secunda coarctata aristata, *Herb. Metzgeri nomenclato*, foliis fetaceis. *Fl.*
57. 51

Folia foliis fetaceis compressis : caulino latiore, *Herb. Metzgeri nomenclato*, corollis acuminato
Herb. All. Stockh. 1741. p. 184.

Folia foliis fetaceis, panicula ramosa, floribus
tristat. anteriorum spectantibus, glumis subul
Roy. lugdb. 62.

Folia spiculis ovato-angustis aristato-acuminatis
Lapp. 77.

2. Panicula, foliis, junceis brevibus, majus, radice
Herb. Fench. p. 5. prodr. 34. Scheuch gram. 279.
Gramen capillatum, paniculis nigricantibus. *Laf. p.*
110. t. 24.

Gramen capillatum, locustis pennatis non aris
Hall. parif. 2.

Habitat in Europæ collibus apricis aridis vulg
um 24

3. Panicula spiculis viviparis. *Fl. suec. 1. n. 94.*

Gramen paniculatum sparteum alpinum, panicula
gusto spadiceo viridi, proferum. *Scheuch. g.*
213. t. 1. Roy. angl. 3. t. 22. f. 1.

Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ, Scotia.

4. FESTUCA paniculae ramis simplicibus, spic
ulis illis.

Habitat in Arabia, Palestina. 24

Ulex cretensis paniculae africæ, longissime reptans
tristat, vestita hinc foliorum rudimentis. Culmus
quam se quædam. Folia involuto-filiformia. Pa
culi oblonga ramis alternis, secundis, simpliciss
quibus nascuntur Spiculae filiformes, alternæ, plurim
imbricatæ, trifloræ, annuatæ, nuticæ.

5. FESTUCA Gramen secundum oblonga, spiculis
tristat oblongis, foliis fetaceis.

Festuca paniculae mutante inferne ramosa, spiculis
tristatibus hirsutis, foliis fetaceis. *Roy. lugdb.*

Gramen praeterea panicula durio e laxa unam partem
spectant *180. angl. 3. p. 413. t. 19. f. 1.*

Gramen tenue duriusculum & pene junceum. *Bauh. hist. 2. p. 463.*

Habitat in Europæ pratis siccis.

FESTUCA panicula spiciformi pubescente, foliis dumetorum. filiformibus.

Habitat in Hispania. 2.

Culmi pedales s. sesquipedales, filiformes, teretes gemiculis duobus tumidis. Folia Radicalia pedalia, teretia, vix ancipitia; Caulina breviora, canaliculata. Panicula parva, quasi spicata. Spiculæ 10. f. 12. oblongæ, pubescentes, canescentes: inferiores geminae, pedicellatæ; superiores sessiles, solitariae. Glumæ terminatæ arista minuta. *Figura Moris. hist. 3. f. 8. t. 2. f. ult. hanc refert. Bulbi sæpe prognascuntur intra vaginas culmi. Affinis valde F. duriusculæ.*

FESTUCA panicula secunda scabra, spiculis sex-floris aristatis: flosculo ultimo mutico, culmo semit-reti. *Fl. suec. 93. 92. **

Gramen alpinum pratense, panicula duriore laxa spadicea: locustis majoribus. *Scheuch. gram. 287.*

Habitat in Europæ sterilibus siccis.

Similitudine, colore maturitatis rubro, culmo tereti, sed altero latere planiusculo, distinguitur a *F. ovina.*

FESTUCA panicula flexuosa, spiculis secundis inclinatissimis submuticis, foliis setaceis. *Roy. lugdb. 68.*

Gramen montanum, foliis capillaribus longioribus, panicula heteromalla spadicea & velut amethystina. *Scheuch. gram. 276.*

Habitat in Italia, Gallia, Anglia.

FESTUCA panicula erecta ramosa, spiculis sessilibus carinatis muticis.

Habitat in Palæstina.

Stemmus altus, ramosus. Folia e vaginis latiusculis, angusta, longitudinaliter involuta, longa, subulata. Panicula erecta, ramosa & subdivisa. Spiculæ erectæ, pollicares, longæ, carinatæ, muticæ, obscuræ: flosculis 16. f. 24.

FESTUCA panicula spicata nutante calycibus minutissimis muticis, floribus scabris longius aristatis. *Roy. lugdb. 68.*

Gramen festuceum myurum, minori spica hetero-
la. *Barr. 10. t. 99. f. 1. Scheuch. gram. 194.*

Gramen murorum, spica longissima. *Kaj. ang. 3.
415. hist. 286. Morif. hist. 3. p. 215. f. 8. t. 7. f.*
Habitat in Anglia, Italia, Barbaria.

maritima.

9. **FESTUCA** spica lineari secunda recta, floribus
pressis subaristatis. *Læfl. it. 44.*

Gramen exile duriusculum maritimum. *Scheuch. g.
272.*

Habitat in Hispania. ☉

Gr. vix spithameum. Flores omnino spicati, se-
aristis capillaribus. Spiculæ sexfloræ. Folia sub-
vaginis striatis.

bromoides.

10. **FESTUCA** panicula secunda, spiculis erectis
vibus, calycis altera valvula integra, altera ar-

Festuca spicis erectis ad unum latus, palea altera
lycina minima, altera acuminata. *Roy. lugdb. 6.*

Gramen paniculatum bromoides minus, paniculis
statis unam partem spectantibus. *Raj. angl. 3. p.
hist. 1287. Pluk. alm. 174. t. 33. f. 10. Scheuch.
gram. 297.*

Habitat in Anglia, Gallia.

*Differt a F. myuro panicula subspicata, glumis
ciliatis.*

calycina.

11. **FESTUCA** panicula coarctata, spiculis linearibus
calyce flosculis longiore, foliis, basi barbatis. *Acad.
3. p. 400. **

Festuca panicula contracta, spiculis linearibus multo
longitudine calycis. *Læfl. it. 116. **

Habitat in Hispania. ☉

*Folia Radicalia in cespitem collecta. Culmi firmi
mes, angusti, digitales. Panicula attenuata,
tracta. Calyx spiculæ longitudine.*

** Panicula equali.*

decumbens.

12. **FESTUCA** panicula erecta, spiculis subovatis
ticis, calyce flosculis majore, culmo decumbente.
Fl. succ. 92. 93. lt. scan. 226.

Gramen montanum avenaceum, locustis muticis
mentibus, pilosum. *Scheuch. gram. 70.*

Gramen triticeum palustre humilius, spica mutica
viore. *Morif. hist. 3. p. 177. f. 8. t. 1. f. 6.*

Gramen avenaceum parvum procumbens, paniculis non aristatis. *Raj. angl.* 3. p. 408. *hist.* 1288. *Pluk. a'm.* 174. t. 34. f. 1. *Mon. prodr.* 53. t. 2. f. 1. *Habitat in Europæ pascuis sterilibus.*

FESTUCA panicula secunda erecta, spiculis subaristatis exterioribus teretibus. *Fl. suec.* 91. 94.

Festuca panicula spicata, spiculis uno versu inclinatis submuticis. *Roy. lugdb.* 68.

Gramen loliaceum, spica divisa, pratense majus. *Morif. hist.* 3. p. 184. f. 8. t. 2. f. 15.

Gramen spartum, spica brizæ paniculata & corniculata. *Barr. rar.* 1154. t. 25.

Gramen paniculatum elatius, spicis longis muticis squamosis. *Vaill. parif.* 92.

Gramen arundinaceum, spica multiplici, Calamagrostis. 1. *Bauh. pin.* 6. ex *Vaillant.*

Gramen pratense majus, locustis tumidis. *Buxb. cent.* 5. p. 41. t. 16.

Gramen arundinaceum aquaticum, panicula avenacea. *Raj. angl.* 3. p. 411.

Habitat in Europæ pratis fertilissimis. 24

FESTUCA panicula ramosa erecta, spiculis subsessilibus teretibus muticis. *Fl. suec.* 90. 95.

Spica spiculis oblongis erectis. *Hort. cliff.* 28. *Roy. lugdb.* 62.

Gramen aquaticum fluitans, multiplici spica. *Bauh. pin.* 2. *theatr.* 41. *Scheuch. gram.* 199.

Gramen loliaceum fluitans, spica longissima divisa. *Morif. hist.* 3. p. 183. f. 8. t. 3. f. 16.

Habitat in Europæ fossis & paludibus.

FESTUCA panicula spicata lobata, spiculis ovatis cristatis sexfloris hirsutis. *Læfl.*

Habitat in Lusitanix collibus sterilibus.

Summi e radice plurimi, vix digiti longitudine. Panicula subspicata, fere ovata, diversa ab Aira cristata floribus pluribus iisque hirsutis, culmo brevior, facie autem ei accedit.

FESTUCA panicula patente, spiculis quadrifloris subaristatis, culmo assurgente tecto foliis brevissimis patentibus. *ferotina.*

Gramen loliaceum ferotinum, panicula dispersa. *Seu. u. ver.* 3. p. 146. t. 3. f. 2.

Habitat Veronæ. Seguier.

*Culmi decumbentes articulis numerosissimis. Folia
na. Flosculi remoti arista brevissima.*

B R O M U S.

secalinus.

1. **BROMUS** panicula patente, spiculis ovatis, ar
rectis. *Fl. suec. 84. 96.*

*Festuca culmo paniculato, spicis compresso-ova
Fl. lapp. 28. Roy. lugdb. 67.*

*Festuca graminea, glumis hirsutis. Bauh. pin.
theatr. 143. Scheuch. gram. 250.*

*Gramen avenaceum segetale majus, gluma turgida
Morif. hist. 3. f. 8. t. 7. f. 17.*

- β. **Bromus hordeaceus** panicula erecta coarctata. *Fl.
1 n. 87. Sp. pl. 1. p. 77.*

Habitat in Europæ agris secalinis arenosis. ☉

mollis.

2. **BROMUS** panicula erectiuscula, spicis ovatis
rectis, foliis mollissime villosis.

*Gramen avenaceum locustis villosis angustis ca
cantibus & aristatis. T. Scheuch. gram. 254.*

*Gramen avenaceum pratense, panicula squamata
villosa. Morif. hist. 3. p. 213. f. 8. t. 7. f. 18.*

*Festuca avenacea hirsuta, paniculis minus sparsis.
hist. 1289.*

Habitat in Europæ australioris siccis. ♂

*Similis B. secalino, sed albido-pubescens. Gra
crassiora, cylindrica, subtus inprimis valde h
Folia utrinque mollissima vaginis striatis. Pan
brevius pedicellata.*

squarrosus.

3. **BROMUS** panicula nutante, spicis ovatis: arista
varicatis.

*Festuca graminea, glumis vacuis. Scheuch. gram.
t. 5. f. 11.*

*Gramen avenaceum, locustis amplioribus candic
bus glabris aristatis. Tournes. inst. 525.*

*Gramen phalaroides acerosum, nutante spica. Bar
24. f. 1.*

- γ. **Gramen festuceum** majus, locustis crassis lanug
sis. *Buxb. cent. 5. p. 19. t. 38. f. 1.*

Habitat in Gallia, Helvetia, Sibiria.

*Panicula nutans, Spicæ glabræ, ovate: pedicellis
priis filiformibus, versus apices incrassatis. An
divaricatæ.*

BROMUS panicula nutante crispa, foliis utrinque nudis: vaginis pilosis, glumis villosis purgans.

Gramen bromoides catharticum. *Few. peruv.* 705. t. 1?

Habitat in Canada. Kalm. 24

Culmus sesquipedalis, firmus. Folia latitudine arundinis, carinata, viridia, supra fere nuda, subtus omnino glabra. Vaginæ foliorum retrosum pilosæ. Panicula crispa, flexuosa, nutans. Spiculæ flosculis 8, ad 14, oblongæ. Glumæ pilis brevissimis undique extus villosæ. Arista sub apice glumæ exterioris. Differt nostra a Fevillæi radicibus fibrosis, nec squamosis; spiculis augustioribus.

BROMUS panicula nutante, foliis utrinque vaginisque subpilosis, glumis ciliatis. ciliatus

Habitat in Canada; ex semine D. Kalm. 24

Culmi tenues. Folia utrinque & vaginæ vix manifeste pubescentes. Panicula valde nutans, non crispis pedunculis. Spiculæ oblongæ, compressæ, petalorum marginibus (non dorso) valde pilosis, qua nota facile distinguitur. Flosculi 8, sub apice aristati; Calyces nudi. Glumæ corollæ lanceolatae.

BROMUS panicula patula, spiculis oblongis distichis, glumis subulato-aristatis. sterilis.

Festuca avenacea sterilis elatior. Bauh. pin. 9. *Morif. hist.* 3. p. 212. f. 8. t. 7. f. 11.

Gramen avenaceum, panicula sparsa, locustis majoribus & aristatis. T. Scheuch. gram. 258.

Habitat in Europæ australioris agris, sylvis.

BROMUS panicula nutante, spiculis ovato-oblongis. *Fl. svec.* 85. 97. arvensis.

Bromus culmo paniculato, spicis compressis. F. lapp. 27. *Hort. cliff.* 25.

Festuca graminea, juba effusa. Bauh. pin. 9. *prodr.* 19. *Scheuch. gram.* 262.

Festuca avenacea sterilis elatior circa Upsaliam. Rudb. clyf. 1. p. 87. f. 7. *opt.*

Festuca graminea nemoralis latifolia mollis. Bauh. pin. 9. ?

Gramen avenaceum dumetorum panicula sparsa. Raj. angl. 3. p. 415. *Vaill. parif.* 93.

Gramen avenaceum dumetorum paniculatum majus hirsutum. Morif. hist. 3. p. 213.

Linnaei spec. plant. P. 1.

H

Ægi-

Ægilops major, caule & foliis arundinaceis, locustis glabrioribus & angustioribus e fusco xerampelino
Dill. app. 60.

Habitat in Europa ad versuras agrorum. ☉

tractorum,

8. **BROMUS** panicula nutante, spiculis linearibus. *F. spec. 86, 98.* *

Gramen murorum, spicis pendulis angustioribus
Tournes. paris. 91.

Festuca avenacea sterilis, spicis erectis. *Raj. angl. p. 413. Pluk. alm. 174. t. 299. f. 2.*

Festuca avenacea sterilis, pedicellis brevioribus & spicis erectis. *Morif. hist. 3. p. 212. f. 8. t. 7. f. 13.*

Habitat in Europæ collibus siccis & tectis terrestribus. ♂

madritensis,

9. **BROMUS** panicula patulo-erecta, spiculis linearibus: intermediis geminis, pedicellis incrassatis.
mæn. acad. 4. p. 265. *

Bromus sterilis, erecta panicula, major. *Barr. ic. 76. f.*

Gramen Bromoides pumilium, locustis erectis majoribus aristatis. *Scheuch. gram. 260.*

Habitat in Hispania, Anglia.

rubens.

10. **BROMUS** panicula fasciculata, spiculis subsessilibus villosis, aristis erectis. *An.æn. acad. 4. p. 265.*

Gramen panicula molli rubente. *Lauh. hist. 2. p. 40.*

Habitat in Hispania.

scoparius.

11. **BROMUS** panicula fasciculata, spiculis subsessilibus glabris, aristis patulis. *Amæn. acad. 4. p. 266.* *

Habitat in Hispania.

giganteus.

12. **BROMUS** panicula nutante, spiculis quadrifloris: aristis brevioribus. *Fl. spec. 2. n. 99. it. Jean. 394.*

Gramen sylvaticum glabrum, panicula recurva. *V. paris. 93. t. 18. f. 3.*

♁. Bromus paniculæ ramis conjugato-binatis. *Fl. fr. 1. n. 88.*

Festuca foliis digiti latitudine longissimis, panicula laxa. *Roy. lugdb. 69.*

Gramen bromoides aquaticum latifolium, panicula sparsa tenuissima aristata. *Scheuch. gram. 264.*

Habitat in Europæ sylvis siccis. ♀

racemosus.

13. **BROMUS** racemo simplicissimo, pedunculis unifloris, floribus subsessilibus lævibus aristatis.

Fe-

Festuca avenacea spicis strigosioribus e glumis glabris compactis. *Raj. angl.* 3. p. 414.

Habitat in Anglia.

Panicula constat racemo simplici: pedunculis alternis, sepius solitariis, unifloris. Flores ovati, acuminati; Folia subtus villosa.

BROMUS spiculis alternis subsessilibus teretibus, culmo indiviso. *Fl. suec.* 89. 100. *it gotl.* 180. pinnatus.

Festuca culmo alternatim spicato, spicis teretibus. *Fl. lapp.* 29. *Roy. lugdb.* 67.

Gramen, spica brizæ, majus. *Bauh. pin.* 9. *prodr.* 19. *theatr.* 133.

Gramen loliaceum corniculatum. *Scheuch. gram.* 35.

Gramen lol. cornic. spicis teretibus angustis & glabris. *Scheuch. gram.* 36.

Habitat in Europæ sylvis montosis asperis. 24

Spicularum latus planum culmo obvertitur; aristæ sunt terminales.

BROMUS spiculis distiche imbricatis sessilibus depressis. *Amæn. acad.* 2. p. 339. * cristatus.

Festuca culmo spicato, spiculis multifloris. *Gmel. sibir.* 1. p. 115. t. 23.

Gramen triticeum, spica latiore compacta, cristatum. *Buxb. cent.* 1. p. 32. t. 50. f. 3.

Habitat in Sibiria, Tartaria. 24

BROMUS panicula patente, floribus subtrifloris. triflorus.

Gramen Bromoides panicula sparsa, locustis minoribus aristatis. *Scheuch. gram.* 511.

Habitat in Germaniæ, Daniæ nemoribus Föyskåhl.

BROMUS spicis duabus erectis alternis. *Amæn. acad.* 4. p. 304. 450. * distachyos.

Gramen spica brizæ minus. *Bauh. pin.* 9. *prodr.* 10. *Fluk. alm.* 173. t. 33. f. 1.

Habitat in Europa australi, Oriente. ☉

Culmus ramosus geniculis tumidis pubescentibus.

STIPA.

STIPA aristis lanatis

Festuca aristis paniculæ circiter longitudine plumosis. pennata. *Roy. lugdb.* 68.

- Gramen spicatum, aristis pennatis. Tournef. inst. Scheuch. gram. 153.*
- Gramen sparteum pennatum. Bauh. pin. 5. theatr Spartum austriacum. Clus. hist. 2. p. 221.*
Habitat in Austria, Gallia, Svecia. 2
- capillata. 2. STIPA aristis nudis incurvatis, calycibus se longioribus.
Festuca longissimis aristis. Bauh. pin. 10. theatr. Gramen avenaceum montanum, spica simplici, stis recurvis. Raj. Vaill. parif. 85.
Habitat in Germania, Gallia.
Simillima Stipæ junceæ, sed Folia non teretia sulco longitudinali; sed rigidiora, breviora, minus scabra, re superiore magis explanata & subpubescentia. C non albidus, sed spadiceus. Aristæ breviores & tiores varie curvatæ.
- juncea. 3. STIPA aristis nudis rectis, calycibus femine loricibus.
Festuca aristis circiter longitudine paniculæ m Roy. lugdb. 68.
Festuca junceo folio. Bauh. pin. 9. Theatr. Scheuch. gram. 151
Habitat in Helvetia, Gallia. ♂
- tenacissima. 4. STIPA aristis basi pilosis, panicula spicata, filiformibus. *Amzn. acad. 4. p. 266. Læfl. it. 11*
Gramen sparteum panicula comosa. Bauh. pin Spartum herba Plinii. Clus. hist. 2. p. 220.
Habitat in Hispaniæ collibus arenosis. 2
- avenacea. 5. STIPA aristis nudis, calycibus fermen æquantibus
Andropogon folio superiore spithaceo, pedunculi teralibus oppositis unifloris, aristis flexuosis. C virg. 133.
Habitat in Virginia.
Culmi tenues, Folium summum ventricosum longit paniculæ. Panicula pedunculis conjugatis, unij Calycis gluma uniflora, pallida, bivalvis, aeq Corollæ arista terminalis, contorta, basi articu nuda, longitudine pedunculorum. Gramen hoc & sativa minus est.
- membrana- 6. STIPA pedicellis dilatatis membranaceis.
 cca. *Habitat in Hispania. Læfling.*

Gramen vix pedale, facie *Avenæ*. Panicula simplex, vix subdivisa, laxa, debilis. Pedicelli membranacei, ancipites, obtusifusculi. Calycis arista longitudine ariste corollinæ.

STIPA aristis nudis, bracteis basi barbatis, flosculis sessili-fasciculatis. arguens.

Gramen arguens. *Rumph. amb. 6. p. 15. t. 6. f. 1.*
Habitat in India.

Flores in fasciculos congesti, ut glumæ vix a bracteis distinguantur. Bracteæ longiores, basi extus valde pilosæ. Semina basi hirsuta aristis terminalibus nudis, nigris, contortis

AVENA.

AVENA paniculata, calycibus unifloris, seminibus hirsutis, aristis calyce triplo longioribus. fibrica.

Festuca glumis villosis, aristis calyce triplo longioribus. *Gmel. sibir. 1. p. 113. t. 22.*

Habitat in Sibiria.

AVENA paniculata, calycibus bifloris, flosculo hermaphrodito mutico, maculo aristato. *Fl. suec. 98, 102.* elatior.

Avena calycibus bifloris, panicula laxe spicata: pedunculis prioribus fasciculatis. *Guett. stamp. 1. p. 182.*

Gramen avenaceum, panicula acerosa, femine papposo. *Dill. app. 48.*

Gramen avenaceum elatius, juba longa splendente. *Raj. meth. 179. angl. 3. p. 406. Moris. hist. 3. p. 214. f. 8 t. 7. f. 37. Scheuch. gram. 239. Hall. herb. 225. Vaill. paris. 89.*

Avena panicula nutante, calycibus bifloris: altero flosculo aristato. *Roy. lugdb. 66.*

Gramen nodosum avenacea panicula, radice tuberosa prædita. *Bauh. pin. 2. prodr. 3. theatr. 18. Scheuch. gram. 237.*

Habitat in Europæ maritimis & apricis. 24

Flosculi Masculi arista major, versus basim inserta; Hermaphroditi brevissima & fere terminalis.

AVENA panicula attenuata, calycibus bifloris, seminibus villosis, aristis calyce duplo longioribus. pennsylvanica.

Habitat in Pennsylvania. Kalm.

- loasingiana. 4. AVENA panicula contracta, flosculis binis a
biaristatis, dorso arista reflexa. *Læfl.*
Habitat in Hispania.
Gramen vix digiti longitudine; Culmi plures ex
dice. Folia planiuscula: summum ventricosum li
Panicula coarctata, crassa. Calyx flosculis lon
Aristæ terminales, setaceae, longitudine corollari
dorsalis duplo longior, torta.
- fativa 3. AVENA paniculata calycibus dispermis, femin
lævibus. *Hort. cliff. 25. Hort. upf. 20, Mat.*
38. Roy. lugdb. 65.
Avena nigra. Bauh. pin. 23.
β. Avena alba *Bauh. pin. 23.*
Habitat in insula Ivan Fernandez versus Chill.
son. ☉
- nuda. 6. AVENA paniculata, calycibus trifloris, recepta
calycem excedente, petalis dorso aristatis. *Ama*
cad. 3. p. 401.
Avena nuda. Bauh. pin. 23. Bauh. hist. 2. p.
Raj. angl. 3. p. 389.
Habitat - - - - - ☉
Affinis admodum A. fativæ, sed semina decorticata
cidunt.
- fatua. 7. AVENA paniculata, calycibus trifloris, flos
omnibus basi pilosis aristis totis lævibus. *Fl.*
97, 101.
Avena seminibus hirsutis. Fl. lapp. 30. Roy. lugdb
Festuca utriculis lanugine flavescens. Bauh. pin
Gramen avenaceum, locustis lanugine flavescens
Scheuch. gram 239.
Habitat in Europæ agris inter segetes, ☉
- sterilis. 8. AVENA paniculata, calycibus quinquefloris: ext
ribus flosculis aristisque basi pilosis, interioribus
ticis.
Habitat in Hispania. ☉ Alstroemer.
Similimus A. fatuæ, ut forte sola varietas, sed t
omnibus partibus major ☉ cultura constans.
- flavescens. 9. AVENA panicula laxa, calycibus trifloris brevi
flosculis omnibus aristatis. *Roy. lugdb. 66. Fl.*
2. n. 103.
Gramen avenaceum pratense elatius, panicula fl
sce

- fcente, locustis parvis. *Raj. angl. 3. p. 407. hist. 1284. Scheuch. gram. 223.*
- Gramen avenaceum, spica sparsa flavescente, locustis parvis. *M. ris. hist. 3. p. 215. f. 8. t. 7. f. 42.*
- Habitat in Germania, Anglia, Gallia.*
6. AVENA spicata, floſculis ſubquaternis calyce longioribus. *fragilis.*
- Gramen loliaceum lanuginofum, ſpica fragili articulata, glumis pilofis ariftatum. *Scheuch. gram. 32.*
- Gramen loliaceum ſpurium hirtutum, ariftis geniculatis. *Barr. ic. 905. f. 1, 2, 3.*
- Habitat in Luſitania, Hiſpania. Læſl.*
7. AVENA ſpicata calycibus quinqueſloris. *pratensis.*
- Avena panicula ſpicata, ſpiculis cylindricis culmo appreſſis. *Guett. ſtamp. 1. p. 182.*
- Avena ſpicis erectis, calyce ſpiculis brevior. *Fl. lapp. 31. Fl. ſvec. 96, 104.*
- Avena calycibus triſloris, panicula nutante, foliis planis. *Gmel. ſibir. 1. p. 129.*
- Gramen avenaceum montanum, ſpica ſimplici, ariftis recurvis. *Raj. angl. 3. p. 252. t. 21. f. 1. Scheuch. gram. 226.*
- Gramen avenaceum glabrum ſ. potius hirtutum, panicula purpureo-argentea ſplendente. *Raj. angl. 3. p. 406. t. 21. f. 2.*
- Fefluca dumetorum. *Bauh. pin. 20. prodr. 19. ex Vaill. parif. 89.*
- Habitat in Europæ paſcuſ ſiccis apricis.*
8. AVENA ſpicata, calycibus ſpiculis ſexſloris longioribus: petalo exteriori apice ariftato furcatoque. *ſpicata.*
- Habitat in Penſylvania.*
- Gramen anguſtum; Folia linearia; Spica compoſita ex ſpiculis 3. f. 4, remotis, erectis: Spiculæ ſubpedunculatae: ſingulis Calyx diphyllus, ſubulatus, æqualis, ſpicula longior; Floſculi 6, ſeſſiles, erecti: Petalo exteriori apice biſido in apices duos ſetaceos, e quorum diviſura arifta articulata, longitudine ſpiculae. Facies Feflucae decumbentis.

LAGURUS.

9. LAGURUS ſpica ovata ariftata. *Hort. cliff. 25. ovatus.*
- Gramen alopecuroides, ſpica rotundior. *Bauh. pin. 4. theatr. 36.*

Gramen spicatum tomentosum longissimis aristis decoratum. *T. Scheuch. gram.* 58.

Habitat in Italia, Gallia, Sicilia, Lusitania. ☉

cylindricus.

2. LAGURUS spica cylindrica mutica.

Gramen alopecuros, spica longa tomentosa candida.
Bauh. hist. 2. p. 474.

Gramen tomentosum alopecuros. *Dalech. hist.* 430.

Gramen tomentosum spicatum. *Bauh. pin.* 4.

Gramen tomentosum creticum spicatum, spica pura.
Scheuch. gram. 57.

Habitat Monspeli, in Creta, Smyrnæ, D. Gerar

ARUNDO.

Bambos.

1. ARUNDO calycibus multifloris, spicis ternis sessilibus.

Arundo arbor. *Bauh. pin.* 18. *Hort. cliff.* 25. *Fl.* 7. 47. *Roy. lugdb.* 67.

Tabaxir & Mombu arbor. *Bauh. hist.* 1. p. 222.

Ily. Rheed. mal. 1. p. 25. t. 16.

Habitat in India utraque. ☿

Panicula Scapus rectus, rigidus, gerens ad alteros dentes sepius Flores tres, alternatim s. distichos sessiles, rigidulos, lineares, longos.

Donax.

2. ARUNDO calycibus trifloris, panicula diffusa. *Roy. lugdb.* 66.

Arundo fativa. *Virid. cliff.* 7. *Hort. cliff.* 26.

Arundo fativa, quæ Donax dioscoridis. *Bauh.* 17. *theatr.* 27. *Scheuch. gram.* 159.

β. Arundo indica laconica versicolor. *Morif. hist.* 2. 219. f. 8. t. 8. f. 9. *Hort. cliff.* 26.

Habitat in Hispania, Galloprovincia.

phragmitis.

3. ARUNDO calycibus quinquefloris, panicula laxa. *Roy. lugdb.* 66. *Gron. virg.* 137.

Arundo panicula laxa, flosculis quinis. *Fl. svec.* 99. 100.

Arundo panicula, laxa, calycibus subbifloris. *Scheuch. monsp.* 38.

Arundo vulgaris f. phragmites dioscoridis. *Bauh.* 17. *Scheuch. gram.* 161.

Habitat in Europæ lacubus, fluviis. 2.

epigejos.

4. ARUNDO calycibus unifloris, panicula erecta, flosculis subtus glabris.

Arundo panicula coarctata erecta integra, foliis inferne glabris. Fl. svec. 101. 106.

Gramen arundinaceum paniculatum montanum, panicula spadiceo-viridi, semine papposo. Scheuch. gram. 124.

Habitat in Europæ collibus aridis. 2.

ARUNDO calycibus unifloris, culmo ramoso. *Fl. lapp. 42. Fl. svec. 100, 107. Roy. lugdb. 66.*

Calamogreftis.

Gramen arundinaceum, panicula molli spadicea, majus. Bauh. pin. 7. theatr. 64. Scheuch. gram. 122. t. 5.

Habitat in Europæ paludibus graminosis. 2.

arenaria.

ARUNDO calycibus unifloris, foliis involutis mucronato-pungentibus.

Arundo foliorum lateribus convolutis acumine pungente. Fl. lapp. 43. Fl. svec. 102, 108. It. scan. 336.

Gramen sparteum spicatum, foliis mucronatis longioribus. Bauh. pin. 5.

Gramen spicatum secalinum maritimum maximum, spica longiore. T. Scheuch. gram. 138.

Habitat in Europa & America ad majis littora arenosa. 2.

ARISTIDA.

ARISTIDA panicula ramosa, spicis sparsis.

adscensionis.

Gramen avenaceum, panicula minus sparsa, cujus singula grana tres aristas longissimas habent. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 16. t. 2. f. 56.

Gramen avenaceum maderaspatanum, panicula sparsa aristas longioribus ornata. Pluk. alm. 174. t. 191. f. 3. ?

Habitat in Insula Adscensionis, una ex quatuor istius pauperrime Floræ plantis, quarum 1 Sherardia fruticosa, 2 Euphorbia origanoides, 3 Portulaca. Osbeck. 2.

Habitus Festuæ ovinæ, sed paulo major. Radix cespitum constituens. Culmi inferne ramosi. Folia e basi latiore sensim angustata, plano-canaliculata subulata. Panicula oblonga, distincta glumis corollæ univalvibus, filiformibus, longitudinaliter convolutis, triplici arista terminatis.

- americana. 2. **ARISTIDA** paniculæ ramis simplicissimis, spicis ternis. *Amæn. acad.* 5. p. 393. *
Habitat in Jamaïca.

LOLIUM.

- perenne. 1. **LOLIUM** spica mutica: spiculis compressis multifloris.
Lolium spicis muticis. *Hort. cliff.* 24. *Fl. suec.* 103.
110. *Roy. lugdb.* 69.
Lolium spicis compressis, radice perenni. *Fl. lapp.*
Gramen loliaceum, angustiore folio & spica. *Bauh. pin.* 9. *theatr.* 127. *Scheuch. gram.* 25.
Habitat in Europa ad agrorum versum solo fertili. 24.
- tenuis. 2. **LOLIUM** spica mutica tereti spiculis trisloris.
Gramen Loliaceum; foliis & spicis tenuissimis. *W. parif.* 81.
Graminis loliacei angustiore folio & spica variis.
Bauh. pin. 9. spica tereti angustissima. *Scheuch. gram.* 28.
Habitat in Gallia.
Hoc faciunt plures tantum varietatem prioris; diffusissimum a Tritico tenello est.
- temulentum. 3. **LOLIUM** spica aristata: spiculis compressis aristatis.
Lolium spicis aristatis, radice annua. *Hort. cliff.*
Fl. suec. 103. 109. *Roy. lugdb.* 69.
Gramen loliaceum, spica longiore, s. Lolium didymoides. *Bauh. pin.* 9. *theatr.* 121. *Scheuch. gram.* 31.
Habitat in Europæ agris inter Hordeum, Linum. 24.

ELYMUS.

- arenarius. 1. **ELYMUS** spica erecta arcta, calycibus tomentosis, flosculo longioribus.
Elymus foliis mucronato pungentibus. *It. scan.* 336.
Secale spiculis geminatis. *Fl. suec.* 106, 111.
Triticum foliis acuminatis pungentibus. *Roy. lugdb.*
Gramen caninum maritimum, spica triticea, non aristata.
Raj. hist. 1256. *Scheuch. gram.* 6.
Habitat ad Europæ littora marina in arena mobili.
Spica erecta, longa, tomentosa. Spiculæ 2, rectæ, floræ, muticæ, calyce breviores. Folia arundinis glauca s. albida, involuto-mucronata.
- philadelphicus. 2. **ELYMUS** spica pendula patula; spiculis sexfloris inferioribus ternatis. *Amæn. acad.* 4. p. 266. *

Habitat in Pennsylvania. 2

Smilix *E. sibirico* & *canadensi*.

ELYMUS spica pendula arcta, spiculis binatis calyce longioribus. *Hort. ups.* 22. * *Amxn. acad.* 3. p. 20. sibiricus.

Triticum radice perenni, spiculis binis longissime aristatis. *Gmel. sibir.* 1. p. 123. t. 28.

Habitat in Sibiria. 2

ELYMUS spica nutante patula, spiculis inferioribus ternatis, superioribus binatis. *Amxn. acad.* 3. p. 20. canadensis.

Gramen secalinum majus altissimum virginianum. *Morrif. hist.* 3 p. 118. f. 8. t. 10. f. 2. *Raj. suppl.* 599.

Habitat in Canada. *Kalm.* 2

Convenit in plurimis cum *E. Sibirico*, a quo tamen differt 1. Spiculis villosis, nec nudis. 2. involucribus in aristam exeuntibus longioribus ipsa spicula, demittit aristis, at in *Sibirica* involucribus minus subulatum, sed fere lanceolatum in aristam desinens, quæ longe brevior sua spicula. 3. Spicæ inferne ternæ, quum *Sibirica* semper duas obtineat. 4. Spiculæ, dum florent, dehiscunt a scapo patulo, in *Sibirica* vero spiculæ approximatae sunt scapo. Ad singuli flosculi basin, a latere interiore spicularum, est punctum s. macula rufo-fusca. Folia hujus rore cærulescente, præsertim subtus obducta, quod non in præcedente. Aristæ corollinæ cum maturæscit fructus patenti reflexæ sunt, contra ac in *Sibirica*.

ELYMUS spica erecta, spiculis binatis involucribus longioribus *H. rt. ups.* 22. virginicus.

Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis, involucribus flosculos crassitie & longitudine superantibus. *Gron virg.* 13.

Habitat in Virginia. 2

ELYMUS spiculis bifloris, involucribus setaceis patentissimis. caput medusæ.

Elymus involucribus reflexo-patentibus. *Amxn. acad.* 3 p. 21.

Vena lusitanica spicata, caput medusæ referens. *Morrif. hist.* 3. p. 210. *Raj. suppl.* 611.

amen hordaceum, spica aristis longissimis circumvallata. *Scbeuch. gram.* 20. ?

Ha.

Habitat in Lusitaniæ, Hispaniæ maritimis.

Culmus angustus, pedalis. Spica oblonga. Involucra partialia tetraphylla, patentissima s. reflexa, setarum longitudine flosculorum cum eorum aristis. Culmæ geminæ, bifloræ: flosculo utroque aristato, interiore omnibus partibus minore.

- Hystrix. 7. ELYMUS spica erecta, spiculis, involucri destituta
Gramen avenaceum locustis aristatis, paniculis
num referentibus. Gron.

Habitat - - - -

*Spica composita ex spiculis duabus ad singulum de
racheos. Spiculæ quadrifloræ aristis longis. In
lucra nulla, sed horum loco calli duo.*

- caninus. 8. ELYMUS spica nutante arcta, spiculis rectis in
lucri destitutis: infimis geminis. *Fl. svec. 2. p.*
Triticum calycibus subulatis quadrifloris aristatis
pl. 1. p. 86.

Gramen caninum non repens elatius, spica ar
Morif. hist. 3. p. 177. J. 8. t. 1. f. 2. Buxb. cent.
p. 29. t. 50.

Gramen Loliaceum, fibrosa radice, aristis don
Vaill. paris. 82.

Habitat in Europa. 4

SECALE.

- cereale. 1. SECALE glumarum ciliis scabris. *Hort. upf.*
kybernum. Secale hybernium vel majus. *Bauh. pin. 22. theatr.*
vernium. 2. Secale vernum s. minus. *Bauh. pin. 23.*

Habitat - - - - ○

- villosum. 2. SECALE glumarum ciliis villosis, squamis cal
nis cuneiformibus.

Gramen spicatum secalinum, glumis villosis in 2
longissimas desinentibus. *Tournef. inst. 518.*

Gramen secalinum maximum. *Park. theatr. 114.*

3. Gramen creticum spicatum secalinum, glumis
ribus. *Tournef. cor. 39. Buxb. cent. 5 p. 21. t.*

Habitat in Europa australi, & in Oriente.

- orientale. 3. SECALE glumis hirsutis, squamis calycinis
bulatis.

Gramen orientale secalinum, spica brevi &
Tournef. cor. 39.

Habitat ad Archipelagum

SECALE glumis extrorsum ciliatis. creticum
 Gramen creticum spicatum fecalinum altissimum, tu-
 berosa radice. *Tournef. cor. 39. Scheuch. gram. 22.*
Habitat in Creta.

HORDEUM.

HORDEUM flosculis omnibus hermaphroditis ari- vulgare.
 statis; ordinibus duobus erectioribus.

Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis, feminibus
 corticatis. *Hort. upf. 22. Mat. med. 35.*

Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis. *Hort.*
cliff. 24. Roy. lugdb. 64.

Hordeum polytychon vernum. *Bauh. pin. 22. theatr. celeste.*
439. Morif. hist. 3. f. 8. t. 6. f. 3.

Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis, semini-
 bus decorticatis. *Hort. upf. 23.*

Habitat - - - - ○

HORDEUM flosculis omnibus hermaphroditis ari- hexastychon.
 statis, feminibus sexfariam æqualiter positis. *Hort.*
upf. 23.

Habitat - - - - ○

HORDEUM flosculis lateralibus masculis muticis, distichon.
 feminibus angularibus imbricatis. *Hort. upf. 23.*

Hordeum distichon. *Bauh. pin. 22. Morif. hist. 3. f. 8.*
t. 6. f. 1.

Hordeum flosculis lateralibus masculis muticis, fe- rudum.
 minibus angularibus imbricatis decorticatis.

Habitat - - - - ○

HORDEUM flosculis lateralibus masculis muticis, zeocriton.
 feminibus angularibus patentibus corticatis. *Hort.*

upf. 23. n. 5.

Zeocriton f. *Oryza germanica.* *Bauh. pin. 22. Morif.*
hist. 3. f. 8. t. 6. f. 2.

Habitat - - - - ○

HORDEUM flosculis omnibus fertilibus ternis ari- bulbosum.
 statis, involucri setaceis basi ciliatis. *Amæn. acad.*

*4. p. 304. **

Gramen fecalinum bulbosa radice. *Barr. ic. 112. f. 2.*
Scheuch. gram. 19

Gramen bulbosum ex aleppo. *Bauh. pin. 2. prodr. 4.*
theatr. 21.

Gra-

Gramen fecalinum chalepense, radice tuberosa. *M. hist.* 3. p. 179. f. 8. t. 6. f. 7.
Habitat in Italia, Oriente 24

- murinum. 6. HORDEUM flosculis lateralibus masculis aristis involucris intermediis ciliatis. *Hort. cliff.* 24. *Fl.* 107, 113. *Roy. lugdb.* 69.
 Gramen hordeaceum minus & vulgare. *Bauh. pin. theatr.* 134. *Scheuch. gram.* 14.
 β. Gramen spicatum fecalinum minus. *Scheuch.* 17. *Vaill. parif.* 83. t. 17. f. 6.
Habitat in Europæ locis ruderalis. ☉
- nodosum. 7. HORDEUM flosculis lateralibus masculis mutis involucellis fetaceis lævibus.
 Gramen myosuroides nodosum. *Raj. angl.* 3. p. 20. f. 2.
Habitat in India, Anglia.
Simile H. murino, sed angustius, altius. Flosculi laterales carent & aristis, involucella minime aristata.
- jubatum. 8. HORDEUM aristis involucrisque fetaceis longis.
Habitat in Canada. Kalm.
Habitus Hordei murini, sed involucri & aristæ cææ quadruplo longiores, quam tota spica, undè gularis facies graminis.

TRITICUM.

- æstivum. 1. TRITICUM calycibus quadrifloris ventricosis bris imbricatis aristatis. *Hort. ups.* 21.
 Triticum radice annua, spica glabra aristata. *Hort. cliff.* 24. *Roy. lugdb.* 170.
 Triticum æstivum. *Bauh. pin.* 21.
Habitat apud Bäschiros in campis. Heintzelman. ☉
- hybernum. 2. TRITICUM calycibus quadrifloris ventricosis bus imbricatis submuticis. *Hort. ups.* 21. *Mdt.* 36.
 Triticum radice annua, spica mutica. *Hort. cliff.* *Roy. lugdb.* 70.
 Triticum hybernum, aristis carens. *Bauh. pin.* 21.
Habitat - - - ♂ ●
- turgidum. 3. TRITICUM calycibus quadrifloris ventricosis imbricatis tubaristatis. *Hort. ups.* 21.

*Triticum radice annua, glumis villosis Hort. cliff. 24.
Koy. lugub. 70.*

*Triticum spica villosa quadrata brevior & turgidior.
Moris. hist. 3. p. 176. f. 8. t. 1. f. 14.*

Habitat - - - ♂

TRITICUM calycibus bifloris nudis, flosculis lon- polonicum.
gissime aristatis, racheos dentibus barbatis.

Triticum polonicum. Pluk. phyt. 231. f. 6.

*Triticum majus, longiore grano, glumis foliaceis,
polonicum. Moris. hist. 3. p. 3. 175. f. 8. t. 1. f. 8.*

Habitat - - - -

*Simile præcedentibus, sed spica major, cinerea; Glumæ
laplo longiores, bifloræ tantum arista utriusque flosculi
longissima.*

TRITICUM calycibus truncatis quadrifloris, flo- Spelta.
sculis aristatis hermaphroditis: intermedio neutro.

Hort. ups. 21.

*ordeum flosculis lateralibus masculis muticis invo-
lucro destitutis. Sauv. monj. 39.*

*dicoccos vel Spelta major. Bauh. pin. 22. the. tr.
412. t. 414. Moris. hist. 3. f. 8. t. 6. f. 1.*

Habitat - - - - ♂

TRITICUM calycibus trifloris: flosculo altero ari- monococ-
stato; intermedio neutro. cum.

*Triticum involucris unifloris, floribus aristatis, spica
ditricha. Sauv. monj. 39. †*

*ordeum ditrichum spica nitida s. Briza nuncupatum.
Tournef. inst. 513.*

*Briza dicta s. monococcos germanica. Bauh.
21. Moris. hist. 3. f. 8. t. 6. f. 2.*

Briza monococcos dodonæi. Lob. ic. 31.

Habitat. - - - - ⊙

TRITICUM calycibus subquadrifloris: flosculis tenellum.
muticis acutis, foliis setaceis.

*amen loliaceum minus, spica simplici. Bauh. pin.
prodr. 11.*

*amen loliaceum, foliis & spicis tenuissimis. Moris.
hist. 3. p. 182. f. 8. t. 2. f. 3.*

Habitat Niponipenii: Sauvages. ⊙

*amen spithameus, tener, filiformis. Folia setacea,
involuta. Spica floribus 4. f. 7. alternis.*

- juncum. 8. TRITICUM calycibus truncatis quinquefloris, liis involutis. *Amzn. acad. 4. p. 266. **
 Gramen tritici spica mutici simili. *Bauh. pin. 9. prodr. 18. t. 17. theatr. 132. Scheuch. gram. 7. Vaill. ris. 81.*
Habitat in Europa australi, Oriente. 2.
- repens. 9. TRITICUM calycibus subulatis quadrifloris acuminatis.
 Triticum radice repente, foliis viridibus. *Fl. lapp. Fl. svec. 105. 114. Hort. cliff. 24. Mat. med. Roy. lugdb. 70.*
 Gramen caninum arvense f. Gramen dioscori. *Bauh. pin. 1. Scheuch. gram. 5.*
Habitat in Europæ cultis. 2.
- maritimum. 10. TRITICUM calycibus multifloris, flosculis coronatis, spica ramosa.
 Poa panicula ramosa, floribus alternis sessilibus. *lugdb. 274.*
 Gramen Loliaceum, panicula ramosa, maritima. *Bauh. theatr. 130. Scheuch. gram. 274.*
 Gramen maritimum, panicula loliacea. *Bauh. pin. prodr. 19. Moris. hist. 3. f. 8. t. 2. f. 6.*
Habitat in Galliæ & Angliæ maritimis.
 Culmus spithameus, subramosus. Folia longitudine vaginis purpurascensibus. Spica ramosa, fere pilata ramis angulatis. Spiculæ 8. f. 10- flore, alba compressæ, basi crassiusculæ, sessiles, vel etiam solæ in ramificationibus.

TRIGYNIA.

ERIOCAULON.

- triangulare. 1. ERIOCAULON culmo triangulari, foliis emarginatis, capitulo ovato.
 Plantaginella aurea alopecuroides brasiliiana, foliis mineis. *Breyn. cent. t. 50. Moris. hist. 3. p. 259. t. 16. f. 17.*
Habitat in Brasilia.
 Flosculos non potui perspicere in Herb. Fisonis Burmannum.

ERIOCAULON culmo quinquangulari, foliis ensiformibus, calyce universalis pentaphyllo. *Fl. zeyl.* 48. * quinquangulare.

Scabiosa graminea nudicaulis, capitulis argenteis f. Stactice minima maderaspatana. *Pluk. Alm.* 366. t. 221. f. 7. *Habitat in India.* 24

ERIOCAULON culmo sexangulari, foliis ensiformibus. *Fl. zeyl.* 49. sexangulare.

Gramen junceum indiae orientalis minus, capitulo rotundo ex paleaceis spiculis in cacumine caulis glomerato. *Pluk. mant.* 48. *Habitat in India.* 24

ERIOCAULON culmo sexangulari, foliis setaceis. *Fl. zeyl.* 50. setaceum.

Mandalia malabarica, capillaceo folio. *Petiv. topic.* 344. Hieru-kotsijelleti pullu. *Rheed. mal.* 12. p. 129. t. 63. *Habitat in India.*

ERIOCAULON culmo decangulari, foliis ensiformibus. decangulare.

Eriocaulon noveboracense, capitulo albo globoso f. Globularia americana statices haud absimilis, cauliculis lana atro-nitente refertis. *Pluk. amalth.* t. 409. f. 5.

Mandalia americana procerior. *Pet. gaz.* t. 6. f. 2.

Globulariae affinis aquatica, caule tenui aphylo gramineo, capitulis albicantibus parvis globosis, foliis paucis humi stratis gramineis. *Gron. virg.* 13.

Habitat in Americae septentrionalis paludibus.

MONTIA.

MONTIA. *Fl. lapp.* 51. *Fl. svec.* 108, 115. *Roy.* fontana. *Magdb.* 199.

Montia aquatica minor. *Mich. gen.* 18. t. 13. f. 2.

Meraria arvensis minor. *Dill. giss.* 46.

Lineiformis paludosa tricarpus. *Pluk. alm.* 20. t. 7. f. 5.

Linoides annua verna. *Vaill. paris.* t. 3. f. 4.

Montia palustris, portulacae aquaticae similis. *Raj. hist.* 1035. *Pet herb.* t. 10. f. 12.

Portulaca arvensis. *Bauh. pin.* 288.

Habitat in Europa ad scaturigines. ☉

PROSERPINACA.

PROSERPINACA. *Aët. upf.* 1741. p. 81.

Mei Spec. plant. pars. I.

I

Tri-

palustris.

Trixis. Mitch. E. N. C. 1748. n. 23.

Habitat in Virginiae paludibus.

Radix repens. Caules pedales, teretiufculi. Folia ana, lanceolata, serrata, in petiolos defluentia : mersa s. ima in lacinias lineares pinnatifida. Flo. axillares, solitarii. Fructus figura Polygoni.

TRIPLARIS.

americana.

1. **TRIPLARIS.** *Læst. it. 256.*

Habitat in America meridionali. b

Folia spithamea, ovata, integra, acuminata, petiolo Spicæ pilosæ, bracteis ovatis, acuminatis, parvis, losis.

HOLOSTEUM.

cordatum.

1. **HOLOSTEUM** foliis subcordatis. *Amæn. ac. 3. p.*

Aline foliis subcordatis, stipulis utrinque quaternis Hort. upf. 24.

Holosteum foliis orbiculatis oppositis, racemis laxissimalibus remotis. Brown. jam. 139.

Aline americana, nummulariæ folio. Herm. parad. t. 11. Sloan. jam. 87. hist. 1. p. 203.

Habitat in Jamaica, Surinama.

succulentum.

2. **HOLOSTEUM** foliis ellipticis carnosiss. *Amæn. ac. 3. p. 21.*

Aline foliis ellipticis succulentis. Cold. noveb. 9.

Habitat in Noveboraco.

hirsutum.

3. **HOLOSTEUM** foliis orbiculatis hirsutis. *Amæn. ac. 3. p. 21.*

Aline foliis orbiculatis hirsutis, floribus sessilibus. miss.

Habitat in Malabaria.

umbellatum.

4. **HOLOSTEUM** floribus umbellatis. *Læst. it. 190.*

Spergula foliis oppositis, pedunculis umbellatis. G. stamp. 298. Dalib. paris. 134.

Holosteum cariophyllæum arvense. Tabern. ic. 232.

Lychnis graminea hirsuta umbellifera. Moris. hist. 546. f. 5. t. 22. f. 46.

Caryophyllus arvensis umbellatus, folio glabro. pin. 210.

Caryophyllus arvensis. Bauh. hist. 3. p. 361.

Habitat in Europæ australis arvis. ☉

POLYCARPON.

POLYCARPON.

- Mollugo *tetraphylla* foliis quaternis obovatis, paniculis dichotomis. *Hort. cliff.* 28. *Sp. pl.* 1. p. 89. tetraphyllum.
 Anthyllis marina alfinefolia. *Bauh. pin.* 282.
 Anthyllis alfinefolia polygonoides major. *Barr. rar.* 103. t. 534.
Habitat in Italiae, G. Narbonensis vineis. ☉

MOLLUGO.

- MOLLUGO foliis oppositis lanceolatis, ramis alternis, pedunculis lateralibus confertis unifloris. *Fl. Zeyl.* 52. * oppositifolia
Habitat in Zeylona.
 MOLLUGO foliis subquaternis lanceolatis, ramis paniculatis. stricta.
Habitat in Asia.
 Radix fibrosa Caules 3. f. 4, stricti, leves. Folia verticillata, sæpe quaterna, stricta, acuminata, levia. Panicula rarior e racemis terminalibus & lateralibus.
 MOLLUGO foliis quinis obovatis æqualibus, floribus paniculatis. *Fl. Zeyl.* 51. pentaphylla.
 Alfine ramosa procumbens quadrifolia, ad radicem polyphylla. *Burm. Zeyl.* 13. t. 8. f. 12.
Habitat in Zeylona.
 MOLLUGO foliis quinis obovatis, ramis alternis, pedunculis unifloris. Spergula.
Habitat in India.
 Caulis debilis, filiformis, articulatus Ramis alternis. Folia quina, obovata, inæqualia, obtusa. Pedunculi 2. f. 5, ad singula genicula, foliis longiores, uniflori.
 MOLLUGO foliis verticillatis cuneiformibus acutis, caule subdiviso decumbente, pedunculis unifloris. verticillata.
Hort. upf. 24.
 Mollugo foliis sæpius septenis lanceolatis. *Gron. virg.* 14.
 Alfine Spergula mariana, latiori folio, floribus ad nodos pediculis curtis circa caulem insidentibus, calycibus eleganter punctatis. *Pluk. mant.* 9. t. 332. f. 5.
 Alfine procumbens, gallii facie. *Ehret. pict.* t. 6. f. 3.
Habitat in Virginia. ☉

MINUARTIA.

- dichotoma.** 1. MINUARTIA floribus confertis dichotomis.
 Minuartia foliis setaceis, caule simplici erecto,
 ribus sessilibus confertim dichotomis. *Læfl. it.*
 * t. 1. f. 5.
Habitat in Hispania. ☉
 Plantula rigida, dura, tenax, sæpius simplex. Folia
 posita, setacea. Flores cymosi in capitulum quadra
 arte dichotomum, fastigiatum, caule sæpius mi
 sessiles. Bractæ setacæ, flore longiores, apice r
 Semina quinque ad octo, subrotunda, reniformia.
 lor plantæ subfuscus. *Læfl.*
- campestris.** 2. MINUARTIA floribus terminalibus alternis bra
 longioribus. *Læfl. it. 122.* *
Habitat in Hispaniæ collibus planis. ☉
- montana.** 3. MINUARTIA floribus lateralibus alternis bra
 brevioribus. *Læfl. it. 122. t. 1. f. 4.* *
Habitat in Hispaniæ collibus altis. ☉

QUERIA.

- hispanica.** 1. QUERIA floribus confertis.
 Queria hispanica, bracteis patulis hamatis. *Læfl. it.*
Habitat in Hispania. ☉
 Antecedente minor, fragilior. Capitulum florum ob
 tius tetragonum, facillime a caule discedens. Brat
 setacæ, erectæ, apice extrorsum hamatæ, vestibis
 hærentes. Semen 1. compressum, subrotundum. Ca
 plantæ albidus. Habitus antecedentis & structura
 ris eadem; at Semina solitaria & plura consti
 genera diversissima.
- canadensis.** 2. QUERIA floribus solitariis, caule dichotomo.
 Mollugo foliis oppositis, stipulis quaternis, caule
 chotomo. *Gron. virg. 14.*
Habitat in Canada, Virginia. 2.
 Radix fibrosa. Caulis strictus, dichotomus, spithama
 teres, filiformis, erectus. Herba lini cathartici.
 lia opposita, lanceolato-ovata, integerrima, adsp
 utrinque punctis fuscis. Stipulæ geminæ utrinq
 acutæ, membranacæ Flores solitarii, subpedun
 ti, parvi, virides, ex singula dichotomia. Calyx q
 quepartitus: foliolis obtusiusculis, subfornicatis. P
 la nulla. Stamina 3, Antheris flavis. Germen su

tundum. Styli tres. Spontanea planta altior caule capillari; culta crassior & foliis minime punctatis.

L E C H E A

LECHEA foliis lineari-lanceolatis, floribus paniculatis. *Amæn. acad.* 3. p. 10. t. 1. f. 4. *

Capraria foliis integerrimis. *Græn. virg.* 75.

Scoparia foliis tenuissimis in plurimos & tenuissimos ramulos divisa & subdivisa. *Raj. suppl.* 132.

Habitat in Canadæ sylvis glaucosis. 2.

LECHEA foliis ovato-lanceolatis, floribus lateralibus majoribus. *Amæn. acad.* 3. p. 11. * f. 4. *

Habitat in Canadæ aridis.



Classis IV.

TETRANDRIA
MONOGYNIA.

LEUCADENDRON.

- racemofum. 1. LEUCADENDRON foliis fetaceis, flosculis junctis racemosis.
Protea foliis fetaceis, floribus racemosis. *Hort.* c. 496.
Habitat in Æthiopia. †
- proteoides. 2. LEUCADENDRON foliis subulatis, ramis detentatis, floribus terminalibus.
Protea foliis linearibus simplicissimis: ramis detentatis, floribus terminalibus. *Roy. lugdb.* 186.
Habitat ad Caput b. spei. †
Folia conferta. Rami ad determinata spatia conferta ceterum nulli. Calyces subrotundi, pubescentes.
- cancellatum. 3. LEUCADENDRON foliis subulatis, ramis spatulatis, floribus lateralibus.
Lepidocarpodendron foliis angustissimis graminifolium fructu cancellato, femine coronato. *Boerh. lugdb.* p. 193. t. 193.
Habitat ad Caput b. spei, in Ecrietis montis T. dis. †
- Lepidocarpodendron. 4. LEUCADENDRON foliis lanceolatis, floribus oblongis, calycum squamis summis hirsutis.
Protea foliis lanceolatis integerrimis glabris, calycibus superne villosis. *Roy. lugdb.* 186.
Lepidocarpodendron foliis angustis longioribus, calycis squamis elegantissime ex flavo albo nigro variegatis, flosculis plumis atropurpureis. *Boerh. lugdb.* 2. p. 188. t. 188.
- β. Protea foliis lanceolatis integerrimis glabris, calycibus succingentibus hirsutis. *Roy. prodr.* 188.
Lepidocarpodendron folio saligno viridi: nervis margine flavo, cono longo superiore parte marginata clauso. *Boerh. lugdb.* 2. p. 189. t. 189.
Habitat ad Cap. b. spei. †
5. LEUCADENDRON

- LEUCADENDRON** foliis lanceolatis , floribus repens.
oblongis, calycum squamis glabris.
- Protea** caule multifloro , calycibus oblongis , foliis lanceolatis integerrimis. *Roy. lugdb.* 185.
- Lepidocarpodendron** foliis angustis brevioribus salignis, calycis squamis elegantissime ex roseo aureo albo atrorubro variegatis, florum plumis albis. *Boerh. lugdb.* 2. p. 187.
- Leucadendron** foliis longissimis obtuse trigonis, longitudine florem superantibus. *Wach. ultraj.* 204.
- Protea** caule unifloro, calyce oblongo, foliis lineari-bus longissimis. *Roy. lugd.* 185.
- Lepidocarpodendron** foliis longissimis angustissimis, fructum elegantissime ex rubro flavo & albo variegatum succingentibus, radice repente. *Boerh. lugdb.* 2. p. 190. t. 190.
- Habitat ad Caput b. spei, in sabuletis. †*
- LEUCADENDRON** foliis lanceolatis , floribus acaulon.
subrotundis, caule suffruticoso unifloro.
- Leucadendron** acaulon. *Wach. ultraj.* 204.
- Protea** caule unifloro, foliis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 186.
- Lepidocarpodendron** acaulon, foliis paucis latis, nervo & marginibus rubris ornatis, fructu parvo. *Boerh. lugdb.* 2. p. 191. t. 191.
- Habitat ad Caput b. spei, ad radices montium. †*
- Caulis brevis.** Folia lineari-lanceolata, alterna s. sparsa. Calyx patens: Limbo folioso, obtuso, concavo, flore longiore colorato.
- LEUCADENDRON** foliis lanceolatis , floribus Scolymocephalum.
subrotundis, caule fruticoso ramofo.
- Lepidocarpodendron** acaulon, ramis numerosis e terra excrescens, calyce poris immaturo extus ex rubro & flavo variegato, intus flavo. *Boerh. lugdb.* 2. p. 192. t. 192.
- Habitat ad Caput b. spei, in ericetis mont. Tigridis. †*
- LEUCADENDRON** foliis integris, floribus de- Cinaroides,
pressis, corollarum limbis cylindricis.
- Leucadendron** foliis subrotundis patentissimis petiolatis, foliolis calycinis carinatis. *Wach. ultraj.* 204.
- Lepidocarpodendron** folio subrotundo rigido, in pedunculo longo crasso, flore maximo purpureo, *Boerh. lugdb.* 2. p. 184. t. 184.

Cinaroides frutex, folio subrotundo rigido, e ma
tabulari. *Petiv. musf.* 374.

β. Protea foliis lanceolatis integerrimis, flore patet
glabro, stylis longissimis. *Roy. lugdb.* 186.

Habitat ad Caput b. spei in humidis mont. Tabularis.
Variat foliis cordatis, ovatis, lanceolatis.

hirtum.

9. LEUCADENDRON foliis lanceolatis apice cal
fis, caule hirsuto, floribus sparsis axillaribus.
mæn. acad. 6. afr 3. *

Lepidocarpodendrum foliis sericeis brevibus confes
simis, cono gracili longo. *Boerh. lugdb.* 2. p. 194. t. 1.

Habitat ad Cap. b. spei. †

succullatum.

10. LEUCADENDRON foliis calloso-tricuspidatis
volventibus flores laterales.

Leucadendron foliis cuneiformibus apice trident
callofis, summis ultra florem protensis. *Wach.*
traj. 203.

Protea foliis lanceolatis obtusis flores involventib
apice tridentato-callosis. *Roy. lugdb.* 184.

Hypophyllocarpodendron foliis inferioribus apice tr
do rubro; superioribus penitus rubris glabris. *Boerh.*
lugdb. 2. p. 206. t. 206.

Habitat ad Cap. b. spei locis uliginosis. †

Hypophyl-
locarpo-
dendr.

11. LEUCADENDRON foliis calloso-tricuspidat
sublanceolatis, calycibus turbinatis nudis.

Leucadendron africana f. Scolymocephalus folio ang
stiori: apicibus tridentatis. *Pluk. alm.* 212.

Protea foliis lanceolato-linearibus apice tridentato-cl
lofis, capitulis aphyllis. *Roy. lugdb.* 184.

Protea foliis lanceolato-linearibus apice: tridentato-cl
lofis. *Hort. cliff.* 29.

Conocarpodendron folio rigido angusto: apice triden
tato rubro, flore aurantio. *Boerh. lugdb.* 2. p. 19
t. 198.

Habitat ad Cap. b. spei in campis sabulosis. †

Conocarpo-
dendrum.

12. LEUCADENDRON foliis calloso-quinquedentat
Leucadendron foliis obverse ovatis oblongis; marg
ne calloso-fimbriatis: ad apicem crenatis. *Wach. n*

traj. 203.

Leucadendron africana arbor argentea, summo foli
crenato. *Pluk. alm.* 212. t. 200. f. 2.

Protea foliis oblongo-ovatis apice quinquedentato-cal
lofis. *Roy. lugdb.* 184.

Conocarpodendron folio crasso nervo lanuginoso supra crenato ibique limbo rubro, flore aureo, cono facile deciduo. *Boerh. lugdb. 2. p. 196. t. 196.*

Scolymócephalus africanus latifolius lanuginosus, foliis in summitate crenatis. *Herm. afr. 20. Raj. dendr. 9.*

Habitat in Æthiopia. h

LEUCADENDRON foliis fetaceis semitrifidis. cyanoides. *Protea* foliis linearibus ramosis. *Roy. lugdb. 186.*

Pyanus æthiopicus, rigidis capillaceis tenuissimis foliis trifidis. *Pluk. mant. 61. t. 345. f. 6.*

Habitat ad Cap. b. spei. h

LEUCADENDRON foliis fetaceis multifidis, capitulis glomeratis.

Serraria foliis tenuissime divisis, capitulis tomentosis. *Burm. afric. 265. t. 99. f. 2.*

Habitat ad Cap. b. spei. h

Simile L. Serrariae, sed flores non solitarii, at glomerati & demum spicati.

LEUCADENDRON foliis fetaceis multifidis, *Serraria*. capitulis solitariis.

Abrotanoides arboreum monomatapense, floribus in ramulorum cymis. *Pluk. mant. 1. t. 329. f. 1.*

Serraria foliis tenuissime divisis, floribus rubris apetalis. *Burm. afr. 264. t. 99. f. 1.*

Anthifolius frutex africanus, flore sericeo. *Seb. thes. 2. t. 63. f. 6.*

Habitat in Æthiopia. h

P R O T E A.

ROTEA foliis lanceolatis obliquis acutis sparsis argentea. villoso-sericeis planis: floralibus verticillatis.

Protea foliis lanceolatis integerrimis hirsutis nitidis. *Hort. cliff. 29.*

Leucadendros africana arbor tota argentea sericea, foliis integris. *Pluk. alm. 212. t. 200. f. 1.*

Argyrodendros africana, foliis sericeis & argenteis. *Comm. hort. 2. p. 51. t. 26. Raj. dendr. 9.*

Conocarpodendron foliis argenteis sericeis latissimis. *Boerh. lugdb. 2. p. 195. t. 195.*

Obularia africana frutescens thymeleae folio lanuginoso. *Tournef. infl. 467.*

Frutex æthiopicus conifer, foliis cneori lanuginosi æmulis. *Breyn. prodr. 2. p. 49.*

Arbor ferens folia argentea. *Zanon. hist. 24.*

Habitat ad Cap. b. Spei. h

Frutex sylvas argenteas constituens, nitidissimus omnium
foliis floralibus verticillatis.

conifera.

2. **PROTEA** foliis lineari-lanceolatis integerrimis glabris obliquatis. *Hort. cliff. 29.*

Frutex æthiopicus conifer, foliis cneori salicis æ
Breyn. cent. 21. t. 9.

- β. **Protea** foliis lineari-lanceolatis glabris, capsula squamosis, corona foliacea succinctis. *Roy. 185.*

Conocarpodendron folio rigido crasso angusto, loricis parvo. *Boerh. lugdb. 2. p. 197. t. 197.*

- γ. **Protea** foliis lineari-lanceolatis glabris, capsula basin squamosis. *Roy. lugdb. 185.*

Conocarpodendron folio angusto rigido brevi, parvo aureo: corona foliacea succincto. *lugdb. 2. p. 200.*

- δ. **Protea** foliis lineari-lanceolatis glabris, caule in radicato. *Roy. lugdb. 185.*

Conocarpodendron folio tenuissimo angustissimo ligno, cono calyculato. *Boerh. lugdb. 2. p. t. 203.*

- ε. **Protea** foliis lanceolatis acuminatis flexuosis, capsula corona foliacea succinctis. *Roy. lugdb. 185.*

Conocarpodendron folio tenui angusto saligno, calyculato corona foliacea succincto. *Boerh. 2. p. 204. t. 204.*

Habitat ad Cap. b. Spei. h

Planta naturalis, in patria, an ipsa? argentea; et captiva extra patriam exiit decus; dein etiam domi mille modis vere Protea.

CEPHALANTHUS.

- occidentalis. 1. **CEPHALANTHUS** foliis oppositis ternisque. *virg. 15.*

Cephalanthus foliis ternis. *Hort. cliff. 73. Roy. 187.*

Scabiosa dendroides americana, ternis foliis cæcis ambientibus, floribus ochroleucis. *Pluk. alm. 77. f. 4.*

Habitat in America septentrionali. b
Spulæ nullæ. Semina solitaria, longa pyramidata:
basi attenuata, angulata, lanuginosa unilocularia.
Receptaculum commune globosum, villosum.

GLOBULARIA.

GLOBULARIA caule fruticoso, foliis lanceolatis *Alypum.*
tridentatis integrisque. Roy. lugdb. 190.

Globularia fruticosa, myrti folio tridentato. T. Ga-
rid. aix. 210.

Alypum monspeliensium, f. Frutex terribilis. Bauh.
hist. 1. p. 598. Niss. act. 1712. p. 336. t. 18.

Symelæa foliis acutis, capitulo succisæ. Bauh. pin. 463.

Habitat Monspeliæ inque Regni Valentini & Italiæ
sylvis ad rupes & saxosa. b

GLOBULARIA caule fruticoso, foliis radicalibus *bisnagarica*
cuneiformibus retusis; caulinis lanceolatis.

abiiosa bisnagarica f. Globularia frutescens, rigidis
foliis ad radicem rotundioribus cordatis. Pluk. alm.

336. t. 58. f. 5. Moris. hist. 3. p. 51.

Habitat in Bisnagaricæ sylvis. 4

GLOBULARIA caule herbaceo, foliis radicalibus *vulgaris.*
tridentatis; caulinis lanceolatis. Fl. succ. 109. 116.

*it. al. 65. * Dalib. parif. 43.*

Globularia caule folioso, foliis ovatis integerrimis.
Hort. cliff. 490. Roy. lugdb. 190. Hall. helv. 667.

Phyllanthes anguillare. Cam. hort. 18. t. 7.

bellis cærulea, caule folioso. Bauh. pin. 262.

bellis cærulea apula. Tabern. hist. 2. p. 709.

bellis cærulea monspeliaca. Tabern. hist. 2. p. 709.

Habitat in Europæ apricis duris. 4

GLOBULARIA foliis radicalibus *crenato-aculeatis, spinosa.*
caulinis integerrimis mucronatis.

Globularia spinosa. Tournef. inst. 476.

bellis cærulea spinosa. Bauh. pin. 262.

bellis spinosa, flore globofo. Bauh. prodr. 121.

Habitat in Granadæ montibus. 4

GLOBULARIA caule subnudo, foliis cuneiformi- *cordifolia,*
bus tricuspидatis: intermedio minimo.

Globularia foliis radicalibus cuneiformibus retusis den-
tatis: denticulo intermedio minimo. Hort. cliff. 491.

Roy. lugdb. 190.

Scabiosa bellidis folio, humilis, caule nudo, radice repente, folio cordato. *Morif. hist. 3. p. 50. f. 15. f. ult.*

Bellis cærulea montana frutescens. *Bauh. pin. 261.*

β. Globularia alpina minima, origani folio. *Tournef. inst. 467.*

Scabiosa, bellidis folio, pyrenaica minima. *hist. 3. p. 51.*

Habitat in Pannonia, Austria, Helvetia, Pyrenæis

radiculis.

6. GLOBULARIA caule nudo, foliis integris lanceolatis.

Globularia pyrenaica, folio oblongo, caule nudo. *Tournef. inst. 467.*

Scabiosa, bellidis folio, humilis, caule nudo, radice non repente. *Morif. hist. 3. p. 50. f. 6. t. 15. f. 4.*

Bellis cærulea, caule nudo. *Bauh. pin. 262. Rad. 381.*

Habitat in Pyrenæis & Austriæ montibus. 21.

Interdum unicum foliolum in scapo.

orientalis.

7. GLOBULARIA caule subnudo, capitulis sessilibus, foliis lanceolato-ovatis integris.

Globularia orientalis, floribus per caulem nudo. *Tournef. cor. 35.*

Habitat in Natolia. Biörling. 21.

Radix perennis. Folia obverse ovata, in petiolo sessilibus, acuta, integra, nuda, plurima. Caulis teretis, herbaceus, simplicissimus: Foliis lanceolatis, alternis, remotis. Capitula in fasciculis caulis, 7. ad 10. alterna, sessilia.

DIPSACUS.

fallonum

1. DIPSACUS foliis sessilibus serratis.

Dipsacus foliis connato-perfoliatis. *Hort. ups. 156. f. 15. fructus rectis. Sauv. monsp. 156.*

Dipsacus capitulis florum conicis. *Hort. cliff. Gron. virg. 13. Roy. lugdb. 188. Dalib. paris. 44.*

Dipsacus sylvestris aut Virga Pastoris major. *pin. 385.*

Dipsacus sylvestris. *Dod. pempt. 735.*

β. Dipsacus fativus. *Bauh. pin. 385. aristis fructibus. Sauv. monsp. 156.*

Habitat in Gallia, Anglia, Italia. ♂

CUS foliis connatis sinuatis. laciniatus.
 s folio laciniato. *Bauh. pin. 385. Morif. hist.*
58. f. 7. t. 36. f. 4.
 in Alfatia, AZOW, Carniola. ♂

CUS foliis petiolatis appendiculatis. *Hort. pilosus.*
5. Roy. lugdb. 188. Dalib. parif. 44.
 s capitulis florum subglobosis. *Hort. cliff. 30.*
ugdb. 188.
 s sylvestris: capitulo minore s. Virga Pastoris
 . *Bauh. pin. 385.*
 s tertius. *Dod. pempt. 735.*
 in Anglia, Gallia. ♂

SCABIOSA.

* *Corollulis quadrifidis.*

OSA corollulis quadrifidis æqualibus flori- alpina.
 ernuis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis ser-
Hort. cliff. 30. Hort. upf. 26. Roy. lugdb. 188.
 alpina, foliis centaurii majoris. *Bauh. pin. 270.*
 alpina centauroides. *Bess. cyst. æst. 122.*
 in alpihus Helveticis, Italicis. ♀
 ibricatus, flore brevior. *Fruktus semiovatus. Re-*
ulum globosum: paleis lanceolatis, canaliculatis,
entibus. Semina quadrangularia, coronata den-
 4 majoribus ♂ 4 minoribus alternis. *Pappus*
 20, patulis.

OSA corollulis quadrifidis æqualibus calyci- transylvani-
 ristatis, foliis radicalibus lyratis, caulinis pinna- ca.
*Roy. lugdb. 189. Hort. upf. 26. **
 a altissima annua, foliis agrimonie nonnihil
 bus. *Herm. lugdb. 539. Morif. hist. 3. p. 46. f.*
 13 f. 13.
 in Transylvania. ☉

♂ *Paleæ mucronato-aristatæ, ut in S. syriaca.*

OSA corollulis quadrifidis æqualibus, caly- fyriaca.
 ristatis, caule dichotomo, foliis lanceolatis.
cliff. 30. Roy. lugdb. 188.
 à fruticans latifolia alba. *Bauh. pin. 269. Morif.*
3. p. 46. f. 6. t. 14. f. 14.
 biofa perficæ folio, flore amethystino. *Vaill.*
1722. p. 233.
 in Syria. ☉

- leucantha. 4. SCABIOSA corollulis quadrifidis æqualibus, & calycinis ovatis obtulis, foliis pinnatifidis. *cliff. 30. Roy. lugdb. 188. Sauv. meth. 241.*
 Scabiosa flore globofo niveo. *Bauh. pin. 207.*
 Scabiosa fruticans angustifolia alba. *Bauh. pin. 1*
Habitat in collibus Narbonæ. 24
- rigida. 5. SCABIOSA corollulis quadrifidis subradian squamis calycinis obtulis, foliis lanceolatis se *Amæn. acad. 6. afr. 4. **
 scabiosa africana frutescens, foliis rigidis splen bus & ferratis, flore albicante. *Comm. hort 185. t. 93. Raj. suppl. 237.*
Habitat in Æthiopia. 5
- succisa. 6. SCABIOSA corollulis quadrifidis æqualibus, simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-integerrimis. *Hort. cliff. 30. Fl. suec. 112. Mat. med. 41. Roy. lugd. 188. Dalib. paris. 4*
 Succisa glabra. *Bauh. pin. 269.*
 Succisa f. Morfus diaboli. *Cam. epit. 397.*
 β. Succisa hirsuta. *Bauh. pin. 269.*
Habitat in Europæ pascuis humidiusculis. 24
- integrifolia. 7. SCABIOSA corollulis quadrifidis radiantibus, radicalibus ovatis ferratis; rameis lanceolatis herbaceo.
 Scabiosa corollis quadrifidis, foliis omnibus lan tis ferratis. *Sauv. monf. 156.*
 Scabiosa annua integrifolia f. foliis bellidis. *monsp. 231. **
 Scabiosa montana latifolia non laciniata rubra. *pin. 270.*
 Scabiosa latifolia, purpurascete flore. *Clus. hist. 2. p*
Habitat Montpelii & in Helvetia. ☉
Caulis non hispidus; Rami patuli. Calycis squam ceolatæ corollis breviores; Corollæ rubræ. Folia Radicalia Bellidis, ovata, obtusiuscula, acutius serrata; caulina pauca; Ramea lanc amplexicaulia, basi ciliata, raro dentata f. p fida, longissima. Calyx 10-phyllus; flore b Corolla radians, purpurascens. Corollulæ b tæ: Labio interiore indiviso; exteriori tripa lineari. Pappus corona denticulata.
- lylvatica. 8. SCABIOSA corollulis quadrifidis æqualibus,

omnibus indivisis ovatis acuminatis subferratis, caule hispido.

scabiosa corollis quadrifidis, receptaculis pilosis, foliis ovato-lanceolatis ferratis hispidis. *Scop. carn.* 351.

scabiosa foliis ovato-lanceolatis ferratis subhirsutis, caule hispido. *Hall. helv.* 671.

scabiosa latifolia rubra non laciniata. *Bauh. pin.* 270.

scabiosa latifolia, rubro flore II. *Clus. hist.* 2. p. I.

scabiosa montana non laciniata rubra I. *Bauh. pin.* 270.

Habitat in Austria, Helvetiae, Monspeli sylvaticis.

SCABIOSA corollulis quadrifidis radiantibus, caule hispido, foliis lanceolatis pinnatifidis: lobis imbricatis. tatarica.

scabiosa flosculis quadrifidis, foliis pinnatifidis: laciniis lateralibus erectiusculis. *Act. upf.* 1744. p. II. t. I. *

scabiosa altissima segetum. *Triumph. Raj. suppl.* 236.

Habitat in Tataria. ♂

Stem linearis, seminibus longiores, decidua. Planta 12-pedalis.

SCABIOSA corollulis quadrifidis radiantibus, caule hispido, foliis pinnatifidis: lobis distantibus. arvensis. *Hort. cliff.* 31. *Fl. svec.* 110, 117. *Mat. med.* 40. *Roy. lugdb.* 188. *Dalib. paris.* 44.

scabiosa pratensis hirsuta. *Bauh. pin.* 269.

scabiosa arvensis. *Tabern. hist.* 442.

scabiosa major communior, hirsuta, folio non lacinato. *Bauh. hist.* 3. p. 2.

Habitat in Europa, solo glareoso, juxta segetes inque pratis. 4

Fructus simillimus *S. tataricae*, sed absque paleis.

SCABIOSA corollulis quadrifidis, foliis caulinis tripinnatis filiformibus. gramontia. *Sauv. monsp.* 268. †

scabiosa capitulo globofo, foliis in tenuissimas lacini- as divisis. *Bauh. pin.* 271. *Magn. monsp.* 231.

Habitat Monspeli, secus vias autumnno florens.

* * Corollulis quinquefidis.

SCABIOSA corollulis quinquefidis radiantibus, columbaris. foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinnatis fetaceis. *Hort. cliff.* 31. *Fl. svec.* 111, 118. *It. gotl.*

216. 228. * *Roy. lugdb.* 139. *Dalib. parif.* 45. *monsp.* 242.

Scabiosa, capitulo globoso, major. *Bauh. pin.*
Scabiosa minor. *Cam. epit.* 711.

β. Scabiosa, capitulo globoso, minor. *Bauh. pin.*
Habitat in Europæ montosis, ficcioribus.
Flores pallidi disco convexo. Pappus setis 5 longi-
ne corollularum.

maritima.

13. SCABIOSA corollulis quinquefidis rediantibus
lyce brevioribus, foliis pinnatis: summis linearibus
integerrimis. *Amxn. acad.* 4. p. 304. *

Scabiosa maritima parva. *Bauh. hist.* 3. p. 7.

Scabiosa maritima, rutæ caninæ folio. *Bocc. sic.*

Habitat in Sicilia, Mōspelii. ☉

ucranica.

14. SCABIOSA corollulis quinquefidis radiantibus
foliis radicalibus pinnatifidis; caulinis linearibus
ciliatis.

Scabiosa foliis planis carnosis: inferioribus pinnatis
ramis integerrimis linearibus. *Gmel. fib.* 2. p.
t. 87.

Habitat in Ucraina. P. Forskæhl.

stellata.

15. SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis dissectis
receptaculis florum subrotundis. *Hort. cliff.* 31
Hort. upf. 26: *Roy. lugdb.* 189.

Scabiosa stellata, folio laciniato, major. *Bauh.*
271.

Scabiosa major hispanica. *Clus. hist.* 2. p. 1.

β. Scabiosa stellata, folio laciniato minor. *Bauh.*
271.

γ. Scabiosa stellata minima. *Bauh. pin.* 271. *prodr.*

Habitat in Hispania, præsertim in agro Granateni
versuras. ☉

Varietas γ vix palmaris foliis omnibus pinnatis; quæ
a inferiora lanceolata serrata s. incisa

Semina basi lanata, Pappo rotato amplissimo.

prolifera.

16. SCABIOSA corollulis quinquefidis radiantibus
floribus sessilibus, caule prolifero, foliis indivis
subferratis. †

Scabiosa stellata humilis integrifolia prolifera. *Ha-*
parad. 125. t. 125. *Raj. suppl.* 236.

Habitat in India.

atropurpu-
rea.

17. SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis dissectis

re-

receptaculis florum subulatis. *Hort. cliff.* 31. *Hort. upf.* 26.

Scabiosa peregrina rubra, capite oblongo. *Bauh. pin.* 270.

Scabiosa VI. Indica. *Clus. hist.* 2. p. 3.

Habitat in India? ☉

Flos atropurpureus Antheris albis. Fructus ovatus. Receptaculum subulatum, paleis setaceis. Semina tetragona, terminata præputio involuto plicato; Pappo radiis 5. setaceis.

SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis pinnatis: laciniis lanceolatis, pedunculis nudis lævibus longissimis. *Roy. lugdb.* 190. argentea.

Scabiosa orientalis argentea, foliis inferioribus incisis. *Tournef. cor.* 34.

Asterocephalus perennis argenteus laciniatus; caule tenui eburneo. *Vaill. act.* 1722. p. 181.

Habitat in Oriente. 2.

SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis incisis, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 31. *Roy. lugdb.* 189. africana.

Scabiosa africana frutescens. *Herm. parad.* 219. t. 219.

Scabiosa africana frutescens maxima, foliis rugosis & crenatis, minor. *Herm. parad.* 220.

Scabiosa africana frutescens maxima, foliis tenuissime incisis. *Boerh. lugdb.* 1. p. 128.

Scabiosa minor æthiopica frutescens, foliis lanuginosis. *Breyn. ic.* 33. t. 26.

Habitat in Africa, Oriente. 2.

SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis lanceolatis confertissimis integerrimis, caule fruticoso. cretica.

Hort. cliff. 31. *Roy. lugdb.* 169.

Scabiosa stellata, folio non dissecto. *Bauh. pin.* 271.

Morif. hist. 3. f. 6. t. 15. f. 31.

Scabiosa cretica frutescens, auriculæ urfi folio.

Tournef. cor. 34.

Asterocephalus frutescens, leucoji folio longiore angusto. *Vaill. act.* 1722. p. 247.

Habitat in Creta & adjacentibus. ☿

Folia in caule confertissima, ut fere imbricata. Calyces obtusi.

SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis linearilanceolatis integerrimis, caule herbaceo. *Amæn. a-cad.* 4. p. 267. graminifolia.

- Scabiosa argentea angustifolia. *Bauh. pin.* 270. *pro*
127. t. 127.
- Scabiosa graminea argentea. *Bauh. hist.* 3. p. 12.
- Asterócephalus argenteus graminifolius, flore cærule
Vaill. parif. 248.
- Habitat in alpibus Helvetiæ, Baldi, Tridentini.* 2.
- Pterócephala. 22. SCABIOSA corollis quinquefidis, caule procul
la. bente fruticoso, foliis laciniatis hirsutis, pappo pl
moso.
- Pterócephalus perennis humilis laciniatus & incan
Vaill. act. 1722. p. 184.
- Habitat in Græcia? b*
- Caulis vix e terra prominens Scapis brevissimis, a*
floris.
- Schroleuca. 23. SCABIOSA corollulis quinquefidis radiantibus, l
liis linearibus pinnatis; radicalibus bipinnatis, l
tiolis perfoliatis.
- Scabiosa corollulis quadrifidis, foliis pinnatis. fol
lis lanceolatis superne incis. *Sauv. monsp.* 241.
- Scabiosa multifido folio, flore flavescente. *Bauh. p*
270. *Morif. hist.* 3. p. 48. f. 9. t. 13. f. 23.
- Scabiosa VII. *Clus. hist.* 2. p. 3.
- Habitat in Germaniæ pratis siccis. ♂*
- Folia radicalia pinnata, pinnis pinnatifidis; Caulis a*
nata pinnis linearibus. Petiolorum bases utrius
ad caulis latera margine lato exstante unitæ & l
foliatæ. Flores flavescente-albidi: in disco tubi
& quinquefidi, sed quasi truncati. Pedunculi lo
Fructus ovatus. Caulis genicula purpurascens.
- papposa. 24. SCABIOSA corollulis quinquefidis, caule her
ceo, calycibus foliosis florem superantibus; pap
plumoso. *Roy. lugdb.* 189.
- Scabiosa cretica, capitulo pappos mentiente. *Tour*
cor. 34. *Bærh. lugdb.* 1. p. 130.
- Habitat in Creta.*

KNAUTIA.

- orientalis. 1. KNAUTIA. *Hort. cliff.* 32. *Hort. usq.* 27. *Roy. h*
190.
- Lychni-Scabiosa, flore rubro, annua. *Bærh. lugd*
p. 131.

Scabiosa orientalis, caryophylli flore. *Vaill. act.* 1722.
p. 241.

Scabiosa orientalis, foliis superioribus integris, flore parvo purpureo, calyce longo gracili. *Till. pis.* 153.
t. 48. mala.

Habitat in Oriente. ☉

Conferatur Scabiosa cærulea virginiana, flosculis tetrapetalis caryophyllorum more patulis & laciniatis. *Fluk. alm.* 335.

ALLIONIA.

ALLIONIA foliis cordatis, calycibus quinquefidis violacea, trifloris.

Allionia. *Læfl. it.* 181. *

Habitat in Cumana Americæ.

ALLIONIA foliis oblique cordatis, calycibus tri- incarnata, phyllis trifloris.

Wedelia. *Læfl. it.* 180. *

Habitat in Cumanæ arenosis.

HEDYOTIS.

HEDYOTIS foliis lanceolatis petiolatis, corymbis fruticosa terminalibus involucretis. *Fl. zeyl.* 63. * *Amæn. acad.*

I. p. 392.

Valerianella foliis nervosis acutis, flosculis in caulium summo quasi involucretis. *Burm. zeyl.* 227. t. 107.

Habitat in Zeylona. b

HEDYOTIS foliis lanceolato-ovatis, floribus verti- auricularis, cillatis. *Fl. zeyl.* 64. * *Mat. med.* 47. *Amæn. acad.* I.

p. 391.

Valerianella palustris, foliis nervosis oblongis, flosculis ad caulium nodos inter foliorum sinus collectis.

Burm. zeyl. 227. t. 108. f. 1.

Muriguti. *Rheed. mal.* 10. p. 63. t. 32.

Habitat in Zeylona. 2

HEDYOTIS foliis lineari-lanceolatis, caule herbaceo herbaceo, dichotomo, pedunculis geminis. *Fl. zeyl.* 65. *

Habitat in Zeylona.

SPERMACOCE.

SPERMACOCE glabra, foliis lineatis, staminibus tenuior, inclusis.

Spermacoce verticillis tenuioribus. *Dill. elth.* 370. t. f. 359.

Spermacoce annum, foliis lanceolatis glabris, bus verticillatis. *Læfl. it.* 202.

Spermacoce. *Roy. lugdb.* 258.

Anonymos americana, foliis parietariæ scabris, flo albis ad foliorum ortum vix conspicuis. *Pluk.* 33. t. 136. f. 4.

Habitat in Carolina. ☉

verticillata. 2. SPERMACOCE glabra, foliis lanceolatis, vel
lis globosis.

Spermacoce glabra, staminibus exstantibus. *Sp.* p. 102.

Spermacoce verticillis globosis. *Dill. elth.* 369. t. f. 358. *Hort. cliff.* 33.

Scabiola jamaicensis hyssopifolia. *Pluk. alm.* 336. f. 6?

Pulegium fruticosum erectum, verticillis densis
Sloan. jam. 64. *hist.* 1. p. 170?

Habitat in Jamaica, Africa.

*Variat verticillis globosis amplexicaulibus & pe-
latis.*

hirta.

3. SPERMACOCE pubescens, foliis oblongis:
mis quaternis, floribus verticillatis.

Spermacoce erecta subhirsuta, foliis oblongis: su-
perioribus approximatis. *Brown. jam.* 141.

Habitat in Jamaica.

*Caules herbacei, pubescentes, præsertim ad verti-
cillos opposite ramosi. Folia elliptica, lineata, subtu-
bescentia, sessilia; summa quaterna. Verticilli
triflori.*

spinosa.

4. SPERMACOCE suffruticosa, foliis linearibus
nervis ciliatis.

Spermacoce suffruticosum. *Læfl. it.* 201.

Spermacoce spinosa. *Jacq. amer.* 12.

Habitat in America.

*Caules diffusi, duri, ad basin ramosi. Folia li-
nosmarini, articulis longiora, ciliata spinulis
trifloris. Verticilli pauciflori.*

hispida.

5. SPERMACOCE hispida, foliis obovatis. *Fl.*

Caleophs zeylanica, folio oblongo, flore albo. *Burm.*

Zeyl. 163. t. 20. f. 3.

Habitat in Zeylona. 24

Conf. Tardavel. Rheed. mal. 9. p. 149. t. 76.

SPERMACOCE procumbens, foliis linearibus, corymbosis, rymbis lateralibus pedunculatis.

Habitat in India.

Caulis herbaei, angulati, debiles, diffusi. Folia linearia, reflexa. Pedunculi laterales, oppositi, aphylli. Flores fasciculati, s. umbella simplici, involucri polyphylo umbella longiore. Stamina exstantia, corolla longiora.

SHERARDIA.

SHERARDIA foliis omnibus verticillatis, floribus arvensis terminalibus.

Sherardia. Dill. gen. 96. *Hort. cliff.* 33. *Fl. svec.* 113,

120. *Roy. lugdb.* 257. *Hall. helv.* 456. *Dalib. paris.* 46.

Rubeola arvensis repens caerulea. Bauh. pin. 334. *prodr.* 145.

Rubia parva, flore caeruleo se spargens. Bauh. hist. 2. p. 719.

Habitat in arvis Scaniae, Germaniae, Angliae. ○

SHERARDIA foliis floralibus binis oppositis binis muralis floribus.

Sperula verticillata luteola. Bauh. pin. 334.

Aspera verticillata muralis minima. Column. ecphr. 302. t. 300.

Asparine minima. Allion. niceens. 4.

Callium minimum, feminibus oblongis. Buxb. cent. 2. p. 31. t. 30. f. 2.

Habitat in Italia, Constantinopoli in vetustis muris. ○

Caulis decumbentes. Folia ovato-lanceolata, inferiora sena, media quaterna, summa bina. Flores bini pro priis pedunculis, pallidi, plani. Fructus oblongi hispidi. Semina subarcuata, vix ac ne vix coronata.

SHERARDIA foliis quaternis aequalibus, caule fruticoso.

Habitat in insula Adscensionis. Osbeck. 5

Frutex torosus, inaequalis, scaber, Ramis obtuse tetragonis. Folia quaterna, angusto-lanceolata, integer-

gerrima, glabra, marginibus revoluta, articulorum paulo longiora, interstincta Stipulis bracteulatis. Flores oppositi, sessiles, axillares. tetraphyllus, germine innatus, persistens folioli latis. Corolla infundibuliformis, quadrifida, a longitudine germinis. Antheræ quatuor, oblongo ricarpium dicoccum.

ASPERULA.

odorata.

1. ASPERULA foliis octonis lanceolatis, fasciculis pedunculatis. *Fl. suec.* 114, 121. *N.* 45. *Dalib. parif.* 46.

Asperula foliis pluribus, floribus pedunculatis. Hort. cliff. 33. *Roy. lugdb.* 255.

Asperula f. Rubeola montana odorata. Bauh. 334.

Habitat in Sveciæ, Germaniæ umbrosis. 21

arvensis.

2. ASPERULA foliis senis, floribus sessilibus gatis terminalibus. *Hort. upf.* 27.

Asperula foliis pluribus, floribus sessilibus. Hort. 33. *Roy. lugdb.* 255. *Dalib. parif.* 47.

Asperula cærulea arvensis. Bauh. pin. 334.

Asperula cærulea. Dod. pempt. 355.

Habitat in Gallia, Flandria, Germania, Angliæ. Folia floralia ciliata, supra hispida. Capitulum nuda sessilibus. Fructus glabri.

taurina.

3. ASPERULA foliis quaternis ovato-lanceolatis fasciculatis terminalibus.

Asperula foliis quaternis ovato-lanceolatis, raris. Hort. cliff. 33. *Virid. cliff.* 9. *Roy. lugdb.* *Hall. helv.* 457. *Sauv. monsp.* 164.

Rubia quadrifolia & latifolia lævis. Bauh. p. Morif. hist. 3. s. 9. t. 21. f. 1.

Habitat in alribus Helvetiæ, Italiæ. 21

Flores, in fasciculum congestos, masculos esse, unum femineo, ex plantis in solo natali inquirentibus.

tinctoria.

4. ASPERULA foliis linearibus; inferioribus seternis quaternis, caule flaccido, floribus risque trifidis.

Asperula foliis quaternis linearibus, floribus trifidis. Fl. suec. 115, 122. *Sauv. monsp.* 163

Rubeola quadrifolia, caule ramoso flaccido, trifidis. Hall. rupp. 8.

Gallium album tripetalum. *Morif. prælud.* 267. *Dalib. paris* 49.

Gallium album 3. *Tabern. hist.* 433. t. 733. f. 1. *bona.*
Habitat in Sveciæ, Thuringiæ, Galliæ, Sibiricæ collibus aridis saxosis. 4

Planta, nisi sustentetur, procumbens.

ASPERULA foliis quaternis lanceolato-linearibus, pyrenæica. caule erecto, floribus sæpius trifidis.

Rubia cynanchica saxatilis. *Bauh. pin.* 333. *prodr.* 146. *Burf. XIX.* 9.

Habitat in Pyrenæis versus Hispaniam & prope Valentiam Gallorum. 4

Caules erecti, spithamæi, quadrangulares. Folia omnia in caule quaterna, linearia, carinata, acuta, levia; inferiora etiam quaterna, sed breviora, lanceolata, obtusiora; folia summa & floralia opposita, lutiora, acuta, lanceolata. Flores tubulosi, rubri, sæpius trifidi. Statura Sherardie arvensis.

ASPERULA foliis quaternis linearibus: superioribus cynanchicis oppositis stipulatis, caule erecto, floribus quadrifidis.

Asperula foliis ternis subulatis triquetris, floribus quadrifidis. *Sp. pl.* 1. p. 104

Asperula foliis linearibus quaternis, summis oppositis. *Roy. lugdb.* 255. *Sauv. monsp* 163.

Rubeola foliis quaternis, seminibus glabris, floribus umbellatis. *Hall. helv.* 458.

Rubia cynanchica. *Bauh. pin.* 333. *Bauh. hist.* 3. p. 723.

Gallium montanum latifolium cruciatum. *Col. cephr.* 1. p. 296. t. 297. f. 1.

Gallium album minus. *Tabern. hist.* 433. t. 433. f. 2.

Habitat in Germaniæ, Angliæ, Galliæ, Helvetiæ, Italiæ, Orientis prætis aridis saxosis cretaceis. 4

Caulis palmaris, scaber. Germina rubra. Flores extus subrugoso-scabri.

DIODIA.

DIODIA. *Hort. cliff.* 493. * *Gron. virg.* 71.

virginiana

Habitat in Virginiæ aquosis.

KNOXIA.

KNOXIA. *Fl. zeyl.* 400.

zeylanica,

K 4

Den-

Dentellaria zeylanica, flore minimo, antirrhini

Raj. suppl. 246.

Habitat in Zeylona supra truncos arborum putri

HOUSTONIA.

cærulea.

1. **HOUSTONIA** foliis radicalibus ovatis, cauleposito, pedunculis primis bifloris. *Gron. virg. Houstonia. Hort. cliff.* 35.

Rubia parva virginiana, foliis ad genicula binis, cæruleo fistuloso. *Pluk. alm.* 324. *mant.* 164.

Paronychiæ facie planta tetrapetaloides virginianare cæruleo. *Morif. hist.* 3. p. 614. f. 15. t. 4.

β. *Chamejasme inodora*, alfine facie, dispermos petaloides, quadrato caule, virginiana. *Pluk. al mant.* 45. t. 97. f. 9. *Raj. suppl.* 502.

Habitat in Virginia.

purpurea.

2. **HOUSTONIA** foliis ovato-lanceolatis, cor terminalibus, floribus superis. *Gron. virg.* 15.

Rubia mariana, alfine majoris folio ad caulemto, flore purpureo-rubente. *Pluk. mant.* 164 *supp.* 262.

Habitat in Virginia.

GALIUM.

* *Fructu glabro.*

aristatum.

1. **GALIUM** foliis quaternis lanceolatis æqu margine scabris, caule diffuso, petalis caudat minibus glabris.

Rubia lævis linifolia montis virginis. Bocc. mu Barr. ic. 356. 583.

Habitat in monte Ventoso & m. Virginis [N tano. C. G. Minuart. 24

Caules diffusi, ramosi, læves. Folia quaterna, olata, enervia, utrinque glabra, margine sc mucronata. Flores paniculati, albi, pedunculi floris. Corollæ quadrifidæ, rarius trifidæ, aristatæ s. mucronatæ. Antheræ flavæ; Fructu bri. Sub autumno novi rami foliis 4, 5, 6. v

rubrioides.

2. **GALIUM** foliis quaternis lanceolato-ovatis æ bus subtus scabris, caule erecto, fructibus gl

Habitat in Europa australi. D. Bæck.

Facies Galii borealis, sed folia duplo latiora, nervis subtus scabra, Caulis firmus, erectus. Panicula brevis, conglomerata. Semina levia.

GALIUM foliis quaternis obovatis inæqualibus, palustre. caulibus diffusis. *Fl. svec.* 119, 126.

Gallium caulibus diffusis, foliis quaternis verticillatis. *Fl. lapp.* 52

Gallium palustre album. *Bauh. pin.* 335.

Habitat in Europæ rivulis limosis. 2

GALIUM foliis quaternis linearibus obtusis, ramis bermudensis ramosissimis.

Parine foliis quaternis obtusis lævibus. Gron. virg. 16.

Sibia tetraphylla glabra, latiore folio, bermudensis, seminibus binis atropurpureis. Pluk. alm. 224.

t. 248. *Raj. suppl.* 261.

Habitat in Virginia.

GALIUM foliis quaternis linearibus, caule prostrato trifido, cumbente scabro, corollis trifidis.

Habitat in Canada. Kalm.

Caulis procumbens, ramosissimus, Ramis ternis quaternis, divaricatis. Folia linearia, obtusa, latiuscula, glabra, subtus parum scabra. Pedunculi sæpius terni, tenuissimi, foliorum longitudine, uniflori; Flores minimi, albi, tripartiti. Stami a tria; Fructus didymus, globosus, levis.

GALIUM foliis linearibus: caulinis senis; ramorum quaternis, caule flaccido, pedunculis subbifloris, fructibus glabris. tinctorium.

Habitat in America septentrionali. Kalm.

GALIUM foliis senis lanceolatis retrorsum serrato- aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu majoribus. uliginosum.

Parine foliis lineari-lanceolatis acuminatis rigidis, corollis fructu majoribus. Roy. lugdb. 255. *Fl. svec.* 121, 127.

Parine minor palustris parisiensis, flore albo. Fl. lapp. 58.

Mollugo montana minor gallio albo similis. Raj. hist. 482. *angl.* 3. p. 224.

Gallium album minus. *Pet. herb.* 30. f. 6. *Vaill. paris.* 78.

Rubia quædam minor. *Bauh. hist.* 3. p. 716.

Habitat in Europæ pascuis aquosis sterilibus. 2

spurium.

8. GALIUM foliis senis lanceolatis carinatis scaturiformis aculeatis, geniculis simplicibus, fructibus glabris. *Hort. ups.* 28. *

Aparine semine læviore *Raj. hist.* 484.

Aparine foliis crebrioribus & semine læviore. *hist.* 3. p. 332.

Habitat in Europæ cultis. ☉

Affine G. Aparines, sed minus.

saxatile.

9. GALIUM foliis senis obovatis obtusis, caule fissimo procumbente.

Galium caule ramosissimo, foliis quinis obversis. *Hort. cliff.* 34. *Roy. lugdb.* 257.

Galium saxatile supinum, molliore folio. *Ju* 1714. p. 492. t. 15.

Habitat in Hispaniæ maritimis lapidosis, inque Sax

minutum.

10. GALIUM foliis octonis lanceolatis mucronato-aculeatis glabris incurvis, fructibus resili-

Galium foliis senis cuneiformi-lanceolatis mucronatis glabris. *Hort. ups.* 28. *

Galium saxatile minimum supinum & pumilum luteo. *Tournef. inst.* 1152.

Habitat in imperio Ruthenico. 2

Simillimum G. vero, sed palmo brevius, decumbens, foliis lævis, nec margine scaber. Folia utrinque convexa, nec margine reflexa. Fructus carnosus, reflexis pedunculis, unde conglomerati.

pusillum.

11. GALIUM foliis octonis hispidis linearibus; natis subimbricatis, pedunculis dichotomis.

Rubeola saxatilis. *Bauh. pin.* 334. *prodr.* 145. XIX. 17.

Aparine minima s. Rubia saxatilis minima. *monf.* 291. ex *Gerardo.*

Habitat in montibus Galloprovinciæ. 2

Caules numerosi, digitales, angulati; Folia verticillata foliolis 8. s. 6. lanceolato-linearibus vel linearibus, acutis, uti caulis undique pilis patentibus spida. Rami rariores, alterni; Foliorum verticillata sæpe ita conferti, ut folia imbricatim digesta

ciantur. Panicula rarior, fere terminalis ex pedunculis bis dichotomis.

GALIUM foliis octonis linearibus fulcatis, ramis floriferis brevibus. *Hort. cliff. 34. Fl. svec. 116, 123. Mat. med. 46. Roy. lugdb. 256.*

Galium caule erecto, foliis plurimis verticillatis linearibus. *Fl. lapp. 61.*

Gallium luteum. *Bauh. pin. 335.*

Gallium. *Dod. pempt. 335.*

Habitat in Europa frequens. 4

GALIUM foliis octonis lævibus subtus scabris; floribus binis, pedunculis capillaribus, caule lævi. *sylvaticum.*

Galium caule tereti fulcrato, foliis octonis glaucis & obtusis. *Hall. helv. 460.*

Mollugo montana latifolia ramosa. *Bauh. pin. 334.*

Habitat in Germaniæ & Europæ australis montibus sylvosis.

Caulis alti, debiles, obsolete angulati s. teretiusculi.

Leves. Folia verticillata, lato-lanceolata, margine &

carina sabra, glaucescentia. Pedunculi capillares, elongati, sep. ultimi biflori & versus hos foliola duo.

Flores minutissimi.

GALIUM foliis octonis ovato-linearibus subferratis patentissimis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus. *Mollugo.*

Galium foliis pluribus acutis, caule flaccido, ramis patentissimis. *Hort. cliff. 34. Roy. lugdb. 257. Fl. svec. 117, 125.*

Mollugo montana angustifolia ramosa, s. **Gallium** album latifolium. *Bauh. pin. 334.*

Mollugo sylvestris lævis. *Bauh. pin. 333.*

Mollugo belgarum. *Lob. ic. 802.*

Habitat in Europa mediterranea. 4

GALIUM foliis subquaternis linearibus lævibus, caule debili scabro, seminibus glabris. *montanum,*

Galium caule recto, foliis senis inferne canaliculatis.

Hall. gatt. 189. Zinn. gatt. 231.

Gallium montanum altissimum, foliis angustis albican-
tibus. *Rupp. jen. 5.*

Habitat in Germania. 4

Natura inter G. Molluginem & glaucum media. Caulis debilis, scaber. Folia caulina quina, reflexa, sub-

sublinearia; *Ramea quaterna*. Flores *corymbis*
fidis, albi, ante explicationem extus purpurascen
Antheræ fusca.

glaucum.

16. GALIUM foliis verticillatis linearibus, pedun-
lis dichotomis summo caule floriferis, caule la-
Roy. lugdb. 156. Hort. upf. 27. Sauv. monsp. 161.
Gallium saxatile, glauco folio. *Bocc. mus. 2. p. 1*
t. 116.

Rubia montana angustifolia. Bauh. pin. 333. p.
145.

Habitat in Tataria, Helvetia, Austria, Monspelli

purpureum.

17. GALIUM foliis verticillatis lineari-setaceis, ped-
culis capillaribus folio longioribus. *Hort. cliff.*
Roy. lugdb. 256.

Gallium nigropurpureum montanum tenuifolium
ephr. 1. p. 298. Bauh. pin. 335.

Habitat in Italia.

Hierosoly-
mitanum.

13. GALIUM foliis denis lanceolato-linearibus,
bellis fastigiatis, fructibus glabris. *Amzn. acad*
p. 451.

Habitat in Palæstina.

Statura proxime accedit ad G. rubrum.

rubrum.

19. GALIUM foliis verticillatis linearibus patulis,
dunculis brevissimis. *Hort. cliff. 34. Roy. h*
256. Scop. Carn. 341.

Gallium rubrum. *Bauh. pin. 335. Morif. hist. 3. p. 1*

Gallium rubro flore. *Clus. hist. 2. p. 175.*

Habitat in Italia.

* *Fructu hispido.*

boreale.

20. GALIUM foliis quaternis lanceolatis trinerviis
bris, caule erecto, feminibus hispidis. *Fl. lapp.*
Fl. svec. 118, 124. Hort. cliff. 64. Roy. lugdb.
Hall. helv. 450.

Rubia pratensis lævis, acuto folio. Bauh. pin.
prodr. 145. Burf. XIX. 15.

Habitat in Europæ borealis pratis. 24

rotundifolium.

21. GALIUM foliis quaternis ovatis aculeato-cilli-
feminibus hispidis.

Rubia femine duplici hispido, latis & hirsutis fr
Bocconi. Morif. hist. 3. p. 329. f. 9. t. 21. f. 5.

um foliis quaternis ovatis lævibus obtusis, paula dichotoma, seminibus hispidis. *Sp. pl.* 1. p. 108.
a quadrifolia f. rotundifolia lævis. *Bauh. pin.* 334. *prodr.* 145.

a quadrifolia, femine duplici hispido. *Bauh. hist.* p. 718. *Morif. hist.* 3. f. 9. t. 21. f. 4.
vine Cruciatæ. *Hall. opusc.* 275.

at in alpibus Helvetiæ, Styriæ. 2.

LIUM foliis octonis lanceolatis carinatis sca- *Aparine,*
is retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructu
spido.

vine foliis lanceolatis acuminatis scaberrimis, col-
lis fructu minoribus. *Roy. lugdb.* 455. *Fl. svec.*
o, 128.

vine foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 34.

vine vulgaris. *Bauh. pin.* 334.

vine. *Dod. pempt.* 353.

at in Europæ cultis & ruderatis. ☉

lis aqueter angulis retrorsum aculeatis, basi articu-
rum villosus. Folia 8. f. 10na, lanceolato-linearia,
pra scabra, subtus glabra margine & carina retror-
n aculeatis. Rami oppositi.

LIUM foliis verticillatis linearibus, peduncu- *parifense.*
; bifidis, fructibus hispidis.

vine foliis lineari-lanceolatis acuminatis flaccidis,
rollis fructu minoribus. *Roy. lugdb.* 255.

vine minima. *Ray. angl.* 3. p. 225. t. 9. f. 1.

lium parifense tenuifolium, flore atropurpureo,
ournes. inst. 664.

at in Anglia, Gallia. ☉

les pedales, debiles, tetragoni, retrorsum scabri.
olia septena, lanceolata, mucronata; scabra præfer-
m margine. Rami floriferi oppositi, breviores. Pe-
unculi nudi, biflori f. triflori. Corollæ flavæ, par-
æ. Semina hispida.

CRUCIANELLA.

UCIANELLA erecta, foliis tenis linearibus, flo- *angustifolia.*
ibus spicatis. *Hort. ups.* 27. * *Sauv. monsp.* 164.

ucianella foliis linearibus. *Hort. cliff.* 32.

bia angustifolia spicata. *Bauh. pin.* 334. *prodr.* 145.

bitat Mospelii. ☉

- latifolia.** 2. **CRUCIANELLA** procumbens, foliis quaternis
ceolatis, floribus spicatis. *Hort. upf.* 27. *
monsp. 164.
Crucianella foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 33.
Rubia latifolia spicatis. *Bauh. pin.* 334.
Habitat in Creta & Monspeli. ☉
- patula.** 3. **CRUCIANELLA** diffusa, foliis senis, floribus
sis. *Amæn. acad.* 3. p. 401. * *Læfl. it.* 68.
Habitat in Hispania ☉
- maritima.** 4. **CRUCIANELLA** procumbens suffruticosa,
quaternis, floribus oppositis quinquefidis.
Crucianella erecta, foliis quaternis, corolla ad
comvivente. *Sauv. monsp.* 164.
Rubia maritima. *Bauh. pin.* 334. *Dod. pempt.* 357.
hist. 2. p. 176.
Habitat in Creta & Monspeli. *D. Sauvages.* b
Caules provoluti, perennes, lignosi Folia quat
lanceolata, rigida, acuta. Bractæ ovata. C
læ quinquefida, aristata; antheræ nigrae. Flores
stes, lutescentes, die clausi, noctu patentes an
faci.
- monspeliaca** 5. **CRUCIANELLA** procumbens, foliis acutis: c
nis quaternis ovatis; rameis subquinatis linear
floribus spicatis.
Crucianella repens, foliis senis, spicis longis.
monsp. 225.
Rubia spicata repens. *Magn. monsp.* 225.
Habitat Monspeli, inque Palæstin.
Caules crassiusculi, diffusi. Rami alterni, recti,
pliciores. Folia inferiora quaterna, ovata, ri
acuta; superna quina s. sena, linearia, acuta.
dunculi nudi. Spicæ terminales, similes C. an
foliæ.

RUBIA.

- tinctorum.** 1. **RUBIA** foliis subsenis *Hort. cliff.* 35. *Hort. upf.*
Mat. med. 44. *Roy. lugdb.* 254.
Rubia perennis, foliis sæpius quinis. *Sauv. monsp.*
Rubia sylvestris aspera. *Bauh. p. n.* 33.
β. Rubia tinctorum sativa. *Bauh. pin.* 33.
Habitat Monspeli & in Italia. 24
- peregrina.** 2. **RUBIA** foliis quaternis. *Roy. lugdb.* 254.

ia quadrifolia asperrima lucida peregrina. *Herm.*
zdb. 523.

at - - - 24

rum superior pagina enervis, levis, lucida.

FUCHSIA.

FUCHSIA. *Mill. dict.* 4.

triphylla.

tria triphylla, flore coccineo. *Plum. gen.* 14. t.
13. f. 1.

at in America meridionali.

is herbaceus, simplicissimus. Folia terna, lanceola-
ta, sessilia. Racemus terminalis, erectus.

SIPHONANTHUS.

SIPHONANTHUS falicis folio, flore flavescente. *indica.*

Am. ruth. 1736. p. 214. t. 15.

at in India. \S

1 alterna, lanceolata; Pedunculi sæpe e regione
positi folii, umbellati.

CATESBÆA.

CATESBÆA.

spinosa.

1 spinosus, buxi foliis plurimis simul nascenti-
bus, flore tetrapetaloido pendulo fordide flavo tu-

longissimo, fructu ovali croceo semina parva
retinente. *Catesb. carol.* 2. p. 100. t. 100.

at in Provincia. \S

IXORA.

IXORA foliis ovalibus semiamplexicaulibus, flori- coccinea.

bus fasciculatis. *Fl. zeyl.* 22. *Osbeck. it.* 220.

1 num flore tetrapetalo, *Ixora linnæi*, Schetti hor-
nalab. *Burm. zeyl.* 125. t. 57.

2 num indicum, lauri folio, inodorum umbella-
ta, floribus coccineis. *Pluk. alm.* 196. t. 59. f. 2.

3 ma sylvarum. *Rumph. amb.* 4. p. 105. t. 46.

4 r indica, lauri amplioribus foliis obtusis. *Pluk.*
ut. 20. t. 364. f. 1.

5 ti. *Rheed. mal.* 2. p. 17. t. 13.

at in India. \S

- alba. 2. IXORA foliis ovato-lanceolatis, floribus fasciculatis. *Jasminum indicum*, lauri folio, inodorum umbellatum, floribus albicantibus & Schetti album. *alm.* 196. t. 109. f. 2.
Bemschetti. *Rheed. mal.* 2. p. 19. t. 14.
Habitat in India. †
- americana. 3. IXORA foliis ternis lanceolato-ovatis, floribus subsessilibus. *Amæn. acad.* 5. p. 393.
Pavetta foliis oblongo-ovatis oppositis, stipulis sessilibus. *Brown. jam.* 142. t. 6. f. 2.
Habitat in Jamaica. †

PAVETTA.

- indica. 1. PAVETTA. *Fl. zeyl.* 56. * *Amæn. acad.* 1. p. 388.
Arbor malabariensis, fructulentis. *Bauh. pin.* 39.
Pavate. *Raj. hist.* 1581.
Pavetta f. Malleomothé. *Rheed. mal.* 5. p. 19.
Habitat in India. †
Corymbi trichotomi, fastigiati, pedunculo filiformi, longo insidentes. Stigma oblongum, bifidum.

PETESIA.

- stipularis. 1. PETESIA foliis lanceolato-ovatis subtus tomentosis, thyrsis lateralibus.
Petesia fruticosa, foliis ovatis oppositis, stipulis minoribus interpositis, racemis minoribus alaribus, caulis quinquefido. *Brown. jam.* 143. t. 2. f. 2.
Habitat in Jamaica. †
Frutex. Folia opposita lanceolato-ovata, integerrima. Racemi axillares, brachiati, laterales, foliis ovatis vires.
- Lygistum. 2. PETESIA foliis ovatis nudis lineatis, caule teretibus.
Lygistum flexile fruticosum, foliis ovatis oppositis, petiolis pedatis, racemis alaribus. *Brown. jam.* 143. t. 3. f. 2.
Habitat in Jamaica. †
Frutex caule flexuoso, lævi. Folia ovata venis distinctis, petiolata. Pedunculi axillares, sæpius gemini uniflori.

PETESIA foliis oblongis utrinque tomentosis. *Jacq.* tomentosa.
amer. 12. †

Habitat in America. †

MITCHELLA.

MITCHELLA. *Amzn. acad.* 3. p. 16.

repens.

Chamædaphne. *Mitch. gen.* 27.

Lonicera foliis subovatis, germine bifloro, corollis
 interne hirsutis, stylo bifido. *Gron. virg.* 22.

Syringa baccifera, myrti subrotundis foliis, floribus
 albis gemellis. *Pluk. amalth.* 198. t. 444. f. 2. *Catesb. carol.* 1. p. 20. t. 20.

Baccifera mariana, clematis daphnoides minori folio.
Pet. gaz. 1. t. 1. f. 13.

Habitat in Carolina, Terra Mariana, Virginia. †

CALLICARPA.

CALLICARPA. *Aët. upf.* 1741. p. 80.

americana.

Sphondyllococos. *Mitch. E. N. C.* 8. p. 218.

Purchardia. *Du Ham. arb.* 1. p. III. t. 44.

Johnsonia. *Mill. dict.*

Anonymos baccifera verticillata, folio molli & in-
 cano, ex america. *Pluk. alm.* 33. t. 136. f. 3.

Crutex baccifer verticillatus, foliis scabris latis den-
 tatis & conjugatis. *Catesb. carol.* 2. p. 47. t. 47.

Crutex foliis amplis subrotundis acuminatis ex ad-
 verso binis, viminibus lentis infirmis quasi leni
 canitie tectis. *Gron. virg.* 138.

Habitat in Virginia, Carolina, Mississippi. †

AQUARTIA.

AQUARTIA. *Jacq. amer.* 12.

aculeata.

Habitat in America meridionali. †

Planta aculeata, superne inermis. Folia alterna, ova-
 ta, obtusa, petiolata. Corolla rotata laciniis linea-
 ribus. Antheræ erectæ, maximæ. Stylus deflexus.
Jacq. Statura Solani.

POLYPREMUM.

POLYPREMUM. *Aët. upf.* 1741. p. 78.

procumbens.

inum carolinianum. *Pet. gaz.* 9. t. 5. f. 6.

Habitat in Carolina, Virginia. ☉

PENÆA.

- Sarcocolla. 1. PENÆA foliis ovatis planis.
Tithymali myrsinitis specie arbuscula æthiopica, subtundis foliis, stœchadis arabicæ squamato capitulo duro lacrymam fundens. *Fluk. mant.* 183. t. 44.
Habitat in Æthiopia. †
Folia *obtusiuscula.* Corollæ *obtusæ.* Calyx *intermedium flori-nullus;* Stylus *magis subulatus quam in reliquis.*
- mucronata. 2. PENÆA foliis cordatis acuminatis, *Mat. med.* 4
Penæa foliis ovatis acuminatis. *Koy. lugdb.* 399.
Penæa. *Hort. cliff.* 37.
Erica africana, unedonis flore amplo, foliis cordiformibus in acumen desinentibus. *Raj. dendr.* 97.
Tithymali myrsinitis specie arbuscula æthiopica, folio parvo e lata basi in acutissimum mucronem subitodis sinente, capitulis origani. *Pluk. mant.* 183.
Habitat in Æthiopia. †
- squamosa. 3. PENÆA foliis rhombæo cuneiformibus carnosissimis.
Habitat in Æthiopia.
Hæc reliquis minor. Corolla (ut in præcedente) acuta. Folia parte dimidia superiore patula.

BLÆRIA.

- ericoides 1. BLÆRIA. *Hort. cliff.* 49.
Erica carnea, promontorii bonæ spei, foliis & floribus villosis. *Fet. gaz. t. 2. f. 10.*
Habitat ad Cap. b. Spei. †

BUDDLEJA.

- americana. 1. BUDDLEJA foliis ovatis. *Amæn. acad.* 5. p. 394.
Buddleja. *Amm. herb.* 577. *Hort. cliff.* 35.
Buddleja affurgens incana, foliis majoribus, spicis assurgentibus. *Brown. jam.* 144.
Verbasco folio minore arbor, floribus spicatis luteis, minimis singulis oblongis in singulis vasculis sic. *Sloan. jam.* 139. *hist.* 2. p. 29. t. 173. f. 1. *R. dendr.* 97.
Habitat in Caribæis ad ripas & torrentes. †
- occidentalis. 2. BUDDLEJA foliis lanceolatis.
Buddleja foliis lanceolatis acuminatis integerrimis compositis, spicis interruptis. *Mill. dict.*

Ophioxylon americanum, foliis oblongis mucronatis leviter ferratis bardanæ instar subtus lanuginosis.

Pluk. alm. 270. t. 210. f. 1.

Habitat in America. b

EXACUM.

1. EXACUM floribus sessilibus. *Fl. zeyl. 61. ** sessile.

*Exacum. Amæn. acad. 1. p. 391. **

Centaurium minus aureum, flosculis numerosis, æthiopicum. *Pluk. alm. 57. t. 275. f. 3?*

Habitat in Asia & Africa.

2. EXACUM floribus pedunculatis. pedunculatum.

Centaurium minus hypericoides, flore luteo, *lini capitulis*. *Pluk. mant. 43. t. 343. f. 3.*

Habitat in India. C

PLANTAGO.

* *Scapo nudo.*

1. PLANTAGO foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica major. ca flosculis imbricatis.

Plantago foliis ovatis glabris. Hort. cliff. 43. Fl. svec. 122, 129. Mat. med. 49. Key. lugdb. 401. Hall. helv. 470. Dalib. paris. 50.

Plantago scapo spicato, foliis ovatis. Fl. lapp. 62.

Plantago latifolia sinuata. Bauh. pin. 189

Plantago major. Cam. epit. 261.

2. *Plantago latifolia glabra minor. Bauh. pin. 189.*

3. *Plantago latifolia rosea, floribus quasi in spica dispositis. Bauh. pin. 189. Hort. upf. 29.*

4. *Plantago latifolia, spica multiplici sparsa. Bauh. pin. 189.*

5. *Plantago latifolia rosea, flore expanso. Bauh. pin. 189.*

Habitat in Europa & Japonia ad vias. 24

6. PLANTAGO foliis ovatis glabris, scapo angulato, asiatica. spica flosculis distinctis.

Habitat in China, Sibiria.

Planta ita refert P. majorem, ut quisvis facile eandem diceret. At differt Spica longiore, floribus remotis & distantibus, Foliis sæpius basi subdentatis, Scapo angulato.

7. PLANTAGO foliis ovato-lanceolatis pubescenti-media. bus, spica cylindrica, scapo tereti. *Hort. cliff 36.*

Fl. svec. 123, 130. *Roy. lugdb.* 401. *Hall. helv.* 472
Dalib. paris. 50.

Plantago latifolia incana. *Bauh. pin.* 189.

Plantago major incana. *Clus. hist.* 2. p. 109.

β. *Plantago latifolia hirsuta minor.* *Bauh. pin.* 189.

Plantago latifolia incana, spicis variis. *Bauh. pin.*
 189. *Morif. hist.* 3. f. 8. t. 15. f. 7.

Habitat in Europæ pascuis sterilibus apricis argillofis. 2
Folia non dentata, Calyces glabri, Filamenta purpura-
scientia.

virginica.

4. **PLANTAGO** foliis lanceolato-ovatis pubescentibus
 subdenticulatis, spicis cylindricis pubescentibus
 scapo angulato. *Gron. virg.* 16.

Plantago media incana virginiana, ferratis foliis, an-
nua. *Morif. hist.* 3. p. 259. f. 8. t. 15. f. 8.

Plantago virginiana, pilosellæ foliis angustis, radice
turbinata. *Pluk. alm.* 298.

Plantago mariana, spica prætenui. *Pet. gaz.* 1. t. 1.
 f. 10.

Plantago myosotis f. trinervia hirsuta carolina. *Raj.*
hist. 2. p. 188.

Habitat in Virginia. ☉

levisima.

5. **PLANTAGO** foliis lanceolatis quinquenerviis den-
 tatis glabris, scapo subangulato, spica oblongo-
 cylindrica.

Plantago montana, crasso glabro canaliculato tenui
oreque folio, profundissime radicata. *Till. pis.* 146.

Habitat in Italia. 2

Scapus scaber, tripedalis. Folia sesquipedalia, obtuse
dentata, crassa, glabra; dentibus remotis, obtusis. Spi-
ca cylindrica, longa.

anceolata.

6. **PLANTAGO** foliis lanceolatis, spica subovata mu-
 da, scapo angulato. *Vir. cliff.* 9. *Hort. cliff.* 36.
Fl. svec. 124, 131. *Roy. lugdb.* 401. *Hall. helv.* 471.
Dalib. paris. 50.

Plantago angustifolia major. *Bauh. pin.* 189.

Plantago minor. *Dod. pempt.* 102.

β. *Plantago trinervia, folio angustissimo.* *Bauh. pin.*
 189. *prodr.* 98.

γ. *Plantago angustifolia major, caulium summitate fo-*
liosâ. *Bauh. pin.* 189.

- Plantago argentea angustifolia e rupe victoriæ. Tournef. inst. 127.*
Habitat in Europæ campis sterilibus. 24
- PLANTAGO** foliis lanceolatis obsolete denticulatis, spica subrotunda hirsuta, scapo tereti. lagopus.
- Plantago angustifolia, paniculis lagopi. Bauh. pin. 189. prodr. 98. Morif. hist. 3. f. 8. t. 16. f. 13.*
- Plantago Catanance. Rauw. itin. 4. t. 6.*
Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Lusitania. 24
- Folia enervia, subtus pubescentia, apice denticulisque obsolete fusca. Scapus teres. Spica subglobosa Calycibus hirsutis, Corollis limbo levibus.*
- PLANTAGO** foliis lanceolatis obliquis villosis, spica cylindrica erecta, scapo tereti foliis longiore. albicans.
- Plantago foliis lanceolato-linearibus, scapo longitudine foliorum, spica oblonga. Hort. cliff. 37. Roy. lugdb. 401.*
- Plantago foliis lanceolato-linearibus, scapo foliis duplo longiore, spica oblonga. Sauv. monsp. 26.*
- Holosteum hirsutum albicans majus. Bauh. pin. 190.*
- Holosteum salmanticense majus. Clus. hist. 2. p. 110.*
- Holosteum hirsutum albicans minus. Bauh. pin. 190.*
Habitat in Hispaniæ & Narbonæ aridis. 24
- PLANTAGO** foliis linearibus, planis hirsutis, spica oblonga erecta. alpina.
- Plantago foliis linearibus, spica oblonga. Hall. helv. 471. Scop. carn. 281.*
- Holosteum hirsutum nigricans. Bauh. pin. 190.*
Habitat in Helvetiæ, Austriæ Alpibus. 24
- Scapus hirsutus. Spica ante florescentiam cernua. Folia subtus convexa*
- PLANTAGO** foliis linearibus, scapo tereti brevissimo lanato, spica subrotunda nutante. cretica.
- 36. Roy. lugdb. 401.*
- Plantago cretica minima tomentosa, caule adunco. Tournef. cor. 5.*
- Holosteum s. Leontopodium creticum. Bauh. pin. 190.*
- Leontopodium creticum. Clus. hist. 2. p. 11.*
Habitat in Creta.
- PLANTAGO** foliis semicylindræis integerrimis: basi lanatis, scapo tereti. maritima.
- Fl. svec. 127, 133.*

Plantago scapo spicato, foliis linearibus subtus convexis. *Fl. lapp.* 63. *Lob. obs.* 163.

Coronopus maritimus major. *Bauh. pin.* 190.

Habitat in litoribus maritimis Europæ, Americæ borealis. 24

Basis foliorum pilosa est, unde affinitas summa specierum 7. 8. c. II. 12. sed quæ vis naturæ efficeret tam variâ an locus; an copula?

subulata.

12. PLANTAGO foliis subulatis triquetris striatis scabris, scapo tereti. *Roy. lugdb.* 402

Plantago foliis triangulari-prismaticis. *Guett. stamp.* p. 428.

Holosteum, strictissimo folio, minus. *Bauh. pin.* 190

Serpentina omnium minima. *Lob. ic.* 439.

β. Holosteum massiliense. *Bauh. pin.* 190.

Habitat in maritimis Mediterranei arenosis. 24

Folia conferta, filiformia, acuta, supra plana, margine scabra aculeis vix conspicuis: ad radicem lana.

Scapus teres, foliis longior, minime glaber. Spica ovata-oblonga, non villosa.

ferraria.

13. PLANTAGO foliis lanceolatis quinquenerviis dentato ferratis, scapo tereti.

Plantago apula laciniata bulbosa. *Col. ceph.* 1. p. 25 t. 259. *Moris. hist.* 3. p. 260. f. 8. t. 16. f. 19.

Habitat in Apulia, Mauritania Brander. 24

Folia lanceolata, quinquenervia, striata, subpubescentia subpetiolata, dentibus argutis ferrata. Scapus teres pubescens.

Coronopus.

14. PLANTAGO foliis linearibus dentatis, scapo tereti

Plantago foliis linearibus pinnato dentatis. *Hort. cl.* 37. *Fl. suec.* 126, 134. *Roy. lugdb.* 401. *Dalman. parif.* 50.

Coronopus sylvestris hirsutior. *Bauh. pin.* 190.

Herba stella s. Cornu Cervinum. *Dod. pempt.* 109.

β. Coronopus hortensis. *Bauh. pin.* 190.

Habitat in Europæ glareosis.

Isingii.

15. PLANTAGO foliis linearibus subdeptatis, scapo tereti, spica ovata: bracteis carinatis membranaceis

Læfl. it. 124. *

Plantagomarina. *Pet. herb.* 3. f. 9. *Raj. angl.* 3. p. 319

Habitat in Hispaniæ collibus agrorumque marginibus. ☉

Differt a P. Coronopo quod sit minor & præcocior: Spica ovata; ejus vero longa. Floribus rarius imbricatis: bracteis glabris navicularibus; ejus vero subulatis angustissimis pubescentibus. Stamina brevioribus. Calycis foliolis acutioribus. Colore corollæ magis fusco. Foliis linearibus, nec lanceolatis, parce dentatis. Scapus pilosus est. Læst.

6. **PLANTAGO** scapo unifloro. *Fl. lapp. 64. Fl. svec. uniflora. 123, 135. Dalib. parif. 50.*

Plantago floribus femineis sessilibus ad exortum scapi uniflori maris. Juss. act. 1742. p. 131. t. 7. Guett. stamp. 2. p. 26.

Gramen junceum, capitulis quatuor longissimis filamentis donatis. Pluk alm. 180. t. 35. f. 2. Morif. hist. 3. f. 8 t. 9. f. 30.

Habitat ad Europæ littora lacuum.

* * *Caule ramoso.*

7. **PLANTAGO** caule ramoso herbaceo, foliis subdentatis recurvatis, capitulis aphyllis. *Hort. upf. 28. Mat. med. 50.* Pphyllium.

Plantago caule ramoso. Virid. cliff. 9. Roy. lugdb. 401.

Pphyllium majus erectum. Bauh. pin. 191.

Pphyllium. Dod. pent. 115.

Habitat in Europa australi, inter segetes. ☉

Caules diffusi, villosi. Folia inferiora opposita; superiora terna s. quaterna; linearia, recurva, dentata, villosa-viscida. Pedunculi folio longiores. Capitula aphylla Bracteis & calycinis foliolis linearibus.

PLANTAGO caule ramoso herbaceo, foliis integerrimis reflexis, capitulis foliosis. *Hort. upf. 29.* indica.

Kali III. Alp. egypt. 128?

Habitat in Ægypto. ☉

Caulis altus, villosus, diffusus. Folia linearia, integerrima, deflexa, longissima, nuda, basi multum villosa, opposita; superiora sæpe terna. Pedunculi longi. Capituli squamæ quatuor infimæ enatæ in foliola lanceolata, capitulo sæpe longiora. Bracteæ inter flosculos cuneiformes, retusæ, concavæ, lateribus dilatate.

9. **PLANTAGO** caule ramoso fruticoso, foliis filiformibus integerrimis strictis, capitulis subfoliatis. cynops.

Plantago perennis, foliis integerrimis, caule ran-
diffuso. *Hort. cliff.* 47.

Psyllium sempervirens. *Morif. hist.* 3. p. 262. *J*
t. 17. *f.* 1.

Psyllium majus supinum. *Bauh. pin.* 191. *Bauh. hij*
p. 513.

Habitat in Gallo-provincia, Italia. †

Caulis palmaris, durus, lignosus, fruticosus, purp
scens, nudus. Folia opposita, subulata s. filifor
canaliculato-trigona, erecta, integerrima, subvil
Pedunculi axillares, longitudine foliorum. Cap
squamæ infimæ mucronatæ, patulæ, mediocres. *J*
ctæ, inter flosculos, ovatæ, concavæ.

afra.

20. *PLANAAGO* caule ramofo fruticoso, foliis
ceolatis dentatis, capitulis aphyllis.

Psyllium, foliis crenatis, indicum. *Bauh. pin.*
prodr. 99. *Morif. hist.* 3. p. 262. *f.* 8. *t.* 19. *J*
Bauh. hist. 3. p. 513.

Psyllium foliis laciniatis. *Bocc. sic.*

Habitat in Sicilia, Barbaria. †

Caulis pedalis, frutescens, erectus, pubescens. F
lanceolata, dentata, subvillosa, striata. Spicæ a
le, plures ad apices ramorum.

SCOPARIA.

dulcis.

1. *SCOPARIA* foliis ternis, floribus pedunculatis
Capraria foliis ternis, corollis quadripartitis. F
cliff. 320. *Roy. lugdb.* 301.

Samoloides. *Bærh. lugdb.* 2. p. 265. *

Veronica americana erecta frutescens & ramofo. H
parad. 241. *t.* 241.

Veronica fruticosa erecta dulcis, hexangulati ca
Sloan. jam. 81. *hist.* 1. p. 195. *t.* 108. *f.* 2.

phytenoides americanum, flore albo tetrape
Pluk. alm. 296. *t.* 215. *f.* 1.

β. *Tupeicava.* *Pif. bras.* 246.

Habitat in Jamaica, Curassao. ☉

Planta Pisonis in herbario subvillosa erat.

procumbens 2. *SCOPARIA* foliis quaternis, floribus sessilibus. *J*
amer. 12.

Habitat in America calidiorē. ☉

RHACOMA.

RHACOMA. *Anto-n. acad.* 5. p. 393. * Crossopeta-
 Crossopetalum fruticosum tenue, foliis ovatis tenuis- lum.
 sime denticulatis. *Brown. jam.* 145. t. 17. f. 1.
Habitat in Jamaica. ‡

CENTUNCULUS.

CENTUNCULUS. *Dill. giff.* 161. *gen.* III. *E. N.* minimus.

C. 5. app. 92. t. 10. f. 31.

Centunculus foliis alternis ovatis. *Fl. svec.* 129, 136.

Dalib. paris. 52.

Anagallidiastrum exiguum, foliis lanceolatis alternis.

Mich. gen. 14. t. 18.

Anagallis paludosa minima. *Vaill. paris.* 12. t. 4. f. 2.

Anagallis palustris minima, flosculis albis. *Mentz. pug.*

t. 4. f. 5.

Habitat in Italiæ, Galliæ, Germaniæ, Scaniæ areno-
sis subudis. ○

SANGUISORBA.

SANGUISORBA spicis ovatis. *Hort. cliff.* 39. *Fl.* officinalis.

svec. 130, 137. *Mat. med.* 51. *Roy. lugdb.* 240. *Da-*

lib. paris. 51.

Pimpinella sanguisorba major. *Bauh. pin.* 160.

Pimpinella sylvestris f. *sanguisorba major.* *Dod. pempt.*

105.

Pimpinella major rigida præalta auriculata subnuda.

Bocc. mus. 2. p. 19. t. 7.

Habitat in Europæ pratis siccioribus. †

SANGUISORBA spicis cylindricis. †

sanguisorba tetrastemon, staminibus tubo longiori-

bus, spicis cylindricis. *Zinn. gæt.* 239.

Pimpinella minor de canada. *Zanon. hist.* t. 138.

Pimpinella canadensis major, spica brevior rubra,

foliis lævibus. *Morif. hist.* 3. p. 264. f. 8. t. 18. f. 2.

Habitat in Canada. †

Spice cylindricæ longiores, & Stamina longiora, quam

in officinali.

SANGUISORBA spicis longissimis. *Hort. cliff.* 39. canadensis.

Roy. lugdb. 240.

Pimpinella sanguisorba canadensis major, spica lon-

giore alba. *Morif. hist.* 3. p. 264. f. 8. t. 18. f. 12.

Pimpinella maxima canadensis longius spicata. (
canad 175. t. 174. *Barr. var.* 18. f. 739.
Habitat in Canada. 24

CISSUS.

- vitiginea.* 1. **CISSUS** foliis cordatis subquinelobis toment
Cissus. Fl. zeyl. 60. * *Amæn. acad.* 1. p. 390. *
Arbuscula baccifera circumplicatilis, vitiginea
subtus lanato, fructu racemoso fervidiore od
Pluk. mant. 27. t. 337. f. 2.
Funis crepitans. Rumph. amb. 5. p. 446. t. 164.
Schunambu-valli. Rheed. mal. 7. p. t. 11.
Habitat in India. 5
- Cordifolia.* 2. **CISSUS** foliis cordatis integerrimis.
Vitis folio subrotundo, uva corymbosa car
Plum. gen. 18. ic. 159. f. 3.
Habitat in America.
- Sicyoides.* 3. **CISSUS** foliis ovatis nudis fetaceo-ferratis.
Irfiola scandens, foliis oblongo-ovatis ad marg
denticulis fetaceis. Brown. jam. 147. t. 4. f. 1, 2.
Bryonia alba geniculata, violæ foliis, baccis e
di-purpurascentibus. Sloan. jam. 106. *hist.* 1. p.
t. 144. f. 1. Raj. suppl. 347.
Habitat in Jamaica.
- acida.* 4. **CISSUS** foliis ternatis oblongis carnosis incis.
Sicyos trifoliata Sp. pl. 1. p. 1013.
Irfiola triphylla scandens & claviculata, foliis c
ferratis. Brown. jam. 147.
Bryonia alba triphylla geniculata, foliis crassis
dis. Sloan. jam. 106. *hist.* 1. p. 233. t. 142. f. 6.
suppl. 347.
Bryonioides trifoliatum indicum, foliis succule
crassis & crenatis. Pluk. alm. 71. t. 152. f. 2.
Vitis trifolia minor corymbosa, acinis nigrioribus
binatis. Plum. spec. 18. t. 259. f. 5.
Habitat in America.
- trifoliata.* 5. **CISSUS** foliis ternatis subrotundis subdentatis.
Irfiola triphylla scandens, foliis ovatis subdentatis
tiolo communi marginato, calycibus majoril
Brow. jam. 147.

a alba triphylla maxima. *Sloan. jam* 106. *hist. t.*
233. *t.* 144 *f.* 2. *Raj. suppl.* 347.
tat in Jamaica.

EPIMEDIUM.

MEDIUM. *Hort. cliff.* 37. *Hort. upf.* 29. *Roy. alpinum.*
ldb. 402. *Dod. pempt.* 599. *Lob. hist.* 176.
tat in *Alpium Euganeorum, Ligurinarum, Gret-*
ænsium, Ponteborum umbrosis. 4

CORNUS.

UNUS arborea, involucro maximo: foliolis ob- *florida.*
rdalis. *Hort. cliff.* 38. *Hort. upf.* 29. *Roy.*
db. 249. *Græ. virg.* 17. *Kalm. it.* 2. *p.* 321. 6
p. 104.

us mas virginiana, flosculis in corymbo digestis
perianthio tetrapetalo albo radiatim cinctis. *Pluk.*
t. 120. *t.* 20. *f.* 3. *Catesb. carol.* 27. *t.* 27.

tat in Virginiae sylvis. 6

UNUS arborea, umbellis involucrum æquanti- *mas.*
s. *Hort. cliff.* 38. *Hort. upf.* 29. *Roy. lugdb.* 249.
lib. parif. 52.

us sylvestris mas. *Bauh. pin.* 447.

us mas pumilio. *Clus. hist.* 1. *p.* 13.

us hortensis mas. *Bauh. pin.* 447.

tat in sepibus Austriae. 6

UNUS arborea, cymis nudis. *it. W-goth.* 32. *fanguinea.*

us umbellis involucro multoties longioribus.

rt. cliff. 38. *Roy. lugdb.* 249. *Hall. helv.* 463.

lib. parif. 52. *Fl. svec.* 131.

us femina. *Bauh. pin.* 447.

us fanguinea. *Dod. pempt.* 782.

tat in Europæ, Asiæ, Americæ borealis dume-
6

UNUS herbacea, ramis binis. *Fl. lapp.* 65. *t.* 5. *fuecica.*

Fl. svec. 132, 138. *Roy. lugdb.* 249. *Oed. dan.* *t.* 5.

us pumila herbacea, Chamæpericlymenum dicta.

U. elth 108. *t.* 91.

lymenum humile. *Bauh. pin.* 302. *norvegicum.*

uh. pin. 302. *Buxb. act.* 3. *p.* 268.

tat in Svecia, Norvegia, Russia. 4

- canadensis. 5. CORNUS herbacea, ramis nullis. *Amæn. ac.*
p. 157.
Pyrola, alfine flore, brasiliana. *Bauh. prodr.*
pin. 191. *Burf. X.* 106.
Habitat in Canada. †
Involucrum, quam in priore, longius.

FAGARA.

- Pterota. 1. FAGARA foliolis emarginatis. *Amæn. acad.*
393. *
Schinus foliis pinnatis: foliolis oblongis, p
marginato articulato inermi. *Mat. med.* 533.
1. p. 389.
Pterota subspinosa, foliis minoribus per pinna
ginato-alatas dispositis, spicis geminatis ali
Brown. jam. 146. t. 5. f. 1.
Lauro affinis, jasmini alato folio, costa media
branulis utrinque exstantibus alata, ligno
ferro vix cedens. *Sloan. jam.* 137. *hist.* 2. p.
162. f. 1. *Raj. dendr.* 86.
Habitat in Jamaica. †
- Tragodes. 2. FAGARA articulis pinnarum subtus aculeatis.
amer. 13.
Schinus tragodes. *Sp. pl.* 1. p. 369.
Schinoides petiolis subtus aculeatis. *Hort. cliff.*
Rhus obsoniorum similis leptophyllis tragodes
ricana spinosa, rachi medio appendiculis.
Pluk. alm. 319. t. 107. f. 4?
Habitat in America. †
Præcedenti nimis affinis.
- Piperita. 3. FAGARA foliolis crenatis. †
Piper japonicum Slo & Sanfio. *Kämpf. amæn.*
893.
Habitat in Japonia. †

TOMEX.

- tomentosa. 1. TOMEX.
Tomex tomentosa. *Fl. zeyl.* 59. * *Amæn. acad.*
389.
Arbor malabarica Illa dicta. *Burm. zeyl.* 26.
Habitat in India. †

PTELEA.

EA foliis ternatis. *Mill. dict.* 211.

Hort. cliff. 35.

similis. *Zinn. g.ett.* 207. *

virginianus trifolius, ulmi samaris. *Pluk. alm.*

Dill. elth. 147. f. 122. f. 148.

in Virginia. †

EA foliis simplicibus.

æa. *Hort. cliff.* 144. *Fl. zeyl.* 141. * *Roy. lugdb.*

Jacq. amer. 19.

eris erecta fruticosa, foliis oblongis acuminatamulibus gracilibus. *Brown. jam.* 191. t. 18. f. 1.

Paliuro affinis, angusto oblongo ligustri folio, tetrapetalo herbaceo. *Sloan. jam.* 138. *hist.* 2.

t. 162. f. 3. *Raj. dendr.* 94.

phyllaster litoreus. *Rumph. amb.* 4. p. 110. t. 50.

us viscosa, salicis folio integro oblongo. *Burm.*

55. t. 23.

ula viscosa, æleagni foliis læte virentibus, amela tricoccus. *Pluk. phyt.* 142. f. 1.

in Indiis, locis arenosis. †

rborem idem genus cum *Ptelea* agnoscere observat. *Jussieus*, at *Florem trifidum hexandrum Brownii* quadrifidum octandrum *Jacquin* tribuit, mihi non it.

LUDVIGIA.

VIGIA foliis alternis lanceolatis.

gia capsulis cubicis apice perforatis. *Hort.*

30.

gia capsulis subrotundis. *Hort. cliff.* 491. *Roy.*

5. 252.

gia. *Gron. virg.* 17.

achia non papposa, flore luteo majore, siliqua ophyllouide minore, ex virginia. *Pluk. alm.* 235.

23. f. 2.

t saligneis foliis, caule purpureo, capsularis.

amalt. 99. t. 412. f. 1.

in Virginia. ☉

VIGIA foliis oppositis lanceolatis, capsulis pe- perennis.

gia caule diffuso, foliis lanceolatis capsulis pe- culatis folio dimidio brevioribus. *Fl. zeyl.* 66. *

Ca-

trifoliata.

viscosa.

alternifolia.

Carambu. *Rheed. mal. 2. p. t. 49.*
Habitat in India. 24

OLDENLANDIA.

- uniflora. 1. OLDENLANDIA pedunculis simplicissimis, bus hispidis.
 Oldenlandia calycibus fructuum maximis col
Gron. virg. 138.
 Oldenlandia aquatica, foliis obovatis oppositis, bus singularibus ad alas. *Brown. jam. 146.*
 Alfine aquatica major repens, foliis acuminatis, niana. *Pluk. alm. 20. t. 74. f. 5. mala.*
Habitat in Virginia, Jamaicæ aquosis.
 Caules ramoso-subdivisi, repentes. Folia opposita, olato-ovata, subpetiolata, integerrima. Flores res, pauci, pedunculis propriis. Germina hispida.
- biflora. 2. OLDENLANDIA pedunculis bifloris petio- gioribus, foliis lanceolatis. *Fl. Zeyl. 68. **
Habitat in India. ☉
- umbellata. 3. OLDENLANDIA umbellis nudis lateralibus nis, foliis linearibus. *Fl. Zeyl. 67. **
 Lyfimachæ adfinis, saturejæ folio, maderaspæ capfulis in summitate fere umbellatis. *Pluk. ab t. 119. f. 4.*
Habitat in India. 24
- corymbosa. 4. OLDENLANDIA pedunculis multifloris, fe neari-lanceolatis. †
 Oldenlandia caule tenerrimo, foliis linearibus, fitis, ramu'is minimis floriferis, pedunculis r & simplicibus. *Brown. jam. 146.*
 Oldenlandia humilis hystopifolia. *Plum. gen. 42. f. 1. Fhret. pict. t. 2. f. 1.*
Habitat in America meridi-nali. ☉

AMMANNIA.

- latifolia. 1. AMMANNIA foliis semiamplexicaulibus, ca tragono. *Hort. cliff. 344 Hort. ups. 30.*
 Ammannia palustris, caule quadrangulari, foliis fitis. *Amm herb. 344.*
 Inardia foliis sessilibus lanceolatis quasi auritis bus ternis. *Brown. jam. 148.*

Aparines folio anomala, vasculo seminali rotundo, femine minutissimo. *Sloan. hist. 1. p. 44. t. 7. f. 4.*

Habitat in Caribæis, locis humidis. ☉

AMMANNIA foliis subpetiolatis, caule ramoso. ramosior.

Ludvigia aquatica erecta, caule rubente, foliis adgenicula binis longis angustis hyssopi instar, flore tetrapetalo albo. *Clayt. 774.*

Habitat in Virginia. D. Gronovius. ☉

Planta pedalis, inferne Ramis oppositis, teretibus, simplicibus. Calyces ex alis foliorum solitarii (nec ut in præcedenti terni), ad apices ramorum magis conferti & ferme spicati.

AMMANNIA foliis subpetiolatis, capsulis calyce baccifera. majoribus coloratis.

anonymos, linariæ folio, orientalis, gallii lutei flore, herba capsularis verticillata. Fluk. alm. 33. t. 136. f. 2? at non ramo: a.

Habitat in China. Osbeck. ☉

Planta tenera, digiti longitudine, erecta, absque ramis.

Caule rufescente, tereti. Folia opposita, lanceolata, subpetiolata integerrima. Flores verticillati, ad axillas foliorum plurimi, propriis pedunculis insistentes, minimi. Capsula globo:sa, rubra, calyce major.

ISNARDIA.

ISNARDIA. *Dalib. parif. 53.*

palustris.

Planta palustris. Petit. gen. 49. t. 49.

Planta foliis subovatis pediculatis, floribus in foliorum alis sessilibus. Guett. stamp. 2. p. 115.

Symphyllum Buxb. act. 4. 277. t. 27.

Isnardia aquatica, foliis obovatis oppositis, floribus singularibus ad alas. Brown. jam. 146.

aux major palustris, flore herbaceo. Morif. præl. 268.

Raj. hist. 1102. suppl. 635. Bocc. mus. 105. t. 84 f. 2.

Isnardia palustris rotundifolia repens, foliis portulacæ pingvibus. Lind. alfat. 114. t. 2.

Habitat in Galliæ, Alsatia, Russia, Jamaica, Virginia fluviiis. ☉

TRAPA.

TRAPA.

natans.

Trapa petiolis foliorum natantium ventricosis. Hort. cliff.

cliff. 483. *Fl. jvec.* 134, 140. *Mat. med.* 52. *D. parif.* 52.

Tribulus aquaticus. *Bauh. pin.* 194. *Cam. epit.* 71.

Panover-Tieraua. *Rheed. mal.* 11. p. 65. t. 33.

*Habitat in Europæ australis, Aliæque stagnis
fis.* ☉

DORSTENIA.

- Contrajerva.* 1. **DORSTENIA** acaulis, foliis pinnatifido-palmatis, ferratis, floribus quadrangulis.
Dorstenia scapis radicatis. *Hort. cliff.* 32. *med.* 53.
Dorstenia dentariæ radice, sphondylii folio, placentata ovali. *Houft. act. n.* 421. f. 1.
Dorstenia sphondylii folio, dentariæ radice. *gen.* 29. ic. 119.
Drakena radix. *Chf. exot.* 83.
Cyperus longus odoratus peruanus. *Bauh. pin.* 194. *Tuzpatlis.* *Hern. mex.* 147.
Habitat in nova Hispania, Mexico, Peru, Tabaculana, insula Vicentii. 2.
- Drakena.* 2. **DORSTENIA** acaulis, foliis pinnatifido-palmatis, integerrimis floribus ovalibus.
Dorstenia dentariæ radice, sphondylii folio, placentata ovali. *Houft. act. n.* 421. f. 1.
Habitat in Vera Cruce. 2.
- houstoni.* 3. **DORSTENIA** acaulis, foliis cordatis angulatis, ferratis, floribus quadrangulis.
Dorstenia dentariæ radice, folio minus lacte placenta quadrangulari & undulata. *Houft. angl.* 421. f. 2.
Habitat in Campechia. 2.
- caulescens.* 4. **DORSTENIA** pedunculis caulinis. *Hort. cliff.* 32. *Parietaria racemosa, foliis ad oras villosis.* *spec.* 10. ic. 120. f. 1.
Habitat in America meridionali. 2.

ELÆAGNUS.

- angustifolia.* 1. **ELÆAGNUS** foliis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 1719. *Hort. upf.* 31.
Elæagnus. *Cam. epit.* 106. *Hort. cliff.* 33.
Olea sylvestris, folio molli incano. *Bauh. pin.* 194.

Habitat in Bohemia, Hispania, Syria, Cappadocia, inque Aquis sextiis locis subhumidis.

ELÆAGNUS foliis ellipticis *Amæn. acad. 4. p. spinosa.*
305. *

Elæagnus matthioli incolis Seisefum. Rauw. it. 112, 276.

Habitat in Ægypto. †

ELÆAGNUS foliis ovatis. *Roy. lugdb. 250. Fl. latifolia.*
zeyl. 58.

Elæagnus foliis rotundis maculatis. Burm. zeyl. 52. t. 39. f. 2.

Habitat in Zeylona. †

BRABEJUM.

BRABEJUM. *Hort. cliff. 36. Roy. lugdb. 400. stellatife-*
amygdalus æthiopica, fructu holosericeo. Breyn. cent. lium.
t. 1. f. 1.

Arbor æthiopica hexaphylla, foliis circa caulem ad intervalla senis. Pluk. alm. 47. t. 265. f. 3.

Habitat in Æthiopia. †

KRAMERIA.

KRAMERIA. *Læfl. it. 195. ** *Ixina.*

Habitat in Cumana America. †

Folia alterna, lanceolata. Racemus terminalis floribus alternis.

RIVINA.

RIVINA floribus tetrandris. *humilis.*

Rivina. Hort. cliff. 35. Roy. lugdb. 207.

Rivina humilis racemosa, baccis puniceis. Plum. canescens.
gen. 48.

Manoides americana, circææ foliis canescentibus.
Tournef. art. 1706.

Polanum barbadosense racemosum minus tinctorium.
Pluk. alm. 353. t. 112. f. 2.

Amarantus baccifer, circææ foliis. Comm. hort. 1. p.
127. t. 66.

Habitat in Caribæis, Jamaica, Barbados. †

RIVINA floribus octandris dodecandrisve. *Amæn. octandra.*
*acad. 4. p. 305. * Læfl. it. 207.*

in Spec. plant. pars I. M Ri-

Rivina scandens racemosa, amplioribus foliis
baccis violaceis. *Plum. gen.* 48. *ic.* 241.

Rivina sarmentosa, sarmentis crassioribus, foliis ovatis, floribus spicatis dodecandris. *Brown, jam.* 1. t. 23. f. 2.

Habitat in America calidiore. †

SALVADORA.

perfica.

1. SALVADORA. *Garc. act. angl.* 1749. n. 491. *Amæn. acad.* 3. p. 21.

Rivina paniculata. *Syst. nat.* 10. p. 899.

Habitat ad Sinum Perlicum, in India orientali. †

Frutex foliis oppositis, Racemo terminali composito.

CAMPHOROSMA.

monsipelia-
ca.

1. CAMPHOROSMA foliis hirsutis linearibus. *Amæn. acad.* 1. p. 392. *Mat. med.* 43.

Camphorosma. *Sauv. monsp.* 45.

Selago caule procumbente, foliis sparsis. *Hort. c.* 321. *Roy. lagdb.* 300.

Camphorata hirsuta. *Bauh. pin.* 486. *Tournef. act.* 17 p. 313. *Buxb. cent.* 1. p. 18. t. 28. f. 1.

Camphorata montpelienfium. *Bauh. hist.* 3. p. 3 Lob. *adv.* 174.

Habitat in Hispaniæ, Narbonæ, Tartariæ arenosis.

acuta.

2. CAMPHOROSMA foliis subulatis rigidis glabris. *Amæn. acad.* 1. p. 393.

Camphora altera. *Tabern. hist.* 57.

Camphoratæ congener. *Bauh. pin.* 486. (*variæ*)

Anthyllis altera italorum. *Lob. ic.* 404. *Dalech.* 1150.

Habitat in Italia, Tartaria. 24

glabra.

3. CAMPHOROSMA foliis subtriquetris glabris linearibus. *Amæn. acad.* 1. p. 393.

Camphorata foliis confertissimis inermibus lævibus. *Hall. helv.* 193.

Camphorata glabra. *Bauh. pin.* 286. *Dalech. hist.* 1150. *Habitat in Helvetia.* 24

ALCHEMILLA.

vulgaris.

1. ALCHEMILLA foliis lobatis. *Fl. suec.* 135. *Mat. med.* 54.

Alchemilla foliis palmatis. Hort. cliff. 38. Roy. lugdb. 231.

Alchemilla foliis simplicibus. Fl. lapp. 66.

β. *Alchemilla vulgaris. Bauh. pin. 319.*

Alchemilla minor. Tournef. inst. 502.

Habitat in Europæ pascuis. 2

2. *ALCHEMILLA foliis digitatis serratis. Fl. lapp. 61. alpina.*

*Fl. fvec. 136, 142. * Hort. cliff. 39. Roy. lugdb. 232.*

Alchemilla perennis incana argentea, f. sericea satinum provocans. Moris. hist. 2. p. 195. f. 2. t. 20. f. 3.

Tormentilla alpina, foliis sericeis. Bauh. pin. 326.

β. *Alchemilla alpina pubescens minor. Tournef. inst. 508. hybrida.*

Pluk. phyt. 240. f. 1.

Habitat in Alpibus Europæ. 2

3. *ALCHEMILLA foliis quinatis multifidis glabris. pentaphyl.*

Alchemilla alpina quinquefolia. Bauh. pin. 320. pro- lea. dr. 138.

Alchemilla alpina pentaphyllea minima, lobis fimbriatis. Bocc. mus. 1. p. 18. t. 1.

Habitat in monte Canisio, Furca, Gotthardo Rhetorum. 2

DIGYNIA.

APHANES.

1. *APHANES. Hort. cliff. 39. Fl. fvec. 137, 143. Roy. arvensis.*

lugdb. 231 Gron. vrg. 17. Dal. b. paris. 53.

Chærophyllo nonnihil similis. Bauh. pin. 182.

Alchemilla minima montana. Col. ecphr. 145. t. 146.

Habitat in Europæ & Orientis arvis. ☉

CRUCITA.

*CRUCITA. Læfl. it. 203. **

hispanica.

Habitat in Cumana Americæ.

Caulis alius. Folia opposita lanceolata integerrima. Flores spicati, in paniculam collecti.

BUFONIA.

1. *BUFONIA. Sauv. monsp. 141. Amæn. acad. 1. p. 386. tenuifolia.*

Læfl. it. 44.

Alfinoides Raj. angl. 3. p. 346.

Herniaria, angustissimo gramineo folio, erecta. *M hort.* 97. t. 97.

Alfina polygonoides tenuifolia, flosculis ad longinam caulis velut in spicam dispositis *Pluk.* 22. t. 75. f. 3.

Habitat in Anglia, Gallia, Hispania. 2

Stamina 4 numeravit in flore *Læfling*, confirmavit *C. Stræmer*.

HAMAMELIS.

virginiana. 1. HAMAMELIS. *Gron. virg.* 139. *Cold. noveb. Catesb. car.* 3. p. 2. t. 2. *Duham. arb.* 1. p. 2. t. 114.

Trilopus. Mitch. gen. 22.

Pistacia virginiana nigra, coryli foliis. *Pluk. alm.* 9

Habitat in Virginia.

CUSCUTA.

europæa. 1. CUSCUTA floribus sessilibus. *Cuscuta nuda repens filiformis. Fl. svec.* 138. 1 *Mat. med.* 55. *Dalib. parif.* 53.

Cuscuta nuda repens funiformis. Sauv. monsp. 11.

Cuscuta major. Bauh. pin. 219.

Cuscuta. Cam. epit. 984

epithimum. 2. *Cuscuta nuda repens filiformis. Sauv. monsp.* 11.

Epithimum s. Cuscuta minor. Bauh. pin. 219.

Habitat in Plantis Europæ, parasitica. ☉

Parasitica planta eotyledonis, dehiscente semine absque cotyledonibus, extendit spirale corpusculum, nec in ramum petit radicanda, sed absque omni radice contra solem volubilis ascendit plantas, quasi emissis in exhaustis; nec Folia gerit præter squamam, hinc in minimam, membranaceam, arctam sub ramo. Flos æque nos sæpius quadrifidus; in Europa australi sæpius quadrifidus.

americana. 2. CUSCUTA floribus pedunculatis. *Læfl. it.* 216.

Cuscuta caule aphylo volubili repente. Gron. virg.

Cuscuta inter majorem & minorem media, filamentum

longis & floribus late super arbores & campos

extendens. Sloan. jam. 85. *hist.* 1. p. 201. t. 128. f.

Habitat in Virginia.

HYPECOUM.

HYPECOUM filiquis arcuatis compressis articulatis. *procumbens.*
Hort. upf. 31.

Hypecoum. *Bauh. pin. 172. Dod. pempt. 449. Hort. cliff. 38. Roy. lugdb. 402.*

Habitat inter Archipelagi, Narbonæ & Salmanticeses segetes. ☉

HYPECOUM filiquis cernuis teretibus cylindricis. *pendulum.*
Hort. upf. 31. Sauv. monsp. 263.

Hypecoum filiquis pendentibus non articulatis bivalvibus incurvis. *Moris. hist. 2. p. 280.*

Hypecoi altera species. *Bauh. pin. 172.*

Cuminum sylvestre filiquatum pone. *Dalech. hist. 698.*

Habitat in Galloprovincia. ☉

HYPECOUM filiquis erectis teretibus torulosis. *erectum.*
Hort. upf. 32.

Hypecoum tenuifolium, filiquis erectis teretibus. *Ann. ruth. 58. t. 9. Hall. gatt. 229.*

Habitat in Dauria.

TETRAGYNIA.

I L E X.

* *Flores quadrifidi.*

ILEX foliis ovatis acutis spinosis. *Hort. cliff. 40. Aquifolium*
Hort. upf. 32. Roy. lugdb. 400. Gron. virg. 12. Da-
lib. parif. 54.

Ilex aculeata baccifera. *Bauh. pin. 425.*

Habitat in Europa australiori, Japonia, Virginia. ♪

ILEX foliis ovato-lanceolatis serratis. *Hort. cliff. 40. Cassia.*

Mat. med. 56. Roy. lugdb. 400.

Aquifolium carolinense, foliis dentatis, baccis rubris.

Catesb. car. 1. p. 31. t. 31.

Habitat in Carolina. ♪

ILEX foliis lato-lanceolatis obtusis integerrimis.

asiatica.

Habitat in India Asia. ♪

** *Flores trifidi.*

ILEX foliis cuneiformibus tricuspидatis.

cuneifolia.

Ilex aculeata, folio tricuspидi. *Plum. ic. 118. f. 2.*

Habitat in America meridionali. ♪

- Dodonæa. 5. ILEX foliis pinnatis †
 Dodonæa aquifolii folio tricuspido. *Plum. gen. 20. ic.*
 118. f. 1.
 β. Dodonæa aquifolii folio anguloso non aculeato. *Plum.*
gen. 20.
Habitat in America meridionali. †
 Folia pinnata: foliolis 21, sessilibus, rigidis, ovatis, acuminatis, in medio utrinque denticulo angularis. Flores racemosi ut in Rhoe; forte diversi generis?

C O L D E N I A.

- procumbens 1. COLDENIA. *Fl. zeyl. 69. Mill. dict. **
 Teucris facie bisnagarica tetracoccus rostrata. *Pluk.*
alm. 363. t. 64. f. 6. Raj. suppl. 281. Moris. hist. 3.
p. 423.
Habitat in India. ☉
Frustrificationem ulterius examinent alii in vivente planta, ego perfectam non vidi.

P O T A M O G E T O N.

- natans. 1. POTAMOGETON foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus. *Hort. cliff. 40. Fl. succ. 139. 145. Roy. lugdb. 212. Hall. herb. 199. Dalib. paris. 54.*
 Potamogeton foliis ovato-oblongis natantibus. *Fl. lapp. 68.*
 Potamogeton rotundifolium. *Bauh. pin. 193.*
 β. Potamogeton foliis lanceolato-oblongis, petiolis longis. *Gron. virg. 139.*
Habitat in Europæ lacubus & fluviis. 2.
 perfoliatum. 2. POTAMOGETON foliis cordatis amplexicaulibus. *Fl. lapp. 69. Fl. succ. 140. 145. Roy. lugdb. 212. Hall. herb. 199. Dalib. paris. 54.*
 Potamogeton perfoliatum. *Raj. hist. 188.*
 Potamogeton foliis latis splendentibus. *Bauh. pin. 195.*
 Potamogeton rotundifolium alterum. *Læs. pruss. 205. t. 65.*
Habitat in Europæ lacubus fluviisque argillose. 2.
 densum. 2. POTAMOGETON foliis ovatis acuminatis oppositis confertis, caulibus dichotomis, spica quadriflora. *Guett. stamp. 1. p. 102. **

- Potamogeton minus**, foliis densis mucronatis nonfer-
ratis. *Magn. monsp.* 303.
- Fontinalis media lucens**. *Bauh. hist.* 3. p. 769. *Raj.*
hist. 189.
- Tribulus aquaticus minor alter**. *Clus. hist.* 2. p. 252.
Habitat in Gallia, Italia.
- Fedunculus e dichotomia caulis brevissimus**. *Spica 4-*
fiora.
- POTAMOGETON** foliis lanceolatis planis in pe- lucens.
tiolos desinentibus. *Hort. cliff.* 40. *Fl. succ.* 141. 147.
Roy. lugdb. 212. *Dalib. paris.* 54.
- Potamogeton foliis angustis splendidibus**. *Bauh. pin.*
193
- Fontinalis lucens major**. *Bauh. hist.* 3. p. 769.
Habitat in Europæ lacubus, stagnis, fluviis argillofis, 24
- POTAMOGETON** foliis lanceolatis alternis undu- crispum,
latis serratis. *Roy. lugdb.* 212. *Fl. succ.* 142. 148. *It.*
scan. 142. *
- Potamogeton foliis crispis s. Lactuca ranarum farmen-**
tis planis. *Bauh. pin.* 193.
- Habitat in Europæ fossis & rivulis.*
- POTAMOGETON** foliis lanceolatis oppositis sub- ferratum.
undulatis.
- Potamogeton foliis lanceolatis obscure undulatis, cau-**
libus longe ramosis. *Guett. stamp.* 1. p. 102. *Dalib.*
paris. 55.
- Potamogeton longo ferrato folio**. *Bauh. pin.* 193.
Habitat in Europæ rivulis.
- POTAMOGETON** foliis linearibus obtusis, caule compressum
compresso. *Hort. cliff.* 40. *Fl. succ.* 143. 149. *Roy.*
lugdb. 213. *Dalib. paris.* 55.
- Potamogeton caule plano, foliis gramineis undulatis,**
spica exigua. *Hall. helv.* 201.
- Potamogeton caule compresso, folio graminis canini**.
Raj. hist. 189.
- Habitat in Europæ fossis paludosis.*
- POTAMOGETON** foliis setaceis parallelis app- pectinatum.
ximatis distichis. *Fl. succ.* 145. 150. *Dalib. paris.* 55.
- Potamogeton foliis linearibus acutis longissimis alternis**
confertis. *Roy. lugdb.* 213.

Potamogeton gramineum ramosum. *Bauh. pin. prodr.* 101.

Habitat in Europæ fossis & paludibus.

setaceum. 9. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppositis minatis. *Roy. lugdb.* 213. *Dalib. paris.* 55.

Potamogeton ramosum angustifolium. *Bauh. pin. prodr.* 101.

Habitat in Europæ fossis paludosis.

gramineum. 10. POTAMOGETON foliis linearilanceolatis : nis sessilibus stipula latioribus. *Fl. succ.* 144. 1.

Potamogeton gramineum latiusculum, foliis & racionibus dense stipatis. *Raj. angl.* 3. p. 149. t. 3. *Fl. lapp.* 70.

Potamogeton gramineum latifolium. *Læs. pruss.* t. 66.

Habitat in Europæ fossis & paludibus. ☉

marinum. 11. POTAMOGETON foliis linearibus alternis distinctis inferne vaginantibus. *Fl. succ.* 146, 152

Potamogeton pusillum fluitans. *Bocc. sic.* 42. t. 20 *It. gotl.* 221.

Potamogeton maritimum ramosissimum, grandium capitulis, capillaceo folio. *Pluk. alm.* 305. n. f. 5.

Habitat in Europa ad maris littora. ☉

pusillum. 12. POTAMOGETON foliis linearibus oppositis ternisque distinctis: basi patentibus, caule tereti *succ.* 147, 153. *Dalib. paris.* 56.

Potamogeton foliis linearibus alternis remotis. *lugdb.* 213.

Potamogeton minimum, capillaceo folio. *Bauh.* 193. *prodr.* 101.

Potamogeton gramineum tenuifolium. *Læs. pruss.* t. 67.

Potamogeton pusillum, gramineo folio breviori. *paris.* t. 32. f. 4.

Habitat in Europæ paludibus. ☉

R U P P I A.

maritima. 1. RUPPIA. *Hort. cliff.* 436. *It. wgoth.* 186. * *Fl.* 2. n. 154. *Guett. stamp.* 2. p. 416.

Buccaferrera maritima, foliis acutissimis. *Mich. ge.* t. 35.

Potamogeton maritimum, gramineis longioribus foliis, fructu fere umbellato. *Raj. angl. 3. p. 134. t. 6. f. 1.*
Gramen maritimum fluitans cornutum. *Bauh. pin. 3. prodr. 7.*

Fucus folliculaceus, fœniculi folio longiore. *Bauh. pin. 365.*

Fucus ferulaceus *Lob. ic. 255.*

Habitat in Europæ maritimis. ☉

S A G I N A.

SAGINA ramis procumbentibus, petalis brevissimis. *procumbens*
Fl. Japp. 157. Fl. succ. 148. 155. Roy. lugdb. 452.

Sagina scapis & ramis unifloris. *Guett. stamp. 2. p. 277.*

Linella muscoso flore repens. *Dill. giff. 81. Raj. angl. 4. p. 90.*

Linne pusilla graminea, flore tetrapetalo. *Segu. veron. 491. t. 5. f. 3.*

Linne minima, flore fugaci. *Raj. suppl. 501.*

*Linne tetrapetala, foliis angustis in origine latefcen-
 tibus.* *Hall. hev. 390.*

*Saxifraga graminea pusilla, foliis brevioribus crassiori-
 bus & succulentis.* *Raj. angl. 3. p. 345.*

Habitat in Europæ pascuis sterilibus uliginosis aridis.

SAGINA caule erecto unifloro triflorove.

erecta.

Sagina scapis unifloris. *Guett. stamp. 2. p. 276. Dalib. parif. 56.*

Linne foliis caryophyllæis. *Raj. angl. 3. p. 344. t. 15. f. 4.*

Linne verna glabra. *Magn. monsp. 14. Vaill. parif. 6. t. 3. f. 2.*

*Habitat in Galliæ, Angliæ, Germaniæ sterilibus gla-
 cyosis.*

SAGINA caule erecto, floribus oppositis.

virginica.

Saginæ affinis planta minima, floribus albis. *Clayt. mss. 649.*

Habitat in Virginia inter muscos ad margines fontium. *D. Gronovius.*

Caulis digitalis, filiformis, erectus; Folia opposita, subulata, remota, minima. Flos terminalis & oppositi nonnulli propriis pedunculis. Perianthium 4partitum, erectum. Petala 4. oblonga. Stamina 4. longitudine calycis. Germen conicum, longitudi-

ne calycis. Stylus nullus. Stigma obtusum, pfula pyramidalis, rostrata, unilocularis. S numerosa. An proprii generis?

T I L L Æ A.

aquatica.

1. TILLÆA erecta dichotoma, foliis acutis. *Fl. n. 156.*

Crassula caule dichotomo, floribus linearibus, sic quadrifidis. *Fl. suec. 259. Dalib. parif. 98.*

Crassula floribus quadrifidis. *Hort. cliff. 497.*

Sedum minimum annuum, flore roseo tetrap. *Vaill. parif. 181. t. 10. f. 2.*

Habitat in Europæ inundatis. ☉

muscosa.

2. TILLÆA procumbens. *Hort. upf. 24. Sauv. 129.*

Tillæa. *Dalib. parif. 43.*

Tillæa muscosa annua perfoliata. *Mich. gen. 22.*

Crassula foliis sessilibus connatis, floribus aggr. in foliorum alis. *Guett. stamp. 1. p. 97.*

Polygonum muscosum minimum. *Bocc. sic. 56.*

Sempervivum omnium minimum repens musca polygoni faci. *Bocc. mus. 2. p. 36. t. 22.*

Habitat in Italiæ, Siciliæ, Galliæ muscosis.

Flores hujus sæpius trifidi, antecedentium quadr. Phil. Bot. 178.



Classis V.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

HELIOTROPIUM

HELIOTROPIUM foliis lanceolato-ovatis, caule peruvianura
fruticoso, spicis numerosis aggregato-corymbosis.
Heliotropium foliis ovato-lanceolatis, spicis plurimis
confertis, caule fruticoso. *Mill. dict. t. 143.*

abitat in Peru. ☽

HELIOTROPIUM foliis cordato ovatis acutis sca- indicum.
riusculis, spicis solitariis, fructibus bifidis. *Fl.*
eyl. 70.

Heliotropium foliis ovatis acutis, spicis solitariis. *Hort.*
cliff. 45. Roy. lugdb. 405.

Heliotropium americanum cæruleum. *Dod. mem. 83.*
Pluk. phyt. 245. f. 4.

Heliotropium americanum cæruleum, foliis hormini
angustioribus. *Herm. lugdb. 307. Sloan. jam. 98.*

abitat in India utraque ☉

ina unilocularia, per paria approximata.

HELIOTROPIUM foliis ovatis integerrimis to- europæum.
mentosif rugosis, spicis conjugatis. *Hort. upf. 33.*
Sauv. monsp. 305.

Heliotropium foliis ovatis integerrimis, spicis con-
junctis. *Hort. cliff. 45. Roy. lugdb. 404.*

Heliotropium majus dioscoridis. *Bauh. pin. 253.*

abitat in Europa australi. ☉

HELIOTROPIUM foliis ovatis integerrimis to- lupinum.
mentosif plicatis, spicis solitariis.

Heliotropium minus lupinum. *Bauh. pin. 253.*

Heliotropium lupinum *Clus. hist. 2. p. 47.*

*abitat Salmanticæ juxta agros, Monspelii in litto-
re.* ☉

HELIOTROPIUM foliis lineari-lanceolatis pilosis, fruticosum.
spicis solitariis sessilibus. *Amæn. acad. 4. p. 394.**

Heliotropium fruticosum hirsutum, foliis lanceolatis

mi-

minoribus, spicis singularibus terminalibus. *Jam.* 151.

Heliotropium minus, lithospermi foliis. *Sloan. hist.* 1. p. 214. t. 132. f. 4.

Habitat in Jamaica. ☿

curassavicum.

6. **HELIOTROPIUM** foliis lanceolato-linearibus veniis, spicis conjugatis. *Hort. cliff.* 45. *upf.* 33. *Roy. lugdb.* 405. *Dalib. parif.* 57.

Heliotropium indicum procumbens glaucophyllis rubis albis. *Pluk. alm.* 182. t. 36. f. 3.

Heliotropium maritimum minus, folio glauco albo. *Sloan. hist.* 1. p. 213. t. 132. f. 3.

Heliotropium curassavicum, foliis lini umbri. *Morif. hist.* 3. p. 452. f. 11. t. 31. f. 12.

Heliotropium americanum procumbens, facie bilicati. *Herm. par.* 183. t. 183.

Habitat in Americæ calidioris maritimis. ☉

orientale.

7. **HELIOTROPIUM** foliis linearibus glabris a floribus sparsis lateralibus.

Habitat in Asia. ☉

Planta parva, procumbens, repens. Folia linearia alterna. Flores subsessiles, alterni, solitarii, folia sparsi.

gnaphalodes

8. **HELIOTROPIUM** foliis linearibus obtusis tosis, pedunculis dichotomis, spicarum floribus ternis, caule frutescente.

Heliotropium arboreum maritimum tomentum gnaphalii americani foliis. *Sloan. jam.* 93. p. 213.

Heliotropium gnaphalodes littoreum frutescens ricanum. *Pluk. alm.* 182. t. 193. f. 5.

Habitat in Barbados, Jamaicae maritimis. ☿

M Y O S O T I S.

scorpioides.

1. **MYOSOTIS** seminibus nudis: foliorum apicalibus callosis. *Vir. cliff.* 149. *Fl. succ.* 149, 157. *lugdb.* 404. *Hort. cliff.* 45.

arvensis.

2. *Myosotis foliis hirsutis.* *Hort. cliff.* 46.

Myosotis hirsuta arvensis major. *Dill. giss.* 51. *lapp.* 74.

Echium scorpioides arvense. *Bauh. pin.* 254.

patuliflora.

3. *Myosotis foliis glabris.* *Hort. cliff.* 46. *Dalib.*

58.

osotis glabra pratensis. *Dill. giff. 67. Fl. lapp. 75.*
 um scorpioides palustre. *Bauh. pin. 254.*
 ium scorpioides minus, flosculis luteis. *Bauh.*
1. 254. prodr. 119. Burf. XIV. 6.
 at in Europæ a campis aridis & β aquosis sca-
 iginosis. ☉

OSOTIS feminibus aculeatis glochidibus, foliis virginica.
 rato-oblongis, ramis divaricatis.

osotis feminibus hispida, foliis lanceolato-ovatis.
 ron. virg. 19.

oglossum virginianum, flore & fructu minimo.
 uk. alm. 126. *Morif. hist. 3. p. 449. f. 11. t. 30. f. 9.*
 izat in Virginia. ☉

na interiori latere nuda, angulata, erecta, basi affixa,
 in sequenti, fructus nutans.

OSOTIS feminibus aculeis glochidibus, foliis Lappula.
 lanceolatis pilosis. *Fl. svæc. 150, 158. Dalib. paris.*

ospermum feminibus echinatis. *Hort. cliff. 46. Roy.*
 gdb. 405.

oglossum foliis lanceolatis, floribus in foliorum
 is subsessilibus. *Guett. stamp. 1. p. 92.*

oglossum minus. *Bauh. pin. 257.*
 izat in Europæ argillofis, nudis, ruderatis. ☉

OSOTIS feminibus nudis, foliis hispida, race- apula.
 is foliosis.

ospermum feminibus lævibus, corollis vix caly-
 m superantibus, foliis lanceolatis. *Roy. lugdb. 405.*
 av. monsp. 62.

um luteum minimum. *Bauh. pin. 254.*

oides lutea minima apula campestris. *Col. ephr. 1.*
 184. 1. 185.

hula lutea minima. *Lob. ic. 312.*

izat in Italia, Hispania, Narbona. ☉

LITHOSPERMUM.

LITHOSPERMUM feminibus lævibus, corollis officinale.

lycem vix superantibus, foliis lanceolatis. *Hort.*
iff. 46. Fl. svæc. 151. 159. Mat. Med. 57. Roy.

gdb. 505. *Dalib. paris. 58.*

ospermum majus erectum. *Bauh. pin. 258.*

izat in Europæ ruderatis. 24

- arvense. 2. LITHOSPERMUM seminibus rugosis, corollis calycem superantibus. *Hort. cliff.* 46. *Fl. parif.* 59. 152. 160. *Roy. lugdb.* 405. *Hall. helv.* 518. *Bauh. pin.* 73.
Lithospermum arvense, radice rubra. *Bauh. pin.* 73.
Habitat in Europæ agris & arvis. ☉
- virginianum 3. LITHOSPERMUM foliis subovalibus nervis corollis acuminatis, Lithospermum corollarum laciniis acuminatis *Bauh. pin.* 140.
Lithospermum latifolium virginianum, flore longiore. *Morif. hist.* 3. p. 447. f. II. t. 28. f. suppl. 272.
Habitat in Virginia.
Puncta adpersa foliis sunt excavata, horum latitudo egrediente notata.
- purpureo-ceruleum. 4. LITHOSPERMUM seminibus lævibus, corollis calycem multoties superantibus. *Hort. cliff.* 46. *Fl. parif.* 59. 152. 160. *Roy. lugdb.* 405.
Lithospermum flore magno, caule ex apice repente. *Hall. helv.* 517.
Lithospermum minus repens latifolium. *Bauh. pin.* 73.
Lithospermum repens majus. *Clus. hist.* 2. p. 16.
Habitat in Ungariæ, Angliæ, Galliæ, Italiæ agris & secus vias. 24
Caules steriles repentes radicanes: floriferi erecti sunt.
- fruticosum. 5. LITHOSPERMUM fruticosum, foliis linearibus hispida, staminibus corollam subæquantibus. *Hort. cliff.* 46. *Fl. parif.* 59. 152. 160. *Roy. lugdb.* 405.
Lithospermum fruticosum, corollis calyce majore. *Hort. cliff.* 46. *Fl. parif.* 59. 152. 160. *Roy. lugdb.* 405.
Lithospermum fruticosum, foliis linearibus hispida. *Sauv. monsp.* 50, 63.
Anchusa lignosior monspeliensium, flore violacea. *Barr. ic.* 1168.
Anchusa angustifolia. *Bauh. pin.* 255.
Buglossum fruticosum, rosmarini folio. *T. Garb.* 68. t. 15.
β. Anchusa arborea. *Alp. exot.* 67. t. 68.
Buglossum samium frutescens, foliis rosmarini folio, re virentibus lucidis & hirsutis. *Tournef. cor.* 1.
Habitat in Gallia, Samo & Europa australi. ☉
Stamina longitudine tubi s. limbi expansi.

LITHOSPERMUM feminibus duobus, calycibus pa- dispersum.
tentibus *Linn. decad. i. t. 7. **

Habitat in Hispania. ☉

ANCHUSA.

ANCHUSA foliis lanceolatis, spicis imbricatis se- officinalis.
cundis. *Hort. cliff. 46. Fl. suec. 152, 161. Mat.*
med. 59. Roy. lugdb. 406. Dalib. parif. 59.

Buglossum angustifolium majus. *Bauh. pin. 256.*

Buglossum sylvestre majus nigrum. *Bauh. pin. 256.*
Segu. ver. i. p. 214.

Habitat ad Europæ ruderata, vias, agros. 24

ANCHUSA racemis subnudis conjugatis. *Roy. lugdb. angustifolia.*
408.

Orago sylvestris perennis, flore rufo kermesino. *Zan.*
hist. 49. t. 20.

Buglossum angustifolium minus. *Bauh. pin. 256. Mo-*
ris. hist. 3. p. 438. f. 11. t. 26. f. 4.

Echii facie Buglossum minimum, flore rubente. *Lob.*
ic. 576.

Habitat in Italia, Germania. 24

Simillima præcedenti, sed folia caulina margine subnata,
spinulis aspera & basi attenuata; nec ovato-lanceolata.

ANCHUSA strigosa, foliis linearibus dentatis, pe- undulata.
dicellis bractea minoribus. calycibus fructiferis in-
flatis. *Læst. Mill. dict. t. 29.*

Buglossum lusitanicum, echii folio undulato. *Tournef.*
injl. 134

anchusa, angustis dentatis foliis, hispanica. *Barr. ic.*
578.

Habitat in Hispaniæ, Lusitanæ pratis.

ANCHUSA villosa-tomentosa, ramis floribusque al- orientalis.
ternis axillaribus, bracteis ovatis.

anchusa foliis aveniis, floribus solitariis ex alis ramo-
rum, uti rami e caule. *Hort. cliff. 47. Roy. lugdb.*
406.

Buglossum orientale, flore luteo. *Tournef. cor. 6.*
Buxb. cent. 3. p. 17. t. 29. Dill. elth. 60. t. 52 f. 60.

Habitat in Oriente. 24

ANCHUSA floribus sparsis, caule glabro.

virginiana.

anchusa lutea minor, quam alii Paccoon vocant.
Gron. virg. 19. Au-

Anchusa minor lutea virginiana, Puccoon indi dicta, qua se pingunt americani. *Pluk. alm.* 30. *Lithospermum virginianum*, flore luteo duplici a ori. *Morif. hist.* 3. p. 447. f. 11. t. 28. f. 4. *suppl.* 273.
Habitat in Virginia. 2

lanata.

6. ANCHUSA tomentosa, foliis lanceolatis, stami corolla longioribus.
Pulmonaria mitis, fragariæ odore. *Bocc. mus.* 148. t. 105?
Habitat Algeriæ. *Brander.*

Caulis simplex, pedalis. Folia alterna, lanceolata losa, obtusifuscula. Racemi ex alis superioribus liosi, recurvati, multum villosi. Calyces qu partii, lanati, albido-flavescentes. Corolla lea: Nectarium unguibus quinque, brevissimis. mina fere corolla longiora. Antheræ incumb Stylus longior.

tinctoria.

7. ANCHUSA tomentosa, foliis lanceolatis ob staminibus corolla brevioribus.
Lithospermum villosum, caulibus procumbent simplicibus. *Mat. med.* 53. *Sp. pl.* 1. p. 132.
Anchusa puniceis floribus. *Bauh. pin.* 255.
Anchusa monspeliaca. *Bauh. hist.* 3. p. 584.
Habitat monspelii. 2
Simillima præcedenti ♂ *tota albo villo induta. staminum longitudine corollæ.*

sempervi-
rens.

8. ANCHUSA pedunculis diphyllis capitatis.
Anchusa scapis diphyllis. *Hort. cliff.* 47. *Roy.* 407.
Buglossum latifolium sempervirens. *Bauh. pin.* *Morif. hist.* 3. p. 437. f. 11. t. 26. f. 2.
Habitat in Anglia, Hispania. 2

CYNOGLOSSUM.

officinale.

1. CYNOGLOSSUM staminibus corolla brevior foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus.
Cynoglossum foliis lanceolato-ovatis, corollis cal æquantibus. *Roy. lugdb.* 406. *Fl. svec.* 154, *Mat. med.* 154.
Cynoglossum foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cli*

Cynoglossum majus vulgare. Bauh. pin. 257.

Cynoglossum maximum belgicum. Bauh. pin. 257.

Cynoglossum sempervirens. Bauh. pin. 257.

Habitat in Europæ ruderatis. ☉

CYNOGLOSSUM foliis amplexicaulibus ovatis. virginianum.

Cynoglossum foliis amplexicaulibus. Gron. virg. 19.

Morif. hist. 3. f. 11. t. 30. f. 9.

Habitat in Virginia. ☉

CYNOGLOSSUM corollis calyce duplo longioribus, foliis lanceolatis. cheirifolium.

Cynoglossum creticum, argenteo angusto folio. Bauh. pin. 257. Hort. cliff. 47.

Cynoglossum creticum, 1. Clus. hist. 2. p. 162.

Habitat in Creta, Hispania, Oriente.

Corollæ albæ venis sanguineis.

CYNOGLOSSUM staminibus corollam æquantibus. apenninum.

Hort. upf. 33. Sauv. monsp. 64.

Cynoglossa montana maxima frigidarum regionum.

Col. ecphr. 1. p. 168. t. 170.

Habitat in alpihus Apenninis, Campoclarenſibus, locis umbrosis. ☉

CYNOGLOSSUM foliis lineari-lanceolatis glabris. linifolium.

Hort. cliff. 47. Hort. upf. 33. Roy. lugdb. 406.

Cynoglossum minus album, lini foliis glaucis, semine umbilicato. Morif. hist. 3. p. 449. f. 11. t. 30. f. 11.

Habitat in Lusitania. ☉

CYNOGLOSSUM foliis lineari-lanceolatis scabris. lusitanicum.

Cynoglossum caule erecto ramoſo, foliis lanceolatis scabris sessilibus, spicis florum longissimis. Mill. dict. n. 6.

Omplaloides lusitana elatior, cynoglossi folio. Tournef. inst. 140.

Habitat in Lusitania. ☉

Affinis nimium præcedenti, sed major & asperior.

CYNOGLOSSUM repens, foliis radicalibus cordatis. Omphalodes.

borago minor verna repens, folio lævi. Morif. hist. 3. p. 437. f. 11. t. 26. f. 3.

lymphytum minus, boraginis facie. Bauh. pin. 208. *naei Spec. plant. pars I.* N Ha-

Habitat in Lusitaniæ, Carniolæ nemorosis ad radices montium. 24

PULMONARIA.

* *Perianthium longitudine tubi corollæ.*

angustifolia. 1. PULMONARIA foliis radicalibus lanceolatis. *Hort. cliff.* 44. *Fl. svec.* 2. 164. *Roy. lugdb.* 404. *Dalib. parif.* 60. *Hill. plan.* 255. t. 7.

Pulmonaria foliis radicalibus ovato-lanceolatis inferius decurrentibus. *Bæhm. lips.* 14.

Pulmonaria 5 pannonica. *Clus. hist.* 2. p. 170.

Habitat in Pannonia, Helvetia, Svecia. 24

Sequenti nimis affinis, solum foliis angustis distinguenda.

officinalis. 2. PULMONARIA foliis radicalibus ovato-cordatis scabris. *Hort. cliff.* 44. *Fl. svec.* 156, 163. *Mat. med.* 62. *Roy. lugdb.* 403. *Hall. helv.* 516. *Dalib. parif.*

Symphytum maculosum s. *Pulmonaria latifolia.* *Bauh. pin.* 259.

β. *Pulmonaria vulgaris latifolia*, flore albo. *Tournef. inst.* 136.

γ. *Pulmonaria non maculoso folio.* *Clus. hist.* 2. p. 170. *Bauh. pin.* 259.

Habitat in Europæ nemoribus. 24

** *Calyces tubo corollæ dimidio breviores.*

virginica. 3. PULMONARIA calycibus abbreviatis, foliis lanceolatis obtusiusculis. *Mill. dict.* t. 212.

Pulmonaria calyce tubo corollæ brevior, perianthio quinquepartitis. *Gron. virg.* 20.

Pulmonaria foliis ovatis glabris, scapo laxo. *Tournef. Ehret.* 11. t. 12.

Symphytum s. *Pulmonaria non maculata*, foliis radicalibus acuminatis, flore patulo cæruleo. *Pluk. bot.*

359. t. 227. f. 6. *Morif. hist.* 3. 444.

Habitat in Virginia. 24

sibirica. 4. PULMONARIA calycibus abbreviatis, foliis radicalibus cordatis.

Habitat in Sibiria. 24

Radix perennis. Folia glabra, glauca: radicalia ovata; caulina ovata. Corymbi ramosi, nudi.

Media inter antecedentem & sequentem.

5. PUL

5. **PULMONARIA** calycibus abbreviatis, foliis ovatis, *maritima*, caule ramofo procumbente.
Cerinte foliis ovatis petiolatis. *Hort. cliff.* 48. *Roy. lugdb.* 408.
Cerinte *maritima* procumbens. *Dill. clh.* 75. t. 65. f. 75.
Cynoglossum procumbens glaucophyllum *maritimum*. *Pluk. alm.* 126. t. 172 f. 3.
Cynoglossum perenne *maritimum* procumbens. *Morif. hist.* 3 p. 450. f. 11. t. 28. f. 12.
Echium *marinum*. *Raj. angl.* 3. p. 270. *Oed. dan.* t. 25.
Habitat in Angliæ, Norvegiæ, Islandiæ littoribus silicis. ☉ 24.
Tres ultimæ nimis affines : 3. *Caule erecto* ; *Corollis tubo longiore quam limbus.* 4. *Foliis radicalibus cordatis.* 5. *Caule ramossissimo* ; *qui easdem pro varietatibus habeat, vix errat.*

SYMPHYTUM.

1. **SYMPHYTUM** foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. *officinale.*
Hort. cliff. 47. *Fl. suec.* 155, 165. *Mat. med.* 61. *Roy. lugdb.* 407.
Symphytum *Consolida* major. *Bauh. pin.* 259.
Habitat in Europæ umbrosis subhumidis. 24.
 2. **SYMPHYTUM** foliis summis oppositis. *tuberosum.*
Symphytum majus, tuberosa radice. *Bauh. pin.* 259.
Symphytum radice tuberosa. *Cam. epit.* 701.
Habitat in Germania australi, Monspelii, Hispania. 24.
Affine præcedenti, sed folia angustiora: summa magis ovata, nec Folia decurrunt totaliter ad inferiora folia.
 3. **SYMPHYTUM** foliis ovatis subpetiolatis. *orientale.*
Symphytum orientale, folio subrotundo aspero, flore cæruleo. *Tournef. cor.* 7.
Symphytum *constantinopolitanum*, boraginis folio & facie, flore albo. *Tournef. cor.* 7. *Buxb. cen.* 5. p. 36. t. 68.
Habitat juxta Constantinopolis rivulos, primo vere. 24.

CERINTHE.

1. **CERINTHE** foliis amplexicaulibus, fructibus geminis, corollis obtusiusculis patulis. *major.*

Cerinte foliis cordatis sessilibus. *Hort. cliff.* 48. *Hort. ups.* 35. *Roy. lugd.* 408.

Cerinte foliis caulem amplexantibus, dentibus floribus revolutis brevissimis. *Hall. helv.* 515.

Cerinte flore rubro purpurascente. *Bauh. pin.* 258.

β. Cerinte, flavo flore, asperior. *Bauh. pin.* 258.

Habitat in Europa australi. ☉

2. CERINTHE foliis amplexicaulibus integris, fructibus geminis, corollis acutis clausis.

Cerinte foliis caulem amplexantibus, floribus profunde quinquefidis. *Hall. helv.* 516.

Cerinte minor. *Bauh. pin.* 258.

Cerinte minor s. quarta. *Clus. hist.* 2. p. 168.

β. Cerinte foliis amplexicaulibus emarginatis, corollis acutis clausis. *Sp. pl.* 1. p. 137.

Habitat in Austriae, Styriae agris. 24

Præcedenti maxime affinis, at Corolla $\frac{1}{2}$ quinquefida præcedentis vero tantum margine quinqueloba.

O N O S M A.

simplicissima.

1. ONOSMA foliis confertissimis lanceolato-linearibus pilosis.

Echium creticum. *Alp. exot.* 130. t. 129. *Morif. hist.* 2. p. 439. f. 11. t. 27. f. 3?

Habitat in Sibiria. *Gmelin.* 24

Caules spithamei, simplices, lignosi, interdum ad basin uno alterove ramo. Folia confertissima ut fere basi imbricata, digiti fere longitudine, angustissime lanceolata & fere linearia, basi attenuata. Racemus sæpius duo, caules terminantes, vix pedunculati.

Flores Symphyti absque palis. Symphytum creticum Tournef. cor. esse nequit, cum folia pilis brevissimis adpersa.

Flores Symphyti absque palis. Symphytum creticum Tournef. cor. esse nequit, cum folia pilis brevissimis adpersa.

Flores Symphyti absque palis. Symphytum creticum Tournef. cor. esse nequit, cum folia pilis brevissimis adpersa.

orientalis.

2. ONOSMA foliis lanceolatis hispida, fructibus pediculis.

Cerinte orientalis. *Amæn. acad.* 4. p. 267. *

Habitat in Oriente. ☿

echioides.

3. ONOSMA foliis lanceolatis hispida, fructibus erectis.

Cerinte foliis lanceolato-linearibus hispida, seminibus quaternis distinctis, fructibus erectis. *Hort. cliff.* 48. *Roy. lugd.* 408.

- Anchusa lutea minor.* *Bauh. pin.* 255.
Anchusa echioides lutea, cerinthe flore, montana, *Col. ecphr.* 1. p. 182. t. 183.
Anchusa lutea major. *Bauh. pin.* 255.
Anchusa tertia. *Cam. epit.* 736.
Anchusa lutea. *Dalech. hist.* 1102.
Habitat in Austriæ, Pannoniæ, Helvetiæ, Galliæ, Italiæ rupibus. 24

B O R A G O.

- BORAGO** foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Hort. upf.* 34. *Mat. med.* 63. officinalis.
Borago calycibus patentibus. *Hort. cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 403. *Dalib. paris.* 61.
Gnuglossum latifolium, *Borago.* *Bauh. pin.* 256.
Habitat hodie in Normannia ad Colbeck & alibi in Europa; venit olim ex Aleppo. ☉
BORAGO foliis ramificationum oppositis amplexicaulibus, calycinis foliolis sagittatis. indica.
Borago calycinis foliis sagittatis erectis. *Hort. cliff.* 45. *Fl. zeyl.* 71. *Roy. lugdb.* 403.
Cynoglossoides folio caulem amplexante. *Isnard. act.* 1718. p. 325. t. 10.
Anchusæ degeneris facie, indiæ orientalis herba, quadri-capsularis. *Pluk. alm.* 30. t. 76. f. 3.
Habitat in India Orientali. ☉
BORAGO foliis ramificationum oppositis petiolatis, calycinis foliolis ovatis acutis erectis. *Hort. cliff.* 55. africana.
Roy. lugdb. 403.
Cynoglossoides africana verrucosa & hispida. *Isnard. act.* 1718. p. 325. t. 11.
Cynoglossum, *boraginis folio & facie, æthiopicum.* *Pluk. alm.* 34.
Habitat in Æthiopia. ☉
Affinis est admodum antecedenti.
BORAGO calycibus tubo corollæ brevioribus, foliis cordatis. *Hort. cliff.* 45. *Roy. lugdb.* 403. orientalis.
Borago constantinopolitana, flore reflexo cæruleo, calyce vesicario. *Tournef. cor.* 6. itin. 523. t. 523. *Buxb. cent.* 5. p. 16. t. 30. *Mill. dict.* t. 68.
Habitat circum Constantinopolin. 24

ASPERUGO.

procumbens. 1. **ASPERUGO** calycibus fructus compressis. *Fl. lapp.* 76. *Fl. svec.* 159. 166. *Hort. cliff.* 44. *Roy lugdb.* 404. *Hall. helv.* 522. *Dalib. parif.* 61.

Buglossum sylvestre, caulibus procumbentibus. *Bauh.* pin. 257. *Morif. hist.* 3. p. 439. f. II. t. 26. f. 13.

Habitat in Europæ ruderatis pinguibus ☉

ægyptiaca. 2. **ASPERUGO** calycibus fructus ventricosus.

Lycopsis ægyptiaca foliis calloso-verrucosis, caule diffuso, corollis regularibus. *Sp. pl.* 138.

Habitat in Ægypto ☉

Caules diffusi Folia petiolata, lato lanceolata, verrucis callofis hispida, apicibus purpurascens. Perianthium erectum. Corolla regularis, calyce brevior: limbo albo plano; fauce fornicata lutea. Calyx in fructu ventricosus, parum compressus laciniis inæqualibus, unde *Asperuginis* genus, præterquam quod *Semina compressa*, per paria distantia.

LYCOPSIS.

vesicaria. 1. **LYCOPSIS** foliis integerrimis, caule prostrato, calycibus fructescentibus inflatis pendulis. *Hort. cliff.* 44. *Hort. upf.* 35. *Roy. lugdb.* 403.

Echioides flore pullo. *Riv. mor.* II.

Buglossum procumbens annuum, pullo minimo flore. *Morif. hist.* 3. p. 439. f. II. t. 26. f. II.

Habitat in Europa australi. ☉

pulla. 2. **LYCOPSIS** foliis integerrimis, caule erecto, calycibus fructescentibus inflatis pendulis.

Echium sylvestre lanuginosum. *Bauh.* pin. 254.

Echium pullo flore. *Clus. hist.* 2. p. 164.

Buglossum sylvestre minus nigrum. *Bauh.* pin. 256.

Habitat in Tartaria, Germania. ☉

Differt a L. vesicaria caule erecto, radice repente.

variegata. 3. **LYCOPSIS** foliis repandis dentatis callofis, caule decumbente, corollis cernuis. *Hort. upf.* 34.

Lycopsis foliis repando-dentatis. *Hort. cliff.* 44. *Roy. lug b.* 404.

Buglossum creticum verrucosum. *Stiff. bot.* 57. t. 57.

Buglossum humile, bullatis foliis, flore cæ-

ruleo elegant. r variegato. *Morif. hist.* 3. p. 439. f. 11.
t. 26. f. 10.

Habitat in Creta. ☉

LYCOPSIS foliis lanceolatis hispida, calycibus flo- arvensis.
rescentibus erectis. *Fl. lapp.* 77. *Fl. suec.* 157, 167.
Hort. cliff. 44. *Roy. lugdb.* 404. *Gron. virg.* 20.
Dalib. parif. 61.

Buglossum minus sylvestre. *Bauh. pin.* 257.

Habitat in Europæ agris. ☉

LYCOPSIS foliis lanceolatis hirsutis, caule ramo- Echioides.
sissimo erecto, floribus secundis sessilibus. †

Echioides orientale, buglossi folio, flore luteo macu-
lis atropurpureis notato. *Tournef. cor.* 47. *Buxb.*
cent. 1. p. 1. t. 1.

Habitat in America. 24

LYCOPSIS foliis ovatis integerrimis scabris, calyci- orientalis.
bus erectis.

Buglossum orientale angustifolium, flore parvo cæru-
leo *Tournef. cor.* 6.

Habitat in Oriente. ☉

LYCOPSIS foliis lineari-lanceolatis confertis tomen- virginica.
tosis mollibus, caule erecto. *Gron. virg.* 140.

Habitat in Virginia ad vias. 24

ECHIUM.

ECHIUM caule fruticoso. *Hort. cliff.* 43. *Roy. fruticosum.*
lugdb. 407.

Echium africanum fruticans, foliis pilosis. *Comm. hort.*
2. pag. 107. t. 54.

Habitat in Æthiopia. †

ECHIUM caule lævi, foliis lanceolatis nudis: mar- lævigatum.
gine carina apiceque scabris.

Echium africanum perenne, lycopsis facie. *Old. afr.* 27.

Echium africanum minus, foliis oblongis glabris, flo-
ribus cæruleis. *Herm. afr.* 8.

Buglossum africanum, echii folio, flore purpureo.

Pluk. mant. 33. t. 341. f. 7.

Habitat ad Cap. b. Spei. 24

Caules basi suffruticosi, læves, pedales. Folia lanceo-
lata, glabra, margine & carina scabra punctis cal-
lois mucronatis, ut & apice superius. Racemi ex
N 4 alis

alis foliorum supremorum, secundi, laeves. Calices laeves. Corolla parum irregularis. Stamina declinata. Semina muricata.

- italicum. 3. **ECHIUM** caule erecto piloso, spicis hirsutis, corollis subæqualibus, staminibus longissimis. Echium corollis vix calycem excedentibus margine villosis. *Hort. upf. 35. Sp. pl. 1. p. 139.* Echium majus & asperius, flore albo. *Bauh. pin. 254.* Echium flore albo. *Cam. epit. 738.*
- β. **Lycopsis.** *Bauh. pin. 255.*
Habitat in Anglia, Italia, Montspeli, in collibus siccis.
Lycopsis β. Corollis minoribus, extus præsertim interne pilosis, & magis regularibus ab *E. italico* videtur differre, nisi hæc omnia a loco.
- vulgare. 4. **ECHIUM** caule tuberculato hispido, foliis caulibus lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus. *Hort. cliff. 43. Fl. svec. 158. 168. Roy. lugdb. 407. Dalib. parif. 61.* Echium vulgare. *Bauh. pin. 254. Clus. hist. 2. p. 143.* *Habitat in Europa ad vias & agros. ♂*
- creticum. 5. **ECHIUM** calycibus fructescentibus distantibus, caule procumbente. *Hort. upf. 35.* Echium caule simplici, foliis caulinis linearibus, floribus spicatis ex alis. *Hort. cliff. 43.* Echium creticum angustifolium rubrum. *Bauh. pin. 254.* Echium creticum latifolium rubrum. *Bauh. pin. 254.* Echium creticum. 1. 2. *Clus. hist. 2. p. 165.* *Habitat in Creta, oriente. ○* *Stamina non longiora labio brevioris corollæ.*
- orientale. 6. **ECHIUM** caule ramoso, foliis caulinis ovatis, floribus solitariis lateralibus. *Hort. cliff. 43. Roy. lugdb. 407.* Echium orientale, verbasco folio, flore maximo campanulato. *Tournef. cor. 6. itin. 3. p. 94.* *Habitat in Oriente.*
- lusitanicum. 7. **ECHIUM** corollis stamine longioribus. Echium caule simplici, foliis caulinis lanceolatis sericeis, floribus spicatis lateralibus. *Roy. lugdb. 407.* Echium

m, amplissimo folio, lusitanicum. *Tournef. inst.*
 ?
et in Europa australi. 24

TOURNEFORTIA.

RNEFORTIA foliis ovatis serratis, petiolis ferrata.
 rescentibus, spicis terminalibus recurvis.

ia arborescens chamædrifolia major. *Plum. gen.*
c. 228. f. 1.

nia arborescens chamædrifolia minor. *Plum. gen.*
c. 228. f. 2.

et in America calidiore. †

RNEFORTIA foliis ovatis petiolatis, caule hirsutissima.
 futo, spicis ramosissimis terminalibus.

ia hirsutissima & ramosissima, baccis albis. *Plum.*
5. ic. 209.

at in America calidiore. †

RNEFORTIA foliis ovatis acuminatis gla- volubilis.
 s, petiolis reflexis, caule volubili.

nefortia foliis ovatis acuminatis. *Hort. cliff. 48.*

ia nigra fruticosa, racemi ramulis varie impli-
 is. *Sloan. hist. 1. p. 234. t. 143. f. 2.*

ia aurea americana frutescens glabra, foliis subtus
 is. *Pluk. alm. 389. t. 235. f. 6. Raj. suppl. 348.*

et in Jamaica, Mexico, arbores scandens. †

RNEFORTIA foliis ovato-lanceolatis hirtis, foetidissima.
 lunculis ramosis, spicis pendulis.

nefortia foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff. 48.*
v. lugdb. 408.

nefortia scandens, foliis hirtis rugosis ovatis, spi-
 ramosis. *Brown. jam. 169.*

ia racemosa, nicotianæ foliis foetidissimis. *Plum.*
5. ic. 230.

tropium maximum jamaicense, limonii mali folio
 ra scabro subtus lanugine ferruginea molli. *Pluk.*

. 182. Morif. hist. 3 p. 452.

tropii flore frutex baccifer ramosus, folio rugoso
 ido maximo subrotundo hirsuto, fructu albo.

n. jam. 173. hist. 2. p. 108. t. 212. f. 1. Raj.
1. 75.

et in Mexico, Jamaica. †

- cymosa. 5. **TOURNEFORTIA** foliis ovatis integerrimis
dis, spicis cymosis.
Tournefortia frutescens humilis, foliis maximis ob-
ovo-ovatis rugosis, spicis pendulis rarioribus, b-
lis crassis fulcatis. *Brown. jam. 169.*
Pittonia scandens, baccis niveis nigris maculis no-
Plum. gen. 5?
Heliotropii flore frutex, folio maximo oblongo
minato glabro. *Sloan. jam. 173. hist. 2. p. 109. t.*
f. 2. Raj. dendr. 76.
Habitat in Jamaica, præcedenti nimis affinis. b
- humilis. 6. **TOURNEFORTIA** foliis lanceolatis sessili-
spicis simplicibus recurvis lateralibus.
Tournefortia reclinata diffusa & hirsuta, foliis ov-
ramulis rectis validis. *Brown. jam. 169?*
Pittonia humilis, anchusæ folio. *Plum. gen. 5. ic.*
f. 2.
Habitat in America calida. b
- fibrica. 7. **TOURNEFORTIA** foliis lanceolatis, floribus
rymbosis, caule herbaceo.
Messerschmidia. *Hort. upf. 36.*
Arguzia montana. *Amm. ruth. 38.*
Habitat in Dauriæ apricis glareosis aridis. 21.
Planta dubii etiamnum generis, interim huc relata.
- suffruticosa. 8. **TOURNEFORTIA** foliis sublanceolatis inci-
caule suffruticoso.
Tournefortia suffruticosa, foliis incanis oblon-
fronde comosa. *Brown. jam. 170.*
Thymelæa facie frutex maritimus tetraspermus,
tetrapetalo. *Sloan. jam. 138. hist. 2. p. 29. t. 169.*
Raj. dendr. 96.
Habitat in Jamaica. b

NOLANA.

- prostrata. 1. **NOLANA.** *Linn. dec. 1. t. 2. **
Habitat - - - - Dav. Royen. ☉
Plantæ figuram ☉ descriptionem dedit Filius in
curia plant. 1762.

DIAPENSIA.

- lapponica. 1. **DIAPENSIA** floribus pedunculatis.

entia *Fl. lapp.* 88. t. 1. f. 1. * *Fl. svec.* 172, 169.
d. dan. t. 47.

tat in alpinis Lapponicis. 2

PENSIA floribus subsessilibus.

helvetica.

ia caulibus teretibus, foliis imbricatis, floribus sessilibus. *Hall. helv.* 486. t. 8. f. 4.

tat in alpinis Helveticis Gemmi & Pyndtner-
rg. 2

itus antecedentis; fructum non vidi.

A R E T I A.

ETIA villosa, scapis unifloris. *Hall. helv.* 486. t. alpina.
f. 1.

rosace caulescens, foliis alternis, pedunculis unifloris. *Amæn. acad.* 1. p. 164.

tat in Vallesia, monte Loch dicto. 2

lus anatome nobis deest in hac planta.

A N D R O S A C E.

DROSACE perianthiis fructuum maximis. *Hort.* maxima,
f. 36.

rosace calycibus fructuum maximis. *Hort. cliff.*

Roy. lugdb. 414.

rosace foliis lanceolato-ovatis dentatis, calycibus corolla longioribus. *Wachend. ultr.* 28.

rosace altera. *Cam. epit.* 639. *Clus. hist.* 2. p. 134.

ae affinis Androsace dicta major. *Bauh. pin.* 251.

itat inter Austriae segetes. ☉

DROSACE foliis lanceolatis dentatis glabris, septentrio-
perianthiis angulatis corolla brevioribus. *Fl. svec.* 170, 170. nalis.

50, 170.

rosace calyce fructus parvo. *Fl. lapp.* 78.

rosace montana, flore minore. *Buxb. act.* 2. p.

59. t. 23. f. 2.

ae verna, androsaces capitulis. *Bauh. pin.* 251.

odr. 118. *Oed. dan.* t. 7.

ae minor, androsaces alterius facie. *Bauh. pin.*

51. *prodr.* 118. *Burf. XIV.* 75.

ae adfinis Androsace dicta minor. *Bauh. pin.* 251.

itat in alpinum Lapponiae, Russiae apricis glareo-

☉

DROSACE foliis pilosis, perianthiis hirsutis.

villosa.

Are-

Aretia villosa, floribus umbellatis. *Hall. helv.* 4
Sedum alpinum hirsutum, lacteo flore. *Ba*
 284.

Sedum minus X, alpinum IV. *Clus. hist.* 2. p. 61
Habitat in alpibus Rheticis, Pyrenæis, Carnioli

lactea.

4. *ANDROSACE* foliis linearibus glabris, et
 involucris multoties longiore.

Aretia glabra obtusifolia umbellifera. *Allion. p*
p. 22. t. 4. f. 2.

Androsace alpina perennis angustifolia glabra,
 singulari. *Tournef. inst.* 123.

Sedum alpinum, gramineo folio, lacteo flore
pin. 284. *Raj. hist.* 1042. *extr.* 291.

Sedum minus XI. *Clus. hist.* 2. p. 61.
Habitat in Austriæ alpibus. 2

Foliorum margo scaber est.

carnea.

5. *ANDROSACE* foliis subulatis glabris, umb
 volucrum æquante.

Androsace alpina perennis angustifolia glabra
 tiflora. *Tournef. inst.* 123.

Sedum alpinum, angustissimo folio, flore carnea
pin. 284.

Sedum alpinum ejusdem. *Column. ecphr.* 2. 4
 65. f. 2.

Sanicula alpina, angustissimo folio. *Pluk. alm*
 108. f. 5.

β. *Aretia halleri* foliis ciliatis. *Sp. pl.* 1. p. 142.

Aretia foliis ciliatis linearibus, floribus umb
Hall. helv. 486. t. 7.

Habitat in alpibus Pyrenæis, Helveticis. 2

P R I M U L A.

veris.

1. *PRIMULA* foliis dentatis rugosis. *Hort. cliff*
svæc. 161, 171. *Roy. lugdb.* 415. *Dalib. p*
limbo corollarum concavo. *Mat. med.* 64.

efficialis.

Primula veris odorata, flore luteo simplici. *B*
 3. p. 495.

Verbasculum pratense odoratum. *Bauh. pin.* 21

elatior.

β. *Primula* - - - *limbo corollarum plano.*

Verbasculum pratense vel sylvaticum inodoru
pin. 241.

Primula veris, pallido flore, elatior. *Clus*
 p. 301.

caulis. - - - scapo nullo. acaulis.
 eris, pallido flore, humilis. *Clus. hist.* 1.

um sylvestre majus, singulari flore. *Bauh.*

Europæ pratis. 2.

licet constantes β. γ. non specie distinguo,
 Maurum ab Europæo.

LA foliis crenatis glabris, florum limbo farinosa.
Hort. cliff. 50. *Fl. svec.* 162, 172.

oliis crenatis glabris. *Vir. cliff.* 12. *Roy.*
 15.

oliis erectis fastigiatis. *Fl. lapp.* 79.

eris rubro flore. *Clus. dänn.* 340.

um umbellatum alpinum minus. *Bauh. pin.*

Alpinis frigidisque Europæ pratis uligino-

LA foliis ferratis glabris. *Vir. cliff.* 12. Auricula.
pf. 36. *Roy. tugdb.* 415.

oliis ferratis carnosis glabris. *Hort. cliff.* 50.

alpina lutea. *Bauh. pin.* 242.

alpina purpurea. *Bauh. pin.* 242.

alpina, foliis rotundis. *Bauh. pin.* 242.

alpina, flore variegato. *Bauh. pin.* 242.

alpina angustifolia. *Bauh. pin.* 243.

alpina, foliis quasi farina adpersis. *Bauh.*

3.

alpibus Helveticis, Styriacis. 2.

LA foliis integerrimis glabris oblongis, ca- integrifolia
 s tubulosis obtulis.

foliis glabris carnosis integerrimis. *Hall.*

85.

alpina rubescens, folio non ferrato. *Bauh.*

3.

urfi IV. *Clus. hist.* 1. p. 303. t. 304.

in alpibus Helveticis, Styriacis, Pyrenai-

LA foliis cuneiformibus dentatis minimis minima
 longe minoribus.

alpina minima carnea. *Bauh. pin.* 243.

urfi VIII. minima. *Clus. hist.* 1. p. 305.

Habitat in Scheeberg, Tauro, Judenberg inque monte prope salinas Austriæ superioris, quæ in Styriam. 21

Vitaliana. 6. PRIMULA foliis linearibus intermixtis, fœfilibus.

Primula flore subsessili, foliis linearibus. *Amer.* I. p. 160.

Auricula urfi alpina, gramineo folio, jasminea flore. *Tournef. inst.* 122.

Vitaliana. *Sesl. epist.* 69 t. 10. f. 1. *

Sanicula alpina, angustissimo folio, flore c. *Pluk. alm.* 332. t. 108. f. 6.

Sedum alpinum, exiguis foliis. *Bauh. pin.* 21

Sedum alpinum F. gregorii regiensis r. *Columb.* 2. p. 63. t. 65. f. 1. *Raj. hist.* 1044.

Habitat in alpihus Pyrenæis & Italicis. 24

Calyces longitudine tubi corollæ, ultra medium quefidi; corollæ limbus quinquefidus, lobis ovatis longis.

Si Semina tantum duo capsulam replentia, videntur talyana genus proprium constituere, quod nomen duntaxat.

cordifolides. 7. PRIMULA foliis petiolatis cordatis sublobatis.

Habitat in Sibiria D. Gmelin.

Herba foliis sequentis, floribus antecedentis.

CORTUSA.

matthioli. 1. CORTUSA calycibus corolla brevioribus. Cortusa foliis cordatis petiolatis. *Hort. cliff.* Lugdb. 414.

Cortusa matthioli. *Clus. hist.* 1. p. 307.

Sanicula montana latifolia laciniata. *Bauh. pin.*

Habitat in alpihus Austriæ, Sibiriz.

Gmelini. 2. CORTUSA calycibus corollam excedentibus. *acad.* 2. p. 340. *

Habitat in Sibiria. D. Gmelin. 24

SOLDANELLA.

alpina. 1. SOLDANELLA. *Hort. cliff.* 49. *Roy. lugd.* Hall. helv. 488.

Soldanella alpina rotundifolia. *Bauh. pin.* 295. *hist.* 2. p. 285. f. 3. t. 15. f. 8.

Soldanella alpina. *Cam. epit.* 254

Habitat in alpidibus Helvetiæ, Aultriæ, Pyrenæorum. 21

Scapus variat uniflorus & multiflorus.

DODECATHEON.

DODECATHEON. *Anæn. acad.* 3. p. 16. *

Meadia.

Meadia. *Catesb. car.* 3. p. 1. t. 1. *Trew. Ehret. t.* 12.

Mill. dict. t. 174.

Auricula urfi virginiana floribus boraginis instar rostratis, cyclaminum more reflexis. *Pluk. alm.* 62. t.

79. f. 6.

Habitat in Virginia. 24

CYCLAMEN.

CYCLAMEN corolla retroflexa.

europæum

Cyclamen foliis cordatis, corolla reflexa. *Hort. upf.*

47. *Mat. med.* 65.

Cyclamen. *Hort. cliff.* 49. *Roy. lugdb.* 414.

Cyclamina omnia 1. 13. *Bauh. pin.* 307.

Cyclaminus. *Cam. epit.* 35.

Habitat in Austriæ, Tartariæ, Europæ australis siccis umbrasis nemorosis. 24

Varietates sic conjungunt plantas folio anguloso & rotundo, ut vix ac ne vix limites dentur.

CYCLAMEN corollæ limbo nutante. *Fl. zeyl.* 401. indicum.

Habitat in Zeylona. 24

MENYANTHES.

MENYANTHES foliis cordatis integerrimis, corollis ciliatis. *Nymphoides.*

Menyanthes foliis orbiculatis, corollis margine laceris.

Hort. cliff. 53. *Roy. lugdb.* 430. *Dalib. parif.* 62.

Nymphæa lutea minor, flore imbricato. *Bauh. pin.* 194.

Habitat in Belgii, Angliæ, Dantisçi fossis majoribus. 24

Umbella simplex, sessilis e latere petioli, ut in sequenti.

MENYANTHES foliis cordatis subcrenatis, petiolis floriferis, corollis interne pilosis. *Fl. zeyl.* 72. indica.

Nymphæa ceramica. *Rumph. amb.* 6. p. 173. t. 71. f. 3.

Nedel-ambel. *Rheed. mal.* 11. p. 55. t. 28.

Habitat in Malabariæ, Zeylonæ fossis.

- trifoliata. 3. **MENYANTHES** foliis ternatis. *Fl. lapp. svec* 163, 113. *Hort. cliff.* 52. *Mat. med.* 6 lugdb. 430. *Hall. helv.* 487. *Dalib. parif.* 62.
Trifolium palustre. *Bauh. pin.* 327.
Habitat in Europæ paludibus. 2

H O T T O N I A.

- palustris. 1. **HOTTONIA** pedunculo verticillato - mu.
Boerh. lugdb. 1. 207. *Hort. cliff.* 51. *Fl. syc* 174. *Roy. lugdb.* 41. *Hall. helv.* 487. *Dalib. parif.* 93.
Millefolium aquaticum f. *Viola aquatica*, caule
Bauh. pin. 141.
Millefolium aquaticum equisetifolium, caule
Bauh. pin. 141.
Habitat in fossis & paludibus Europæ borealioris
- indica. 2. **HOTTONIA** pedunculis axillaribus unifloris
Hottonia flore solitario ex foliorum alis. *Burm.* 121. t. 55. f. 1.
Tsiunda-Tsiera. *Rheed. mal.* 12. p. 71. t. 36.
Habitat in India. *Burmannus.*
Caulis digitalis; simplicissimus. Folia verticillata octona, linearia, trifida f. tertrifida. Ped laterales, axillares foliorum, solitarii, uniflori longiores. Florem non extricavi, adeoque genere non confirmatus.

HYDROPHYLLUM.

- virginianum. 1. **HYDROPHYLLUM** foliis pinnatifidis.
Hydrophyllum. *Hort. cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 413. *virg.* 21.
Dentariæ facie planta monopetalos, fructu et monopolyreno. *Morif. hist.* 3. p. 599. f. 51. t. 1.
Habitat in Virginia. 2
- canadense. 2. **HYDROPHYLLUM** foliis lobato - angulatis.
Habitat in Canada. 2
Planta tota Structura antecedentis, ac si genuina sed diversa solis Foliis, quæ Aceris forma, quinqueloba, glabra lobis acutis, subdentatis, tiolum sinu ut in Aceris foliis.

LYSIMACHIA.

* *Pedunculis multifloris.*

LYSIMACHIA paniculata, racemis terminalibus.
 Lysimachia foliis lanceolatis, racemo composito terminali. *Virid. cliff.* 415. *Fl. svec.* 166, 175. *Roy. lb.* 416.

vulgaris.

Lysimachia foliis lanceolatis, corymbo terminali. *Fl. p.* 81. *Hort. cliff.* 50.

Lysimachia lutea major. *Bauh. pin.* 245.
 at in Europa ad ripas & paludes. 4

LYSIMACHIA racemis simplicibus terminalibus, caliculis obtusis, staminibus corolla brevioribus. *Ephem.*

rum.

Lysimachia racemo simplici terminali, foliis lanceo-linearibus. *Vir. cliff.* 13. *Hort. cliff.* 3. *Roy. lugdb.* 5.

Lysimachia spicata purpurea minor. *Buxb. cent.* 1. p. 33.

Lysimachia orientalis minor, foliis glaucis. *Till. pis.* 5. t. 40. f. 2.

at in Media. ☉

Ephem. matthioli. *Bauh. pin.* 244. *Bauh. hist.* p. 905. *Dod. pent.* 203.

mit cum *L. atropurpurea* habitu, structura, glaucore. Differt foliis subtus fusco-punctatis, quod non sentis. Petalis obtusis, patulis; staminibus corolla brevioribus; floribus pedicello insidentibus; cum illa capunctis sub foliis & Petala gerit acuminata, calyce longiora, conniventia, saturate rubra; stamina longiora, antheris fuscis; Flores in spicam sessi-; interim maxime affines sunt.

LYSIMACHIA spicis terminalibus, petalis lanceo- s, staminibus corolla longioribus.

atropurpurea.

Lysimachia foliis lanceolato-linearibus caulem & ras spica ovata terminante. *Hort. cliff.* 51.

Lysimachia foliis lanceolato-linearibus, spicis terminalibus. *Roy. lugdb.* 415. *Hort. upf.* 37. *

Lysimachia orientalis angustifolia. *Comm. rar.* 33. t. 33. at in Oriente. ☉

as nimia cum præcedente, tamen distincta.

LYSIMACHIA racemis lateralibus pedunculatis.

thyrsiflora.

Lyfimachia racemis simplicibus lateralibus. *Virid.*
13. *Fl. fvec.* 167, 177. *Roy. lugdb.* 416.

Lyfimachia ex alis foliorum thyrsifera. *Fl. lapp.*
Hort. cliff. 52.

Lyfimachia bifolia, flore globofo luteo. *Bauh.*
242.

Lyfimachia lutea. *Cluf. hist.* 2. 53. f. 12.

Habitat in Europa in paludibus. 2.

* * *Pedunculis unifloris.*

quadrifolia. 5. **LYSIMACHIA** foliis quaternis subseffilibus, pedunculis quaternis unifloris.

Lyfimachia foliis ovato-acutis quaternis. *Gron. virg.*
Anagallis marina lutea, foliis latis stellatis. *Pet.*
5. t. 2. f. 5.

Anagallis lutea, foliis & floribus ex eodem ex
quatuor ex æqualibus furculorum intervallis cru-
tium positis. *Pluk. mant.* 12. t. 333. f. 1.

Habitat in Virginia.

punctata. 6. **LYSIMACHIA** foliis subquaternis, pedunculis
ticillatis unifloris.

Lyfimachia foliis lanceolatis, floribus solitariis. *l.*
cliff. 52. *Roy. lugdb.* 416. *Gron. virg.* 20.

Lyfimachia lutea minor, foliis nigris punctatis
tis. *Bauh. pin.* 245.

Lyfimachia lutea. 11. *Cluf. hist.* 2. p. 52. f. 2.

Blattariæ affinis planta minor, flore luteo, folli-
gris punctatis notatis. *Morif. hist.* 2. p. 491. f.
10. f. 15.

Habitat in Hollandia inter arundines.

Calyces pubescentes. Petala maculis fulvis punctata.

ciliata. 7. **LYSIMACHIA** petiolis ciliatis, floribus cern

Lyfimachia foliis ovato-lanceolatis subcordatis,
tiolis margine utrinque lanatis, flore soli
Wach. ultr. 390.

Lyfimachia canadensis. jalappæ foliis. *Sarac. c.*
Walth hort. 32. t. 12.

Habitat in Virginia, Canada.

Caulis erectus. Folia opposita, oblongo-ovata,
gerrima, acuta, glabra: nervis lateralibus; 1
canaliculati, ciliati. Pedunculi solitarii, un-
nudi.

8. **LYSIMACHIA** calycibus corollam superantibus, *Linum stel-*
 caule erecto ramouissimo. *Roy. lugdb.* 416. *Hort. latum.*
ups. 27. *Sauv. monsp.* 130.
Linum minimum stellatum. *Bauh. pin.* 214. *prodr.*
 107. *Magn. monsp.* 163. t. 162.
Habitat in Gallia, Italiae collibus. ☉

9. **LYSIMACHIA** foliis ovatis acutis, floribus solita- *nemorum.*
 riis, caule procumbente. *Hort. cliff.* 52. *Roy. lugdb.*
 416.
Anagallis lutea nemorum. *Bauh. pin.* 252. *Morif. hist.*
 2. p. 569. f. 5. t. 26. f. 5.
Anagallis. *Clus. hist.* 2. p. 182.
Habitat in Germaniae, Galliae, Angliae nemoribus gla-
reosis roridis.

20. **LYSIMACHIA** foliis subcordatis, floribus solita- *Nummula-*
 riis, caule repente. *Vir. cliff.* 13. *Hort. cliff.* 52. *ria.*
Fl. svec. 168. *Mat. med.* 67. *Roy. lugdb.* 416. *Hall.*
helv. 481.

Nummularia major lutea. *Bauh. pin.* 309.
Anagallis mas. *Cam. epit.* 394.
Habitat in Europa juxta agros & scrobes. 24

21. **LYSIMACHIA** foliis ovatis acutiusculis, pedun- *tenuis.*
 culis follo longioribus, caule repente.

Lysimachia foliis subrotundis, floribus solitariis longe
 pedunculatis. *Guett. stamp.* 2. p. 119.

Lysimachia foliis orbiculatis planis, floribus solitariis
 rubellis, caule repente. *Sauv. monsp.* 135.

Nummularia minor, purpurascente flore. *Bauh. pin.*
 310. *prodr.* 139. *Morif. hist.* 2. p. 567. f. 5. t. 26. f. 2.

Habitat in Galliae, Angliae, Italiae Ericetis humidis,

ANAGALLIS

ANAGALLIS foliis indivisis, caule procumbente. *arvensis.*
Anagallis foliis indivisis. *Roy. lugdb.* 416. *Fl. svec.* 169.
 178.

Anagallis foliis ovatis. *Hort. cliff.* 52.

Anagallis phoeniceo flore. *Bauh. pin.* 252.

Habitat in Europae arvis. ☉

ANAGALLIS foliis indivisis, caule erecto. *truncata.*
Anagallis foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 52. *Hort. ups.*
 28.

Anagallis cærulea, foliis binis ternisve ex adven-
nascentibus. *Bauh. pin.* 252.

Anagallis tenuifolia monelli. *Clus. app. alt.*

Habitat Veronæ. ☉

atifolia.

3. **ANAGALLIS** foliis cordatis amplexicaulibus, cau-
libus compressis.

Anagallis hispanica latifolia, maximo flore. *Tournef.*
inst. 143.

Cruciata montana minor, flore cæruleo. *Barr. ic.* 384

Habitat in Hispania. Læsf. ☉

*Caulis erecto patens, brachiatus, ramosus, quadrangula-
ris: angulis oppositis triplo latioribus, angustioribus ve-
ro margine acuto utrinque septis. Folia subcordata me-
xime sessilia & amplexicaulia, basi deorsum spectantia
obtusiuscula, nervosa, glabra, subtus pallide punctata.
Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, nudi, teretes
corolla cærulea, fundo purpurascente. Filamenta pur-
purea: Antheris oblongis flavis. Notabilis foliis
magnis & latis, caule compresso, A. arvensi attamen
valde affinis.*

infolia.

4. **ANAGALLIS** foliis linearibus, caule erecto:

Anagallis lusitanica, linearæ folio angustiore. *Tournef.*
inst. 143.

Habitat in Lusitania, Hispania. *Claud. Alstræmer.* ☉

*Caulis tetragonus, erectus, palmaris, rigidulus; Ramis
alternis, erectis. Folia opposita, sessilia, linearis
acutiuscula, lævia, internodiis longiora. Pedunculi
filiformes, foliis duplo longiores. Fructus cernui, ca-
lyce breviores.*

THEOPHRASTA.

mericana.

- I. **THEOPHRASTA.** *Roy. lugdb.* 528.

Erefia foliis aquifolii longissimis. *Plum. gen.* 8. *ic.* 126.

Habitat in America æquinoctiali. †

*Caudex nudus, simplicissimus, apice frondosus, ut in Pal-
mis. Folia lanceolata, longissima, dentata nervis
dulatis; omnia ex apice caudicis undique diffusa. Fru-
ctificationes ramosæ, diffusæ, inter folia ad apicem
caulis.*

PATAGONULA.

mericana.

- I. **PATAGONULA.** †

Patagonica foliis partim serratis partim integris. *Dill.*
elth. 306. t. 226. f. 293.

Habitat in Patagonia Americæ australis. †

Ignota nobis, videtur Cordiæ affinis.

SPIGELIA.

SPIGELIA. *Amæn. acad.* 5. p. 133. t. 2. *

Anthelmia,

Spigelia quadrifolia, spicis terminalibus. *Brown. jam.*
156. t. 37. f. 3.

Arapabaca quadrifolia, fructu testiculato. *Plum. gen.*
11. *Barr. æquin.* 15.

Brazeel - parffis. *Pet. gaz.* t. 59. f. 10.

Arapabaca brasiliensis dicta planta. *Marcgr. bras.* 46.

Habitat in Cajenna, Brasilia. ☉

Caulis simplex, herbaceus. Folia terminalia, quatuor, lanceolata. Folia caulina alia duo opposita. Ramus ex ala singula folii caulini solitarius, cauli simillimus, terminatus foliis quatuor cruciatim positis, ut in caule. Racemi terminales solitarii in caule & ramis.

OPHIORRHIZA.

OPHIORRHIZA foliis lanceolato-ovatis.

Mungos.

Ophiorrhiza. Fl. zeyl. 402. *Mat. med.* 79. t. 1. *Amæn. acad.* 2. p. 118.

Habitat in India orientali. †

Conf. Limonium mauritanicum, flore minimo, caule folioso. *Pet. gaz.* 66. t. 41. f. 12.

OPHIORRHIZA foliis ovatis.

Mitreola.

Mitreola. Hort. cliff. 492. *Gron. virg.* 28.

Mitra. Houst. mss. t. bona.

Habitat in America meridionali.

RANDIA.

RANDIA subnervis.

mitis.

Randia. Hort. cliff. 485.

Cacao affinis frutex spinosus, lycii facie, jasmini flore albo. *Sloan. jam.* 135. *hist.* 2. p. 18. t. 161. f. 1.

Raj. dendr. 82.

Habitat in America. †

Hortensis spinis fere destituitur; an sola cultura a sequenti diversa?

2. **RANDIA** ramis bispinosis.
Randia foliis subrotundis confertis, summis ramulis
 bispiniferis, floribus solitariis. *Brown. jam.* 143. t.
 8. f. 1.
Jycium majus americanum, jasmini flore, foliis sub-
 rotundis lucidis. *Fluk. alm.* 234. t. 97. f. 6.
Habitat in Jamaica. ♪

A Z A L E A.

1. **AZALEA** floribus subsolitariis, calycibus pilosis.
Chamærhododendron exoticum, amplissimis floribus
 liliaceis. *Breyn. prodr.* 1. p. 24.
Cistus indicus, ledi alpini foliis, floribus amplis. *Hera-*
lugdb. 152. t. 153. *Kaj. hist.* 1895.
Tsuutsusi. Kämpf. amæn. 845. t. 846.
Habitat in India. ♪
2. **AZALEA** foliis ovatis, corollis pilosis, staminibus
 longissimis. *Kalm. it.* 3. p. 110. *Duham. arb.* 1. p.
 85. t. 3.
Azalea ramis infra flores nudis. *Gron. virg.* 21.
Azalea scapo nudo, floribus confertis terminalibus,
 staminibus declinatis. *Hort. cliff.* 69. *Trew. chret.* 48.
Azalea erecta, foliis ovatis integris alternis, flore luteo
 piloso præcoci. *Cold. ebor.* 25.
Cistus virginiana, periclymeni flore ampliori minus
 odorato. *Pluk. mant.* 49.
Habitat in Virginie siccis. ♪
Floret ante folia vel sub ipsa vernatione ☉ *stamina ge-*
rit duplo corollis longiora.
3. **AZALEA** foliis margine scabris, corollis piloso-glu-
 tinosis. *Kalm. it.* 3. p. 110.
Azalea ramis infra flores foliosis. *Gron. virg.* 21. *Cold.*
ebor. 24.
Cistus virginiana, flore & odore periclymeni. *Pluk.*
alm. 106. t. 161. f. 4. *Catesb. car.* 1. p. 57. t. 57.
Habitat in Virginia. ♪
Affinis nimis præcedenti, sed floret postquam omnia adu-
ta sunt folia, ☉ stamina vix corollis longiora gerit.
4. **AZALEA** foliis adspersis punctis excavatis.
Azalea ramis compositis suberectis. *Fl. svec.* 171, 180.

Azalea maculis ferrugineis subtus adpersa. Fl. lapp. 89.

t. 6. f. 1.

Habitat in Alpibus Lapponiæ. †

AZALEA ramis diffuso-procumbentibus. *Fl. lapp. 90. procumbens*

t. 6. f. 2. Fl. svec. 170, 179. Hall. helv. 416.

Chamærhododendros supina ferruginea, thymi folio, alpina. Bocc. mus. 2. p. 64. t. 53.

Chamæcistus serpyllitolia, floribus carneis. Bauh. pin. 466.

Chamæcistus VII. Oed. dan. t. 9.

Habitat in Alpibus Europæ. †

P L U M B A G O.

PLUMBAGO foliis amplexicaulibus lanceolatis sca- *europpæ.*

bris. Hort. cliff. 53. Mat. med. 75. Roy. lugdb. 417.

Sauv. monsp. 63.

Lepidium Dentillaria dictum. Bauh. pin. 97.

Tripolium dioscoridis. Col. cephr. 1. p. 160. t. 161.

Habitat in Europa australi. †

PLUMBAGO foliis petiolatis ovatis glabris, caule *zeylanica.*

filiformi. Hort. cliff. 53. Hort. ups. 43. Fl. zeyl. 73.

Roy. lugdb. 417.

Lychnis indica spicata, ocymastri foliis, fructibus lap- paceis oblongis, radice urente. Comm. hort. 2. p. 169. t. 85.

Tamba codiveli. Rheed. mal. 10. p. 15. t. 8. Raj. suppl. 550.

Habitat in India. †

PLUMBAGO foliis petiolatis ovatis glabris, caule *rosea.*

geniculis gibbosis.

Plumbago zeylanica, folio splendente ocymastri, flo- re rubro. Burm. zeyl. 195.

Radix vesicatoria. Rumph. amb. 5. p. 453. t. 168.

Ichetti codiveli. Rheed. mal. 10. p. 17. t. 9. Raj. suppl. 550.

Habitat in India. †

PLUMBAGO foliis petiolatis ovatis glabris, caule *scandens.*

flexuoso-scandente.

Plumbago americana, viticulis longioribus semper vi- rentibus. Moris. hist. 3. p. 599.

Dentillaria lychnoides sylvatica scandens, flore albo. Sloan. jam. hist. 1. p. 211. t. 133. f. 1.

Caapomonga. *Marcgr. bras.* 28. *Pis. bras.* 200.

Habitat in America calidiorē. †

*Calyx a D. Jacquino missus distinctam speciem demon-
vit.*

PHLOX.

- paniculata. 1. PHLOX foliis lanceolatis margine scabris, corym-
paniculatis. *Mill. dict. t.* 205. *f.* 2.
Lychnidea folio saicino. *Dill. elth.* 205. *t.* 166. *f.*
Lysimachia virginiana umbellata maxima, *lysimachia*
luteæ floribus amplioribus. *Pluk. mant.* 121?
Habitat in America septentrionali. *Collinson.* 24.
Planta magna, alta. Caulis lævis, obtusus. Folia
to-lanceolata: margine aculeis minutissimis sparsis
sperata. Corymbi conferti in umbellam Floribus
merosissimis, tubo pubescentibus.
- maculata. 2. PHLOX foliis lanceolatis lævibus, racemo oppo-
corymbofo. *Kalm. it.* 3. *p.* 153.
Lychnoides marilandica, foliis binis oppositis ba-
auriculis caulem utrinque amplexantibus. *Raj. f.*
489?
Habitat in Virginia. Kalm. 24
Plantæ caulis teretiusculus, subscaber, rubro viri-
undique tenuissime maculatus, erectus. Folia k-
e basi amplexicauli cordata, elongata in lanceolata
sim acutiora. Flores in Racemum digesti, ex ped-
lis brevissimis corymbofis.
- pilosa. 3. PHLOX foliis lanceolatis villosis, caule erecto,
rymbo terminali.
Lychnoides marilandica, calycibus lanuginosis, l-
angultis acutis. *Raj. suppl.* 490.
Lychnidea umbellifera, blattariæ accedens virgin-
major repens, pseudomelanthii foliis pilosis,
pentapetaioide fistuloso. *Pluk. alm.* 133. *t.* 98. *f.*
Habitat in Virginia. 24.
- carolina. 4. PHLOX foliis lanceolatis lævibus, caule scabro
rymbis subfastigiatis.
Phlox foliis lanceolatis sessilibus glabris crassis, c-
erecto, floribus v rticillatis terminalibus. Mill
Lychnidea caroliniana, floribus quasi umbellatim
positis, foliis lucidis crassis acutis. *Mart. cent*
t. 10.
Habitat in Carolina. 24

lis Ph. glaberrimæ, sed Caulis triplo altior, nonnihil scaber. Folia latiora, ex ovato-lanceolata. Corymbus floribus numerosis, pluribus pedunculis ex alis premis foliorum, erectis, quasi in corymbum fastigiatis. Corollarum tubus lævis est.

LOX foliis lineari-lanceolatis glabris, caule erecto, corymbo terminali. *Hort. cliff. 63. Roy. lugdb.*

33. *Gron. virg. 21. Kalm. it. 3. p. 153.*

hnidea folio melampyri. Dill. elth. 203. t. 166. f. 22.

itat in Virginia. 24

LOX foliis lato-lanceolatis: superioribus alternis, caule bifido, pedunculis geminis. *Mill. dict. t. 205.*

hnidea virginiana, alfine aquaticæ foliis, floribus in ramulis divaricatis. Pluk. mant. 121 ?

itat in Virginia.

les erectiusculi, simplices, dein divisi in Ramos duos, & opposita in caule simplici per 5 oppositiones, ovato-lanceolata, molliuscula, scabra, superiora alterna. Flores ex divaricatione caulis & foliorum alternorum is, bini, propriis pedunculis. Calyx 5-partitus. Corollæ pallide cærulecentes tubo curvato.

LOX foliis ovatis, floribus solitariis.

hnidea fistulosa marilandica, clinopodii vulgaris folio, flore amplo singulari. Pluk. mant. 122. t. 348.

itat in Virginia. 24

LOX foliis subulatis hirsutis, floribus oppositis.

hnidea, blattariæ accedens virginiana, minor rens, hirsutis camphoratæ foliis. Pluk. alm. 233. t. 2. f. 2.

itat in Virginia.

Corollæ lobi emarginati & tubus calyce duplo longior est.

LOX foliis linearibus villosis, pedunculis ternis.

næn. acad. 2. p. 342.

itat in Asia boreali. 24

Corollæ rotundati, integri & calyces longitudine æquales corollæ.

LOX foliis setaceis glabris, floribus solitariis.

Lychnidea, blattariæ accedens virginiana, campho congeneris, glabris foliis. *Phuk. alm.* 283. t. 98.
Habitat in Virginia.

CONVOLVULUS.

* *Caule volubili.*

- arvensis. 1. CONVOLVULUS foliis sagittatis utrinque acutis, pedunculis unifloris. *Fl. suec.* 173, 181. *Dalib. rif.* 65.
Convolvulus foliis sagittatis utrinque acutis. *Hort.* 66. *Roy. lugdb.* 427.
Convolvulus minor arvensis. *Bauh. pin.* 294.
3. Convolvulus minimus, angusto auriculato lacinis. *Bocc. mus.* t. 33.
Habitat in Europæ agris. 24
- sepium. 2. CONVOLVULUS foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis tetragonis unifloris. *Roy. lugdb.* 427. *suec.* 174, 182. *Dalib. Paris.* 65.
Convolvulus foliis sagittatis postice truncatis. *cliff.* 66. involucris cordatis. *Virid. cliff.* 18.
Convolvulus major albus. *Bauh. pin.* 294.
Habitat in Europæ sepibus. 24
Foliorum margo fuscus est. Corollæ albæ, at in Europa septentrionali, incarnatæ.
- Scammonia. 3. CONVOLVULUS foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis teretibus subtrifloris. *Roy. lugdb.* 427. *Mat. med.* 82.
Convolvulus syriacus s. Scammonia syriaca. *Mill. dict.* t. 102.
Scammonia syriaca. *Bauh. pin.* 294.
Habitat in Syria, Myfia, Cappadocia. 24
Simillima præcedenti, sed Folia non margine fissis, Pedunculi teretes, biflori s. triflori, nec tetraflori, folio longiores, nec breviores. Involucrum minimum, patulum, remotum, nec calyce majus, etum approximatum. Calyx lateribus dilatatus, lobis quinatus, nec teres acuminatus.
- Medium. 4. CONVOLVULUS foliis linearibus hastato-acuminatis: auriculis dentatis, pedunculis subunifloris lacinibus sagittatis, caule volubili.
Tala-neli, Rheed. mal. 11. p. 113. t. 55.
Habitat in India.

s volubilis, non radicans. Folia lanceolata, glabra, acuta, integra basi dilatata in 2 auriculas revas, extrorsum subdentatas. Pedunculi uniflori, bis biflori. Bractææ in medio pedunculi, duæ, oppositæ, lanceolatæ, acuminatæ. Calycis foliola særata, ut in *Campanula Medio*.

VOLVULUS foliis cordatis integris panduriformibus, calycibus lævibus. panduratus.

volvulus foliis inferioribus cordatis, superioribus ovatis, calycibus pedunculis petiolisque glabris, luteo rubescente. *Gron. virg.* 141.

volvulus megalorhizus, flore amplo lacteo; fundo pureo. *Dill. elth.* 101. t. 85. f. 99.

ut in *Virginizæ arenosis*.

VOLVULUS foliis cordatis integris trilobis villosis, calycibus lævibus, capsulis hirsutis, pedunculis subbifloris. carolinus.

volvulus, folio hederaceo, arvensis, flore dilute purpureo. *Dill. elth.* 100. t. 84. f. 98.

ut in *Carolina*. 2

culi uniflori aut biflori.

VOLVULUS foliis cordatis integris trilobis hederaceis, corollis indivisis, fructibus erectis.

volvulus annuus, foliis cordatis rarius trilobis, calycibus tuberculato-pilosis. *Hort. cliff.* 67.

volvulus flore purpureo, calyce punctato. *Dill.* 99. t. 83. f. 96. *infer.* 97. t. 81. f. 93.

ut in *India Asiæ, Africæ, Americæ*. ☉

pedunculi erecti, etiam fructus, longitudine petiolorum.

VOLVULUS foliis cordatis trilobis, corollis Nilquinquefidis, pedunculis petiolo brevioribus.

volvulus cæruleus, hederaceo anguloso folio. *h. pin.* 295. *Bauh. hist.* 2. p. 164. *Dill. elth.* 96.

10. f. 91. ☉ 92.

ut in *America*. ☉

pedunculi brevissimi, Fructus erecti.

VOLVULUS foliis cordatis indivisis, fructibus cernuis, pedicellis incrassatis. purpureus.

volvulus calycibus tuberculatis pilosis. *Virid. cliff.* *Hort. upf.* 38. *Gron. virg.* 141.

Convolvulus purpureus, folio subrotundo. *Ba*
295. *Ehret. pict.* 7. f. 2.

β. *Convolvulus cæruleus minor*, folio subrotundo.
Dill. elth. 97. t. 82. f. 94.

γ. *Convolvulus folio cordato glabro*. *Dill. elth.*
84. f. 97.

Habitat in America. ☉

Pedunculi erecti, at Pedicelli in fructu incrassati, calyce punctato-scabro & piloso.

obscurus.

10. **CONVOLVULUS** foliis cordatis indivisis, subpubescente, pedunculis incrassatis unifloris, cibus glabris.

Convolvulus flore minore lacteo, fundo atro
Dill. elth. 98. t. 83. f. 95.

Habitat in China, Batavia, Zeylona, Surina
Caulis teres. Folia exacte cordata, subtus sub
marginè scabra petiolis subpubescentibus. Pe
uniflori, petiolis longiores, subpubescentes,
erassiores & glabri: bracteis duabus obsolete
rolla C. hederacei, sed minor, colore diversa.

Batatas.

11. **CONVOLVULUS** foliis cordatis hastatis quenerviis, caule repente hispido tuberifer

Convolvulus foliis cordatis angulatis, radice tu
Hort. cliff. 67. *Roy. lugdb.* 427.

Convolvulus radice tuberosa esculenta &c
car. p. 60. t. 60.

Convolvulus indicus orientalis Inhame f. Bata
ris. hist. 2. p. 11. f. 1. t. 3. f. 4.

Convolvulus indicus vulgo Patates dictus. 1
728.

Batatas. Bauh. pin. 91. *Rumph. amb.* 5. p. 367
Kalm. it. 2. p. 300.

Kappa kelengu. Rheed. mal. 7. p. 95. t. 50.

Habitat in India utraque. ☿

Conf. Convolvulus indicus vulgo Patates di
Few. per. 3. p. 16. t. 11. foliis palmatis.

verticillatus. 12. **CONVOLVULUS** foliis cordatis oblongis pedunculis umbellatis bifidis multifloris.

Convolvulus minor scandens, floribus pluribus, calycibus glabris, foliis oblongo-
Brown. jam. 153.

Ipomœa verticillata Amxn. acad. 5. p. 394.

oclit purpurea folanifolia minor. Plum. ic. 94.

at in America.

llæ figura est Convolvuli campanulata, nec secta Plumieri. Folia cordata vel ovata, margine repando scabriusculo. Flores cærulescentes, parvi. dunculi folio breviores, umbellati, at pedicelli rales saepe subdivisi.

INVOLVULUS foliis cordatis, pedunculis umbellatis, caule volubili. †

volvulus americanus, vulgaris folio, capsulistris numerosis. Pluk. alm. 114. t. 167. f. 1.

volvulus luteus polyanthos. Plum. amer. 88. t.

2.

volvulus polyanthos, folio subrotundo, flore eo. Sloan. jam. 53.

at in Martinica, Domingo, Jamaica. †

INVOLVULUS foliis cordatis glabris, caule malabari-
renni villoso. cus.

volvulus foliis cordatis acuminatis, caule arboreo indente. Roy. lugdb. 429.

kelengu. Rheed. mal. 11. p. 105. t. 51. Raj. pl. 376.

at in Malabariæ arenosis. †

INVOLVULUS foliis cordatis pubescentibus, canariensis.
le perenni villoso, pedunculis multifloris.

volvulus foliis cordatis, caule fruticoso villoso. cliff. 18. Hort. cliff. 67. Roy. lugdb. 428.

volvulus canariensis sempervirens, foliis mollibus incanis. Comm. hort. 2. p. 101. t. 51.

volvulus canariensis, foliis longioribus mollibus canis. Pluk. alm. 114. t. 325. f. 1.

at in Canariensibus insulis. †

INVOLVULUS foliis peltatis, pedunculis mul-
peltatus.
peltatis.

volvulus lævis indicus major. Rumph. amb. 6. p. 8. t. 159.

at in Amboina.

INVOLVULUS foliis cordatis angulatis, caule Turpethum.
embranaceo-quadrangulati, pedunculis multifloris.

zeyl. 74. Mat. med. 84.

Con-

Convolvulus zeylanicus alatus maximus, foliis nonnihil similibus angulosis. *Herm. lugdb.* 177
179.

Turpethum repens, foliis althææ vel indicur
pin. 149.

Habitat in Zeylona. 24

tomentosus. 18. *CONVOLVULUS* foliis trilobis tomentosis
le lanuginoso.

*Convolvulus folio lanato in tres lacinias divisio
oblongo purpureo.* *Sloan. jam.* 55. *hist.* 1. p.
98. f. 2. *Raj. suppl.* 381.

Convolvulus jamaicensis trilobus, foliis tomen-
tugine densiori ac veluti instar utrinque ol
Pluk. alm. 115. t. 167. f. 4.

Habitat in Jamaica.

althæoides. 19. *CONVOLVULUS* foliis cordatis palmati-
ceis: lobis repandis, pedunculis subbifloris

*Convolvulus foliis cordato-digitatis sericeis:
linearibus: intermediis duplo longioribus.* *V*
18. *Roy. lugdb.* 429. *Sauv. monsp.* 202.

*Convolvulus foliis ovatis divisis basi truncatis
niis intermediis duplo longioribus.* *Hort. clij*

Convolvulus argenteus, folio althææ. • *Bau*
295.

Convolvulus, betonicæ althææque foliis, rep-
genteus. *Barr. rar.* 5. t. 312.

β. *Convolvulus argenteus elegantissimus*, foliis t-
incis. *Tournef. inst.* 85.

*Habitat in Europæ meridionalis, Orientis,
collibus.* 24

macrocar-
pos. 20. *CONVOLVULUS* foliis palmato-pedatis qu-
partitis, pedunculis unifloris.

Convolvulus polyphyllus, flore & fructu pu-
maximis. *Plum. spec.* 1. ic. 91. f. 1.

Habitat in America.

Pedunculi articulati, incrassati, plicati.

cairicus. 21. *CONVOLVULUS* foliis palmato-pinnatif-
tegerimis, pedunculis paniculatis.

Convolvulus foliis laciniatis & quinquefoliis
pin. 295.

Convolvulus quinquefolius. *Bauh. prodr.* 134

*volvulus ægyptius. Vestl. ægypt. 73. t. 74.
itat in Ægypto.*

INVOLVULUS foliis digitatis septenis integerrimis, caule glabro, pedunculis trifloris. *maerohi-
zos.*

*volvulus coccineus heptaphyllus, radice crassis-
sa. Plum. spec. 1. ic. 90. f. 1.*

itat in America.

INVOLVULUS foliis palmatis: lobis septem paniculatus.
atis acutis integerrimis, pedunculis paniculatis.

nodecca. Rheed. mal. 11, p. 101. t. 49. Raj. suppl.

4.

itat in Malabarix ærenosis.

INVOLVULUS foliis digitatis quinis pilosis integerrimis, caule piloso. *pentaphyl-
lus.*

*icea foliis digitatis supra glabris, caule piloso, pe-
dunculis multifloris. Hort. upf. 39. Sp. pl. 162.*

*volvulus americanus pentaphyllus & heptaphyl-
lus major. Herm. lugd. 183. t. 185. Raj. hist. 1881.*

*volvulus pentaphyllus, flore pallide navescente,
cule hirsuto pungente. Sloan. jam. 55. hist. 1. p. 153.*

*volvulus pentaphyllos, folio glabro dentato, vi-
vilis hirsutis. Plum. amer. 1. ic. 91. f. 2. serpens.*

itat in America. ☉

*albus. Stylus bicapitatus. Bractea 2. magnæ caly-
m includunt.*

INVOLVULUS foliis digitatis glabris, foliis quinquefo-
liatis, caule lævi. *liis.*

*volvulus quinquefolius glaber americanus. Pluk.
n. 116. t. 167. f. 6.*

itat in America. ☉

* * *Caule prostrato.*

INVOLVULUS foliis cordato-ovatis, pedunculis ficulus.
unifloris: bracteis lanceolatis, flore sessili.

*volvulus foliis ovatis acutis, floribus duplici
bractea succinctis. Roy. lugdb. 428.*

volvulus foliis ovatis acutis. Hort. cliff. 67.

*volvulus ficulus minor, flore parvo auriculato.
occ. sic. 89. t. 48. Morif. hist. 2. f. 1. t. 7. f. 5.*

itat in Sicilia. ☉

*is vix vel admodum parum, sæpius minime volu-
lis.*

- terrestris. 27. CONVULVULUS foliis linearibus sericeis, dunculis subtrifloris, calycibus hirsutis multinatis.
 Volvulus terrestris. *Dalch. hist.* 1425. *Bauh. hist.* p. 160.
Habitat in Europa australi & Africa. 24
- Dorycnium. 28. CONVULVULUS foliis sublinearibus sericeis, le paniculato, calycibus obtusis nudiusculis.
Habitat in Oriente. 5
 Caulis paniculatus. Folia sublanceolata, sericea, in ramis minora rariora. Rami rigidi, rarius detomi, terminati floribus subsolitariis.
- lineatus. 29. CONVULVULUS foliis lanceolatis sericeis latis petiolatis, pedunculis bifloris, calycibus ceis subfoliaceis.
 Convolvulus minor repens rupellensis, flore ru
Morif. hist. 2. p. 17. f. 1. t. 4. f. 2. mala.
 Convolvulus marinus repens, anguste & oblongo, flore purpureo. *Barr. rar.* 31. t. 1132.
 Convolvulus serpens* maritimus, spicæ foliis. *Tr. obs.* 91. t. 91. f. 2.
Habitat in Hispaniæ, Siciliæ, Mediterranei maris. 24
 Caules semipedales, prostrati, flexuosi. Folia lanceolata, basi angustiora, sericea, acuta, ad apicem acutum lineata. Pedunculi folio breviores, Bracteæ 2, calyce longioribus. Calyces subfoliacei, non sed obsolete sericei. Corollæ extus hirtæ.
- Cneorum. 30. CONVULVULUS foliis lanceolatis tomentosis floribus capitatis, calycibus hirsutis, caule erecto.
 Convolvulus argenteus umbellatus erectus. *Tom. inst.* 84.
 Convolvulus major erectus creticus argenteus. *Rif. hist.* 2. p. 11. f. 1. t. 3. f. 1.
 Convolvulus saxatilis erectus villosus perennis. *Barr. rar.* 4. t. 470. *Bocc. mus.* 2. p. 79. t. 70.
 Dorycnium. *Clus. hist.* 2. p. 254.
 Cneorum album, folio argenteo molli. *Bauh.* 463.
Habitat in Hispania. Creta, Syria. 24
 Calyces obtusi & valde hirsuti.

- CONVOLVULUS** foliis linearibus acutis, caule cantabrica,
ramoso subdichotomo calycibus pilosis. *Hort. cliff.*
68. *Sauv. Monsp.* 56.
- Convolvulus minimus** spicæfolius. *Morif. hist.* 2. p.
17. f. 1. t. 4. f. 3.
- Convolvulus** linariæ folio. *Bauh. pin.* 295.
- Cantabrica** quorundam. *Clus. hist.* 2. p. 49.
- Habitat in Italia, Sicilia, Narbona, Verona.*
- CONVOLVULUS** foliis cordatis pubescentibus, spithamæus,
caule recto, pedunculis unifloris.
- Convolvulus** spithamæus, caule recto, foliis subro-
tundis. *Gron. virg.* 141.
- Habitat in Virginia.*
- CONVOLVULUS** foliis cordatis, pedunculis um- corymbosus
bellatis, caule repente.
- Convolvulus** niveus polyanthus, folio subrotundo
majore. *Plum. spec.* 1. ic. 89. f. 2.
- Habitat in America.*
- CONVOLVULUS** foliis ovalibus tomentosis, pe- perficus.
dunculis unifloris. *Amæn. acad.* 2. p. 341. *
- Habitat in Persia, ad maris Caspici litus. ?*
- CONVOLVULUS** foliis lanceolato-ovatis glabris, tricolor.
caule declinato, floribus solitariis. *Vir. cliff.* 19.
Roy. lugdb. 428.
- Convolvulus** foliis lanceolato-ovatis nudis, caule re-
cto, floribus solitariis. *Hort. cliff.* 68. *Hort. upf.* 38.
- Convolvulus** peregrinus cæruleus, folio oblongo.
Bauh. pin. 295. flore triplici colore insignito. *Mo-
rif. hist.* 2. p. 17. f. 1. t. 4. f. 4.
- Habitat in Africa, Mauritania, Hispania, Sicilia. ☉*
- CONVOLVULUS** foliis sagittatis postice obtusis, repens.
caule repente, pedunculis unifloris.
- Convolvulus** lactescens, foliis sagittatis, radice lon-
ga alba perenni. *Gron. virg.* 141.
- Convolvulus** marinus catharticus, foliis acetosæ, flo-
re niveo. *Plum. amer.* 89. t. 105.
- Allel. Rheed. mal.* 11. p. 107. t. 52.
- Habitat in Americæ maritimis. ?*
- CONVOLVULUS** foliis hastato-lanceolatis: auri- reptans.
culis rotundatis, caule repente, pedunculis subbi-
floris.
- Solus** vagum. *Rumph. amb.* 5. p. 419. t. 155. f. 1.

Habitat in India.

Planta ex minoribus. Caulis filiformis, nec volubilis. Folia cordata, hastata, sagittata, basi la utrinque recurvata, interdum dentata, g acuminata. Pedunculi biflori, breves, pedicell tiolo longioribus. Calyx rotundatus.

hirtus.

38. CONVOLVULUS foliis cordatis subhastatis villosis, caule petiolisque pilosis, pedunculis trifloris.

Convolvulus foliis cordato-hastatis glabris acutis angustis rotundatis, caule petiolisque vili Hort. cliff. 496? Roy. lugdb. 429.

Habitat in India. Osbeck.

Planta non magna, minus volubilis. Pedunculi Caulis pilis flavescentibus exstantibus hirti. parum villosa: primaria cordato-subrotunda; daria proprie cordata; floribus proxima sepe h Pedunculi nudi, foliis longiores, floribus nis pedicellatis, involucris ad singulum pedic minimis lanceolatis.

Soldanella.

39. CONVOLVULUS foliis reniformibus, pediculis unifloris. Hort. cliff. 67. Mat. med. 81. lugdb. 428.

Soldanella maritima minor. Bauh. pin. 295.

Brassica marina. Cord. hist. 205.

Habitat in Angliæ, Frisiæ littoribus maris.

Pes capræ.

40. CONVOLVULUS foliis bilobis, pedunculis floris

Convolvulus foliis bilobis. Fl. zeyl. 75.

Convolvulus foliis subrotundis apice emarginatis integris. Roy. lugdb. 428.

Convolvulus maritimus zeylanicus, folio crasso diformi. Herm. lugdb. 174. t. 175.

Convolvulus marinus. Rumph. amb. 5. p. 433. t. f. 1.

Schovanna-adamboe. Rheed. mal. 11. p. 117. t.

Habitat in India.

brasiliensis.

41. CONVOLVULUS foliis emarginatis basi bilobulosis, pedunculis trifloris.

Convolvulus maritimus, foliis nitidis subrotundis emarginatis, petiolis biglandulosis. Brown.

153.

Convolvulus marinus catharticus, folio rotundo, flore purpureo. *Plum. amer.* 89. t. 104.

Convolvulus marinus f. *Soldanella brasiliensis*. *Marcgr. bras.* 51. *Pif. bras.* 258.

Habitat in Brasiliæ, Domingo maritimis.

CONVOLVULUS foliis lobato - palmatis oblongis, pedunculis unifloris, caule repente. littoralis.

Convolvulus albus, folio laciniato, maritimus. *Plum. spec.* 1. ic. 90. f. 2.

Habitat in America.

I P O M O E A.

* *Floribus sparsis.*

IPOMOEA foliis pinnatifidis linearibus, floribus subsolitariis. *Quamoclit.* *Hort. cliff.* 60. *Hort. upf.* 39. *Fl. Zeyl.* 77.

Roy. lugdb. 430. *Mill. dict.* t. 214.

Quamoclit f. *Jasminum americanum*. *Clus. posth.* 9.

Convolvulus pennatus exoticus rarior. *Col. aquat.* 73. t. 72.

Ilos cardinalis. *Rumph. amb.* 5. p. 421. t. 155. f. 2.

Jasminum millefolii folio. *Bauh. pin.* 398.

Sturria-cranti. *Rheed. mal.* 11. p. 123. t. 60.

Habitat in India, innotuit 1580. per Casalpinum. ☉

IPOMOEA foliis digitatis septenis, pedunculis umbellatis brevissimis. umbellat.

Quamoclit heptaphyllus, flore coccineo umbellato.

Plum. spec. 3. ic. 92. f. 2.

Habitat in America.

IPOMOEA foliis digitatis: foliolis petiolatis, pedunculis unifloris, carolina.

Convolvulus minor pentaphyllos, flore purpureo minore. *Catesb. car.* 2. p. 9. t. 19.

Habitat in Carolina.

IPOMOEA foliis palmatis: lobis septenis lanceolatis acuminatis integerrimis, pedunculis trifloris. *tuberosa.* *Hort. upf.* 39.

Convolvulus major heptaphyllus, flore sulphureo odorato. *Sloan. jam.* 55. *hist.* 1. p. 152. t. 96. f. 2.

Convolvulus americanus, mandjuccæ multifido folio, heptaphyllos, flore albo fundo purpureo, radice tuberosa, cortice albo. *Pluk. alm.* 116. t. 276. f. 5.

Habitat in Jamaica. b

- digitata. 5. IPOMOEA foliis palmatis: lobis septenis lanceatis obtusis, pedunculis trifloris.
 Quamoclit foliis digitatis, flore coccineo. *Plum.* 3. ic. 92. f. 1.
Habitat in America.
- coccinea. 6. IPOMOEA foliis cordatis acuminatis: basi acutis, pedunculis multifloris. *Hort. ups.* 39.
 Ipomœa foliis cordatis acuminatis vix dentatis. *cliff.* 66. *Roy. lugdb.* 429.
 Ipomœa foliis cordatis integerrimis, limbo floris quefido. *Sauv. meth.* 114.
 Quamoclit americanã, folio hederæ, flore coccineo. *Comm. rar.* 21. t. 21.
 Convolvulus coccineus, folio anguloso, *Plum.* 89. t. 103. *Raj suppl.* 380.
Habitat in Domingo. ☉
- lacunosa. 7. IPOMOEA foliis cordatis acuminatis scrobiculis basi angulatis, pedunculis subunifloris flore vioribus.
 Convolvulus stellatus, periplocæ rotundioris. *Dill. elth.* 103. t. 87. f. 102.
Habitat in Virginia, Carolina. ☉
Simillima I. coccineæ, sed Pedunculi uniflori f. bi
Flores tubo crassiore albi, oris purpurascetes, nec cinei.
- campanulata. 8. IPOMOEA foliis cordatis, pedunculis multiperianthio exteriori orbiculari, corollis campanulatis lobatis.
 Adamboe. *Rheed. mal.* 11. p. 115. t. 56.
Habitat in India.
Corolla crassior, quam in reliquis; sub Perianthio quepartito, aliud perianthium minus orbiculatum gerrimum.
- bona nox. 9. IPOMOEA foliis cordatis acutis integerrimis, caule aculeato, floribus ternis, corollis indivisis.
 Convolvulus foliis cordatis, caule aculeato. *cliff.* 496.
 Ipomœa sylvestris, foliis & floribus amplissimis bis florum subteretibus. *Brown. jam.* 155.
 Convolvulus maximus, caule spinulis obtusis. *Sloan. jam.* 55. *hist.* 1. p. 151. t. 96. f. 1.

Convólulus americanus, subrotundis foliis, viticulis spinosis. *Pluk. alm.* 115. t. 275. f. 3.

Smilax aspera indiæ occidentalis. *Bauh. pin.* 296.

Munda-valli. *Rheed. mal.* 11. p. 103. t. 50.

Habitat in Indiæ arenosis, arbores scandens.

Plantæ non florentes incertos de genere reliquissent Botanicos, nisi Brownius figuram variare docuisset; præsertim cum aliæ caule tantum aculeato & foliis cordatis, aliæ, ex alio loco, foliis panduratis, caule & petiolis aculeatis prodire.

IPOMOEA foliis cordatis integerrimis, floribus con- violacea.
fertis, corollis indivisis. *Sauv. monsp.* 114. †

Quamoclit foliis amplissimis cordiformibus. *Plum. spec.* 3. ic. 93. f. 1.

Habitat in America meridionali.

IPOMOEA foliis cordatis acutis integerrimis, flo- solanifolia.
ribus solitariis. *Roy. lugdh.* 430.

Quamoclit solani folio, flore roseo. *Plum. spec.* 3. ic. 94. f. 1.

Habitat in America.

IPOMOEA foliis sagittatis postice truncatis, pedun- glaucifolia,
culis bifloris.

Convólulus foliis cordato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 67.

Convólulus stellatus arvensis, folio glauco. *Dill. elth.* 103. t. 87. f. 101.

Habitat in Mexicæ arvis.

IPOMOEA foliis trilobis cordatis, pedunculis tri- triloba.
floris.

Convólulus pentaphyllos minor, flore purpureo? *Sloan. jam.* 55. *hist.* 1. p. 153. t. 97. f. 1. *Raj. suppl.* 381.

Habitat in America. ☉

Caulis volubilis; angulatus. Folia cordata, profunde triloba: intermedio ovato; lateralibus semicordatis, integerrima, glabra. Pedunculi triflori. Corollæ cylindricæ, violaceæ. Stigmata duo, globosa. Cap-
sulæ pilosæ.

IPOMOEA foliis trilobis cordatis, pedunculis multi- hederifolia.
floris racemosis.

Quamoclit hederæ folio trifido. *Plum. spec.* 3. t. 93. f. 2.

Habitat in America.

*Corollæ quam in *J. triloba* quadruplo longiores & dunculi plurimis floribus racemosis.*

* * *Floribus aggregatis.*

- hepaticifolia. 15. IPOMOEA foliis trilobis, floribus aggregatis. *Zeyl.* 79.
Convolvulus indicus villosus, hederæ folio tripartito flore cæruleo. Herm. lugdb. 182.
Convolvulus zeylanicus hirsutus, foliis hepaticæ. Herm. prodr. 327.
Habitat in Zeylona.
- tamniifolia. 16. IPOMOEA foliis cordatis acuminatis pilosis, floribus aggregatis.
Volubilis carolinienfis, tamni folio subhirsuto. Dill. elth. 428. t. 318. f. 414.
Habitat in Carolina.
- Pes tigridis. 17. IPOMOEA foliis palmatis, floribus aggregatis. *Zeyl.* 79.
Convolvulus zeylanicus villosus pentaphyllos & heptaphyllos minor, Pes tigrinus. Herm. lugdb. 184. t. 11.
Afl. bonon. 11. p. 2. p. 362. t. 23. f. 2.
Volubilis zeylanica, Pes tigrinus dicta. Dill. elth. 418. t. 318. f. 411.
Pulli-schovadi. Rheed. mal. 11. p. 121. t. 59.
Habitat in India.

POLEMONIUM.

- cæruleum. 1. POLEMONIUM foliis pinnatis, floribus erectis calycibus corollæ tubo longioribus.
Polemonium. Fl. lapp. 86. 183. *Fl. svec.* 175. *Hort. cl.* 163. *Roy. lugdb.* 432. *Hall. helv.* 490.
Valeriana cærulea. Bauh. pin. 164.
2. Polemonium calycibus lanatis. *Hort. upf.* 40.
Habitat in Europæ, Asiæ, septentrionalibus. 24
- reptans. 2. POLEMONIUM foliis pinnatis septenis, floribus nutantibus.
Polemonium foliis pinnatis, radicibus reptantibus. Gron. virg. 22. *Mill. dict.* t. 209.
Habitat in Virginia. 24

POLEMONIUM foliis pinnatifidis linearibus, flo-
ribus racemosis pendulis. rubrum.

Polemonium calycibus tubo corollæ brevioribus. *Sp.*
pl. 1. p. 163.

Quamoclit pinnatum erectum, floribus in thyrsum di-
gestis. *Dill. elh.* 321. t. 241. f. 312.

Habitat in Carolinæ citerioris arenosis. B. Jussieu.

POLEMONIUM foliis inferioribus hastatis, supe-
rioribus lanceolatis. *Gron. virg.* 142. †

Habitat in Virginia.

Facies aliena a Polemoniis, genus mihi dubium.

POLEMONIUM? foliis pinnatifidis acutis dentatis, *Nyctelea.*
caule diffuso.

Ipomœa Nyctelea. Sp. pl. 1. p. 160.

Scorpiurus humilis virginianus, foliis rutaceis. *Morif.*
hist. 3. p. 451. f. 11. t. 28. f. 3.

Habitat in Virginia.

Caulis he. baccus, dichotomus, angulatus, diffusus. Fo-
lia alterna, petiolata, pinnatifida, fere *Hydrophylli*:
laciniis acutis, utrinque dente angulatis. Pe-
dunculis oppositifolii, uniflori, pubescentes, elongati.
Calyx monophyllus, quinquefidus ultra medium, a-
cutus, corolla longior patens. Corolla monopetala,
campanulata, quinquefida. Stamina 5. Pistillum 1.
Fructus sphericus. *Facies Solani peruviani s. radi-*
eantis, sed corolla campanulata; forte proprii gene-
ris planta.

CAMPANULA.

a. *Foliis levioribus angustioribus.*

CAMPANULA caule unifloro, calyce corollam uniflora,
æquante. *Fl. lapp.* 85. t. 9. f. 5. 6. *Fl. suec.* 177, 185.

Habitat in alpebus Lapponicis. 2.

CAMPANULA caulibus unifloris, foliis caulinis pulla,
ovatis crenatis, calycibus cernuis.

Campanula alpina latifolia, flore pullo. *Bauh. pin.* 93.
prodr. 33. *Burf. IV.* 21.

Campanula foliis subrotundis. *Bauh. prodr.* 34. t. 35.
Habitat in Austria.

Radix filiformis, repens. Caules spithamæi, erecti,
flexuosi, filiformes, raro ramo uno alterove, eoque flo-
P 4 flo-

florifero. Folia radicalia & caulina ovata, obtusis subcrenata crenis distantibus, nuda, petiolata. Pediculus terminalis. Flos cernuus, magnitudine C. rotundifoliæ, calyce lævi. β. floribus pluribus in summate caulis variat.

- rotundifolia 3. **CAMPANULA** foliis radicalibus reniformibus, ciliatis linearibus. *Fl. lapp. 83. Fl. svec. 176, 184. H. cliff. 65. Roy. lugdb. 247. Dalib. paris. 66.*
Campanula minor rotundifolia vulgaris. Bauh. pin.
 β. *Campanula minor rotundifolia alpina. Bauh. pin. prodr. 34. t. 34.*
 γ. *Campanula alpina linifolia cærulea. Bauh. pin. 93. lapp. 84. it. gotl. 229. Magn. monsp. 47. t. 46. Habitat in Europæ pascuis. 2.*
- patula. 4. **CAMPANULA** foliis striatis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula patula. *Fl. svec. 2. n. 186*
Campanula minor rotundifolia, flore in summis ciliatis. Bauh. pin. 93.
Campanula esculentæ facie, ramis & floribus patula. Dill. elth. 68. t. 58. f. 68.
 β. *Campanula decurrens, foliis caulinis lanceolatis ciliatis decurrentibus. Fl. svec. 1. n. 178. Habitat in Angliæ, Sveciæ arvis. ♂*
Calyx ad basin laciniarum utrinque denticulo livido.
- Rapunculus. 5. **CAMPANULA** foliis undulatis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula coarctata. *Hort. upf. 40*
Campanula foliis radicalibus lanceolato-ovalibus, longe ramosissimo patulo. Hort. cliff. 65. Dalib. paris. 68.
Rapunculus esculentus. Bauh. pin. 92.
Rapunculum. Dod. pempt. 165.
Habitat in Helvetia, Anglia, Gallia. ♂
Folia lanceolata. Racemus terminalis. Rami fruticulosi breviores, erecti. Pedunculi terni sæpius, interdum longiore. Caulis angulatus, scaber.
- perficifolia. 6. **CAMPANULA** foliis radicalibus obovatis; ciliatis lanceolato-linearibus subferratis sessilibus renatis. *Fl. svec. 179. 187. Dalib. paris. 67.*
Campanula foliis lineari-lanceolatis crenatis, longe ramosissimo simplicissimo, floribus raris. Vir. cliff. Hort. cliff. 65. Roy. lugdb. 246.

unculus perficifolius, magno flore. *Bauh. pin.* 93.

unculus nemorosus angustifolius, magno flore, major. *Bauh. pin.* 93.

stat in Europæ septentrionalis asperis. 2

MPANULA foliis ovatis glabris subserratis, caule erecto paniculato: ramulis brevibus. pyramidalis

panula foliis ovatis glabris obsolete serratis, ramis brevissimis cauli approximatis. *Vir. cliff.* 17. *ly. lugdb.* 246.

panula foliis ovatis margine cartilagineo crenatis, ule ramosissimo angustato. *Hort. cliff.* 64.

unculus hortensis, latiore folio, f. *Pyramidalis.*

uh. pin. 93.

stat - - - ♂

MPANULA foliis cordatis lanceolatisque, petiis ciliatis, floribus secundis, corollis quinque-rtitis planis. americana.

panula caule ramoso, foliis linguiformibus crenatis margine cartilagineo. *Roy. lugdb.* 246.

panula minor americana, foliis rigidis, flore cæreo patulo. *Herm. lugdb.* 107.

helium americanum minus, flore cæruleo patulo. *dart. mem.* 4. p. III. t. III.

stat in Pennsylvania. ♂

MPANULA foliis lanceolatis: caulinis acutis, floribus paniculatis nutantibus, *Hort. upf.* 41. lilifolia.

panula urticæ foliis glabra, floribus minoribus nudis. *Amm. ruth.* II. n. 17.

stat in Tataria, Sibiria. ♂

MPANULA foliis rhomboidibus serratis, spica nuda. rhomboidalis.

panula foliis rhomboidibus serratis, spica unilateri subnuda. *Hall. helv.* 491.

panula drabæ minoris foliis. *Bauh. pin.* 94. *adr.* 36.

unculus teucris folio. *Barr. rar.* 78. t. 567.

unculus alpinus, (teucris folio) rhomboidalis. *cc. mus.* 75. t. 61.

stat in alpebus Helvetiæ, Italiæ.

β Foliis scabris latioribus.

MPANULA foliis ovato-lanceolatis, caule latifolia. sun-

- simplicissimo tereti, floribus solitariis pedunculatis fructibus cernuis. *Vir. cliff.* 17. *Hort. cliff.* 63. *svéc.* 180, 188. *Roy. lugdb.* 245.
- Campanula maxima, foliis latissimis. *Bauh. pin.* 9. *Habitat in Angliæ, Sueciæ montosis, sepibus.* 2.
- Caulis simplicissimus, teres. Folia lanceolato-ovata serrata. Flores ex alis superioribus, solitarii, dunculati. Calyces glabri. Fructus cernui.
- rapuncu-
lodes. 12. CAMPANULA foliis cordato-lanceolatis, caule ramoso, floribus secundis sparsis, calycibus repletis. *Vir. cliff.* 17. *Roy. lugdb.* 246. *Dalib. paris.* 66.
- Campanula foliis ovatis crenatis, floribus per caulem uno versu sparsis. *Hort. cliff.* 64.
- Campanula hortensis, rapunculi radice. *Bauh. pin. Morif. hist.* 2. p. 460. f. 5. t. 3. f. 32.
- Campanula urticæ foliis oblongis minus asperis. *Bauh. pin.* 94. *Hallero.*
- Habitat in Helvetia, Gallia, Austriæ siccissimis.*
- bononiensis. 13. CAMPANULA foliis ovato-lanceolatis subteretibus sessilibus, caule paniculato. †
- Campanula f. Cervicaria bononiensis, flore purpurea. *Bauh. hist.* 2. p. 804. *Morif. hist.* 2. p. 461. f. 5. f. 38.
- Campanula foliis lanceolatis leviter ferratis altera parte floris thyrso spicato & ad basin ramoso. *Seguier. i.* p. 176.
- Habitat in Baldi, Lessinensium jugis, Bononiæ.*
- graminifolia. 14. CAMPANULA foliis lineari-subulatis, caule terminali. †
- Campanula alpina, tragopogi folio. *Bauh. pin.* 94.
- Trachelium, tragopogi folio, montanum. *Col. pin.* p. 25. *Bauh. hist.* 2. p. 802.
- Trachelium minus gramineum cæruleo-violaceo. *Barr. ic.* 332.
- Habitat in Italiæ montibus, Aprutii Salmonis vicinis.*
- spicata. 15. CAMPANULA hispida, spica laxa floribus densis, foliis linearibus.
- Campanula hirsuto folio angusto leviter ferrato, floribus parvis spicatis. *Pluk. alm.* 76. t. 153. f. 3.
- Habitat in Vallesia.*
- Radix crassitie digiti. Folia radicalia lineari-lanceolata caulina similia, sed breviora. Caulis pedalis; †

ernis, terminatis spica longissima ex Floribus sessibus, alternis, remotis, plurimis. Corollæ subindricæ. Planta caule, foliis, calycibus, pilis alhispidis.

MPANULA caule angulato, foliis petiolatis, Trachelium.
yribus ciliatis, pedunculis trifidis. *Vir. cliff. 16.*

Jvec. 181, 189. Roy. lugdb. 245. Dalib. paris. 66.

panula foliis radicalibus cordatis, calycibus cilia-

Hort. cliff. 64.

panula vulgarior, foliis urticæ, vel major & erior. *Bauh. pin. 94.*

at in Europæ sepibus. 24

ovata, subcordata, petiolata, dentata. Pedun- i trifidi, triflori.

MPANULA caule angulato simplici, floribus glomerata.

ilibus, capitulo terminali. *Vir. cliff. 16. Fl. Jvec.*

1, 190. it. gotl. 196. it. scan. 306. Roy. lugdb.

3. Dalib. paris. 67.

panula foliis lanceolato-ovatis crenatis, ramis ca- ullo florali terminatis. *Hort. cliff. 64.*

panula pratensis, flore conglomerato. *Bauh. pin.*

relium alpinum, floribus conglomeratis, foliis

inæ rigidis & hirsutis. *Herm. par. 235. t. 235.*

at in Angliæ, Galliæ, Austriæ, Sveciæ pratis

lis. 24

ovato-oblonga, sessilia, obtusiuscula. Flores 3,

les in alis foliorum; capitulo terminale.

MPANULA hispida, floribus sessilibus, capi- cervicaria.

o terminali, foliis lanceolato-linearibus undulatis.

*eland. 115. Fl. Jvec. 183, 191.**

anula foliis echii. *Bauh. prodr. 36. (non pinac.).*

helium altissimum, foliis asperis angustis, flori-

parvis. Bauh. hist. 2. p. 301. t. 301.

at in Helvetiæ, Sveciæ, Germaniæ asperis syl-

cis.

læ anguli exteriores longitudinaliter ciliati.

MPANULA hispida, racemo ovato-oblongo thyrfoides.

ninali, caule simplicissimo, foliis lanceolato-li-

ribus.

anula foliis echii. *Bauh. pin. 94.*

Alopecurus alpinus quibusdam, *Echium montanum dalechampii*. *Bauh. hist.* 2. p. 809.

Cervicaria major tenuifolia. *Thal. harc.* 32. t. 4. *

Habitat in alpihus Harcyniæ, Carniole. 24

petræa.

20. **CAMPANULA** caule angulato simplici, floribus sessilibus capitato-glomeratis, foliis subtus tomentosis.

Campanula foliis lanceolato-ovatis ferratis hispidis floribus per caulem dense congestis. *Segu. v. p.* 179.

Campanula alpina sphærocephalos. *Bauh. pin.* 94.

Trachelium majus petræum. *Pon. bald.* 333. *Bauh.* 2. p. 301.

Habitat in Baldo.

Folia ovato-oblonga, obtusiuscula, serrata, supra sessilibus subtus tomentosa nivea.

Medium.

21. **CAMPANULA** capsulis quinquelocularibus adscissis, caule simplici erecto folioso floribus erectis. *Vir. cliff.* 16. *Roy. lugdb.* 245.

Campanula calycibus a tergo lamellis quinque natis. *Hort. cliff.* 64.

Campanula hortensis, folio & flore oblongo. *Bauh. pin.* 94.

Viola mariana. *Dod. pempt.* 163.

Habitat in Germaniæ, Italiæ sylvis apricis. 3

barbata.

22. **CAMPANULA** capsulis quinquelocularibus adscissis, caule simplicissimo unifolio, foliis lanceolatis, corollis barbatis.

Campanula foliis echii, floribus villosis. *Bauh.* 94. *prodr.* 36. t. 36.

Campanula alpina asperior, foliis echii, flore multo villosa. *Pluk. Phyt.* 153. f. 6.

Rapunculus montanus. *Bauh. hist.* 2. p. 808.

Habitat in Alpibus Austriæ, Helvetiæ, Pedemontaniæ.

Caulis simplicissimus, spithameus, in medio folio radicalibus simili. Folia radicalia lanceolata, sessilibus obtusiuscula, integerrima. Flores ad apicem caulis 4, secundi, intus valde barbati. Capsula 5-locularis, obtusa sinibus reflexis.

fibrica.

23. **CAMPANULA** capsulis trilocularibus obtusis caule paniculato.

Habitat in Sibiria. Gmelin.

Plantæ Caulis pedalis, angulatus parum hispida, re-
ctus, indivisus. Panicula rarior, laxa. Folia linea-
ria, semiamplexicaulia: Caulina scabra. Flores oblon-
gi, parvi. Calyces hispidi. Varietas ludit caule sub-
diviso, foliis latioribus.

dichotoma.

CAMPANULA capsulis quinquelocularibus ob-
tectis, caule dichotomo, floribus cernuis. *Amæn.*
acad. 4. p. 306.*

Campanula hirsuta, ocyimi folio caulem ambiente, flo-
re pendulo. *Bocc. sic.* 83. t. 45. f. 1. *Morif. hist.* 2.
p. 459. f. 5. t. 3. f. 26. *Raj. hist.* 736.

Habitat in Syria, Sicilia.

CAMPANULA capsulis quinquelocularibus ob-
tectis pedunculatis, caule prostrato, foliis suborbi-
culatis. mollis.

Campanula rotundifolia hirsuta saxatilis, folio molli.
Bocc. mus. app.

Habitat in Oriente, Hispania. Alströmer.

Caules decumbentes, subramosi, rigidiusculi, villosi.
Folia parva, sessilia, suborbiculata, subintegerrima, to-
mentosa, pubescentia. Flores ex alis foliorum, soli-
tarii, longius pedunculati. Calyces magni, nudi sinu-
bus reflexis. Flores foliis sextuplo majores. Verbo:
Herba Antirrhini mollis, Flores Campanulæ Medii,
cæterum statura Camp. heterophyllæ.

CAMPANULA foliis obovatis crenatis, floribus saxatilis.
alternis nutantibus, capsulis quinquecarinatis. †

Campanula cretica saxatilis, bellidis folio, magno
flore. *Tournef. inst.* 111. *Barr. rar.* 79. t. 813.

Rachelium saxatile, bellidis folio, cæruleum creti-
cum. *Bocc. mus.* 2. p. 76. t. 64.

Habitat in Cretæ scopulis saxosis.

CAMPANULA capsulis obtectis pedunculatis, laciniata.
foliis ferratis: radicalibus lyratis; caulinis lanceo-
latis.

Campanula foliis longis laciniatis. Sp. pl. 1. p. 165.

Campanula græca saxatilis, jacobææ folio. Tournef.
it. 1. p. 99. t. 99. cor. 1.

Campanula mariana, laciniatis foliis peregrina. Bauh.
pis. 94. *Morif. hist.* 2. p. 460. f. 5. t. 2. f. 31.

Campanula foliis radicalibus dentato-pinnatis, c
nis cordatis sessilibus. *Gron. orient.* 19.

Medium dioscoridis. *Raw it.* 284.

Habitat in Græcia, Libano. Burmannus.

Planta *leviuscula*. Folia radicalia pinnatifida,
ta, serrata; Caulina lanceolata, subcuneiform
serrata. Calyces sinubus reflexis, germen ob
tibus.

- fricta. 28. **CAMPANULA** capsulis obtectis, foliis hirtis:
linis lanceolatis ferratis, caule simplicissimo,
bus sessilibus.

Campanula orientalis, folio oblongo rigido ad
flore sursum spectante. *Tournef. cor.* 3.

Habitat in Syria, Palæstina.

Caulis sesquipedalis, simplicissimus, hirtus.
Radicalia cordata s. ovata, oblongiuscula, ser
utrinque hirta, petiolata. Caulina alterna, re
sessilia, lanceolata, obtusa, serrato-dentata,
basi angustiora. Flores axillares, solitarii, s
erecti. Calyces hirti, germen sinubus tegentes.

* Caule subdiviso.

- canariensis. 29. **CAMPANULA** capsulis quinquelocularibus,
haftatis dentatis oppositis petiolatis.

Campanula foliis haftatis dentatis, caule determ
foliofo. *Hort. cliff.* 65. t. 8. *Roy. lugdb.* 247.

Campanula canariensis regia s. Medium radice tu
fa, foliis sinuatis cæsiis atriplicis æmulis terni
cum caulem ambientibus, flore amplo pendulo
lore flammeo rutilante. *Pluk. alm.* 76. t. 276.

Habitat in insulis Canariis. 24

- fruticosa. 30. **CAMPANULA** capsulis quinquelocularibus
lumnaribus, caule fruticoso, foliis lineari-subu
pedunculis longissimis.

Campanula africana, ericæ folio, flore cæruleo p
Herm. afr. 5.

Habitat ad Caput b. Spei. 5

- Specu-
lum. ♀ 31. **CAMPANULA** caule ramosissimo diffuso,
oblongis subcrenatis, calycibus solitariis coroll
gioribus, capsulis prismaticis. *Hort. upf.* 41.
Campanula caule ramoso, foliis ovato-oblongi
natis. *Hort. cliff.* 65.

panula calycibus corollam superantibus, capsulis
 columnaribus. *Vir. cliff.* 17. *Roy. lugdb.* 247. *Dalib.*
virif. 68.

panula arvensis f. *Campanula arvensis erecta.*
auh. pin. 215.

itat inter segetes Europæ australis. ☉

AMPANULA caule basi subramoso stricto, fo- hybrida.
 lis oblongis crenatis, calycibus aggregatis corolla
 interioribus, capsulis prismaticis.

panula arvensis minima erecta. *Morif. hist.* 2. p.
 17. f. 5. t. 2. f. 22.

culum veneris minus. *Raj. hist.* 743.

itat in Anglia, Gallia, inter segetes.

ert a Speculo ♀ f. matre: Caule basi tantum ra-
 moso, erecto, superne vix ramoso, stricto; Floribus
 filibus, 3. f. 4. simul; Corollis sæpius in rudimento
 ventibus nec explicatis. Quin hæc ex C. Spec. ♀
 in orta sit, dubium vix videtur.

AMPANULA ramis patentibus indivisis, foliis limonifolia
 pedicellatis ellipticis lævibus integerrimis, floribus
 filibus ternis.

panula orientalis, limonii minimi facie, flore pa-
 lo. *Tournef. cor.* 3.

itat in Oriente. *Burmannus.*

radicalia ovali-oblonga, integerrima, glabra, pe-
 data, non tamen rigida. Caulis ramis simplicissi-
 mis, virgatis, foliis linearibus f. subulatis. Flores
 moti, axillares, sessiles, sæpius terni, bracteis lon-
 gitudine germinis.

AMPANULA caule subdiviso ramosissimo, Pentagonia.
 foliis linearibus acuminatis. *Hort. cliff.* 66. *Roy.*
ldb. 247.

panula pentagonia, flore amplissimo, thracica.
Tournef. infl. 112.

culum veneris, flore amplissimo, thracicum. *Raj.*
 f. 742.

itat in Thracia. ☉

AMPANULA caule simplici, foliis cordatis perfoliata
 amplexicaulibus, floribus sessilibus aggrega-
 tis. *Hort. upf.* 40.

panula caule simplicissimo, foliis amplexicaulibus.
Hort. cliff. 65. *Roy. lugdb.* 247. *Gron. virg.* 22.

Cam-

Campanula pentagonia perfoliata. Morif. hist. 2. p. f. 5. t. 2. f. 23. Barr. rar. 83. t. 1133.

Habitat in Virginia. ☉

Flores sæpius mutilati, excepto terminali.

capensis.

35. *CAMPANULA* foliis lanceolatis dentatis hisp. pedunculis longissimis, capsulis strigosis.

Campanula africana annua hirsuta, latis serratis foliis, flore magno violaceo. Comm. hort. 2. p. t. 35.

Habitat ad Caput b. Spei. ☉

elatines.

37. *CAMPANULA* foliis cordatis dentatis pubes. bus petiolatis, caulibus prostratis, pedunculis pillaribus multifloris.

Habitat in alpinis Europæ australis. Allioni.

Specimen: Caulis prostratus, teres, pubescens, ramosus. Folia alterna, cordata, dentato-serrata, gius petiolata, utrinque subpubescentia. Pedu. axillares, capillares s. filiformes, aphylli, laxi mosi, sæpius triflori, pubescentes.

hederacea.

38. *CAMPANULA* foliis cordatis quinquelobis p. latis glabris, caule laxo. *Dalib. parif. 68.*

Campanula foliis subrotundis quinquangularibus emarginatis glabris, floribus solitariis. Læst. it.

Campanula cymbalaræ vel hederæ folio. Bauh. 93. prodr. 84. Morif. hist. 2. p. 456. f. 5. t. 4. f. Pluk. phyt. 23. f. 1.

Habitat in Anglia, Gallia, Hispania, locis umbrosis midiusculis.

heterophyl-
la.

39. *CAMPANULA* foliis subovatis glabris integ. mis, caulibus diffusis.

Campanula saxatilis, foliis inferioribus bellidis, c. ris nummulariæ. Tournef. cor. 3. itin. 1. p. 24. 243.

Habitat in Oriente. 24

Krinus.

40. *CAMPANULA* caule dichotomo, foliis sessil. utrinque dentatis, floralibus oppositis. *Hort. 65. Roy. lugdb. 247. Guett. stamp 429.*

*Campanula caule quadrangulo patulo scabro, c. cibus sessilibus axillaribus corollæ tubulosæ s. libus. Læst. it. 127. **

Erini s. Rapunculi minimum genus. Column. phy. 122. t. 28.

Rapunculus minor, foliis incis. *Bauh. pin.* 92.
 Aline oblongo folio serrato, flore cæruleo. *Bauh. hist.*
 3. p. 367.

Habitat in Italia, Hispania, G. Narbonensi. ☉

Genus *dubium monent Corolla inæqualis, Capsula non*
extus dehiscens, Ramificatio opposita, Stigma sim-
plex.

ROELLA.

ROELLA foliis ciliatis: mucrone recto. ciliatis.

Roella: Hort. cliff. 492. t. 35.

Campanula africana frutescens aculeosa, flore viola-
ceo. Comm. hort. 2. p. 77. t. 30.

Campanula africana humilis pilosa, flore exalbido lan-
guide purpureo. Seb. thes. 1. p. 25. t. 16. f. 5.

Aculeosa mauritanica, ericæ foliis hirsutis rigidis infe-
sto mucrone pungentibus. Fluk. alm. 8. t. 252. f. 4.

Habitat in Mauritania, Aethiopia. 24

ROELLA foliis ciliatis: mucrone reflexo. reticulati

Roella foliis imbricatis. Roy. lugdb. 248.

Campanula capitis bonæ spei, foliis reticulatis spinos-
is. Pet. mus. 21. f. 157.

Habitat ad Caput. b. Spei. 24

PHYTEUMA.

PHYTEUMA capitulo subfolioso, foliis omnibus pauciflor
 lanceolatis.

Rapunculus foliis obtusis, spica pauciflora: Hall. helv.
 497.

Rapunculus alpinus parvus comosus. Bauh. hist. 2. p.
 811.

Habitat in alpibus Helveticis, Styriacis.

Capsula bi-f. trilocularis.

PHYTEUMA capitulo subrotundo, foliis linearibus hemisph
 integerrimis. ca.

Phyteuma foliis linearibus, floribus capitatis. Roy.
lugdb. 248.

Rapunculus umbellatus, folio gramineo. Bauh. pin. 92.

Rapunculus sylvestris cæruleus umbellatus: Thal. herc.
 94. t. 3.

Rapuntium alterum angustifolium alpinum: Columi:
ecphr. 2. p. 23. t. 26.

Habitat in alpibus Helvetiæ, Italiæ, Pyrenæis. 24

Linnei Spéc. plant. P. 1.

Q

3. PHY-

- orbicularis.** 3. PHYTEUMA capitulo subrotundo, foliis ser radicalibus cordatis.
 Phyteuma foliis oblongis, spica orbiculari. *Stamp. 1. p. 34. Dalib. paris. 69.*
 Rapunculus folio oblongo, spica orbiculari. *Bauh. 92. Morif. hist. 2. p. 463. f. 5. t. 5. f. 47.*
 Rapuntium montanum rarius corniculatum. *Cecphr. 1. p. 222. t. 224.*
- β. Rapunculus umbellatus latifolius. *Bauh. pin. 92.*
 γ. Rapunculus umbellatus angustifolius. *Bauh. pin.*
 Rapunculus sylvestris umbellatus. *Thal. herb. f. 1, 2.*
Habitat in alpihus Italiæ, Helvetiæ, Veronæ, xiæ.
- spicata.** 4. PHYTEUMA spica oblonga, capsulis bilocula foliis radicalibus cordatis.
 Phyteuma spica oblonga nuda, foliis caulinis latis serratis. *Amæn. acad. 1. p. 149.*
 Phyteuma foliis cordato-lanceolatis, spica obl *Guett. stamp. 1. p. 34. Dalib. paris. 69.*
 Rapunculus spicatus. *Bauh. pin. 92. cæruleus. 32. t. 32.*
 Rapunculus foliis cordatis, spica florum obl *Monnier. obs. 130.*
 Rapunculus corniculatus spicatus f. alopecuro flore albo & cæruleo. *Morif. hist. 2. p. 463. f. 5. f. 46.*
Habitat in Alpestribus Helvetiæ, Austriæ, F Angliæ, Galliæ, Italiæ.
 Capsula non trilocularis, sed bilocularis. *Dill. giff.*
- epomosa.** 5. PHYTEUMA fasciculo terminali sessili, foliis tatis: radicalibus cordatis.
 Rapunculus alpinus corniculatus. *Bauh. pin. 113. 33. t. 33.*
 Trachelium petræum minus. *Pon. bald. 326. t. 32*
 Campanula sphærocephalus pervenusta, foliorum oras insigniter denticulata. *Pluk. alm. 77. t. 152*
Habitat in Baldi & Tyrolensibus montibus. ♂
- pinnata.** 6. PHYTEUMA floribus sparsis, foliis pinnatis. *lugdb. 248.*
 Rapunculus creticus f. Pyramidalis altera. *Bauh. 92.*

Rapunculus creticus, *Petromarula*. *Bauh. hist.* 2. p. 811. t. 712.

Habitat in Creta.

TRACHELIUM.

TRACHELIUM. *Hort. upf.* 41.

cæruleum.

Trachelium foliis ovatis ferratis, corymbis compositis.

Vir. cliff. 17. *Roy. lugdb.* 248.

Trachelium foliis ovatis ferratis, caule umbella terminato. *Hort. cliff.* 66.

Cervaria valerianoides cærulea. *Bauh. pin.* 95.

Habitat in Italiæ & Orientis umbrosis. ♂

SAMOLUS.

SAMOLUS. *Hort. cliff.* 51. *Hort. upf.* 42. *Fl. svec.* valerandl.

165, 192. *Roy. lugdb.* 249. *Gron. virg.* 23. *Dalib. parif.* 69.

Samolus aquatica, rotundo folio non crenato. *Bauh. pin.* 252.

Samolus aquatica, foliis rotundis beccabungæ. *Morif. hist.* 2. p. 323. f. 3. t. 24. f. 28.

Samolus africanus, folio rotundiore. *Walth. hort.* 162. africanus.

t. 23. *Habitat in maritimis Europæ, Asiæ & Americæ borealis, ad litora, fontes.* ♂

Differt africana planta Caule magis ramofo & firmiore; sed vix sufficiunt notæ pro distincta specie.

NAUCLEA.

NAUCLEA.

orientalis.

Sphenanthus foliis oppositis. *Fl. zeyl.* 53. *Sp. pl.* 1. p. 95.

Samolus citri foliis bijugis, capite majore. *Vgill. act.* 1722. p. 259.

Samolus indica, fructu aggregato globofo. *Raj. hist.* 1441.

Samolus Tfiacca. *Rheed. mal.* 3. p. 29. t. 33.

Samolus Rumph. amb. 3. p. 84. t. 55?

Habitat in India Asiatica. ♀

RONDELETIA.

RONDELETIA foliis sessilibus, panicula dichotoma. americana.

Rondeletia arborescens, tini facie. *Plum. gen.* 15
142. f. 1.

Habitat in America. †

Arbuseula Folia opposita, sessilia, lanceolata. Pedunculi
communes solitarii, longissimi, nudi, apice forma
corymbum dichotomum; in cujus singula dichoto
Flos sessilis, cum involucrio diphylo.

asiatica.

2. RONDELETIA foliis petiolatis oblongis acutis,
zeyl. 80.

Cupi. *Rheed. mal.* 2. p. 37. t. 23. *Raj. hist.* 1494.

Habitat in Malabar, Zeylona. †

MACROCNEMUM.

jamaicensis.

1. MACROCNEMUM. *Amæn. acad.* 5. p. 413. *

Macrocnemum arborescens, foliis ovatis opposi-
tibus racemis sustentaculis longis infidentibus. *Brown.*
165.

Habitat in Jamaica.

BELLONIA.

aspera.

1. BELLONIA.

Bellonia frutescens, folio melissæ aspero. *Plum.*
19. ic. 47.

Habitat in America. †

Arbuseula Folia opposita, ovata, serrata, subtus a-
ra: petiolis brevissimis Flores in corymbum.

PORTLANDIA.

grandiflora.

1. PORTLANDIA.

Portlandia floribus pentandris. *Jacq. amer.* 16.

Portlandia foliis majoribus nitidis ovatis oppositis,
ribus amplissimis. *Brown. jam.* 164. t. 11. f. 1.

Habitat in Jamaica. †

Corolla Daturæ speciosa.

CINCHONA.

officinalis.

1. CINCHONA panicula brachiata.

Cinchona. *Mat. med.* 71.

Quinquina. *Cond. act. paris.* 1738. *Godofr. m. n.* 2.
180.

Arbor febrifuga peruviana. *Raj. hist.* 1756.

Habitat in Loxa Peruviana. †

CINCHONA pedunculis unifloris. *Jacq. amer. caribæa.*

16. †

Habitat in Caribæis. †

PSYCHOTRIA.

PSYCHOTRIA stipulis emarginatis, foliis lanceola- asiatica.
to- ovatis. *Amæn. acad. 5. p. 395.*

Psychotrophum fruticosum, foliis amplioribus ovatis,
stipulis rigidis interpositis. *Brown. jam. 160. t. 17.*

f. 2.

Habitat in Jamaica & India Orientali. †

PSYCHOTRIA caule repente, foliis cordatis petio- herbacea.
latis.

Psychotrophum herbaceum repens sylvaticum, foliis
subrotundo-cordatis oppositis, floribus paucioribus
alaribus, laciniis corollæ erecto-patentibus. *Brown.*
jam. 161.

Jasminum inodorum repens, violæ foliis, fructu pu-
niceo. *Barr. æqu. 63.*

Violæ folio baccifera repens, flore albo pentapetaloi-
de, fructu rubro dispermo. *Sloan. jam. 115. hist. 1.*
p. 243.

Periclymeno accedens planta indiæ, foliis periclymeni
rotundioribus, fructu bipyreno. *Morif. hist. 3. p. 535.*

Kariata-kali. *Rheed. mal. 10. p. 41. t. 21. Raj. suppl.*
358.

Habitat in Indiæ utriusque umbrosis roridis.

COFFEA.

COFFEA floribus quinquefidis dispermis. *Amæn. arabica.*
*acad. 6. Coffea. **

Coffea. *Hort. cliff. 59. Hort. ups. 41. Mat. med. 70.*
Roy. lugdb. 239.

Jasminum arabicum, lauri folio, cujus semen apud nos
Coffe dicitur. *Juss. act. 1713. p. 388. t. 7.*

Jasminum arabicum, castaneæ folio, flore albo odori-
ratissimo. *Till. pis. 87. t. 32.*

Evonymo similis ægyptica, fructu baccis lauri simili.
Bauh. pin. 498. Pluk. phyt. 272. f. 1.

Bon. Alp. ægypt. 36. t. 36.

Habitat in Arabia felici, Æthiopia.

- occidentalis. 2. **COFFEA** floribus quadrifidis, baccis monosper
Jacq. amer. 16.
Pavetta foliis oblongo-ovatis oppositis, stipulis
 ceis. *Brown. jam. 142. t. 6. f. 1.*
Jasminum arborefcens, lauri foliis, flore albo od
 tiffimo. *Plum. spec. 17. ic. 156. f. 2.*
Habitat in America calidiore. †
Flores in panicula brachiata.

CHIOCOCCA.

- racemosa. 1. **CHIOCOCCA** foliis oppositis. *Jacq. amer. 16.*
Chiococca farmentosa, foliis myrtinis, spicis plu
 tenuiffimis & terminalibus & ex alis supremis. *Br*
jam. 164.
Lonicera racemis lateralibus simplicibus laxis, flo
 oppositis pendulis, geniculis compressis. *Sp. pl.*
175. n. 12. Hort. cliff. 496.
Periclymenum racenosum, flore flavescente, fi
 niveo. *Plum. ic. 211. t. 217. f. 2. Dill. elth. 3*
228. f. 295.
Jasminum folio myrtino acuminato, flore albis
 racemoso. *Sloan. jam. 196. hist. 2. p. 97. t. 188.*
Raj. dendr. 64.
Habitat in Jamaica, Barbados, locis confragosis. †
- nocturna. 2. **CHIOCOCCA** foliis alternis. *Jacq. amer. 16. †*
Habitat in America. †

HAMELLIA.

- patens. 1. **HAMELLIA** racenis patentibus. *Jacq. amer. 1*
Periclymenum arborefcens, ramulis inflexis, flon
 teo. *Plum. ic. 218 ?*
Habitat in America meridionali. †

LONICERA.

* *Periclymena caule volubili.*

- caprifolium 1. **LONICERA** floribus verticillatis terminalibus
 libus, foliis summis connato-perfoliatis. *Hort.*
45. Hort. upf. 42. Virid. cliff. 14. Roy. lugd.
Sauv. monsp. 139.
Periclymenum perfoliatum. *Bauh. pin. 302.*

Caprifolium Italicum. *Dod. pempt. 411. Hortul. angl. t. 5. f. 1, 2, 3.*

Habitat in Europa australi. †

LONGICERA spicis nudis verticillatis terminalibus, foliis summis connato-perfoliatis.

sempervirens.

LONGICERA floribus capitatis terminalibus, foliis summis connatis, inferioribus perfoliatis. *Hort. cliff. 58. Roy. lugdb. 237.*

Periclymenum perfoliatum virginianum sempervirens & florens. *Herm. lugdb. 484. t. 483.*

Periclymenum virginianum. *Riv. mon. 116.*

Habitat in Virginia, Mexico. †

LONGICERA capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis. *Hort. cliff. 58. Hort. upf. 42. * Fl. suec. 191, 193. Roy. lugdb. 237. Dalib. paris. 69. Sauv. monsp. 139. it. sean. 305. Mat. med. 68.*

Periclymenum.

Periclymenum non perfoliatum germanicum. *Bauh. pin. 302.*

Caprifolium non perfoliatum. *Hort. angl. t. 6. † 8. f. 1, 2.*

Caprifolium germanicum, flore rubello, serotinum. *Fournesf. instit. 226.*

Habitat in Europa media. †

Caulis & folia pubescentia in α, at in β glabra.

* * Chamæcerasa pedunculis bifloris.

LONGICERA pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis ellipticis integerrimis. *Roy. lugdb. 238. Sauv. monsp. 140.*

nigra.

Chamæcerasus alpina, fructu nigro gemino. *Bauh. pin. 451.*

Periclymenum alpinum nigrum. *Gesn. fasc. 37. t. 8. f. 43.*

Periclymenum rectum, folio ferrato. *Bauh. hist. 2. p. 107.*

Periclymenum rectum 2. *Clus. hist. 1. p. 58.*

Habitat in Delphinatu, Gallia, Helvetia.

Involucrum germinibus brevius. Folia integerrima, sæpe leguntur ferrata, sed hæc a Papilione Camilla sunt erosa. Schniedel.

LONGICERA pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis cordatis obtusis. *Hort. upf. 42.*

tatarica.

Chamæcerasus fructu gemino rubro, foliis glabris
datis. *Amm. ruth.* 184.

Habitat in Tataria. †

Folia cordata glabra, - brevius petiolata. Pedes
axillares, biflori. involucrium lanceolatum; in
cella obovata. Corolla pallide incarnata: labi
periore tripartito: lacina media bifida; infe
simplici.

Xylosteum. 6. *LONICERA* pedunculis bifloris, baccis distin
foliis integerrimis pubescentibus. *Roy. lugdb.*
Fl. succ. 192, 194. *Dalib. parif.* 69. *Sauv.* 140.

Lonicera pedunculis bifloris, foliis ovatis obtusis.
Hort. cliff. 58.

Chamæcerasus dumetorum, fructu gemino rubro.
pin. 451.

Xylosteum. *Dod. pempt.* 412.

Habitat in Europæ frigidioris sepibus. †

Pyrenæica. 7. *LONICERA* pedunculis bifloris, baccis distin
foliis oblongis glabris.

Lonicera pedunculis bifloris, baccis distinctis, sic
infundibuliformibus, ramis divaricatis. *Roy.*
238.

Xylosteum pyrenæicum. *Tournef. inst.* 609, *Magi*
209. t. 209. *Raj. dendr.* 29. *Duham. arb.* 2. p.
t. 110.

Habitat in Pyrenæis. †

*Differt a præcedente Corollis regularibus, Ramis
ricatis, Foliis glabris.*

alpigena. 8. *LONICERA* pedunculis bifloris, baccis coad
didymis. *Mill. dist.* t. 167. f. 2.

Lonicera pedunculis bifloris, foliis ovatis acutis
gris. *Hort. cliff.* 58. *Sauv. monf.* 140.

Lonicera baccis bifloris concretis, floribus bila
Roy. lugdb. 238.

Chamæcerasus. *Gesn. fasc.* 33. t. 14. f. 44.

Chamæcerasus alpina, fructu rubro gemino: d
punctis notato. *Bauh. pin.* 451.

Periclymenum rectum quartum. *Clus. hist.* 1. p.

*Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenæicis, Al
gicis.* †

• LONICERA pedunculis bifloris, baccis coadunato-globosis, stylis indivisis. cærulea.

Lonicera pedunculis bifloris bilabiatis, bacca singulari globosa integerrima. Roy. lugdb. 239.

Chamæcerasus montana, fructu singulari cæruleo. Bauh. pin. 451.

Periclymenum rectum, fructu cæruleo. Clus. pon. 85. Bauh. hist. 2. p. 108. Raj. hist. 1492.

Habitat in Helvetia. †

Rami teretes, rigidi, rubri. Folia ovata, integra. Gemmæ. 2. f. 3, altera supra alteram, tamquam duæ spinæ, subulatæ, compressæ, horizontales. Pedunculi ex infimis oppositionibus foliorum, cernui, brevissimi. Germen unicum, absque visibili periantho, cum Corollis duabus, 5-fidis, regularibus, albis.

* * * *Caule erecto pedunculis multifloris.*

• LONICERA sp. cis terminalibus, foliis ovato-oblongis acuminatis distinctis sessilibus. Gron. virg. 142. marilandica.

Periclymeni virginiani flore coccineo planta marilandica, spica erecta, foliis conjugatis. Raj. dendr. 32.

Catesb. carol. 2. p. 78. t. 78.

Habitat in Virginia, Marilandia, Carolina. †, 2

Generis dubii planta a nobis non viso fructu.

• LONICERA capitulis lateralibus pedunculatis, foliis petiolatis. Symphoricarpos.

Lonicera pedunculis axillaribus capitatis, foliis petiolatis. Hort. cliff. 58. Roy. lugdb. 237. Gron. virg. 23.

Symphoricarpos foliis alatis. Dill. elth. 371. t. 278. f. 360.

Vitis idæa caroliniana, foliis subrotundis hirsutis. Hort. tul. angl. 85. t. 20.

Habitat in Virginia, Carolina. †

• LONICERA racemis terminalibus, foliis serratis. Diervilla. Diervilla. Hort. cliff. 63. t. 7.

Diervilla acadensis fruticosa, flore luteo. Tournef. aët. 1706. t. 7. f. 1. Duham. arb. 1. p. 209. t. 87.

Habitat in Acadia, Noveboraco. †

• LONICERA corymbis terminalibus, foliis ovatis acutis. corymbosa.

Periclymenum foliis acutis, floribus profunde dissectis.

Fewill. peruv. 1. p. 760. t. 45.

Habitat in Peru. †

TRIOSTEUM.

- perfoliatum. 1. **TRIOSTEUM** floribus verticillatis sessilibus.
 Triosteospermum, latiore folio, flore rutilo.
elth. 394. t. 293. f. 378.
Habitat in America septentrionali. †
- angustifolium. 2. **TRIOSTEUM** floribus oppositis pedunculatis.
 Lonicera humilis hirsuta, caule obsoleto rubente
 drato, foliis lanceolatis aduersis, flore luteo
 alas unico. *Gron. virg.* 143.
 Periclymenum herbaceum rectum virginianum.
alm. 287. t. 104. f. 2.
Habitat in Virginia. †

MORINDA.

- umbellata. 1. **MORINDA** erecta, foliis lanceolato-ovatis, pedunculis confertis. *Fl. zeyl.* 81. *
 Bancudus angustifolia. *Rumph. amb.* 3. p. 157. t. 1.
Habitat in India. †
- latifolia. 2. **MORINDA** arborea, pedunculis solitariis. *Fl.* 82.
 Bancudus latifolia. *Rumph. amb.* 2. p. 158. t. 99.
 Coda-pilava. *Rheed. mal.* 1. p. 97. t. 52. *Raj.* 1442.
Habitat in India. †
- Royoc. 3. **MORINDA** procumbens. *Hort. cliff.* 73.
lugdb. 187.
 Morinda americana humifusa laurifolia. *Vail.* 1722. p. 275.
 Royoc humifusum, fructu cupressino. *Phun. spe.*
 Periclymenum americanum, e cujus radice fit atrium.
Pluk. alm. 287. t. 212. f. 4.
Habitat in America calidior. †

CONOCARPUS.

- erecta. 1. **CONOCARPUS** erecta, foliis lanceolatis.
 Conocarpus. *Hort. cliff.* 485.
 Conocarpus foliis oblongis, petiolis brevibus, sic
 in caput conicum. *Brown. jam.* 159.
 Alnus maritima myrtifolia coriariorum. *Pluk. alm.* t. 240. f. 3.

Alni fructu laurifolia arbor maritima. *Sloan. jam.* 135.

hist. 2. p. 18. t. 161. f. 2. *Raj. dendr.* 11.

Rudbekia laurifolia maritima. *Amm. herb.* 581.

Innominata. *Plum. ic.* 135. t. 144. f. 2.

Habitat in Jamaica, Bermudensium, Brasiliæ maritimis. †

CONOCARPUS foliis lanceolato-ovatis obtusiusculis, fructibus sejunctis. *racemosa*

Conocarpus foliis elliptico-ovatis, petiolis biglandulosis, racemis laxis, fructibus sejunctis. *Brown. jam.* 159.

Mangle julifera, foliis ellipticis ex adverso nascentibus. *Sloan. jam.* 156. *hist.* 2. p. 66. t. 187. f. 1. *Raj. dendr.* 115.

Habitat in Jamaica maritimis. †

CONOCARPUS procumbens, foliis subrotundis. *procumbens.*

Rudbeckia supina, foliis subrotundis. *Amm. herb.* 581.

Habitat in Cuba.

ERITHALIS.

ERITHALIS.

fruticosa.

Erithalis fruticulosa, foliis obovatis crassis nitidis oppositis, pedunculis ramosis ad alas superiores. *Brown. jam.* 165. t. 17. f. 3.

Habitat in Jamaica. †

MENAI S.

MENAI S. *Læfl. it.* 306.

topiaria.

Habitat in America meridionali. †

Caules teretes, subvillosi. Folia alterna, ovata, integra, aspera.

GENIPA.

GENIPA.

americana.

Genipa fructu ovato. *Plum. spec.* 20. *ic.* 136.

Janipaba. *Marcgr. bras.* 92. *Pis. bras.* 158.

Habitat in America meridionali. *Monnier.* †

MUSSÆNDA.

MUSSÆNDA. *Herm. zeyl.* 36. *Fl. zeyl.* 84.

frondosa.

Mussænda zeylanica, flore rubro, folio ex florum thyrsis prodeunte albo. *Burm. zeyl.* 165. t. 76.

Fo-

Folium principissæ. *Rumph. amb. 4. p. III. t. 51.*
 Bellilla. *Rheed. mal. 2. p. 27. t. 18. Raj. hist. 149.*
dendr. 126.

Habitat in India. †

MIRABILIS.

Jalapa.

1. MIRABILIS floribus congestis terminalibus erectis.
 Mirabilis. *Hort. cliff. 53. Hort. upf. 43. Fl. zeyl. 85. M.*
m-d. 76. Rumph. amb. 5. p. 253. t. 89. Osb. it. 21.
 Nyctage. *Roy. lugdb. 417. Cold. noveb. 29.*
 Solanum mexicanum, flore magno. *Bauh. pin. 11.*
 Admirabilis peruviana. *Clus. hist. 2. p. 87.*
Habitat in India utraque. †
Flores terminales, subseni, congesti absque interjectis
foliolis, nec folio longiores.

dichotoma.

2. MIRABILIS floribus sessilibus axillaribus erectis
 solitariis. *Amæn. acad. 4. p. 267. **
 Admirabilis Jasmini rosa. *Clus. hist. 2. p. 90.*
 Jalapa officinarum. *Mart. cent. 1. t. 1.*
 Solanum mexicanum, flore parvo. *Bauh. pin. 11.*
prodr. 91.
Habitat in Mexico. †
Simillima M. Jalapæ. Flores noctu fragrantissimi.

longiflora.

3. MIRABILIS floribus congestis terminalibus longis
 simis nutantibus, foliis subvillofis. *act. Holm.*
1756. p. 176. t. 6. f. 1. Amæn. acad. 4. p. 268.
 Alzoyatl, Mirabilis mexicana. *Hern. mex. 170. f.*
Habitat in Mexicæ frigidis montibus. Monnier. †

CORIS.

monspeliensis.

1. CORIS. *Hort. cliff. 68. Hort. upf. 46. Mat. med. 1.*
Roy. lugdb. 304. Sauv. monsp. 46.
 Coris cærulea maritima. *Bauh. pin. 280.*
 Symphytum petræum. *Cam. epit. 699.*
Habitat in Europæ australis arenosis maritimis. ☉
Caulis ruber. Folia alterna, linearia, crassiuscula
patentia. Flores spicati.

VERBASCUM.

Thapsus.

1. VERBASCUM foliis decurrentibus utrinque tomentosis.
Vir. cliff. 13. Fl. svec. 186, 195. Mat. med. 90.
Roy. lugdb. 421. Dalib. paris. 71.

Ver

Verbascum caule simplici superne floribus sessilibus clavato, foliis utrinque lanigeris. *Hort. cliff.* 55.

Verbascum mas latifolium luteum. *Bauh. pin.* 239.

Verbascum latius. *Dod. pemp.* 153.

Habitat in Europæ glareosis sterilibus. ♂

VERBASCUM foliis cuneiformi-oblongis. *Hort. lychnitis.*
upf. 45. *Fl. svéc.* 2. p. 196.

Verbascum foliis ovato-acutis subtus villosis crenatis, spicis laxis lateralibus & terminalibus. *Hort. cliff.*

54. *Roy. lugdb.* 421. *Dalib. paris.* 71.

Verbascum pulverulentum, flore luteo parvo. *Bauh. hist.* 3. p. 812. *Raj. hist.* 1094.

Verbascum mas, angustioribus foliis, floribus pallidis. *Bauh. pin.* 239.

Verbascum lychnitis, flore albo parvo. *Bauh. pin.* 240.

Verbascum candidum femina. *Fuch. hist.* 847.

Phlomis mas alter. *Lob. ic.* 562.

Habitat in Europæ ruderatis cultis. ♂

VERBASCUM foliis ovatis utrinque tomentosis: phlomoïdes inferioribus petiolatis.

Verbascum femina, flore luteo magno. *Bauh. pin.* 239.

Verbascum montanum tomentosum & incanum, folio subrotundo, caule non alato, staminibus purpureis. *Till. pif.* 171.

Habitat in Italia. ♂

caulis erectus, spicatus, valde tomentosus. Folia ovata, minime cordata, crenata: inferiora petiolata petiolo supra plano; superiora sessilia, semiamplexicaulia, non decurrentia. Racemus spiciformis ex Bracteis sparsis, lanceolatis. Flores intra singulas bractæas quatuor, quorum intermedius primum, tum infimus, demum laterales florent. Capsulæ oblongæ.

VERBASCUM foliis oblongo-cordatis petiolatis. nigrum. *Mat. med.* 91.

Verbascum foliis ovatis crenatis subtus tomentosis, caule angulato. *Vir. cliff.* 13. *Fl. svéc.* 187, 197.

Roy. lugdb. 421. *Dalib. paris.* 91.

Verbascum foliis ovatis subtus incanis crenatis, spica laxa rarius ramosa. *Hort. cliff.* 54.

Verbascum nigrum, flore ex luteo purpurascente. *Bauh. pin.* 240.

Habitat in Europa ad pagos, vias. 24

- phoeniceum 5. VERBASCUM foliis ovatis crenatis radice caule subnudo racemoso.
 Verbascum foliis ovatis crenatis nudis scabris, ramofo. *Hort. cliff.* 55.
 Blattaria perennis, flore violaceo. *Morif. hij.* 497.
 Blattaria purpurea. *Bauh. pin.* 241. *Raj. hist.* 10
Habitat in Europa orientali. ♂
Blattariæ nimis affinis.
- Blattaria. 6. VERBASCUM foliis amplexicaulibus oblongis, pedunculis solitariis. *Hort. upf.* 46.
 Verbascum annuum, foliis oblongis sinuatis
Hort. cliff. 15. *Guett. stamp.* 2. p. 309.
 Verbascum foliis glabris serrato-dentatis, radiis sinuatis. *Roy. lugdb.* 421. *Dalib. paris.* 72. *monsp.* 276.
 Blattaria lutea, folio longo laciniato. *Bauh. pi.*
- ♂. Blattaria alba. *Bauh. pin.* 241.
Habitat in Europæ australioris argillaceis. ☉
- Arcturus. 7. VERBASCUM foliis lyrato-pinnatis.
 Verbascum humile creticum laciniatum. *Ba.* 240.
 Verbascum brassicæ folio. *Column. ephr.* 2. p. 8.
 Verbascum sylvestre creticum. *Alp. exot.* 123.
Habitat in Creta.
- spinofum. 8. VERBASCUM caule folioso spinoso fruticeo.
Amæn. acad. 4. p. 307.
 Verbascum creticum spinosum frutescens. *T. cor.* 8.
 Verbascum spinosum creticum. *Lob. illust.* 113.
 Leucojum creticum spinosum incanum
Bauh. pin. 201.
 Leucojum spinosum. *Alp. exot.* 37. t. 36.
 Glastivida 1. cretica. *Pon. ital.* 114.
Habitat in Creta. ♀
- sinuatum. 9. VERBASCUM foliis radicalibus pinnatifidis tomentosis, caulibus amplexicaulibus nudis rameis primis oppositis.
 Verbascum foliis pinnato-sinuatis hirsutis: subtomentosis. *Roy. lugdb.* 421. *Sauv. monsp.* 276.
 Verbascum nigrum, foliis papaveris corniculatis
pin. 240. *Camer. hist.* 403. t. 403.

Verbascum græcum fruticosum, folio sinuato candidissimo. *Tournef. cor. 8. itin. 1. p. 335. t. 335.*

Habitat Monspeli, Florentiæ. ♂

Folia radicalia repanda s. obtuse sinuato-pinnata; Caulina oblonga, undulata, basi utrinque parum decurrentia. Ramea ovata s. cordata, parum decurrentia: horum prima opposita; reliqua alterna.

VERBASCUM foliis incisus nudis, caule folioso, calycibus lanatis, pedunculis bifloris. *Osbeckii* *Osb. it. 52.*

Lattaria orientalis, bugulæ folio, flore maximo virescente lituris luteis in semicirculum striato. *Tournef. cor. 8. it. 2. p. 83. t. 83. Buxb. cent. 5. p. 17. t. 32.*

Habitat in Hispania; circa Bosphorum.

VERBASCUM foliis lanatis radicalibus, scapo nudo.

Cortufa foliis ovatis sessilibus. *Hort. cliff. 50. Roy. lugdb. 417.*

anicula alpina, foliis boraginis, villosa. *Bauh. pin. 243.*

Auricula urfæ myconi. *Dalech. hist. 837. Bauh. hist. 3. p. 869.*

Habitat in Pyrenæorum nemorosis. 24

D A T U R A.

DATURA pericarpis spinosis erectis ovatis: spinis supremis maximis convergentibus. *Amæn. acad. 3. p. 403. **

Datura cochiniensis spinosissima. *Zanon. hist. 1. p. 76*
stramonium s. Datura ferox, pomo crassioribus aculeis robustioribus. *Hern. lugdb. 583. Moris. hist. 3. p. 607. f. 15 t. 2. f. 4. Raj. hist. 748.*

stramonium ferox *Bocc. sic. 50.*

stramonium longioribus aculeis. *Barr. rar. 109. t. 1112.*

Habitat in China. ☉

similis D. Stramonio, sed minus glabra & Capsule 4 spinis supremis maximis: in mea erectæ erant.

DATURA pericarpis spinosis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. *Hort. cliff. 55. Hort. ups. 43. Fl. sv. c. 185. 198. Gron. virg. 23. Roy. lugdb. 422. Dalib. parif. 70.* *Stramonium*

Solanum foetidum, pomo spinoso oblongo, flore
bo. *Bauh. pin.* 168.

Tatula, *Cam. epit.* 176.

Habitat in America, nunc vulgaris per Europam.

Tatula. 3. **DATURA** pericarpis spinosis erectis ovatis, fr
cordatis glabris dentatis.

Solanum fativum, pomo spinoso oblongo, flore
Bauh. pin. 168?

Stramonium majus purpureum. *Raj. hist.* 748.

Habitat - - - - - ○

*Similis D. Stramonio, sed duplo major. Caulis
purascens, punctis albis adpersus, ad angulum
tum divisus, laevis. Corollae pallide caeruleae. F
argutius dentata, si complanenter cordata.*

Metel. 4. **DATURA** pericarpis spinosis nutantibus glob
foliis cordatis subintegris pubescentibus. *Flor.*
55. *Hort. ups.* 44. *Fl. zeyl.* 85. *Mat. med.* 85.
Juglb. 422.

Datura alba. *Rumph. amb.* 5. p. 242. t. 87.

Solanum pomo spinoso rotundo, longo flore. 11
pin. 168.

Hummatu. *Rheed. mal.* 2. p. 47. t. 28.

Habitat in Asia, Africa. ○

istuosia. 5. **DATURA** pericarpis tuberculatis nutantibus gl
sis, foliis laevibus.

Datura rubra. *Rumph. amb.* 5. p. 243.

Solanum foetidum, fructu spinoso rotundo, se
pallido. *Bauh. pin.* 168.

Nux Metella. *Cam. epit.* 175.

β. *Solanum aegyptiacum*, flore pleno. *Bauh. pin.*

Stramonium fructu spinoso rotundo, flore dupli
plicive. *Tournef. inst.* 119.

Habitat in Aegypto. ○

*Corolla extus violacea, intus alba, sepe gemina
intra alteram s. duplicata.*

arborea. 6. **DATURA** pericarpis inermibus nutantibus,
arboreo.

Stramonionides arboreum, oblongo & integro fr
fructu laevi. *Fewil. peruv.* 2. p. 761. t. 46.

Habitat in Peru. ⚭

HYOSCYAMUS.

HYOSCYAMUS foliis amplexicaulibus sinuatis, niger.
 floribus sessilibus. *Hort. cliff.* 56. *r. l. svec.* 184, 199.
Mat. med. 86. *Roy. lugdb.* 422. *Dalib. parif.* 70.
Hall. helv. 512.

Hyoscyamus vulgaris & niger. *Bauh. pin.* 169.

Habitat in Europæ ruderatis pinguibus. ♂

HYOSCYAMUS foliis caulinis petiolatis cordatis reticulatus.
 sinuatis acutis; floralibus integerrimis, corollis
 ventricosis.

Hyoscyamus foliis caulinis lanceolatis subdentatis, radicalibus sinuato-dentatis. *Gron. orient.* 51.

Hyoscyamus, cauliculis spinosissimis, ægyptiacus:
Bauh. pin. 169.

Hyoscyamus ægyptius. *Raj. hist.* 713.

Hyoscyamus rubello flore. *Bauh. pin.* 169.

Hyoscyamus peregrinus. *Clus. p. n.* 502.

Hyoscyamus peculiaris Cam. hort. 77: t. 22.

Habitat in Creta, Syria, Ægypto. ☉

Similis H. nigro, sed Folia caulina ovata, repanda, supra magis glabra; Floralia ovata, sessilia, integra. Flores pedunculo brevissimo. Corollæ campanulatae, rubrae, venis obicuris pulchre reticulatae.

HYOSCYAMUS foliis petiolatis sinuatis obtusis, albus.
 floribus subsessilibus. *Hort. cliff.* 56. *Roy. lugdb.* 422.
Sauv. monsp. 275.

Hyoscyamus albus major. *Bauh. pin.* 169.

Hyoscyamus albus minor. *Bauh. pin.* 169.

Hyoscyamus albus vulgaris. *Clus. hist.* 2. p. 118.

Habitat in Europa australi. ☉

Variat Corollæ fauce atropurpurea & viridi.

HYOSCYAMUS foliis petiolatis eroso-dentatis acutis aureus.
 floribus pedunculatis, fructibus pendulis. *Flort.*
cliff. 56. *Roy. lugdb.* 422.

Hyoscyamus creticus luteus major. *Bauh. pin.* 169:
prodr. 92.

Hyoscyamus albus creticus. *Clus. hist.* 2. p. 84:

Hyoscyamus creticus luteus minor. *Bauh. pin.* 169:

Hyoscyamus aureus. *Alp. exot.* 99. t. 98:

Habitat in Creta, Oriente. ♂

Caulis biennis, pilosus pedalis: Petioli valde pilosi. Folia lobata; denticulata: Pedunculi laterales pedalis.
mai Spec. plant. pars I. R tto-

*tiolorum, erecti sub flore, omnino destexi sub
ctu. Corolla flavissima, aurea, fauce atropur
striata, limbo semiquinquefido: lobo exteriori
re: sinu inferiore ultra limbum secto, ut in Teu
ad quod stamina & pistillum longissimum declina:*

- puffillus.** 5. **HYOSCYAMUS** foliis lanceolatis dentatis: flora inferioribus binis, calycibus spinosis. *Hort. upl*
Hyoscyamus foliis lanceolatis. *Hort. cliff. 56. lugdb. 422.*
Hyoscyamus puffillus aureus americanus, antirrhilii glabris. *Pluk. alm. 188. t. 37. f. 5.*
Habitat in Persia. ☉
- physalodes.** 6. **HYOSCYAMUS** foliis ovatis integerrimis, cibus inflatis subglobofis. *Hort. upl. 44. **
Habitat in Sibiria. 4

NICOTIANA.

- puffilla.** 1. **NICOTIANA** foliis oblongo-ovalibus radicalibus floribus racemosis acutis.
Nicotiana foliis ovato-lanceolatis obtusis rugosis calycibus brevissimis. *Mill. ic. 185. f. 2.*
Habitat in Vera cruce.
- fruticosa.** 2. **NICOTIANA** foliis lanceolatis subpetiolatis axillaribus, floribus acutis, caule fruticoso.
Nicotiana foliis lineari-lanceolatis acuminatis semplexicaulibus, caule fruticoso. *Mill. dict.*
Habitat ad Cap. b. spei, China. †
Simillima N. Tabaco, ut fere varietas basi persisten
- Tabacum.** 3. **NICOTIANA** foliis lanceolato-ovatis sessilibus currentibus, floribus acutis.
Nicotiana foliis lanceolatis. *Hort. cliff. 56. Hort. 45. Mat. med. 87. Roy. lugdb. 423. Sp. pl. 1. p. 180.*
Nicotiana major latifolia. *Bauh. pin. 169.*
Blennochoes. *Reneal. spec. 37. t. 38.*
Habitat in America, nota Europæis ab 1560. ☉
- ruffica.** 4. **NICOTIANA** foliis petiolatis ovatis integerrimis floribus obtusis.
Nicotiana foliis ovatis. *Hort. cliff. 56. Hort. upl. Roy. lugdb. 423. Sp. pl. 1. p. 180.*
Nicotiana minor. *Bauh. pin. 170.*

phylla *Reneal. spec.* 40.

at in America, nunc in Europa. ☉

OTIANA foliis petiolatis cordatis integerrimis, paniculata.
ribus paniculatis obtusis clavatis.

tiana foliis cordatis, floribus paniculatis: tubis
vatis. *Sp. pl.* 1. p. 180.

tiana minor, folio cordiformi, tubo floris præ-
gò. *Fewill. peruv.* 1. p. 717. t. 10.

at in Peru. ☉

t a *N. rustica* Caule teneriore, altiore, paniculato.
rollis angustioribus: limbo brevissimo, obtusissimo,
longo clavato; calycibus capsulisque acutis.

OTIANA foliis petiolatis cordatis integerrimis, glutinosa.
ribus racemosis secundis ringentibus.

tiana foliis cordatis, corollis racemosis subringen-
is, calycibus inæqualibus. *Sp. pl.* 1. p. 181.

tiana militaris. *Act. holm.* 1753. p. 41. t. 2.

at in Peru. *B. Jussieu.* ☉

magis cordata, glutinosa. Flores in racemos pau-
longos. Corollæ ferme speciei primæ, sed magis
uales & fere ringentes, fauce hiantes. Stamina
latus superius inflexa. Calycis una lacinia reli-
s duplo major.

OTIANA foliis petiolatis cordatis crenatis, ra-
nis recurvatis caule aculeato pruriginoso frute-
nte. urens.

tiana arborescens spinosissima, flore exalbido.
m. spec. 3. ic. 211.

at in America meridionali. †

ificatio Racemis secundis revolutis, Corollis cam-
ulatis, Foliaque cordata præcedentis, sed crenata
tota arbor aculeata.

A T R O P A.

LOPA acaulis, scapis unifloris.

ragora. *Hort. cliff.* 51. *Roy. lugdb.* 423. *Mat. med.*
Sp. pl. 1. p. 181.

ragora fructu rotundo. *Bauh. pin.* 169.

ragoras. *Dod. pempt.* 457.

at in Hispaniæ, Italiæ, Cretæ, Cycladum apri-

Mandragora

- Belladonna. 2. **ATROPA** caule herbaceo, foliis ovatis integris.
Atropa. Hort. cliff. 57. Hort. upf. 45. Roy. lugdb. 423.
Solanum melanocerafus. Bauh. pin. 166.
Solanum lethale. Cluf. hift. 2. p. 86.
Habitat in Auftriæ, Angliæ, Italiæ montibus fyl-
fis. 2
- Physalodes. 3. **ATROPA** caule herbaceo, foliis sinuato-angulatis
 calycibus clausis acutangulis.
Alkekengi amplo flore violaceo. Few. peruv. 724. t.
Habitat in Peru. B. Juffieu. ☉
Radix fibrofa, annua. Caulis bipedalis, patulus,
Ætus, ramis angulatis. Folia alterna, glabra, oblonga,
per petiolum decurrentia, obtufe finuata (Datum)
Pedunculi ad latus petiolorum, folitarii, nudis,
flori. Calyx ovatus, bafi excifus, angulis quin-
compressis, profunde 5-partitus: foliolis sagittato-
tis. Corolla campanulata, parum quinqueloba, a-
fa: Limbo erecto, subplicato, cærulefcence. Stam-
5, subulata, bafi dilatata, subvillofa, corolla longè
viora, superne divergentia. Antheræ erectæ. O-
men intra basin flaminum. Stylus filiformis longius-
ne flaminum. Stigma capitatum. Fructus cerum-
tectus calyce majore, quinquangulari angulis compr-
arctè clausis, bafi mucronatis. Bacca exfucca, 3-
5-locularis. Semina subrotunda, compressa. Mee-
inter Atropam & Physalidem; a Physalide differt fo-
ra corollæ, flaminibus distantibus, calyce quinquepar-
to, capsula loculamentis pluribus.
- frutescens. 4. **ATROPA** caule fruticoso, pedunculis confertis
 foliis cordato-ovatis obtusis.
Bella-donna frutescens rotundifolia hispanica. To-
nes. inf. 77. Barr. ic. 1173.
Habitat in Hispania. †
Habitus & omnia Physalidis somniferæ, ut limites
nerum in solo calyce quinquepartito.
- arborefcens. 5. **ATROPA** caule frutescente, pedunculis confertis
 corollis revolutis, foliis oblongis. *Amæn. acad.*
p. 307.
Bella-donna frutescens, flore albo, nicotianæ foli-
Plum. spec. 1. ic. 46. f. 1.
Habitat in America meridionali. †

PHYSALIS.

* *perennes.*

PHYSALIS caule fruticoso, ramis rectis, floribus somniferis confertis.

alis caule fruticoso tereti, foliis ovatis integerrimis, floribus confertis. *Hort. cliff.* 62. *Roy. lugdb.* 5.

um somniferum verticillatum. *Bauh. pin.* 166.

um somniferum. *Cus. hist.* 2. p. 85.

at in Mexico, Creta, Hispania. *h*

us Physalidis; Flos Atropæ; Herba præcedentis, ita similis, ut vix genere separari queat.

PHYSALIS caule fruticoso, ramis flexuosis, floribus flexuosis; confertis.

fera indica, floribus ad foliorum exortus, fructu sulcato decapyreno. *Raj. hist.* 1632.

tti. *Rheed. mal.* 4. p. 113. t. 55.

at in India. *h*

us *♀* statura *P. somniferæ*; Flores itidem sparsi axillis foliorum; Calyces etiam nascuntur *♀* inveniunt baccam; manifeste vero differt floribus minoribus, ramis bifariam valde flexuosis, hinc folia quasi sic disposita, flexuræ angulis exterioribus inserta.

PHYSALIS caule fruticoso, foliis ovatis pilosis, ramis arborescens. floribus subsolitariis, corollis revolutis.

alis foliis ovato-lanceolatis integerrimis oppositis, caule fruticoso. *Mill. dict.* t. 206. f. 2.

at in Campechia. *h*

PHYSALIS caule fruticoso, foliis ovatis tomentosis, ramis curassavica. r. *cliff.* 16. *Roy. lugdb.* 426.

alis caule perenni, foliis ovatis solitariis, ramis rotundis simplicissimis. *Hort. cliff.* 62. *

um vesicarium curassavicum, solano antiquo non simile. foliis origani subincanis. *Morij. hist.* 3. 527. *Pluk. alm.* 352. t. III. f. 5.

at in Curassao. *h*

PHYSALIS foliis geminis repandis obtusis subto-mentosis, caule herbaceo superne paniculato, ramis viscosa.

alis foliis cordatis integerrimis obtusis scabris, ramis glabris. *Sp. pl.* 1. p. 183.

Physalis radice perenni, foliis cordatis obtusis, cliff. 496. Roy. lugdb. 426. Gron. virg. 24.

Alkekengi bonariense repens, bacca turbinata v. *Dill. elth. II. t. 10. f. 10.*

Habitat in Virginia, Bonaria. 4.

Alkekengi. 6. *PHYSALIS* foliis geminis integris acutis, cauceo inferne supramoso.

Physalis caule simplici annuo, foliis integerrimis natis, floribus solitariis. Hort. cliff. 62. Hort. Mat. med. 93. Dalib. paris. 73.

Physalis radice perenni, foliis lanceolato cordatis cliff. 16. Roy. lugdb. 426.

Solanum vesicarium. Bauh. pin. 166. Dod. pem.

Habitat in Italiæ, Germaniæ, Japoniæ scrobibus

Calyces maturi fructus saturatissime sanguinei.

* * *Annua*

angulata. 7. *PHYSALIS* ramosissima, ramis angulatis glabris ovatis dentatis.

Physalis annua ramosissima, ramis angulosis glabris dentato-ferratis. Hort. cliff. 62. Hort.

Fl. zeyl. 97. Roy. lugdb. 427.

Halicacabum s. Solanum indicum. Cam. hort. 70

Solanum vesicarium indicum. Bauh. pin. 166.

Alkekengi indicum glabrum, chenopodii foliis *clth. 13. t. 12. f. 12.*

β. Alkekengi indicum glabrum, capsicii folio. *l. 12. t. 11. f. 11.*

Habitat in India utraque. ☉

pubescens. 8. *PHYSALIS* ramosissima, foliis villoso-viscosis pendulis.

Physalis annua ramosissima, ramis teretibus pubescentibus: geniculis nodosis. Hort. cliff. 62.

Alkekengi virginianum, fructu luteo. *Fewill. p. 5. t. 1.*

Solanum vesicarium virginianum procumbens: folio lanuginoso. Moris. hist. 3. p. 527. f.

f. 24.

Habitat in India utraque, imprimis in Virginia.

Fructus villoso-viscosus, nec glaber; macule fuscae, nec pallidae. Pedunculi nutantes, ne

PHYSALIS ramosissima, pedunculis fructiferis folio villoso longioribus. *Hort. cliff.* 62. *Roy. lugdb.* 427. Solanum vesicarium indicum minimum. *Herm. lugdb.* 569. t. 571.

minima.

Pee- inota - inodien. *Rheed. mal.* 10. t. 140. f. 71.

Habitat in Indiæ aridis sordidis. ☉

PHYSALIS ramosissima, foliis villosis, pedunculis strictis. pruinosa.

Alkekengi indicum glabrum, chenopodii folio. *Dill. elth.* 12. t. 12. f. 12.

Habitat in America. ☉

Facies antecedentium 7, 8, 9, sed antheræ flavæ, nec cæruleæ; rami teretes: supra plani villosi; Folia villoso-viscosa; Alæ ramificationum viridi quasi pruinosa germinant. Pedunculi floriferi longi, erecti, stricti. Flores cernui. Calyces fructus maximi, quinquanguli, pedunculo stricto penduli.

SOLANUM.

* inermia.

SOLANUM caule inermi fruticoso, foliis ovatis tomentosis integerrimis, umbellis compositis. verbascofolium.

Solanum arborecens, verbasco folio. *Plum. spec.* 4.

Solanum maxime tomentosum, spinis carens, virginianum. *Pluk. alm.* 351. t. 216. f. 1.

Habitat in America. †

SOLANUM caule inermi fruticoso, foliis ovatis integerrimis; pedunculis lateralibus filiformibus. guineense.

Solanum caule inermi perenni, foliis ovatis integris, floribus ad basin ramulorum confertis. *Roy. lugdb.*

424.

Solanum africanum lignosum, folio atroviridi angusto oblongo obtuso. *Berh. lugdb.* 2. p. 68.

Habitat in Guinea. †

SOLANUM caule inermi fruticoso, foliis lanceolatis repandis, umbellis sessilibus. Pseudocapsicum.

Solanum caule inermi fruticoso, foliis ovato-lanceolatis integris, floribus solitariis. *Hort. cliff.* 61. *Hort. upf.* 48. *Roy. lugdb.* 424.

Solanum fruticosum bacciferum. *Bauh. pin.* 61.

Pseudocapsicum. *Dod. pempt. 718.*

Habitat in Madera. †

diphyllum. 4. SOLANUM caule inermi fruticoso, foliis geminis altero minore, floribus cymosis.

Solanum caule inermi perenni, foliis ovato-lanceolatis geminis: altero minimo. *Vir. cliff. 15. H. cliff. 61. Roy. lugdb. 424.*

Solanum americanum strychnodendro accedens, fructu medio quasi fisso. *Pluk. alm. 549. t. III. f. mala.*

Habitat in America? †

Dulcamara. 5. SOLANUM caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. *H. cliff. 6c. Fl. suec. 189, 201. Mat. med. 95. R. lugdb. 424. Dalib. parif. 73.*

Solanum scandens s. Dulcamara. *Bauh. pin. 167.*

β. Solanum dulcamarum africanum, foliis crassis hastatis. *Dill. eth. 365. t. 272. f. 352.*

Habitat in Europæ ssepibus humentibus. †

quercifolium. 6. SOLANUM caule inermi herbaceo angulato flexuoso scabro, foliis pinnatifidis, racemis cymosis.

Solanum foliis quernis. *Few. peruv. 722. t. 15.*

Habitat in Peru. D. Jussieu. 24

Habitus S. Dulcamaræ. Caules angulati, erecti, scabri. Folia oblonga, in petiolum decurrentia, venosa, supra, subtus scabra, pinnatifida. Pedunculi racemosi. Corollæ violacææ, obtusiores quam Dulcamaræ: masculis duobus viridibus ad basin singuli lobi. Antheræ breviores. Baccæ ovatæ.

radicans. 7. SOLANUM caule inermi herbaceo lævi teretiusculo prostrato radicante, foliis pinnatifidis, racemis cymosis. *Linn. decad. I. t. 10. **

Habitat in Peru. 24

bonariense. 8. SOLANUM caule subfrutescente subinermi, fructu cuneiformibus sinuato-repandis.

Solanum bonariense arborefcens, papas floribus. *Dill. eth. 364. t. 272. f. 351.*

Solanum arborescens, foliis angulatis, fructu aurantio. *Plum. spec. 4. ic. 224. f. 2.*

Habitat in agro Bonariensi. †

ia ☉ Flores maximi; Aculei aliquot in tenella planta, on vero in adulta. Flores plures steriles. Fructus lobosi, grandes, lutei.

LANUM caule inermi herbaceo, foliis ovatis æthiopicum
 expando-angulatis, pedunculis fertilibus unifloris
 erui. *Amæn. acad.* 4. p. 367. *

num pomiferum, fructu rotundo striato duro.
Bauh. pin. 167. *Bauh. hist.* 3. p. 620.

num pomiferum herbariorum. *Lob. ic.* 263.

itat in Æthiopia. *Burserus.* China. ☉

lis rigidulus. Folia *S. bonariensis*, *palmaria*, obtu-
 . Fructus ruber, magnus, depressus, profunde to-
 losus ☉ quasi in lobos sectus, durus.

LANUM caule inermi herbaceo, foliis pinna- tuberosum.
 s integerrimis, pedunculis subdivisis. *Vir. cliff.*
 . *Hort. cliff.* 60. *Hort. ups.* 48. *Roy. lugdb.* 423.
alib. paris. 73.

num tuberosum esculentum. *Bauh. pin.* 167. *prodr.*
 . t. 89.

itat in Peru: innotuit 1590. *C. Bauhino.* ☉. 24

LANUM caule inermi herbaceo, foliis pinna- Lycoperfi-
cum.
 s incis, racemis simplicibus. *Vir. cliff.* 15. *Hort.*
iff. 60. *Roy. lugdb.* 423.

num pomiferum, fructu rotundo striato molli.
Bauh. pin. 167.

num amoris. *Cam. epit.* 821. *Rumph. amb.* 5. p.
 16. t. 154. f. 1.

lanum racemosum cerasorum forma. *Bauh. pin.*
 57. *prodr.* 90. .

itat in America calidiore. ☉. β. 24

LANUM caule inermi herbaceo, foliis pinna- pimpinelli-
folium.
 s integerrimis, racemis simplicibus. *Amæn. acad.*
 . p. 268. *

itat in Peru. †

LANUM caule inermi herbaceo, foliis pinna- peruvianum
 is tomentosis incis, racemis bipartitis foliosis,
 accis subpilosis.

lycoperficon pimpinellæ folio. *Few. peruv.* 3. p. 37.
 25.

itat in Peru. *B. Jussieu.* 24

lix perennis, vix vel parum supra radicem fruti-
 ns. Folia pinnata, tomentosa, incana, pinnata
 R 5 abs-

- absque foliolis alternis minutis. Racemi bip
foliolo ad quemcumque pedicellum ovato. Co
late flavæ, multo majores quam in Lycopersico.*
- montanum. 14. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis fu
datis repandis.
Solanum tuberosum minus, atriplicis folio, vulg
pa montana. *Ferv. peruv. 3. p. t. 46.*
Habitat in Peru. 21
- nigrum. 15. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis o
dentato-angulatis, umbellis nutantibus.
vulgatum. Solanum caule inermi herbaceo, foliis ovatis an
tis. *Vir. cliff. 15. Hort. cliff. 60. Hort. upf.*
Fl. svec. 188, 200. Mat. med. 94. Gron. virg.
Roy. lugdb. 433. Dalib. parif. 72.
Solanum officinarum. *Bauh. pin. 166.*
- patulum. 13. — ramis teretibus glabris, foliis integerrimis gla
Solanum procerius patulum vulgaris fructu. *Dill.*
367. t. 275. f. 355.
- villosum. 17. — ramis teretibus villosis, foliis angulatis subvillosis
Solanum annuum hirsutius, baccis luteis. *Dill.*
366. t. 274. f. 353.
- guineense. 18. — ramis angulatis dentatis, foliis integerrimis gla
Solanum guineense, fructo magno instar cerasi. *Dill.*
elth. 360. t. 274. f. 354.
- virginicum. 19. — ramis angulatis dentatis, foliis repandis glabris.
Solanum nigrum vulgari simile, caulibus exasper
Dill. elth. 368. t. 275. f. 256.
- judaicum. 20. — ramis aculeis incurvis, foliis repandis nudis.
Habitat in Orbis totius cultis. ☉
*Tot varietates 17. 18. 19. 20. videntur esse hybride
les.*

* * Spinosa.

- Melongena. 16. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis o
tomentosis integris, calycibus aculeatis, fructu
dulo.
Solanum calycibus aculeatis, foliis ovatis integ
mis tomentosis. *Hort. cliff. 61. Hort. upf. 49*
zeyl. 93. Roy. lugdb. 426.
Solanum pomiferum, fructu oblongo. *Bauh. pin.*
Mala insana. Dod. pempt. 458.
Trongum hortense. *Rumph. amb. 5. p. 238. t. 85.*
Habitat in Asia, Africa, America. ☉

SOLANUM caule aculeato herbaceo, foliis cordatis angulatis tomentosis aculeatis, baccis hirtis calyce obtectis.

ferox.

Habitat in Malabar.

Statura S. Melongene. Caulis herbaceus. Folia cordata, angulata, ampla, petiolata, venis aculeis erectis adspersa, supra villosa, subtus tomentosa. Aculeati sunt petioli, pedunculi, calyces. Pedunculi axillares, simplices, breves. Calyces campanulati, tomentosi, valide aculeati, obtegentes totas baccas. Baccæ admodum hirtæ.

SOLANUM caule aculeato herbaceo hirtio, foliis cordatis sinuatis subtomentosis, calycibus aculeatis finis. *Vir. cliff. 16. Hort. cliff. 61.*

Campechiense.

Solanum campechiense, calycibus echinatis. Dill. elth. 261. t. 268. f. 347.

Habitat in America ad sinum Campechiensem.

Folia utrinque testâ setis stellatis divergentibus.

SOLANUM caule aculeato herbaceo, foliis cordatis angulato-lobatis: utrinque villosis aculeatis. *Vir. cliff. 15. Hort. cliff. 61. Hort. ups. 49. Roy. lugdb. 425.*

mammosum

Solanum barbadosense spinosum annuum, fructu aureo rotundiore pyri parvi inverfi forma & magnitudine.

Pluk alm. 350. t. 225. f. 1. Merian. surin. 27. t. 27.

Habitat in Virginia, Barbados. ☉

Folia longitudine & latitudine æqualia, obtusiuscula.

SOLANUM caule petiolisque aculeatis, foliis sinuato-angulatis supra glabris, floribus paniculatis. *urepeba. Pis. bras. 181.*

paniculatum.

Habitat in Brasilia.

Caulis & Petioli albo-tomentosi aculeis rectis, varioribus, nudis. Folia tomentosa, lata, cordata, profunde angulata, acutiuscula, inermia, supra glabra. Panicula terminalis, composita, tomentosa, uti Calyces inermis.

SOLANUM caule aculeato herbaceo, foliis pinatifidis utrinque aculeatis: laciniis sinuatis obtusis, calycibus aculeatis. *Roy. lugdb. 425. **

virginianum.

Solanum americanum laciniatum spinosissimum. Dill. elth. 360. t. 267. f. 346.

Solanum annuum virginianum nigricans spinum, flore cæruleo. *Pluk. alm. 351. t. 62. f.*
Habitat in America. ☉

indicum. 22. SOLANUM caule aculeato fruticoso, foliis ciformibus angulatis subvillosis integerrimis: acutis utrinque rectis. *Fl. zeyl. 94. **

Solanum caule aculeato fruticoso, foliis ovatis integerrimis: spinis utrinque erectis. *Hort. 61. Roy. lugdb. 424.*

Solanum indicum spinosum, flore boraginis. *Rob. 28. Dill. elth. 362. t. 270. f. 349.*

Solanum americanum perenne subincanum, fructu riformi longiore, spinis plurimis armatum. *alm. 350. t. 225. f. 6.*

Habitat in India utraque. ☿

fasciatum. 23. SOLANUM caule aculeato fruticoso, foliis c. obtuse lobatis: aculeis utrinque rectis: superbus coloratis.

Solanum americanum, caule & pedunculo nigro liis acanthi spinosis. *Berh. lugdb. 2. p. 68.*

Habitat in America. ☿. ☉

Rami varie spinosi, latere solari fuscescentes. Folia panda, sinuata, obtusa, utrinque viridia: Spinis superiore pagina late purpureis, saepe fascia percinctis. Pedunculi spinis validioribus. Flores laevi.

carolinense. 24. SOLANUM caule aculeato annuo, foliis haec angulatis: aculeis utrinque tectis, racemis laxi

Solanum caule aculeato fruticoso, foliis ovatis ribus laciniatis: aculeis utrinque rectis. *Hort. 61. * Vir. cliff. 15. Roy. lugdb. 424.*

Solanum carolinense spinosum, boraginis floribus catis. *Dill. elth. 362. t. 269. f. 348.*

Habitat in Carolina. ☉

Caulis quasi fruticosus, sed annuus. Folia basi im sinuata angulis acutiusculis, spinis in costa nec late. Racemi foliis longiores laxi, simplices.

sodomeum. 25. SOLANUM caule aculeato fruticoso, foliis obtis pinnatifido-sinuatis obtusis sparse aculeatis in calycibus aculeatis.

Solanum caule aculeis recurvis, foliis sinuatis in

mentosis undique aculeatis, pedunculis aculeatis.

Zeyl. 95. * *Hort.* *upf.* 49.

um caule aculeato fruticoso, foliis oblongis pin-

o-laciniatis: spinis supinis erectis. pronis recur-

Hort. cliff. 61. *Vir. cliff.* 15. *Roy. lugdb.* 424.

um pomiferum frutescens africanum spinosum ni-

ans, boraginis flore, foliis profunde laciniatis.

em. lugdb. 573. t. 575. *Morif. hist.* 3. p. 521. f. 13.

f. 15.

um spinosum, profunde laciniatis foliis subtus

iginosis, maderaspatanum. *Pluk. alm.* 351. t. 316.

ut in Africa. †

ANUM caule aculeato fruticoso, aculeis to- sanctum.

mentosus foliisque oblique ovatis repandis.

um caule aculeato fruticoso, foliis repandis, ca-

ibus aculeatis. *Roy. lugdb.* 425.

um spinosum, fructu rotundo. *Bauh. pin.* 167,

io Burserus.

ut in Palæstina. †

tomentosus, cinereus, aculeis crassis, rectis, bre-

vis, flavescens, excepto apice tomentosus. Folia

ta, altera basi breviora, tomentosa, crassa, obtusa:

illis pinnatim sinuatis margine albidis; aculeis in co-

tribus. Petioli subtus aculeati. Pedunculi ex la-

caulis; pedicello primario cum calyce spinoso, re-

is masculis inermibus. Corolla Boraginis, ceru-

purpurea.

ANUM caule aculeato fruticoso, aculeis ace- tomentosum

ntosis, foliis cordatis inermibus subrepandis: tenel-

lissimis purpureo-pulverulentis.

um caule aculeato fruticoso, foliis cordatis vil-

losissimis repandis, calycibus inermibus. *Hort. cliff.* 61.

em. lugdb. 425.

um africanum spinosum, folio canescente undu-

latum. *Triumpf. præl.* 46. t. 6. *Raj. suppl.* 355.

um foliis & caule spinosis. *Morif. blæs.* 310.

um spinosum maxime tomentosum. *Bocc. sic.* 8.

ut in Æthiopia. †

† tota planta tomentosa aculeis angustissimis,

s. Folia cordata, obtusa, repanda, fere sola

spinosa: tenella prodeuntia margine pulvere vi-

oiosa.

olaceo ex pilis stellatis. Baccæ fulvæ, magnitudinis Grossulariæ.

- bahamense. 28. SOLANUM caule aculeato fruticoso, foliis lanolatis repandis obtusis margine reflexis, race simplicibus. *Hort. cliff. 61. Roy. lugdb. 424.*
Solanum bahamense spinosum, petalis angustis reflexis. *Dill. elth. 263. t. 271. f. 250.*

Solanum fruticosum bacciferum spinosum, flore caeleo. *Sloan. jam. 108. hist. 1. p. 38. t. 11. f. 3.*
Habitat in Americæ insula Providentia. †

- igneum. 29. SOLANUM caule aculeato fruticoso, foliis lanolatis acuminatis basi utrinque revolutis, race simplicibus.

Solanum spiniferum frutescens, spinis igneis, americanum. *Pluk. alm. 350. t. 225. f. 5.*

Habitat in America. †

Simillimum S. bahamensi, sed Flores albi, nec neci; Folia acuminata, nec obtusiuscula. Spinae diodes, copiosiores, rubro-ignæ.

- trilobatum. 30. SOLANUM caule aculeato fruticoso, foliis cuneiformibus subtrilobis glabris obtusis inermibus.
Solanum spinosum jamaicense glabrum, foliis parvis profunde laciniatis. *Pluk. alm. 351. t. f. 5.*

Habitat in Jamaica, ad Cap. b. Spei. †

Caulis subfrutescens, altus, angustus. Folia parva glabra, obtusa, subtri-f. quinqueloba, raro etiam basi lobata. Aculei reflexi in caule, petioli, pedunculis. Pedunculi uniflori; Calyces mihi, inermes aut aculeati. Stylus ascendens. cæ parvæ Sambuci: An duæ species, cum una? bus parvis, albis; altera magnis, violaceis?

C A P S I C U M.

- annuum. 1. CAPSICUM caule herbaceo, pedunculis solitis. *Roy. lugdb. 426.*

Capsicum annuum. Hort. cliff. 59. Hort. ups. 47. Zeyl. 92. Mat. med. 96.

Capsicum filiquis longis propendentibus. Tournes. 152.

Piper indicum vulgatissimum. Bauh. pin. 102.

Vallia-capo-mojago. Rheed. mal. 2. p. t. 35.

at in America meridionali. ☉

us hujus ☉ sequentis speciei mire variat figura.

'SICUM caule fruticoso, pedunculis geminis. frutescens.
v. lugdb. 426.

cum frutescens. *Hort. cliff.* 59.

cum brasilianum. *Clus. exot.* 340. f. 2.

cum indicum. *Rumph. amb.* 5. p. 247. t. 88. f.

3, 4.

icum fructu minimo conico rubro. *Brown.*

. 176.

cum minus, fructu parvo pyramidali erecto.

an. jam. 112. *hist.* 1. p. 249. t. 146. f. 2.

filiquosum magnitudinis baccharum asparagi.

uh. hist. 2. p. 944.

brasilianum *Petita. Clus. cur.* 55. *Rumph. amb.*

p. 247. t. 88. f. 2.

at in Indiis. ☿

STRYCHNOS.

YCHNOS foliis ovatis, caule inermi. *Fl. zeyl.* Nux vomica.

Mat. med. 77.

hnos foliis quinquenerviis. *Wach. ultraj.* 32.

Vomica officinarum. *Bauh. pin.* 511. *Raj. hist.*

14-

brini ligni tertium genus in malabar. *Bauh. pin.*

1.

ram. *Rheed. mal.* 1. p. 67. t. 37. *Raj. hist.* 1661.

at in India. ☿

YCHNOS foliis ovatis acutis, cirrhis simplici- colubrina.

s. Mat. med. 78. *Amxn. acad.* 2. p. 119.

hnos foliis trinerviis ovatis binatis. *Wach. ultraj.* 32.

tatis indica spinosa, foliis luteis. *Bauh. pin.* 301.

tus orbicularis major fuscus striatus. *Bauh. pin.* 405.

ira-caniram. *Rheed. mal.* 7. p. 10. t. 5. *Raj. hist.*

51.

at in India. ☿

JAQUINIA.

VINIA foliis lanceolatis acuminatis. *Jacq. a-* ruscifolia.

r. 15.

eola aculeata foliis verticillatis, ramis aculeatis.

. *pl.* 1. p. 339.

Fruticulus foliis rusci stellatis. *Dill. elth.* 148. t. f. 149.

Habitat in America meridionali. †

armillaris. 2. JAQVINIA foliis obtusis cum acumine. *Jacq.* 15. †

Chrysophyllum Barbaeo. Læfl. it. 204. 277.

Habitat in America. †

linearis. 3. JAQVINIA foliis linearibus acuminatis. *Jacq.* 15. t. 40.

Habitat in America. †

CHIRONIA.

trinervia. 1. CHIRONIA herbacea, calycinis foliolis medio carinatis. *Fl. zeyl.* 90. *

Chironia foliis lanceolatis trinerviis. *Hort. cliff.*

Lysimachia folio sinuato acuminato trinervio, cæruleo amplo, calyce carinato alato. *Burm*

145. t. 67.

Habitat ad Cap. b. Spei. ○

linoides. 2. CHIRONIA herbacea, foliis linearibus. *Hort.* 54. *Roy. lugdb.* 433.

Rapuntio affinis, lini facie, capitis b. spei.

cent. 175. t. 90.

Habitat in Capitis b. Spei herbidis. †

jasminoides. 3. CHIRONIA herbacea, foliis lanceolatis. *Amz* 6. *afr.* 5. *

Habitat ad Cap. b. spei.

campanulata. 4. CHIRONIA herbacea, foliis sublinearibus, bus longitudine corollæ.

Habitat in Canada. *Kalm.*

Caulis pedalis, teres: Ramis longis. Folia lanceolata, lævia. Flores terminales, solitarii, purpurei, pedunculo longo insidentes; Calycis longitudine corollæ subulata. Antheræ spirales

angularis. 5. CHIRONIA herbacea, caule acutangulo, foliis amplexicaulibus.

Habitat in Virginia. *Kalm.*

Facies Centaurii minoris. Caulis pedalis, tetralis membranaceis. Folia ovata, hypericæ,

sessilia & *semialexicaulia*. Flores congesti, ut in *Hyperico*; Antheræ spirales; Stylus bifidus.

HIRONIA floribus duodecimfidis. dodecandra.
antiana floribus duodecim-petalis, foliis distinctis.
Gron. virg. 27.
abitat in Virginia.

HIRONIA frutescens baccifera. baccifera.
antaurium minus arborescens pulpiferum. *Comm. rar.*
9. t. 9.
antaurium minus africanum arborescens angustifolium.
Old. afr. 26.
abitat in Æthiopia. †

HIRONIA fruticosa, foliis linearibus subtomentosis, calycibus campanulatis. *Amæn. acad.* 4. p. 308. n. 130. frutescens.

Hironia frutescens capsulifera. *Sp. pl.* 1. p. 190. *Mill. dist.* 1. 97.
antaurium minus africanum arborescens latifolium, flore ruberrimo. *Comm. rar.* 8. t. 8. *Old. afr.* 26.
antaurium foliis binis oppositis angustis linearibus, flore magno rubente. *Burm. afric.* 205. t. 74. f. 1.
abitat in Æthiopia. †
lyx tubo corollæ multo amplior. Stylus deflexus.

CORDIA.

CORDIA foliis ovatis tomentosis, corymbis lateralibus, calycibus decemstriatis. Myxa.

ordia foliis subovatis serrato-dentatis. *Hort. cliff.* 63.

Mat. med. 171. *Sp. pl.* 1. p. 190.

bestena sylvestris & *domestica.* *Bauh. pin.* 446. *Alp. egypt.* 30.

bestena domestica f. *Myxa.* *Comm. hort.* 1. p. 139. t. 72.

idi-maram. *Rheed. mal.* 4. p. 77. t. 37.

abitat in Ægypto, Malabaribus. †

CORDIA foliis lanceolato-ovatis scabris, panicula terminali calycibus decemstriatis. Geraschanthus.

geraschanthus foliis ovato-oblongis utrinque productis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 170. t. 29. f. 3.

abitat in Jamaica. †

Sebestena.

- 3.
- CORDIA*
- foliis oblongo - ovatis repandis scæ

*Hasselq. it. 458.**Cordia nucis juglandis folio. Plum. gen. 13. ic. 109**Cordia foliis amplioribus hirtis, tubo floris subæq**Brown. jam. 202.*Sebestena scabra, flore miniato crispo. *Dill. elth.**t. 255. f. 331.**Caryophyllus spurius inodorus, folio subrotunde**bro, flore racemoso hexapetaloide coccineo. J**jam. 136. hist. 2. p. 20. t. 64. Raj. suppl. 86. C**car. 2. p. 91. t. 91.*Novella nigra. *Rumph. amb. 2. p. 226. t. 75.**Habitat in Indiis. †*Folia juniora serrata, adulta ~~scæ~~ repanda, scæ*certe integerrima; ovato-oblonga, scabra. P**teretes. Stipulæ nullæ. Calyx cylindricus, t**gus ore trifido. Corolla figura Mirabilis, ful**tea, æstivatione rugosissima Papaveris. Stami**Stylus bis bifidus.*

macrophylla.

- 4.
- CORDIA*
- foliis ovatis villosis sesquipedalibus.

*Collococcus platyphyllos major, racemis umbel**Brown. jam. 168.**Prunus racemosa, foliis oblongis hirsutis max**fructu rubro. Sloan. jam. 184. hist. 2. p. 130. t.**f. 1. Raj. dendr. 43.**Habitat in Jamaica. †*

Collococca.

- 5.
- CORDIA*
- foliis oblongo-ovatis integerrimis, flæ

*subcorymbosis, calycibus interne tomentosis.**Cordia glabra. Sp. pl. 1. p. 191.**Collococcus foliis rugosis venosis oblongo-ovati**ribus laxè racemosis. Brown. jam. 167.**Cerafo affinis arbor baccifera racemosa, flore 1**petalo herbaceo guttato, fructu coccineo mo**reno viscido, semine rugoso. Sloan. jam. 169**2. p. 95. t. 203. f. 2.**Habitat in Jamaica. †*

E H R E T I A .

tinifolia.

- 1.
- EHRETIA*
- foliis oblongo-ovatis integerrimis g

*floribus paniculatis. Amæn. acad. 5. p. 395.**Ehretia foliis alternis oblongis acuminatis, spi**rum sparsa, petalis reflexis albis. Trew. ehret*

E

ia arborea, foliis oblongo-ovatis alternis, racemosis terminalibus. *Brown. jam. 168. t. 16. f. 1.*

o affinis arbor baccifera racemosa, flore albo ut petalo, fructu flavo monopyreno eduli dulci. *an. jam. 2. p. 94. t. 203. f. 1. Raj. dendr. 45.*

at in Jamaica. †

ETIA spinosa. *Jacq. amer. 14. †*

spinosa.

at in America. †

ETIA foliis ovatis integerrimis lævibus, floribus subcorymbosis, calycibus glabris. *Bourreria*

a *Bourreria. Amæn. aca. 1. 5. p. 395. **

eria fructibus succulentis. *Jacq. amer. 14.*

eria arborea foliis ovatis alternis, racemosis rariore terminalibus. *Brown. jam. 168. t. 15. f. 2.*

ilus americana laurifolia glabra, fructu rubro caginoso. *Com. hort. 1. p. 153. t. 79.*

nize similis laureolæ foliis, floribus albis, baccis ris. *Catesb. car. 2. p. 79. t. 79.*

rum periclymeni folio, flore albo, fructu flavo undo tetrapyreno. *Sloan. jam. 169. hist. 2. p. 96.*

04. f. 1. *Raj. dendr. 63.*

at in Jamaica. †

exacte ovata, utraque pagina levia. Corollæ et longitudine tantum Calycis. *Bourreria affini- jungit Ehrctias cum Cordiis.*

ETIA foliis cuneiformi lanceolatis margine exsucca. exis. †

eria exsucca. *Jacqu. amer. 14.*

nus cumarënsis. *Læfl. it. 182.*

at in America meridionali. †

VARRONIA.

ARRONIA foliis lanceolatis lineatis, pedunculis lineatis, terminalibus petiolo adnatis, spicis globosis. *Amæn. 1. 5. p. 394. **

na corymbosa, foliis alternis, floribus corymbosis. *Sp. pl. 628.*

angustifoliæ facie baccifera jamaicensis, foliis terne scabris, subtus villosis, floribus flavis perillis, fructu botryoide monospermo. *Pluk. alm. 1. t. 328. f. 5.*

at in America. †

*Folia lanceolata, utrinque attenuata. Pedunculi-
les, elongati, filiformes, basi petiolo adnati.*

bullata.

2. VARRONIA foliis ovatis venoso-rugosis, globosis. *Amæn. acad. 5. p. 394.*

Varronia mirabiloides, spicis subrotundis inæquicorollis hypocrateriformibus. Jacq. amer. 14.

Habitat in America. †

globosa.

3. VARRONIA foliis lanceolato-oblongis, cæchotomo, pedunculis axillaribus elongatis nudis globosis.

Varronia globosa spicis æqualibus globosis. Jacq. amer. 14.

Habitat in America. †

Pedunculus e dichotomia nudus. Calycis dentes longi, recurvati.

curassavica.

4. VARRONIA foliis lanceolatis, spicis oblongis. *Jacq. amer. 14.*

Varronia affurgens sarmentosa, foliis & capitulis longis. Brown. jam. 172.

Lantana foliis alternis, spicis oblongis. Sp. p. 627.

Periclymenum rectum, salviæ folio rugoso & oblongo bullato, flore albo, fructu longiore. jam. 163. hist. 2. p. 81. Raj. dendr. 31.

Habitat in America. †

alba.

5. VARRONIA foliis cordatis, floribus cymosis. *amer. 14.*

Mespilus americana, alni vel coryli foliis, fructu caginoso albo. Comm. hort. 1. p. 155. t. 80.

Habitat in America. †

LAUGIERIA.

odorata.

1. LAUGIERIA. *Jacq. amer. 16. †*

Edechia. Læfl. it. 306, 271, 259.

Habitat in America. †

BRUNSFELSIA.

americana.

1. BRUNSFELSIA.

Brunsfelsia flore albo, fructu croceo molli. Ph. 12. ic. 65.

Habitat in America meridionali. †

Alia oblonga, obtusa, integerrima, petiolata. Flores in apice ramorum plures; Antheræ extra corollæ tubum prominentes.

CESTRUM.

CESTRUM floribus pedunculatis. *Hort. cliff.* 490. nocturnum. -
Gminoides foliis pishaminis, flore virescente noctu
 odoratissimo. *Dill. elth.* 183. t. 153. f. 185.

Gminum laurinis foliis, flore pallido luteo, fructu
 atrocæruleo polypyreno venenato. *Sloan. jam.* 169.
Hist. 2. p. 96. t. 204. f. 2. *Raj. dendr.* 63. *Brown.*
jam. 173.

Tringa laurifolia jamaicensis, floribus ex flavo palle-
 scentibus. *Pluk. alm.* 35. t. 64. f. 3.

Peru. *Fewill. peruv.* 2. p. 32. t. 32. f. 1.
Habitat in Jamaica, Chilli. †

CESTRUM floribus sessilibus. *Hort. cliff.* 491. diurnum.

Gminoides laureolæ folio, flore candido interdiu o-
 dorato. *Dill. elth.* 186. t. 154. f. 186.

Laureola sempervirens americana, latioribus foliis, flo-
 ribus albis odoratis. *Pluk. alm.* 209. t. 95. f. 1. *Raj.*
dendr. 53.

Guinda jasmini flore. *Fewill. peruv.* 2. p. 25. t. 20.
 f. 3.

Habitat in Chilli, Havana. †

LYCIUM.

LYCIUM foliis linearibus. *Hort. cliff.* 57. *Hort. upf.* afrum.
Mill. dict. t. 171. f. 1. *Trew. chret.* 4. t. 24.

Gminoides africanum, jasmini aculeati foliis & facie.
Niss. act. 1711. p. 420. t. 12.

Gminoides aculeatum, salicis folio. *Mich. gen.* 224. t.
 105. f. 2.

Hamnus alter, foliis falsis, flore purpureo. *Bauh.*
pil. 477.

Habitat in Africa & in Regno Valentino. †

Stylis rectus, rigidus. *Flores atropurpurei. Bacca globo-*
sa, atrorubra.

LYCIUM foliis laneolatis crassiusculis, calycibus barbarum.
 bifidis.

Hamnus peregrinus, rosmarini folio, candidior. Pluk.
alm. 317. mant. 160. t. 322. f. 2. mala.

Jasminoides aculeatum humile, halimi minoris;
fructu per maturitatem flavo-scente. *Mich. ga*
t. 105. f. 1.

Jasminoides sinense, halimi folio longiore & am
re. Duham. arb. 1. p. 306. t. 121. f. 4.

Jasminoides aculeatum, polygona folio, floribus
albidis. Schaw. afric. 349. f. 349.?

Habitat in Asia, Africa, Europa. †

Calycis ore bilobo, aut interdum trilobo, a reliqui
ciebus diversum. Frutex debilis, ni sustentan
tans ♂ decumbens. Flores intus pallide n
di. Baccæ ovatæ, flavæ. Cortex ramorum i
du. Hyemes nostrates fert.

capsulare.

3. **LYCIUM** foliis lanceolatis tenuibus glabris,
culis calycibusque pubescentibus, pericarpis
laribus. *Amæn. acad. 4. p. 308. **

Habitat in Mexico. Miller. †

CHRYSOPHYLLUM.

Cainito.

1. **CHRYSOPHYLLUM** foliis ovatis parallele
subtus tomentoso-nitidis. *Jacq. amer. 15.*

Chrysophyllum foliis ovatis superne glabris p
striatis, subtus tomentoso-nitidis. Hort. cliff.

Anona foliis subtus ferrugineis, fructu rotund
re lævi purpureo, semine nigro partim
partim glabro. Sloan. jam. 206. hist. 2. p. 170.
Raj. dendr. 78.

Cainito. Lact. amer. 390.

Cainito folio subtus aureo, fructu maliformi
gen. 10.

β. *Cainito folio subtus aureo, fructu oliviformi*
gen. 10. ic. 69.

Sideroxylon Pacurero. Læfl. it. 204.

Habitat in America calidiore. †

Folia alterna, petiolata, ovata, integerrima. Pt
li laterales, uniflora, numerosi, brevissimi.

glabrum.

2. **CHRYSOPHYLLUM** foliis utrinque glab
*Jacq. amer. 15. **

Habitat in America. †

SIDEROXYLON.

inermis

1. **SIDEROXYLON** inermis. *Hort. cliff. 69.*

roxylon primum f. dein Coriæ indorum nomine

ita arbor. *Dill. elth.* 357. t. 265. f. 344.

us foliis oblongis, fructu solitario. *Burm. afric.*

38. t. 84. f. 2.

itat in Æthiopia. †

EROXYLON spinosum, foliis deciduis. *Duham. lycioides.*

b. 2. p. 260. t. 68

oides. *Hort. cliff.* 488. *

or folio salicis viridi alterno splendente, spinis lon-

oribus alternis ad alas foliorum. *Boerh. lugdb.* 2.

263.

tat in Canada. †

EROXYLON spinosum, foliis perennantibus. *spinosum.*

ort. cliff. 69.

- mcelli. *Rbeed. mal.* 5. p. 77. t. 39. *Raj. hist.*

34.

tat in Malabaria. †

RHAMNUS.

* *Spinosi.*

AMNUS spinis terminalibus, floribus quadrifidis *catharticus.*

oicis, foliis ovatis. *Hort. cliff.* 70. *Fl. Svec.* 193,

2. *Mat. med.* 72. *Roy. lugdb.* 224.

mnus catharticus. *Bauh. pin.* 478.

ispina. *Cord. hist.* 175.

tat in Europæ sepibus. †

AMNUS spinis terminalibus, foliis linearibus. *lycioides,*

mnus tertius flore herbaceo, baccis nigris. *Bauh.*

477.

onus tertius forte niger. *Clus. hist.* 1. p. 110.

tat in Hispania. †

AMNUS spinis terminalibus, foliis oblongis in- *Oleoides.*

errimis

mnus hispanicus, oleæ folio. *Tournef. inst.* 539.

tat in Hispania. C. *Alströmer.* †

is *R. cathartico*, sed minor. Folia ad gemmas 2.

3, Oleæ similia & minora, levia, consistentia, in-

errima, quasi venis marginata, brevius petiolata,

ufuscula, reticulato-venosa. Fructus solitarii, simi-

R. cathartico.

* * *inermes.*

- alpinus. 4. RHAMNUS inermis, floribus dioicis, foliis cato-crenatis.
 Rhamnus inermis, foliis glabris crenatis. *AE.*
 349. t. 16.
 Frangula ora foliis ferrata. *Hall. herb.* 164.
 Frangula rugosiflora & ampliore folio. *Tournef.*
 612.
 Frangula altera polycarpus. *Bauh. prodr.* 160.
 Alnus nigra baccifera, rugosiflora folio f. major.
hist. 1. p. 562.
 Alnus nigra polycarpus. *Bauh. pin.* 428.
Habitat in alpibus Helveticis. †
- Frangula. 5. RHAMNUS inermis, floribus monogynis
 phroditis, foliis integerrimis. *Hort. cliff.* 70.
 194. 203. *Mat. med.* 73. *Roy. lugdb.* 224.
 Rhamnus inermis, foliis annuis. *Fl. lapp.* 60.
 Alnus nigra baccifera. *Bauh. pin.* 428.
 Frangula. *Dod. pempt.* 784.
Habitat in Europæ borealis nemorosis humidiusculis.
- Sarcophalus. 6. RHAMNUS inermis, foliis ovalibus coriaceis
 gerrimis emarginatis. *Amæn. acad.* 5. p. 395.
 Sarcophalus foliis ovatis glabris alternis apice
 emarginatis, cortice interiore ferrugineo.
jam. 179.
Habitat in America. †
- micranthus. 7. RHAMNUS inermis, foliis ovato-lanceolatis
 pubescentibus, stipulis lanceolatis
Amæn. acad. 5. p. 395. *
 Rhamnus an Zizyphus arboreus, foliis ovatis
 hirsutis & leniter ferratis. *Brown. jam.*
 12. f. 2.
 Muntingia folio corni, fructu minore. *Plum.*
ic. 206. f. 1.
Habitat in America. †
- colubrinus. 8. RHAMNUS inermis, floribus monogynis
 phroditis, capsulis trilocularibus, ramis hori-
 bus, floribus erectis. *Jacq. amer.* 16.
 Arbor baccifera indica, foliis majoribus splendide
 flore pentapetalo. *Comm. hort.* 1. p. 175. t. 9

at in America. †
magna, ovata, integerrima.

AMNUS inermis, floribus dioicis, stigmatibus tri- Alaternus.
 ci, foliis ferratis. *Vir. cliff.* 19. *Hort. ups.* 47. *Sauv.*
isp. 95.

AMNUS inermis, floribus polygamis, stigmatibus tripli-
 foliis ferratis. *Hort. cliff.* 70. *Roy. lugdb.* 225.
ca elatior. Bauh. pin. 477.

AMNUS humilior. *Bauh. pin.* 477.
 AMNUS 1, 2. *Clus. hist.* 1. p. 50.
 at in Europa australi. †

AMNUS inermis, floribus hermaphroditis, calicibus cubensis.
 trilocularibus, foliis rugosis integerrimis ciliatis.
Jacq. amer. 16.

at in America. †
 AMNUS R. colubrinus Fructu capsulari est.

AMNUS inermis, floribus hermaphroditis, foliis lineatis.
 ovatis lineatis repandis subtus reticulatis. *Amæn.*
d. 4. p. 308. *

AMNUS lineata. *Osb. it.* 219. t. 7.
 at in Chinæ elevatis. †

* * * *Aculeati.*

AMNUS aculeis geminatis: inferiore reflexo, Pallurus.
 floribus trigynis. *Hort. cliff.* 69. *Hort. ups.* 47. *Roy.*
db. 224. *Sauv. mons.* 306.

AMNUS folio subrotundo, fructu compresso. *Bauh.*
477.

AMNUS rus. *Dod. pempt.* 576.

at in Europa australi. †

AMNUS aculeis geminatis: altero recurvo, Lotus.
 foliis ovato-oblongis.

AMNUS plus sylvestris. *Tournef. instit.* 627. *Shaw. afr.*
t. f. 631.

at in Regno Tunetano. †

AMNUS ramulis teretibus. Aculei duo ad exortum fo-
 rum: altero horizontali, altero recurvo ut in Pa-
 ro, sed Folia omnia zizyphi, figura, nervis, gla-
 cie, magnitudine, at margo obsolete & rarius
 ratus.

- Napect.** 14. **RHAMNUS** aculeis subgeminatis recurvis, pediculis corymbosis, floribus semidigynis, foliis & petalis utrinque lævibus. *Fl. zeyl.* 87. *
- Jujuba indica spinosa, folio & fructu longiore. *Alm.* 199. t. 216. f. 2. *Raj. dendr.* 44.
- Vidara littorea. *Rumph. amb.* 2. p. 119. t. 42.
- Habitat in Zeylona.* †
- Jujuba.** 15. **RHAMNUS** aculeis solitariis recurvis, pedunculis aggregatis, floribus semidigynis, foliis retusis subtomentosis. *Fl. zeyl.* 89. *
- Jujuba indica spinosa, folio & fructu rotundo. *Alm.* 199. *Raj. dendr.* 44.
- Malus indica. *Rumph. amb.* 2. p. 117. t. 36.
- Perim toddal. *Rheed. mal.* 4. p. 41.
- Habitat in India.* †
- Oenoplia.** 16. **RHAMNUS** aculeis solitariis recurvis, pedunculis aggregatis subsessilibus, foliis semicordatis subtomentosis. *Fl. zeyl.* 88. *
- Jujuba aculeata, nervosis foliis infra sericeis laevibus. *Burm. zeyl.* 131. t. 61.
- Habitat in Zeylona.* †
- Iguaneus.** 17. **RHAMNUS** aculeis geminatis altero patentibus, axillaribus monoicis, foliis nudis. *Jacq.* 16.
- Jujube americana spinosa, loti arboris foliis, & fructu rotundo parvo dulci. *Comm. hort.* 1. p. 73.
- Habitat in America.* †
- Zizyphus.** 18. **RHAMNUS** aculeis geminatis rectis, floribus digynis, foliis ovato-oblongis glabris. *Hort. cliff.* *Mat. med.* 74. *Roy. lugdb.* 224. *Sauv. monsp.* 59.
- Jujuba sylvestris. *Bauh. pin.* 446.
- Zizyphus. *Dod. pempt.* 807.
- β. Jujubæ majores oblongæ. *Bauh. pin.* 446.
- Habitat in Europa australi.* †
- Spina Christi.** 19. **RHAMNUS** aculeis geminatis rectis, foliis ovatis. *Hort. cliff.* 63. * *Roy. lugdb.* 224.
- Oenoplia spinosa. *Bauh. pin.* 477. *Clus. hist.* 2. p. 3.
- Nabca Pallurus athenæi credita. *Alp. egypt.* 16 t.
- Jujube s. Zizyphus africana, mucronatis foliis, spina gemella. *Pluk. alm.* 199. t. 197. f. 2.

Habitat in Æthiopia, Palæstina. †

Arbuseula e seminibus missis sub nomine Spinæ Christi.

Hierosolyma a D. Hasselquist.

PHYLICA.

PHYLICA foliis linearibus verticillatis.

ericoides.

Phylica foliis ovato-linearibus. Hort. cliff. 70. Roy. lugdb. 199.

Alaternoides africana, ericæ foliis, floribus albicantibus & muscosis. Comm. hort. 2. p. 1. t. 1.

Habitat in Æthiopia. †

PHYLICA foliis lineari-subulatis: summis hirsutis.

plumosa.

Roy. lugdb. 199.

Ricinus arboreicens africanus, tomentosus capitulis.

Seb. thes. 1. p. 38. t. 23. f. 4, 5.

Chamælea africana tricoccus & tetracoccus taxifolia, villosa cæsarie coronata. Pluk. mant. 45. t. 342. f. 3.

Chamælea foliis angustis subtus incanis, floribus capitatis muscosis. Burm. afr. 117. t. 43. f. 2.

Alaternoides africana, rorismarini latiore & pilosiore folio. Comm. prælud. 63. t. 13.

Habitat in Æthiopia. †

PHYLICA foliis linearibus triquetris sparsis, caule piloso, bracteis apice glabris coloratisque.

ra liati.

*Amæn. acad. 4. p. 938. **

Chrysanthemum ericoides coronatum. C. B. S. Breyn. cent. 165. t. 82. Pluk. mant. 47. t. 454. f. 7.

Habitat ad Cap. b. Spei. †

PHYLICA foliis cordato-ovatis patentibus, caule prolifero.

cordata.

Alaternoides africana, chamæmespilio folio. Comm. rar. 62. t. 12.

Habitat ad Cap. b. Spei. †

Differt a. PH. buxifolia, quod Folia non ovata, sed cordata exquisite attenuato apice. Caulis prolifer, nec capitula lateralia.

PHYLICA foliis cordatis, floribus dioicis.

dioica.

Habitat ad Cap. b. Spei. †

PHYLICA foliis ovatis sparsis ternisque subtus tomentosus.

buxifolia.

Cha-

Chamælea folio subrotundo subtus incaho, floribus
capitulum collectis. *Burm. afr. 119. t. 44. f. 1.*
Chamælea africana, foliis subrotundis. *Herm. afr. 1.*
Habitat in Æthiopia. †

CEANOTHUS.

- americanus. 1. CEANOTHUS foliis trinerviis. *Mill. dict. t. 81.*
Duham. arb. 1. p. 138. t. 51.
Ceanothus corymbis folio longioribus. *Hort. upf. 51.*
Ceanothus. *Act. upf. 1741. p. 77.*
Celastrus inermis, foliis ovatis ferratis trinerviis, racemis ex summis alis longissimis. *Hort. cliff. 73.*
Gron. virg. 25. Roy. lugdb. 435.
Evonymus novi belgii, corni feminae foliis. *Comm. hort. 1. p. 167. t. 86. Raj. dendr. 69.*
Evonymus, jujubinis foliis, carolinensis, fructu parvifere umbellato. *Pluk. alm. 139. t. 28. f. 6.*
Habitat in Virginia, Carolina. †
- asiaticus. 2. CEANOTHUS foliis ovatis enerviis.
Ceanothus racemis folio brevioribus. *Fl. zeyl. 98.*
Grossularia spinis vidua, baccis in racemo congestis spadicis, foliis crenatis ovato-acuminatis. *Burm. zeyl. III. t. 48.*
Spireæ theophrasti similis frutex indicus, latiori folio. *Pluk. alm. 350. t. 63. f. 2?*
Habitat in Zeylona. †
- africanus. 3. CEANOTHUS foliis lanceolatis enerviis, stipulis subrotundis.
Celastrus inermis, foliis lanceolatis obtuse ferratis petiolatis appendiculatis. *Hort. cliff. 73. Roy. lugdb. 435.*
Alaternoides africana, lauri serratae folio. *Comm. praef. 61. t. 11.*
Ricinoides africana arborescens, folio phillyreae longigifoliae serratae. *Seb. thes. 1. p. 35. t. 22. f. 6.*
Habitat in Æthiopia. †

BYTTNERIA.

- seabra. 1. BYTTNERIA. *Læfl. it. 313.*
Chætæa aculeata. *Jacq. amer. 17.*
Habitat in America meridionali. †

Frutex aculeatus. Folia lanceolata. Flores racemosi, albi.

MYRSINE.

MYRSINE. *Hort. cliff. 72. * Zinn. gart. 202.* africana.

Vitis idæa æthiopica, myrti tarentinæ folio, flore atropurpureo. Comm. Hort. 1. p. 123. t. 64.

Buxus africana rotundifolia ferrata. Pluk. alm. 74. t. 80. f. 5.

Frutex æthiopicus baccifera, foliis myrtilli. Breyh. cent. 9. t. 5.

Habitat in Æthiopia. †

CELASTRUS.

CELASTRUS inermis, foliis ovatis integerrimis. bullatus

Evonymoides virginiana, foliis non ferratis, fructu coccineo eleganter bullato. Isard. act. 1716. p. 369.

Evonymus virginianus rotundifolius, capsulis coccineis eleganter bullatis. Pluk. alm. 139. t. 28. f. 5.

Habitat in Virginia. †

CELASTRUS inermis, caule volubili, foliis serrulatis. scandens.

Evonymoides canadensis scandens, foliis ferratis. Isn. act. 1716. p. 369. Duham. arb. 1. p. 223. t. 95.

Frutex viminibus lentis infirmis, foliis profunde serratis. Gron. virg. 55.

Habitat in Canada. †

CELASTRUS inermis, foliis ovatis serrulatis, floribus racemosis, caule erecto. myrtifolius.

Myrtifolia arbor, foliis latis subrotundis, flore albo. Sloan. jam. 162. hist. 2. p. 79. t. 193. f. 1. Raj. dendr. 36.

Habitat in Virginia, Jamaica. †

CELASTRUS spinis foliosis, ramis angulatis, foliis obtusis. buxifolius.

Lycium portoricense, buxi foliis angustioribus. Pluk. alm. 234. t. 202. f. 3.

Habitat in Æthiopia. †

Rami ♂ ramuli angulati. Folia obovata, obtusa, acute serrata. Cymæ pedunculatæ, ex alis.

CELASTRUS spinis nudis, ramis teretibus, foliis pyracanthus acutis. *Hort. cliff. 72. Mill. dict. t. 87.*

Ly-

Lycium æthiopicum, pyracanthæ folio. *Comm. hort.*
p. 163. t. 84. *Raj. dendr.* 72.

Evonymo affinis æthiopica, lycii foliis & aculeis
fructu evonymi. *Pluk. alm.* 139. t. 280. f. 5.

Habitat in Æthiopia. †

Rami ♂ ramuli teretiufculi. Folia ovali-lanceola
utrinque acuta, in petiolos desinentia, superne si-
raturis acuminatis ut fere spinosis, persistentia; C-
mæ pedunculatæ, laterales.

EVONYMUS.

- europæus. 1. **EVONYMUS** floribus plerisque quadrifidis.
Evonymus foliis oblongo-ovatis. *Hort. cliff.* 38.
fvec. 133, 204. *Roy. lugdb.* 436. *Hall. heb.* 523.
- tenuifolius. *Evonymus* vulgaris, granis rubentibus. *Bauh. pin.* 41
Evonymus 2. *Clus. hist.* 1. p. 57.
- latifolius. 2. *Evonymus* latifolius. *Bauh. pin.* 428.
Evonymus 1. s. latifolia. *Clus. hist.* 2. p. 56.
Habitat in Europæ sepibus; ? in Pannonia. †
Ex flore primario convenit cum congeneribus. *P.*
Bot. 178.
- americanus. 2. **EVONYMUS** floribus omnibus quiquefidis.
Evonymus foliis lato-lanceolatis serratis. *Hort. upf.*
Evonymus foliis lanceolatis. *Gron. virg.* 17.
Evonymus virginianus, pyracanthæ foliis, capsula v-
rucarum instar exasperata. *Pluk alm.* 139. t. 115.)
Celastrus foliis oppositis ovatis integerrimis, flori-
subsolitariis. *Hort. cliff.* 32.
Rhus virginianum, folio myrti. *Comm. hort.* 1
157. t. 81. *Raj. dendr.* 57.
Habitat in Virginia. †

DIOSMA.

- oppositifo- 1. **DIOSMA** foliis subulatis acutis oppositis. *H*
lia. *cliff.* 71. *Roy. lugdb.* 434.
Spiræa africana, foliis cruciatim positis. *Comm.*
1. t. 1.
Hypericum africanum vulgare. *Seb. thes.* 2. p. 41
40. f. 5.
Habitat ad Caput b. Spei. †
- hirsuta. 2. **DIOSMA** foliis linearibus hirsutis. *Hort. cliff.*
Roy. lugdb. 424.

æa africana odorata, foliis pilosis. *Com. rar.* 3.

3.
itat ad Caput b. Spei. †

OSMA foliis linearibus mucronatis glabris carina-
s subtus bifariam punctatis. rubra!

ima foliis setaceis acutis. *Hort. cliff.* 72.

æa africana odorata, floribus suave rubentibus.
mm. rar. 2. t. 2.

æa æthiopica, rosmarini sylvestris folio eleganter
unctato, flore tetrapetalo purpureo. *Pluk. mant.* 68.

347. f. 4.

itat in Æthiopia. †

itus juniperi. *Folia juniperina, glabra, subtri-
que-1, subtus punctis pertusa.*

OSMA foliis lineari-lanceolatis subtus convexis ericoides,
fariam imbricatis.

æa africana, ericæ bacciferæ foliis. *Raj. dendr.* 91.

æformis, cordis folio, æthiopica, floribus pen-
petalis in apicibus. *Pluk. amalth.* 236. t. 279. f. 5.

itat in Æthiopia. †

valde fragrans in *Emplastris Hottentottorum.*

OSMA foliis lanceolatis ciliatis.

ciliata.

ææ forte genus africanum, serpilli hirsutis foliis,
sticosum, floribus albis umbellatis. *Pluk. amalth.*

7. t. 411. f. 3. *Seb. mus.* 2. t. 17. f. 5.

itat in Æthiopia. †

OSMA foliis lanceolatis glabris.

lanceolata,

æa africana, saturejæ foliis brevioribus. *Raj. udr.* 91.

itat in Æthiopia. † -

OSMA foliis lanceolato-ovalibus glanduloso-cre-
tis, floribus solitariis. *Amæn. acad.* 4. p. 308. *

itat in Æthiopia. †

SMA foliis ovato-oblongis, floribus solitariis uniflora,
minalibus.

s humilis æthiopicus, inferioribus foliis rosmarini
vestris punctatis, cæteris autem serpilli subrotun-

is, flore carneo. *Pluk. mant.* 49. t. 342. f. 5.

itat in Æthiopia. †

rigidiora, & longe majora, quam in præceden-
tibus.

tibus. Flos etiam sextuplo major $\frac{1}{2}$ margine ut $\frac{1}{2}$ tus punctatus.

- pulchella. 9. DIOSMA foliis ovatis obtusis glanduloso-cre
floribus geminis axillaribus.
Habitat in Æthiopia. $\frac{1}{2}$
Fruticulus pulcherrimus Ramis virgatis. Folia ca
ta. Flosculi cærulei, minimi, axillares, gemin
priis pedunculis.

HARTOGIA.

- capensis. 1. HARTOGIA.
Habitat ad Cap. b. spei. $\frac{1}{2}$
Statura Diosmæ aut Brunia. Folia opposita, fol
triquetra. Flores albi in Corymbum.

BRUNIA.

- nodiflora. 1. BRUNIA foliis quadrifariam imbricatis: Hort.
Cupresso-Pinulus capitis b. spei. *Breyn. cent. 22.*
Erica capitata s. nodiflora cupressiformis african
mant. 69. t. 346. f. 4.
Sca bioisæ affinis Arbuscula africana ericoides sp
cephalos. *Raj. hist. 1444.*
Habitat in Æthiopia. $\frac{1}{2}$
- lanuginosa. 2. BRUNIA foliis linearibus patulis apice callosis,
cliff. 71.
Tamariscus monomopatensis, ericæ tenuissimo
pilulifera, ramulis lanugine araneorum instar
xis. *Pluk. alm. 361. t. 318. f. 4.*
Habitat in Æthiopia. $\frac{1}{2}$
- ciliata. 3. BRUNIA foliis ovatis acuminatis ciliatis.
Habitat in Æthiopia. $\frac{1}{2}$
- abrotanoi-
des. 4. BRUNIA foliis lineari-lanceolatis patentibus t
tris apice callosis.
Brunia foliis creberrimis lanceolatis, floribus c
batis. *Burm. afric. 266. t. 100. f. 1.*
Levisanus africanus, ericæ folio, capitulo m
Raj. dendr. 130.
Levisanus capensis, serpylli folio. *Pet. 227. 9*
f. 7.
Erica capitata s. nodiflora, corios foliis rectis,
pica. *Pluk. mant. 69. t. 346. f. 7.*
Habitat in Æthiopia. $\frac{1}{2}$

BRUNIA foliis spatulatis acutis carnofis.

Levisanus.

Brunia foliis oblongis lucanis, florum capitulo ramulum terminante. *Burm. afric. 267. t. 109. f. 2.*

Protea fusca foliis ovatis obtulis imbricatis, capitulis globosis. *Sp. pl. 1 p. 95.*

Protea foliis oblongo-ovatis lana obvolutis. *Roy. lugdb. 187.*

Conocarpodendron folio subrotundo brevissimo *Boerh. lugdb. 2. p. 202. t. 202.*

Chrysanthemum fruticosum, polygони foliis, africanum, caulibus scabris, flore minore. *Pluk. mant. 47. t. 343. f. 9.*

Habitat in Æthiopia. h

BRUNIA floribus solitariis. *Hort. cliff. 71.*

uniflora.

Ericæformis æthiopica, cupressi foliis compressiusculis. *Pluk. alm. 136. t. 279. f. 2.*

Habitat in Æthiopia. h

I T E A.

ITEA. *Gron. virg. 143. Duham. arb. 1. p. 219. t. 126. virginica.*

Iconangia. *Mitch. gen. 5.*

Habitat in Virginia. h

Folia Padi integra. *Racemi angusti.*

G A L A X.

GALAX.

aphylla.

Sticella. *Mitch. gen. 24.*

anonymos f. *Bevedere. Gron. virg. 25.*

Habitat in Virginia. 24.

C E D R E L A.

CEDRELA floribus paniculatis.

odorata

Cedrela Cedro. *Læst. it. 183.*

Cedrela foliis pinnatis, floribus laxè racemosis, ligno levi odorato. *Brown jam. 158. t. 10. f. 1.*

Cedrus barbadiensium, alatis fraxini foliis. *Pluk. alm. 92. t. 157. f. 1.*

Pruno forte affinis arbor maxima materie rubra laxa odorata. *Sloan. jam. 182. hist. 2. p. 128. t. 220. f. 2.*

Raj. dendr. 43.

Habitat in America meridionali. h

Linnaei Spec. plant. pars 1.

T

MAN

MANGIFERA.

indica.

1. MANGIFERA.

Mangifera arbor. *Bon. jav. 95. Fl. zeyl. 471.*Manga domestica. *Rumph. amb. 1. p. 93. t. 25.*Manga indica, fructu magno reniformi. *Raj. 1550.*Persicæ similis, putamine villoso. *Bauh. pin. 440*Mao f. Mau f. Manghos. *Rheed. mal. 4. p. 1. t.**Habitat in India. †**Racemus compositus, brachiatus; an flores omnes maphroditi? utrum una aut plures species, aliis determinet?*

CUPANIA.

americana.

1. CUPANIA.

Cupania castaneæ folio, fructu sericeo & rari
*Plum. gen. 45. ic. 110.**Habitat in America calidiore. †**Folia alterna, obovata, oblonga, obtusa, dentato
rata: nervis transversalibus crassis. Flores raci
an Monoici?*

HIRTELLA.

americana.

1. HIRTELLA. *Hort. cliff. 17. **Frutex innominatus. *Marcgr. bras. 78. f. 2. mal**Habitat in Basilia. †**Facies Royenæ lucidæ. Racemus simplex, erectus.*

RIBES.

** Ribesia inermia.*

rubrum.

1. RIBES inermis, racemis glabris pendulis, flo
planiusculis.*Ribes inermis, floribus planiusculis, racemis pen
Hort. cliff. 82. Fl. svec. 197, 205. Hort. ups. 51.
med. 99. Vir. cliff. 21. Roy. lugdb. 270. i
paris. 75.**Ribes vulgare acidum. Bauh. hist. 2. p. 97. Fl. lap
Grossularia, multiplici acino, f. non spinosa hor
rubra. Bauh. pin. 455.*β. Grossularia hortensis, fructu margaritis simili.
*pin. 455.**Habitat in Sueciæ borealibus. †*

RIBES inerme, racemis erectis, bracteis flore longi- alpinum:
oribus.

Ribes inerme, floribus planiusculis, racemis erectis.

Hort. cliff. 82. *Fl. svec.* 198, 206.

Ribes alpinum dulce. *Bauh. hist.* 2. p. 93. *Fl. lapp.* 97.

Grossularia vulgaris, fructu dulci. *Bauh. pin.* 455.

Grossularia distinctis baccis. *Bauh. pin.* 455.

Ribes montana, oxyacanthæ sapore. *Bauh. prodr.* 160.

Amæn acad. 1. p. 170.

Habitat in Sueciæ, Helvetiæ, Angliæ sepibus siccis. †

RIBES inerme. racemis pilosis, floribus oblongis. nigrum.

Ribes inerme, floribus oblongis. *Hort. cliff.* 269. *Hort.*

upf. 51. *Fl. svec.* 198, 207. *Mat. med.* 100. *Roy.*

lugdb. 269. *Dalib. parif.* 74.

Ribes vulgaris, fructu nigro. *Rudb. vall.* 32. *Fl. lapp.* 99.

Grossularia non spinosa, fructu nigro. *Bauh. pin.* 455.

Ribesium nigrum pensylvanicum, floribus oblongis.

Dill. eth. 324. t. 244. f. 315.

Habitat in Suecia, Helvetia, Pensylvania. †

* * *Grossulariæ aculeatæ.*

RIBES ramis subaculeatis reclinatis, pedunculi bra- reclinatum.
ctea triphylla.

Ribes ramis subaculeatis reclinatis. *Hort. cliff.* 82. *Hort.*

upf. 51. *Roy. lugdb.* 270.

Grossularia spinosa sativa altera, foliis latioribus. *Bauh.*
pin. 455.

Habitat in Germania, Helvetia. †

RIBES ramis aculeatis, petiolorum ciliis pilosis, bac- *Grossularia*
cis hirsutis.

Ribes ramis aculeatis, racemis erectis, baccis hirsutis.

Hort. cliff. 82.

Ribes ramis aculeatis erectis, fructu hispido. *Vir. cliff.*

21. *Roy. lugdb.* 269.

Grossularia, fructu maximo hispido margaritarum fere
colore. *Raj. hist.* 1484.

Habitat in Europa. †

RIBES ramis undique aculeatis. *Hort. upf.* 51.

Grossularia, oxyacanthæ foliis amplioribus, e linu hud- oxyacan-
sonis. *Pluk. amalth.* 212. *Dill. eth.* 166. t. 139. thoides.

f. 116.

Habitat in Canada. †

- Uva crispa. 7. **RIBES** ramis aculeatis, baccis glabris, pedicellis t
 ctea monophylla.
 Ribes ramis aculeatis erectis, fructu glabro. *Hort. c*
82. Fl. svec. 195, 208. Roy. lugdb. 273. Hall. h
346. Dalib. parif. 74.
 Grossularia simplici acino vel spinosa sylvestris. *Ba*
pin. 455.
Habitat in Europa boreali. †
- synobati. 8. **RIBES** aculeis subaxillaribus, baccis aculeatis ra
 mosis.
Habitat in Canada. Kalm. †
 Facies præcedentium. Folia parum fissa. Aculeus
 star spinæ sub alis. Pedunculi sæpius triflori. G
 men in flore hispidum, nec aculeatum. Corolla
 Grossulariæ. Baccæ magnitudine nucis coryli,
 dique armatæ aculeis robustis.

G R O N O V I A.

- scandens. 1. **GRONOVIA.** *Hort. cliff. 74.*
 Gronovia scandens lappacea, pampinea fronde. *Ha*
Mart. cent. 1. p. 40. t. 40. Amm. herb. 346.
Habitat in Vera Cruce.

H E D E R A.

- Helix. 1. **HEDERA** foliis ovatis lobatisque. *Fl. lapp. 91.*
svec. 190, 209. Hort. cliff. 74. Mat. med. 98. R
lugdb. 223. Hall. helv. 164.
 Hedera arborea. *Bauh. pin. 305.*
 β. Hedera poëtica. *Bauh. pin. 305.*
 γ. Hedera major sterilis. *Bauh. pin. 305.*
 δ. Hedera humi repens. *Bauh. pin. 305.*
Habitat in Europæ arboribus putrescentibus, in
sepibus. †
- quinquefo-
 lia. 2. **HEDERA** foliis quinatis ovatis serratis. *Hort. a*
74. Roy. lugdb. 223. Gron. virg. 24.
 Vitis hederacea indica. *Stapel. theatr. 364.*
 Edera quinquefolia canadensis. *Corn. canad. 99. t. 1*
 Helix. *Mitch. gen. 30.*
Habitat in Canada. †
 Capsula utrinque turbinata, bilocularis, polysper
 Flores masculi a femineis distincti. *D. Mitchel.*

VITIS.

- VITIS** foliis lobatis sinuatis nudis. vinifera.
Vitis foliis palmato - angulatis. *Hort. cliff.* 74. *Hort. upf.* 50. *Mat. med.* 97. *Gron. virg.* 144. *Roy. lugdb.* 222.
Vitis vinifera. *Bauh. pin.* 299.
Vitis corinthiaca f. *apyrena.* *Bauh. hist.* 2. p. 72. apyrena.
Habitat in Orbis quatuor partibus temperatis. †
Carrhus oppositifolius racemifero - floriferus.
- VITIS** foliis cordatis dentatis subtus villosis, cirrhis indica.
 racemiferis. *Fl. zeyl.* 99. *
Vitis sylvestris indica, acinis rotundis. *Raj. dendr.* 67.
Scembra Valli. Kheed. mal. 7. p. t. 6.
Habitat in India. †
- VITIS** foliis cordatis subtrilobis dentatis subtus to- Labrusca.
 mentosis.
Vitis hederæ folio ferrato. *Plum. spec.* 18. ic. 259. f. 1.
Vitis sylvestris virginiana. *Bauh. pin.* 299.
Vitis vinifera sylvestris americana, foliis averfa parte densa lanugine tectis. *Pluk. phyt.* 249. f. 1.
Vitis fructu minore rubro acerbo, folio subrotundo minus laciniato, subtus alba lanugine tecto. *Sloan. hist.* 2. p. 104. t. 210. f. 4.
Habitat in America septentrionali. †
- VITIS** foliis cordatis dentato-ferratis utrinque nudis. vulpina.
Vitis vulpina dicta virginiana nigra. *Pluk. alm.* 392.
Vitis aceris folio. *Raj. dendr.* 68.
Habitat in Virginia. †
- VITIS** foliis ternatis : foliolis subrotundis ferratis. trifolia.
Vitis pearme doorica, foliis ternis subrotundis ferratis.
Raj. dendr. 68.
Folium Cauffonis. *Rumph. amb.* 5. p. 450. t. 166. f. 2.
Habitat in India. †
Flores non vidi, hinc dubius utrum Vitis f. Cissi generis.
- VITIS** foliis quinatis : foliolis multifidis. *Hort. cliff.* laciniosa.
 74. *Roy. lugdb.* 223.
Vitis laciniatis foliis. *Corn. canad.* 182. t. 183.
Vitis apii folio. *Bauh. hist.* 2. p. 73.
Habitat †

- arbores. 7. VITIS foliis supradecompositis : foliolis lateralibus pinnatis.
Vitis caroliniana, foliis apii, uva corymbosa purpurea
 scente. *Act. bot. on.* 2. part. 2. p. 365. t. 24.
 Frutex scandens, petroselini foliis, virginianus clavus
 donatus. *Pluk. mant.* 85. t. 412. f. 2.
Habitat in Carolina; Virginia. 5

LAGOECIA.

- Cuminoides. 1. LAGOECIA. *Hort. cliff.* 73. *Hort. upf.* 52.
 Cuminum sylvestre, capitulis globosis. *Bauh. pin.* 1
 Cuminum sylvestre. *Cam. epit.* 518 *Gesn. epist.* 50.
Habitat in Creta, Lemno, Lysia, Galatia. 0

SAUVAGESIA.

- erecta. 1. SAUVAGESIA.
 Ireon herbaceus minor, foliis oblongis tenuissime denatis,
 stipulis, ciliatis, floribus singularibus adaxialibus.
Brown, jam. 179. t. 12. f. 3.
Habitat in Domingo, Jamaica, Surinamo. 0
Habitat Hyperici aut Corchori. Caulis erectus. Lilia
 alterna, ovato-lanceolata, obtuse serrata. Stipulae
 acutae, ciliatae.

CLAYTONIA.

- virginica. 1. CLAYTONIA foliis linearibus.
Claytonia. *Green. v. 2.* 25
 Ornithogalo affinis virginiana, flore purpureo per
 perloide. *Pluk. alm.* 272. t. 102. f. 3. *Rudb. chys.*
 p. 139. f. 6.
Habitat in Virginia. 24
- fibrica. 2. CLAYTONIA foliis ovatis. *Hort. upf.* 52. *
 Limnia. *Act. stohk.* 1746. p. 130. t. 5. *
Habitat in Sibiria 24

ACHYRANTHES.

- sanguinolenta. 1. ACHYRANTHES caule erecto simplicissimo, sp
 brachiatis laevibus.
 Verbena rubra. *Rumph. amb.* 7. p. 60. t. 27. f. 2.
Habitat in India. 24
 Caulis humanae altitudinis, simplicissimus. Folia
 pefita, ovata, integra, petiolata, subtus sanguin

2a. Spicæ terminales, brachiatae, leves. Flores parvi, Stamina 5 alterna castrata.

ACHYRANTHES caule patulo, floribus spicatis remotis ovatis, calycibus squarroso-patulis, foliis alternis. muricata.

Blitum frutescens. Rumph. amb. 5. p. 235. t. 83. f. 2.
Habitat in India. §

Frutex Caule patulo. Folia alterna, petiolata, ovata & integra, nudiuscula. Spicæ alternæ, pedunculatæ, longæ, A. asperæ, at Flores remotiores, magis ovati, non reflectuntur, sed calycis squamæ tres breviores patulæ.

ACHYRANTHES caule erecto, calycibus reflexis spicæ adpressis. *Fl. zeyl.* 105. aspera.

Achyranthes caule erecto. *Hort. cliff.* 42. *Roy. lugdb.* 418.

Amaranthus ficulus spicatus. Boct. sic. 16. t. 9. *Pluk. ficula.* phyt. 260. f. 2.

Amaranthus spicatus zeylanicus, foliis obtusis amarantho ficulo boconni similis. *Burm. zeyl.* 16. t. 5. f. 3. indica.

Amaranthus spicatus, dictamni cretici folio, maderaspatensis. *Pluk. alm.* 26. t. 10. f. 4. *Mill. dict.* t. 11. f. 2.

Habitat in Sicilia, Zeylona, Jamaica. §

Indica β. caule & fructificatione simillima, sed folia obovata obtusa, crassa, undulata quintuplo majora, hybridam indicant.

ACHYRANTHES caule patulo, spicis interruptis: flosculis ternis: lateralibus utrinque fasciculo setarum uncinato. lappacea.

Achyranthes caule erecto, spica interrupta, floribus externe lanatis. *Sp. pl.* 1. p. 204.

Achyranthes floribus externe lanatis interrupte spicatis. *Fl. zeyl.* 103.

Blitum scandens, fructu lappaceo. *Burm. zeyl.* 47. t. 18 f. 1.

Centaurium ciliare minus, circææ foliis firmioribus, spicatis floribus. *Pluk. alm.* 93. t. 82. f. 2.

Wellia Codivelli. *Rheed. mal.* 10. p. t. 59.

Habitat in India:

Spicæ longæ, solitariae, interruptæ: ad singulos dentes pedunculi Flores 3 transverse positi, ad latera florum.

rum lateralium utrinque penicillus purpureus, et
tis rigidis uncinatis, sensim se pandentibus in
lam lappaceam, maturo fructu discedentem
harentem.

- prostrata. 5. **ACHYRANTHES** caulibus prostratis, spicis
longis: flosculis binatis utrinque fasciculo fetarum
uncinato.

Auris anina f. mina. *Rumph. amb. 6. p. 26. t. 11.*

Verbena indica. *Bont. jav. 150. t. 150.*

Habitat in India. 24

Caul'es prostrati, sæpe repentes, sesquipedales, di-
ricati, bipedales, atropurpurei, pilosi. Folia oppo-
obovata, subpetiolata, subpilosa, acuta, margine
purascentia. Spicæ e dichotomia, pedunculatæ, se-
tariæ, oblongæ, virides, apice purpurascentes. Flo-
res minuti, subpedicellati, gemini, calyce com-
triphylo mucronato; ad latera alterius flosculi pe-
cillus purpureus setis uncinatis. Fructus reflexi
ovati, obtusi.

- lanata. 6. **ACHYRANTHES** caule prostrato, spicis ovatis
teralibus, calycibus tomentosis. *Mill. dict. t. 11. f.*
Chenopodium incanum r *cemosum*, folio majora
nori opposito. *Burm. zeyl. 60. t. 26. f. 1.*
Amaranthus indicus verticillatus albus, foliis lan-
incanus. *Pluk. alm. 27. t. 57. f. 8.*
Scherubala. Rhe.d. mal. 10. p. 75. t. 29.
Habitat in India.

- corymbosa. 7. **ACHYRANTHES** foliis oppositis linearibus, pe-
cula dichotomia. *Fl. zeyl. 100.*
Peronychia foliis ad genicula confertis acutis, flo-
bus umbellatis. *Burm. zeyl. 184. t. 65. f. 2.*
Amaranthus folio tenuissimo incano mollugini æ-
lante. *Bocc. mu. 44. t. 39.*
Elichryso affinis herba indica polygonoides ramosa
foliis caulium nodos ambientibus. *Pluk. alm. 134*
86. f. 6.
Habitat in Zeylona.

C E L O S I A.

- argentea. 1. **CELOSIA** foliis lanceolatis, stipulis subsalcatis,
dunculis angulatis, spicis scariosis.

Celosia foliis lineari-lanceolatis. *Hort. cliff.* 43. * *Roy. lugdb.* 419.

Amaranthus spica albescente habitiore. *Mart. cent.* 7. t. 7.

Habitat in China. ☉

CELOSIA foliis ovatis, stipulis falcatis, pedunculis angulatis, spicis scariosis. *margaritacea*

Amaranthus simplici panicula. *Bauh. pin.* 121.

Amaranthus spica albescente habitiore. *Mart. cent.* 7. t. 7.

Habitat in America. ☉

Millima C. argentea, ut fere varietas, sed Folia fere ovata, stamina purpurea.

CELOSIA foliis lanceolato-ovatis recurvis subundatis, pedunculis angulatis, spicis oblongis cristatis. *cristata.*

Celosia foliis oblongo-ovatis, pedunculis teretibus subtstriatis, spicis oblongis. *Sp. pl.* 1. p. 205.

Celosia foliis lanceolato-ovatis. *Hort. cliff.* 43. *Hort. upf.* 52.

Amaranthus panicula conglomerata. *Bauh. pin.* 121.

Amaranthus major, paniculis surrectis flavescentibus. *Herm. lugdb.* 30.

Habitat in Asia. ☉

CELOSIA foliis lanceolato-ovatis lineatis acuminatissimis, stipulis falcatis, spicis cristatis. *eastrensis.*

Amaranthus cristatus. *Cam. epit.* 792.

Amaranthus minor, spica singulari, lunatis circumcaulem foliis. *Barr. rar.* 471. t. 1195. *Bocc. mus.* 2. p. 77. t. 65.

Amaranthus vulgaris. *Rumph. amb.* 5. p. 236. t. 84.

Habitat in India. ☉

Rami laterales ex singulis alis. Folia subtus venis rubris striata: inferiora sæpe ternata. Stipulæ dimidiatæ, falcatæ.

CELOSIA foliis ovatis strictis inauriculatis, caule sulcato, spicis multiplicibus cristatis. *coccinea.*

Amaranthus panicula incurva. *Bauh. pin.* 121.

Amaranthus panicula speciosa cristata. *Bauh. hist.* 2. p. 969.

Habitat in India.

Differt ab C. cristata foliis triplo crassioribus, fragilibus.

Floribus penitus purpureis, nec rubicundis, et
purpurea. Stamina corolla brevioribus, nec
gioribus.

- paniculata. 6. CELOSIA foliis oblongo-ovatis, caule assurgens
spicis terminalibus alternis remotis.
Celosia major sarmentosa assurgens, foliis majoribus
ovatis. *Brown. jam. 179.*
Blitum album majus scandens. *Sloan. jam. 49. h.
p. 142. t. 91. f. 2.*
Habitat in Jamaica.
Caulis prostratus, teres, ramosus. Folia alternata,
acuminata. Rami terminati paniculae spicis
alternis, saepe ramosis. Flores alterni, distincti,
minima corolla breviora. Stigma trifidum.
- lanata. 7. CELOSIA foliis lanceolatis tomentosis obtusis,
cis confertis, staminibus lanatis. *Fl. zeyl. 102.*
Habitat in Zeylona.
- nodiflora. 8. CELOSIA foliis cuneiformibus acutiusculis,
globosis lateralibus. *Fl. zeyl. 101. **
Amaranthoides indicum nodiflorum, capitulis
virescentibus. *Burm. zeyl. 16. t. 5. f. 2.*
Amaranthoides indicum globosum, ad caulium
floridum, foliis solitariis summo apice barbato.
Pluk. alm. 27. t. 133. f. 2.
Habitat in Zeylona.

ILLECEBRUM.

* *Caulibus prostratis.*

- verticillatum. 1. ILLECEBRUM floribus verticillatis nudis, caulis
procumbentibus.
Illecebrum caulibus procumbentibus. *Roy. lugdb.
Dalib. parif. 76, 126.*
Illecebrum. *Hort. cliff. 492.*
Paronychia serpillifolia palustris. *Vaill. parif. 1
15. f. 1.*
Polygala repens nivea. *Bauh. pin. 215.*
Habitat in Europæ pascuis udis.
- suffruticosum. 2. ILLECEBRUM floribus lateralibus solitariis,
libus suffruticosis
Illecebrum caule erecto. *Roy. lugdb. 214.*

Polygonum herniariæ foliis. *Lob. adv.* 404. *Dalech. hist.* 1124?

Paronychia hispanica fruticosa, myrti folio. *Tournef. inst.* 508.

Habitat in Hispania.

ILLECEBRUM spicis cymosis secundis, caule dif- cymosum.
fuso, foliis quaternis

Polygonum capitula inter genicula echinata. *Bocc. sic.*

41. t. 20. f. 3. *Raj. bist.* 214.

Polygonum hispanici genus Clusii. *Dalech. hist.* 1125?

Habitat Monspelii. *D. Sauvages. Lusitania, Ilva.* ☉

antia facie Sedi aut Polygoni; Caulis filiformis,

brachiatus. Folia subquaterna, linearia, crassiuscula.

Flores digesti in spicas secundas, Spicæ in cymastam

laterales quam terminales. Calyces pentaphylli, co-

lorati, apice fornicati aristati; in viva Generis certitu-
dinem inquirant autoptæ.

ILLECEBRUM floribus bracteis nitidis obvallatis, *Paronychia.*
caulibus procumbentibus.

Herniaria squamis nitidis flores superantibus. Hort.

cliff. 41. *Hort. upf.* 54. *Roy. lugdb.* 2 5. *Sauv.*

monsp. 129.

Paronychia hispanica. Clus. hist. 2. p. 183.

Polygonum minus candicans. Bauh. pin. 281.

Habitat in Hispania & Narbona. 4

ILLECEBRUM floribus bracteis nitidis occultan- capitatum.
tibus capitula terminalia, caulibus erectis, foliis
ciliatis.

Herniaria erecta, squamis nitidis flores occultantibus.

Sauv. monsp. 129.

Paronychia narbonensis erecta. Tournef. inst. 508.

Polygonum minus candicans, capitulis surrectis. Magn.

monsp. 209.

Polygonum montanum niveum minimum. Lob. ic.

420.

Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Oriente.

Folia ciliata, subtus villosa.

* * *Caulibus repentibus.*

ILLECEBRUM caulibus repentibus pilosis, foliis *Achyrantha.*
ovatis mucronatis opposito minore, capitulis sub-
globosis subspinosis.

Achyranthes repens, caule repente, capitulis latis sessilibus. *Sp. pl.* 1. p. 205.

Achyrantha repens, foliis bliti pallidi. *Dill. ch.* t. 7. f. 7.

Habitat in Turcomannia. ☉

polygono-
ides.

7. **ILLECEBRUM** caulibus repentibus hirtis, lato-lanceolatis petiolatis, capitulis orbiculatis
Gomphrena polygonoides. *Sp. pl.* 1. p. 225.

Herniaria hirsuta repens ad nodos alternos flo.
Brown. jam. 184.

Amaranthoides humile curassavicum, foliis poly
Herm. prodr. 17. t. 17. *Sloan. jam.* 48. *hist.* 1
141. t. 86. f. 2. *Raj. suppl.* 126.

β. *Amaranthoides marina hirsuta*, halimi folio.
ic. 94. t. 21. f. 2.

Habitat in Americæ littoribus maris.

Simillima sequenti, sed caule, non flore villoso.

ficoideum.

8. **ILLECEBRUM** caulibus repentibus glabris, lato-lanceolatis petiolatis, capitulis orbiculatis
sessilibus.

Gomphrena ficoidea. *Syst. nat.* 1. p. 225.

Gomphrena caule diffuso repente, capitulis sessilibus.
Roy. lugdb. 418.

Amaranthoides marina repens, polygони folio,
tulis argenteis. *Plum. spec.* 20.

Habitat in marinis littoribus Americæ, nunc H
niæ. 2.

Corollæ acutis oculis pubescentes sunt.

sessile.

9. **ILLECEBRUM** caulibus repentibus glabris, lanceolatis subsessilibus, capitulis oblongis gl
Gomphrena sessilis. *Sp. pl.* 1. p. 225. *Fl. zeyl.* 116

Amaranthoides humile maderaspatanum, capitulis
dicantibus, folio molli. *Pluk. alm.* 27. t. 133. f.

Amaranthus humilis, foliis oppositis, flosculis et
glomeratis. *Burm. zeyl.* 17. t. 4. f. 2.

Coluppa. *Rheed. mal.* 10. p. 21. t. 9.

Habitat in India Orientali.

Folia angustiora quam in I. ficoideo; petala glabra.

vermicula-
tum.

10. **ILLECEBRUM** caulibus repentibus glabris, subteretibus carnosis, capitulis oblongis glabri
minalibus.

Gomphrena vermicularis. *Sp. pl.* 224.

Caraxeron humile, cepeæ foliis, capitulis albis. *Vaill. art. 1722. p. 264.*

Lomphrena repens rufescens, foliis linearibus crassiusculis. *Brown. jam. 184.*

Amaranthoides humile curassavicum, cepeæ foliis lucidis, capitulis albis. *Herm. par. 15. t. 15. Pluk. alm. 27. t. 75. f. 9.*

Amarantho affinis aizoides f. *Amaranthoides minor americana procumbens*, sedi teretifolii foliis & facie, flore oblongo niveo. *Breyn. prodr. 2.*

Trifolii spica Crithmum marinum non spinosum brasiliense. *Raj. hist. 1331.*

abitat in Brasilia, Curassao.

G L A U X.

GLAUX. Hort. cliff. 43. Fl. svec. 199, 210. Roy. maritima. Lugdb. 417.

Glauz foliis elliptico-oblongis. Fl. lapp. 72.

Glauz maritima. Bauh. pin. 215.

Glauz sine bifolia, fructu coriandri, radice geniculata. Læsel. pruss. 13. t. 3.

abitat in Europæ maritimis, salsis. 24

T H E S I U M.

THESIUM panicula foliata, foliis lineari-lanceolatis. Linophyl-
lon.

Thesium. Hort. cliff. 41. Hall. helv. 183. Dalib. par. ris. 75.

Thesium floribus sparsis. Sauv. monsp. 48.

Thesium montana, flosculis albicantibus Bauh. pin. 213.

Thesium amoides procumbens montanum, linariæ folio, floribus albicantibus. Moris. hist. 3. p. 601. f. 15. t. 1. f. 3.

Thesium synonymos lini folio. Clus. hist. 1. p. 324.

Thesium nobrychis IV lutea. Bauh. pin. 215. Dalech. hist. 491.

abitat in Europæ siccis montosis, Cretaceis & in Oriente. ☉

THESIUM racemo foliato, foliis linearibus. alpinum.

Linophyllum collinum lignosum minus, flore albicante.

Mont. anth. 261. Segu. ver. 3. p. 90.

Thesium alpinum, linariæ foliis, calyce florum albo in foliorum alis. Till. pis. 6.

Alchimilla linariæ folio, floribus & vasculis in rum alis sessilibus. Shaw. spec. 14.

Habitat in Italiæ alpibus, in Sveciæ collibus. ☉

Differt a præcedenti Caulibus non ramosis; Folnearibus, nec lanceolatis; confertis, nec remotis. cemo pedicellis unifloris brevissimis, folio uniminali, duobusque lateralibus minoribus, nec lato floribus ternis quinive. Floribus sæpius quidis, nec quinquefidis

capitatum. 9. **THESIUM** capitulis sessilibus terminalibus, folquetris lævibus.

Thesium floribus capitatis. Roy. lugdb. 214.

Habitat in Æthiopia. ☿

Caules duri: Ramis alternis, remotis, superis sensim longioribus. Folia alterna, parva, sub mucronata. Capitula terminalia, sub quibus excrescit. Florum laciniæ valde acuminatæ & secundum totam longitudinem villosæ.

scabrum. 4. **THESIUM** capitulis pedunculatis, foliis triquamargine scaberrimis.

Habitat ad Cap. b. spei. ☿

Simillima T. capitato, sed Capitula longo pedunculo; Flores obtusifusculi, tantum ad apices villosi: Folia triplici angulo cartilagineis dentibus asperata.

funale. 5. **THESIUM** floribus spicatis, corollis ciliatis, suffruticoso, foliis subulatis brevissimis.

Habitat ad Cap. b. spei. ☿

Fruticulus facie Schæni capensis, subnudus: numerosis, alternis, confertis, virgatis, simpliciteretibus, filiformibus. Folia subulata, alternamota minutissima. Spicæ terminales, 2. f. ternæ.

umbellatum 6. **THESIUM** floribus umbellatis, foliis oblongo

Centaurium luteum aescyroides virginianum. mant. 43. t. 342. f. 1.

Habitat in Virginiæ, Pennsylvaniae pascuis Kalm. 24

Radix perennis. Folia alterna, ovali-lanceolata gerrima. Rami alterni, in summitate caulis

ulae racemose, terminales: involuero tetraphyllo, no: Flosculi 5. f. 3.

RAUVOLFIA.

VOLFIA glaberrima nitidissima. *Jacq. amer. 14. nitida.*
olia. Hort. cliff. 75. t. 9.

olia tetraphylla angustifolia. Plum. gen. 19. ic. f. 1.

it in America meridionali. †

VOLFIA subpubescens. *canescens.*

olia fruticosa, foliis verticillatis tenuissime villosa. Brown. jam. 180.

olia tetraphylla latifolia. Plum. gen. 19. ic 236. f. 2.

li fructu fruticosa, foliis laurinis oblongis integeribus subtus hirsutis. Sloan. jam. 173. hist. 2. p. 107.

II. f. 1. Raj. dendr. 75.

† Sycophora jamaicensis, foliis minoribus. Pluk. t. 266. f. 2.

at in Jamaica. †

subtumentosi. Folia subtus potius tomentosa, quam supra.

CERBERA.

CERBERA foliis ovatis. *Ahouai.*

etia. Hort. cliff. 75. Roy. lugdb. 413.

ai. Thev. antarct. 66. Tournef. inst. 658. Raj. t. 1676.

ai major. Pis. bras. 49.

r americana, foliis pomi, fructu triangulo. Bauh. t. 434.

at in Brasilia. †

CERBERA foliis lanceolatis: nervis transversalibus. *Manghas.*

*zeyl. 106. * Osb. it. 91.*

ghas lactescens, foliis nerii crassis venosis, jasmiflora, fructu persici simili venenato. Burm. zeyl. t. 70. f. 1.

ghas fructu venenato. Bauh. pin. 440. Raj. hist. t. 52.

or lactaria. Rumph. amb. 2. p. 243. t. 81.

lam. Rheed. mal. 1. p. 71. t. 39.

† at in Indiis ad aquas. †

or lactescens. Folia alterna, sparsa ad apices ramulorum,

rum, lato-lanceolata, petiolata, glabra, integripedalia. Racemi terminales, ramosi, inæq. Perianthium pentaphyllum foliolis lanceolatis, 11 tubis, coloratis, deciduis. Corolla alba, infundibuliformis: Tubo calyce longiore, interne angulato. Limbo quinquepartito, lobis ovatis, tubo brevior. Stamina filamenta 5, brevissima, tubi superioris parti inserta. Antheræ ovatae, tetragonæ, tectæ gine tubi. Pist. Germen bifidum. Stylus filiformis tubo fere brevior. Stigma ovatum, fissum. Pericarpium Drupa ovata, magnitudine ovi anseris, punctis albis minutissimis, uno latere compressa futuraque obsoleta; Semina 2, veluti duas castagnas includens, venenatum, vomitorium. Osbe

Thevetia.

3. CERBERA foliis linearibus longissimis confertis
Jacq. hist. t. 34.

Ahouai nerii folio, flore luteo. Plum. spec. 20. 11
Nerio affinis angustifolia lactescens, flore luteo.
alm. 253. t. 207. f. 3.

Habitat in America calidiorè. †

V I N C A.

minor.

1. VINCA caulibus procumbentibus, foliis lanceolatis, floribus pedunculatis.

Vinca foliis ovatis. Hort. cliff. 77. Hort. ups. 53.
med. 101. Roy. lugdb. 412. Dalib. parif. 75.

Clematis Daphnoides minor. Bauh. pin. 301.

Clematis Daphnoides. Dod. pempt. 405.

Habitat in Germania, Anglia, Gallia. †

Caules procumbentes, Folia obtusiora margine inferiori
Pedunculi curvati; Calyces breves.

major.

2. VINCA caulibus erectis, foliis ovatis, floribus pedunculatis.

Clematis Daphnoides major. Bauh. pin. 302.
pempt. 406.

Habitat in Gallia Narbonensi, Hispania. †

Affinis nimis præcedenti, sed Crukes erecti; Folia
cutiora, margine scabra; pedunculi recti; Calyces
gitudine tubi.

lutea.

3. VINCA caule volubili foliis oblongis. Amæn.
4. p. 207.

Apocynum scandens, salicis folio, flore amplo plano.

Cuesb. car. 2. p. 53. t. 53.

Habitat in Carolina. §

VINCA caule suffrutescente erecto, floribus geminis sessilibus foliis, oblongis petiolis basi bidentatis. rosea.

Vinca foliis oblongo-ovatis integerrimis, tubo floris longissimo, caule ramoso fruticoso. *Mill. dict.* t. 186.

Habitat in Madagascar, Java. §

Caulis rigidulus, teres, levis. Folia opposita, lanceolato-ovalia, coriacea rachi alba: Petiolis utrinque basi denticulo. Flores axillares foliorum, sessiles, gemini. Calyx in setas 5, subulatas. Corolla hypocrateriformis, rosea, pulcherrima, plana: Laciniis semisalcatis, obtusis, mucronatis: umbilico atro-purpureo, obtuso, villosa; Tubus longiusculus, clavatus, clava 5 tuberculis.

GARDENIA.

GARDENIA. *Ellis act. angl. vol. 51. p. 392. t. 23.* florida.

aluminum foliis lanceolatis oppositis integerrimis, calycibus acutioribus. *Mill. ic. t. 180.*

Cotsjopiri. Rumph. amb. 7. p. 26. t. 14. f. 2.

Habitat in India orientali: Suratte, Amboina, Cap. b. spei. §

Misit figuram Wachendorf, iconem Ellis, vivam plantam Garden, at flore pleno; unde fructus etiamnum ignotus, diversa certe est a Nandi Ervalam Rheed. mal. 2. t. 54. & Rumph. amb. 4. t. 39. uti ex calyce constat; propius accedere videtur ad Jasminum indicum, mali aurantiæ foliis, flore albo pleno amplissimo. Breyn. prodr. 3. p. 73. Till. pis. 87. t. 30, nisi flores pedunculatos pingeret; qui in Gardenia sessiles sunt.

NERIUM.

NERIUM foliis lineari-lanceolatis ternis. *Hort. cliff.* Oleander.

76. Hort. upf. 53. Fl. zeyl. 108. Roy. lugdb. 412.

Nerium floribus rubescentibus. *Bauh. pin. 464. Burm. zeyl. t. 77.*

Rhododendrum. Dod. pempt. 851.

Areli. Rheed. mal. 9. p. 1. t. 1, 2.

Linnei Spec. plant. pars 1.

V

Ha-

Habitat a Gades in Indiam orientalem locis humidis. ♀

- divaricatum. 2. **NERIUM** foliis lanceolato-ovatis, ramis divaricatis. *Fl. zeyl.* 109. *
Apocynum zeylanicum indicum frutescens, nerii candidissimo. Herm. par. 40.
Habitat in India. ♂
- antidysentericum. 3. **NERIUM** foliis ovatis acuminatis petiolatis. *Fl.* 107. *Mat. med.* 102.
Codaga pala. Rheed. mal. 1. p. 85. t. 47.
Habitat in India. ♀
- zeylonicum. 4. **NERIUM** foliis lanceolatis oppositis, ramis re-
Amæn. acad. 4. p. 309. *
Apocynum arborescens, nerii flore minus. B
zeyl. 23. t. 12. f. 2.
Habitat in India. ♀

PLUMERIA.

- rubra. 1. **PLUMERIA** foliis ovato-oblongis, petiolis biglandulosis. *Hort. cliff.* 76. *Roy. lugdb.* 412.
Plumeria arborescens, ramulis crassis, foliis oblongo-ovatis, petiolis biglandulosis, floribus geminatis spicas terminales. Brown. jam. 181.
Plumeria flore roseo odoratissimo. Tournesf. inst. Catesb. car. 2. p. 92. t. 92. *Ehret. pict.* t. 10. 1
Ehret. t. 41.
Nerium arboreum, folio maximo obtusiore, floribus carnato. Sloan. jam. 154. *hist.* 2. p. 61. t. 185. 2
♂ t. 186 f. 1.
Jasminum indicum. Mer. surin. 8. t. 8.
Clematis arborea americana, laurinis amplissimis flore laccæ colore odoratissimo. Pluk. mant. 50. 109. t. 207. f. 2.
Habitat in Jamaica, Surinamo. ♀
- alba. 2. **PLUMERIA** foliis lanceolatis revolutis, pedunculis superne tuberosis.
Plumeria flore niveo, foliis longis angustis & acuminatis. Plum. spec. 20. ic. 231.
Apocynum americanum frutescens, longissimo folio flore albo odoratissimo. Comm. hort. 2. p. 47. t. 1
 N

Nerium arboreum altissimum, folio angusto, flore albo.

Sloan. jam. 154. hist. 2. p. 62. Raj. dendr. 114.

Herm. parad. 49.

Habitat in Jamaica.

Folia lateribus revoluta. Flores spicati.

PLUMERIA foliis lanceolatis petiolatis obtusis. obtusa.

Plumieria flore niveo, foliis brevioribus obtusis. T.

Catesb. car. 2. p. 93. t. 93. Plum. ic. 232.

Flos convolutus. Rumph. amb. 4. p. 85. t. 38?

Habitat in America calidiore. †

Folia ovali-lanceolata. Pedunculi ramosi.

ECHITES.

ECHITES pedunculis bifloris. *Jacq. amer. 13. biflora*
hist. t. 21.

Apocynum scandens, flore nerii albo. Plum. amer.

82. t. 96.

Habitat in America. †

ECHITES pedunculis racemosis, foliis obovatis acu- quinquan-
minatis. *Jacq. amer. 13. hist. t. 25.* gularis.

Habitat in America meridionali. †

ECHITES pedunculis racemosis, foliis subovatis ob- subrecta.
tusis mucronatis. *Jacq. amer. 13. hist. t. 26.*

Apocynum erectum fruticosum, flore luteo maximo &
speciosissimo. Sloan. jam. 89. hist. 1. p. 206. t. 130.

f. 2.

Habitat in Jamaica. †

ECHITES pedunculis subracemosis, foliis lanceola- torulosa.
tis acuminatis. *Jacq. amer. 13. hist. t. 27.*

Nerium surmentosum scandens, ramulis tenuibus, fol-
liculis gracilibus torosis. Brown. jam. 181. t. 16. f. 2.

Habitat in Jamaica. †

Folliculi filiformes, torulosi, longissimi.

ECHITES pedunculis umbellatis, foliis ovatis obtu- umbellata,
sis mucronatis, caule volubili. *Jacq. hist. t. 22.*

Periploca alia, floribus amplis circinatis & crispis, ra-
dice Bryoniae tuberosa. Plum. ic. 216. f. 2?

Apocynum scandens majus, folio subrotundo. Sloan.
jam. 89. hist. 1. p. 207. t. 131. f. 2.

Echites scandens, foliis ovatis nitidis venosis, i herbaceis. *Brown jam.* 182.

Habitat in Jamaica.

trifida.

6. **ECHITES** pedunculis trifidis multifloris, foliis to-oblongis acuminatis. *Jacq. amer.* 13. *hist.* 1. *Habitat in America.* ‡

CAMERARIA.

latifolia.

1. **CAMERARIA** foliis ovatis utrinque acutis uerse striatis. *Hort. cliff.* 76. *Roy. lugdb.* 412. *Cameraria lato myrti folio.* *Plum. gen.* 18. *ic.* 7. *Cameraria arborea*, foliis ovato-acuminatis nitidis reflexis. *Brown, jam.* 182. *Habitat in America calidiore.*

angustifolia.

2. **CAMERARIA** foliis linearibus. † *Cameraria angusto linariæ folio.* *Plum. gen.* 18. *ic.* 7. *Habitat in America calidiore.*

TABERNÆMONTANA.

citrifolia.

1. **TABERNÆMONTANA** foliis oppositis ovifloribus lateralibus glomerato-umbellatis. *Tabernæmontana foliis lanceolatis.* *Hort. cliff.* 76. *lugdb.* 413. *Tabernæmontana citri foliis undulatis.* *Plum. gen. ic.* 248. *f.* 2. *Pala. Rheed. mal.* 1. *p.* 81. *t.* 46. *Habitat in utraque India.* ‡

laurifolia.

2. **TABERNÆMONTANA** foliis oppositis ovato-obtusiusculis. † *Tabernæmontana laurifolia*, flore albo, fructu rediore. *Amm. herb.* 212. *Nerium arboreum*, folio latiore obtuso, flore minore. *Sloan. jam.* 154. *hist.* 2. *p.* 62. *t.* 186. *Habitat in Jamaica ad ripas fluviorum.* ‡

alternifolia.

3. **TABERNÆMONTANA** foliis alternis, caulibus scente. *Curutu-pala.* *Rheed. mal.* 4. *p.* t. 43. *Raj. hist.* 1. *Habitat in Malabaria.* ‡

Amfonia.

4. **TABERNÆMONTANA** foliis alternis, caulibus subherbaceis.

ymus suffrutex. Gron. virg. 26.

at in Virginia. 21

s Camerariae & Tabernemontana. Folia alterna, lanceolata, subsessilia, levia. Rami alterni, cernuus compositus, terminalis. Folliculi 2, reflectetes, longi, acuminati. Semina cylindrica, scabra. Antheræ intra corollæ faucem. Stigma capitatum supra orbiculum membranaceum.

CEROPEGIA.

OPEGIA umbellis pendulis, floribus erectis. Candelebrum. niodem-valli. Rheed. mal. 9. p. 27. t. 16.

at in Malabaria. 21

*OPEGIA pedunculis bifloris, Fl. zeyl. 46. * biflora. at in Zeylona. 21*

DIGYNIA.

PERIPLOCA.

PERIPLOCA floribus interne hirsutis, oca foliis lanceolato-ovatis. Hort. cliff. 78. Roy. b. 410. græca.

ymum folio oblongo Bauh. pin. 303.

ymum 2 angustifolium. Clus. hist. 1. p. 125.

at in Syria. 21

*PERIPLOCA spicis imbricatis. oca foliis ovatis acutis glabris, spicis imbricatis. zeyl. 113. * indica.*

ymum caule volubili perenni, foliis ovato-lanceolatis. Roy. lugdb. 412.

oca foliis angustis acutis glabris. Burm. zeyl. 187. 3. f. 1.

ymni genus scandens ex india orientali. Pluk. mant. t. 359. f. 2.

at in Zeylona. 21

PERIPLOCA caule hirsuto. ymum caule volubili ramoso, foliis subovatis acuminatis. Hort. cliff. 79. africana.

ymum scandens africanum, vincæ pervincæ folium, subincanum. Comm. rar. 18. t. 18.

Apocynum scandens africanum, convolvuli minoris folio, & caule hirsuto. *Pluk. alm.* 37. t. 137. f. 4.

Apocynum indicum minus, nummulariæ foliis. *Morif. hist.* 3. p. 611. f. 15. t. 3. f. 62.

β. Cynanchum foliis planis sinuatis, flore pallide viridi fructu crasso glabro viridi. *Burm. afric.* 34. t. 1. f. 2.

Habitat in Africa. 2.

tenuifolia,

4. PERIPLOCA foliis lineari-lanceolatis. Cynanchum radice granulosa, foliis angustis sinuatis floribus urceolatis miniatis. *Burm. afric.* 36. t. 15.

β. Cynanchum linearibus foliis acutis, floribus urceolatis rubris. *Burm. afric.* 37. t. 16. f. 1.

Habitat in Cap. b. Spei dunis.

CYNANCHUM.

acutum,

1. CYNANCHUM caule volubili herbaceo, foliis cordato-oblongis glabris. *Hort. cliff.* 79. *Hort. ups.* 5. *Roy. lugdb.* 409.

Scammonia monspeliacæ affinis, foliis acutioribus. *Bauh. pin.* 294.

Apocynum 3 latifolium. *Clus. hist.* 1. p. 125.

Habitat in Sicilia, Hispania, Astracan. 2.

suberosum,

2. CYNANCHUM caule volubili inferne suberoso folio, foliis cordatis acuminatis. *Hort. cliff.* 79. *Roy. lugdb.* 409. *Gron. virg.* 27.

Periploca carolinienfis, flore minore stellato. *Dill. d.* 300. t. 229. f. 296.

Habitat in America calidior.

hirsutum,

3. CYNANCHUM caule volubili fruticoso inferne suberoso fisso, foliis ovato-cordatis. *Hort. cliff.* 79. *Roy. lugdb.* 410.

Periploca scandens, folio citrei, fructu maximo. *Plum. spec.* 2.

Apocynum scandens virginianum rugosum, pullis amplis floribus, capsulis alatis. *Morif. hist.* 3. p. 611. 15. t. 3. f. 61.

Apocynum scandens fruticosum, fungoso cortice, rinamense. *Herm. par.* 53.

Habitat in America. 3.

4. CY-

- CYNANCHUM** caule volubili herbaceo, foliis reniformi-cordatis acutis. *Hort. cliff.* 79. *Roy. lugdb.* 409. *Sauv. monsp.* 133. monspeliacum.
- Scammonea monspeliaca*, foliis rotundioribus. *Bauh. pin.* 294.
- Apocynum** IV. latifolium. *Scammonea valentina.*
Clus. hist. 1. p. 126.
- Habitat in Hispania & Narbonæ maritimis.* 24
- CYNANCHUM** caule erecto divaricato, foliis cordatis glabris. *Hort. cliff.* 79. *Roy. lugdb.* 409. *Sauv. monsp.* 133. erectum.
- Apocynum** folio subrotundo. *Bauh. pin.* 302.
- Apocynum** 1. latifolium. *Clus. hist.* 1. p. 124.
- Habitat in Syria.* 24

A P O C Y N U M.

- APOCYNUM** caule rectiusculo herbaceo, foliis ovatis utrinque glabris, cymis terminalibus. androsæmi-folium.
- Apocynum** caule erecto annuo, foliis ovatis. *Roy. lugdb.* 411.
- Apocynum** foliis ovatis. *Hort. cliff.* 80.
- Apocynum** canadense, foliis androsæmi majoris. *Bocc. succ.* 35. t. 16. f. 3. *Morif. hist.* 3. p. 609. f. 15. t. 3. f. 16.
- Habitat in Virginia, Canada.* 24
- APOCYNUM** caule rectiusculo herbaceo, foliis oblongis, paniculis terminalibus. cannabium *Kalm. it.* 3. p. 258.
- Apocynum** foliis ovatis acutis subtus tomentosis. *Gron. virg.* 28.
- Apocynum** canadense ramosum, flore e viridi albicante, siliqua tenuissima. *Morif. hist.* 3. p. 609. f. 15. t. 3. f. 14.
- Apocynum** virginianum, flore herbaceo, siliqua longissima. *Morif. præl.* 232.
- Apocynum** canadense maximum, flore minimo herbaceo. *Pluk. alm.* 35. t. 13. f. 1.
- Apocynum** erectum virginianum ramosum, caule subrubente, esulæ raræ foliis, siliquis tenuissimis. *Pluk. alm.* 35. t. 260. f. 4.
- Habitat in Canada, Virginia.* 24
- Corollæ virides, nec pictæ sunt.*
- APOCYNUM** caule rectiusculo herbaceo, foliis ovato-lanceolatis. *Roy. lugdb.* 411. *Sauv. monsp.* 133. venetum.

Apocynum foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff. 89.*
 Tithymalus maritimus, purpurascens floribus. *Bauh. pin. 291.*

Esula rara e lio venetorum insula. *Lob. hist. 201.*
Habitat in Adriatici maris insulis. 24

frutescens. 4. APOCYNUM caule erecto frutescente, foliis lanceolato-ovalibus: corollis acutis fauce villosis. *Fl. zeyl. 114.*

Apocynum caule erecto arboreo, foliis ovatis acutis. *Roy. lugdb. 412.*

Apocynum floribus fasciculatis. *Fl. zeyl. 23. t. 13. f. 1.*
Habitat in Zeylona. 5

reticulatum. 5. APOCYNUM caule volubili perenni, foliis ovatis venosis. *Roy. lugdb. 412.*
Habitat in India.

ASCLEPIAS.

* *foliis oppositis planis.*

undulata. 1. ASCLEPIAS foliis sessilibus oblongis lanceolatis undulatis, petalis ciliatis.

Apocynum africanum, lapathi folio. *Comm. rar. 1. t. 16.*

Habitat in Africa. 24

gigantea. 2. ASCLEPIAS foliis amplexicaulibus oblongo-ovalibus. *Fl. zeyl. 112.*

Apocynum erectum majus latifolium indicum. *Fl. alm. 35. t. 175. f. 3.*

Beidel ossar. *Alp. aegypt. 85. t. 86.*

Ericu. *Rheed. mal. 2. p. 53. t. 31. Seb. thes. 1. p. 40. t. 26. f. 1.*

Habitat in India, Aegypto. 24

NeEaria promunt non cornicula subulata, sed lamina solidas conniventes. Occidit inadsueta Pecora, uti Amone nemorosa. Kumph. amb. 7. p. 25.

variegata. 3. ASCLEPIAS foliis ovatis rugosis nudis, caule simplici, umbellis subsessilibus: pedicellis tomentosis.

Asclepias e virginia. *Bauh. pin. 215.*

Apocynum vetus americanum, Wisank. *Dill. clth. 201.*

Apocynum americanum erectum, tuberosa radice incanum, foliis rigidioribus latis subrotundis, sic- bus

bus albis intus purpureis, summo caule corymbum magnum efformantibus. *Pluk. alm. 34. t. 77. f. 1.*

Habitat in America boreali. 2.

Affinis A. Syriacæ.

ASCLEPIAS foliis ovalibus subtus tomentosis, caule *syriacæ.* simplicissimo, umbellis nutantibus.

Asclepias caule erecto simplici herbaceo, foliis ovalibus subtus tomentosis, umbellis nutantibus. *Vir. clif. 20. Hort. upf. 53. Gron. virg. 27. Roy. lugdb. 410.*

Asclepias caule erecto simplici annuo, foliis ovato-oblongis subtus incanis, umbella nutante. *Hort. clif. 78.*

Pocynum majus syriacum rectum. *Corn. canad. 90.*

Pocynum syriacum. *Clus. hist. 2. p. 87.*

Asclepias *eldessar.* *Vesl. ægypt. 28. (non vero Alpini).*

Asclepias foliis lanceolato-ellipticis, caule simplici *exaltata.* glabro, nectarii corniculis conniventibus. *Amæn. acad. 3. p. 404. Kalm. it. 3. p. 259.*

Habitat in Virginia. 2.

ASCLEPIAS foliis ovatis subtus villosis, caule simplici, umbellis erectis, nectariis resupinatis. *purpurascens.*

Asclepias floribus obsolete purpureis, corniculis resupinatis. *Dill. elth. 32. t. 28. f. 31.*

Pocynum erectum noveboracense, foliis minus incanis, flore ex obsoleto dilute purpurascente. *Herm. par. 33.*

Habitat in Carolina. 2.

Affinis valde A. syriacæ.

ASCLEPIAS foliis ovatis subtus pilosiusculis, caule *amœna.* simplici, umbellis nectariisque erectis.

Pocynum floribus amœne purpureis, corniculis surrectis. *Dill. elth. 31. t. 27. f. 30.*

Habitat in America septentrionali. 2.

ASCLEPIAS foliis lanceolatis glabris, caule simplici, *nivea.* umbellis erectis lateralibus solitariis.

Asclepias caule erecto simplici annuo, foliis lanceolato-ovatis glabris, pedunculis alternis, umbellis erectis. *Gron. virg. 27.*

Pocynum *perficariæ* mitis folio, corniculis lacteis. *Dill. elth. 33. t. 29. f. 32.*

Apocynum americanum, foliis amygdali longior

Plum. spec. 2. ic. 30.

Habitat in Virginia ♂ *America calidiorē.* ♂

incarnata.

8. **ASCLEPIAS** foliis lanceolatis, caule superne
so, umbellis erectis geminis.

Asclepias caule erecto ramoso annuo, foliis lan-
tis, umbellis terminalibus erectis pluribus. *Vi*

20. *Hort. cliff. 78. Roy. lugdb. 411. Gron. virg.*

Apocynum minus rectum canadense. *Corn. can*
t. 93. *Barr. rar. 8. t. 72. Raj. hist. 1089.*

Habitat in Canada, Virginia. 2.

Caulis, ubi dividitur, folia e regione tria producit

curassavica.

9. **ASCLEPIAS** foliis lanceolatis petiolatis glabri
le simplici, umbellis erectis solitariis.

Apocynum caule erecto simplici annuo, foliis la-
tis, umbellis alternis erectis. *Hort. cliff. 78*

lugdb. 411.

Apocynum radice fibrosa, petalis coccineis, ca-
lis croceis. *Dill. elth. 34. t. 30. f. 33.*

Apocynum curassavicum s. *americanum*, fibrosi
ce, floribus aurantiis, chamænerii foliis latioribus.

Herm. parad. 36. t. 36.

Habitat in Curassao. 2. 5

decumbens.

10. **ASCLEPIAS** foliis villosis, caule decumbente

Asclepias caule decumbente hirsuto, foliis ovatis
tusis villosis subsessilibus. *Gron. virg. 27.*

Apocynum carolinianum aurantiacum pilosum
sicc. 90.

Habitat in Virginia. 2.

lactifera.

11. **ASCLEPIAS** foliis ovatis, caule erecto, um-
proliferis brevissimis.

Asclepias caule erecto simplici herbaceo, foliis
acuminatis, corymbis compositis longitudine
lorum. *Fl. zeyl. 111. **

Habitat in Zeylona. 2.

Vincetoxi-
cum.

12. **ASCLEPIAS** foliis ovatis basi barbatis, caule
recto, umbellis proliferis.

Asclepias caule erecto simplicissimo herbaceo,
cordato lanceolatis, racemis conglomeratis altis.

Fl. spec. 200, 212. Mat. med. 103. Dalib. parv.

Asclepias caule erecto annuo, foliis ovato-lanceolatis, floribus confertis. *Hort. cliff.* 78.

Asclepias albo flore. *Bauh. pin.* 303.

inconceptivum. *Dod. pempt.* 407.

Habitat in Europæ glareosis. 2

ASCLEPIAS foliis ovatis basi barbatis, caule superne subvolubili.

Asclepias caule subvolubili herbaceo, foliis ovato-lanceolatis, floribus confertis patentissimis. *Roy. lugdb.*

410. *Hort. upf.* 53. *Sauv. monsp.* 133.

Asclepias nigro flore. *Bauh. pin.* 303.

inconceptivum flore nigro. *Cam. epit.* 560.

Habitat Monspelli in collibus. 2

Nectaria huic & præcedenti sunt Calli quinque truncati absque auricula & ungue. Hæc in fertiliori solo incipit scandere subvolubili caule.

* * foliis latere revolutis.

ASCLEPIAS foliis revolutis lanceolatis, caule fruticoso.

Asclepias caule erecto fruticoso, foliis lanceolatis, umbellis nutantibus, conceptaculis inflatis pilosis.

Hort. cliff. 78. *Hort. upf.* 54. *Vir. cliff.* 20. *Roy. lugdb.* 410.

Asclepias erectum africanum, villosa fructu, salicis folio. *Herm. parad.* 23. t. 24. *Mill. dict.* t. 45.

Asclepias erectum elatius, salicis angusto folio, folliculis pilosis. *Pluk. alm.* 36. t. 138. f. 2.

Habitat in Æthiopia. ♂

Nectaria compressa absque ungue, cujus loco auriculae duæ, longiores, reflexæ. Folliculi inflati, aculeati, sed mites.

ASCLEPIAS foliis revolutis lineari-lanceolatis oppositis ternatisque, caule decumbente.

Asclepias montana humilis, radice longius proserpente, lini foliis. *Amm. ruth.* 10.

Habitat in Sibiria. 2

ASCLEPIAS foliis revolutis linearibus verticillatis, caule erecto.

Asclepias foliis verticillatis lineari-setaceis. *Gron. virg.* 26.

Apocynum marianum erectum, linearis angustifoliis umbellatum. *Pluk. mant.* 17. t. 336. f. 4

Apocynum marianum, foliis angustissimis ste
Pet. mus. 609.

Habitat in Virginia. 24

Folia saepe quaterna, verticillata. Pedunculi umbellati sunt oppositifolii.

* * * *foliis alternis.*

rubra

17. *ASCLEPIAS* foliis alternis ovatis, umbellis eodem pedunculo communi pluribus.

Apocynum caule erecto simplici annuo, foliis acuminatis alternis, pluribus in pedunculo umbellatis.
Gron. virg. 27.

Habitat in Virginia.

tuberosa.

18. *ASCLEPIAS* foliis alternis lanceolatis, caule intricato piloso.

Asclepias caule erecto divaricato villosa, foliis lanceolatis, umbellis simplicibus subterminalibus.
cliff. 78. *Roy. lugdb.* 411.

Apocynum novae angliae hirsutum, tuberosa re floribus aurantiis, *Herm. lugdb.* 546. t. 647. *elth.* 35. t. 30. f. 34.

Habitat in America boreali. 24

STAPELIA.

variegata.

1. *STAPELIA* denticulis ramorum patentibus.
cliff. 20. *Roy. lugdb.* 409.

Stapelia denticulis ramorum extrorsum prominentibus.
Hort. cliff. 77. *Hort. upf.* 53.

Asclepias aizoides africana. *Bradl. succ.* 3. p. 22.

Asclepias aizoides aphylla, flore fritillarum, filiculis longis angustis erectis. *Morif. hist.* 3. p. 610. t. 3. f. 4.

Apocynum humile aizoides, filiculis erectis, africana.
Herm. lugdb. 52. t. 53. *Stiff. bot.* 32.

Fritillaria crassa promont. bonae spei. *Stap. theophr.*
Habitat ad Cap. b. Spei. 5

hirsuta.

2. *STAPELIA* denticulis ramorum erectis. *Hort.* 77. *Roy. lugdb.* 409.

Asclepias africana aizoides, flore pulchre fimbriata.

Comm. Var. 19. t. 19. *Bradl. fvec.* 3. p. 5. t. 23.

Raf. inf. musc. t. 9.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♀

HERNIARIA.

HERNIARIA glabra herbacea. *Bauh. hist.* 3. p. 378. glabra.

Herniaria calycibus bractea nudis. Hort. cliff. 41. *Fl.*

fvec. 207, 213. *Mat. med.* 104. *Roy. lugdb.* 215.

Hall. helv. 182. *Dalib. paris.* 76.

Polygonum minus f. *Millagrana major.* *Bauh. pin.* 281.

Habitat in Europæ apricis, glareosis, siccis. ○

HERNIARIA hirsuta herbacea. *Bauh. hist.* 3. p. 379. hirsuta.

Habitat in Angliæ, Hispaniæ, Italiæ agris.

Spinis nimium præcedenti; forte varietas.

HERNIARIA caulibus fruticosis, floribus quadri-fructuosa.

fidis. Amæn. acad. 4. p. 269. * *Læst. it.* 128. *

Herniaria fruticosa, viticulis lignosis. *Bauh. pin.* 182.

Polygonum herniariæ folio & facie, perampla radice.

Bauh. hist. 3. p. 378. *Lob. ic.* 85.

Habitat in Hispania. ♀

HERNIARIA ? quæ *Polygonum lenticulatum.*

lenticulata.

Polygonum minus tenuifolium. *Bauh. pin.* 281.

Polygonum minus lentifolium. *Bauh. prodr.* 131.

Polygonum maritimum longius radicatatum nostras,

serpylli folio crasso nitente. *Pluk. alm.* 302. t. 53.

f. 3. Pet. herb. 10. f. 6. *Raj. angl.* 3. p. 161.

amphorata frutescens, foliis latis & angustis. *Buxb.*

cent. 1. p. 18. t. 28. f. 2. *quoad figuram.*

Habitat in Hispaniæ montibus Escorial, Monspeli,

Anglia.

heres non vidi; at Parietaræ herniariæ folio. Plum.

characterem misit DD. Aymen: cui Perianthium

5-partitum, acutum, vix patens, persistens. Co-

rolla minima, 5-partita. Stamina 5, capillaria.

Antheræ simplices. Germen subrotundum. Stylus

vix ultus. Stigma obtusum. Capsula parva, uni-

locularis, calyce obvoluta. Semen 1, subovatum,

compressum. Habitus proximus Herniariæ, sed mol-

lissimus.

CHENOPODIUM.

* *foliis angulosis:*

- BonusHenri-** 1. **CHENOPODIUM** foliis triangulari - sagittati
cus. gerrimis, spicis compositis aphyllis. *Hort. c*
Fl. svec. 208, 214. Mat. med. 106. Roy. lugd
Hall. helv. 174. Dalib. parif. 79.
Lapathum unctuosum. *Bauh. pin. 115.*
Bonus Henricus. *Bauh. hist. 2. p. 965.*
Habitat in Europæ ruderatis. 2.
Spica composita, aphylla: Spiculis alternus se
floribus glomeratis, sessilibus.
- urbicum.** 2. **CHENOPODIUM** foliis triangularibus subde
racemis confertis strictissimis cauli approxima
gissimis. *Fl. svec. 209, 215. **
Chenopodium latifolium minus ramosum, 1
longissimis ex foliorum alis confertim nasce
Buxb. hall. 69. t. 1.
Habitat in Europæ borealis plateis. ☉
- rubrum.** 3. **CHENOPODIUM** foliis cordato - triangularil
tufiusculis dentatis, racemis erectis compo
llis caule brevioribus. *Fl. svec. 210, 217*
med. 107. Dalib. parif. 78.
Chenopodium erectum, foliis subtriangularibus
sinuato - dentatis, racemis erectis foliosis late
Hort. cliff. 85. Roy. lugdb. 219.
Atriplex sylvestris latifolia. *Bauh. pin. 119.*
Pes anserinus. *Dalech. hist. 542. t. 542. Fuchs. h*
Bauh. hist. 2. p. 975.
Habitat in Europæ cultis, ruderatis. ☉
Spicæ glomerulis sessilibus, interstinctæ foliolis
bus; adulta rubet diffusa. Folia nitida, crassa
- marale.** 4. **CHENOPODIUM** foliis ovatis nitidis acu
tatis, racemis ramosis nudis. *Fl. svec. 211*
Dalib. parif. 211.
Chenopodium erectum ramosissimum, foliis tri
ribus dentatis, racemis ramosis caulem su
bus. *Hort. cliff. 85. Lech. scan. 16.*
Chenopodium 1. *Tabern. hist. 812. f. 1.*
Atriplex sylvestris latifolia, acutiore folio. *B.*
119.
Atriplex dicta Pes anserinus. *Bauh. hist. 2. f.*
figur.

Habitat in Europæ muris aggeribusque. ☉

caules erecti. Fructus subpaniculati. Color viridis.

HENOPODIUM foliis deltoideis sinuato-dentatis ferotinum.
marginibus glabris uniformibus, racemis terminalibus.

*Amæn. acad. 4. p. 309. **

Henopodium hispanicum procerius, folio deltoide.

Tournef. inst. 666.

Henopodium ficus folio. Raj. angl. 3. p. 155.

Habitat in Hispania, Gallia, Anglia. ☉

HENOPODIUM foliis rhomboideo-triangularibus album.
erectis postice integris: summis oblongis, racemis erectis. Fl. svec. 212, 218. Dalib. parif. 80.

Henopodium foliis inferioribus ovatis acutis antror-
um dentatis: summis lanceolatis. Vir. cliff. 22.

Hort. cliff. 85. Gron. virg. 145. Roy. lugdb. 219.

Hall. helv. 175.

Henopodium triplex sylvestris. Fuchs. hist. t. 119.

Henopodium triplex sylvestris, folio sinuato candicante. Bauh.

pin. 119.

Habitat in agris Europæ. ☉

Fructu matura albicat. Racemi recti, conglobati: spicis
alternis, sessilibus, confertis.

HENOPODIUM foliis rhomboideis dentato-sinuatis viride.
racemis ramosis subfoliatis. Fl. svec. 213, 219.

Dalib. parif. 78.

Henopodium sylvestre, opuli folio. Vaill. parif. 36. t.

7. f. 1.

Henopodium folio oblongo integro. Dill. app. 622

Henopodium triplex sylvestris. Bauh. hist. 2. p. 972.

Habitat in Europæ cultis oleraceis, nimium abundans. ☉

caulis erectus, viridis, angulis purpurascens. Folia
ramea lanceolata, integerrima, vix uno alterove dente. Racemi filiformes, divisi, longi, nudi.

Calyces fructus argute pentagoni. Affine nimium
precedenti.

HENOPODIUM foliis cordatis angulato-acuminatis hybridum.
racemis ramosis nudis. Fl. svec. 214, 220.

Dalib. parif. 79.

Henopodium foliis triangulari-sagittatis: infra medium
sinuato-dentatis, racemis longissimis. Hort. cliff.

84. Roy. lugdb. 219.

Chenopodium stramonii folio. *Vaill. parif.* 36. t.

Raj. angl. 4. p. 125.

Chenopodium 2. *Tabern. hist.* 812. f. 2.

Chenopodium affinis, folio lato laciniato in longi
mucronem procurrente. *Raj. suppl.* 123.

Habitat in Europæ cultis. ☉

Botrys.

9. **CHENOPODIUM** foliis oblongis sinuatis,
mis nudis multifidis. *Hort. cliff.* 84. *Hort. up.*
Mat. med. 109. *Roy. lugdb.* 219. *Sauv. monsp.* 1

Botrys ambrosioides vulgaris. *Bauh. pin.* 138.

Botrys. *Dod. pempt.* 34.

Habitat in Europæ australis arenosis. ☉

ambrosioides.

10. **CHENOPODIUM** foliis lanceolatis dentatis
cemis foliatis simplicibus. *Hort. cliff.* 84. *Hort.*
56. *Roy. lugdb.* 219.

Botrys ambrosioides mexicana. *Bauh. pin.* 138.

Botrys odorata suaveolens americana mexicana

Morif. hist. 2. p. 605. f. 5. t. 35. f. 8.

Habitat in Mexico, Lusitania. ☉

multifidum,

11. **CHENOPODIUM** foliis multifidis: segment
nearibus, floribus axillaribus sessilibus.

Chenopodium sempervirens, foliis tenuiter laciniatis.

Dill. elth. 78. t. 66. f. 77.

Habitat in Bonaria. ☿

antihelminticum.

12. **CHENOPODIUM** foliis ovato-oblongis den
racemis aphyllis. *Kalm. canad.* 2. p. 283.

Chenopodium, lycopi folio, perenne. *Dill. elth.*
66. t. 76.

Habitat in Pennsylvania, Bonaria. 2.

glaucum.

13. **CHENOPODIUM** foliis ovato-oblongis rep
racemis nudis simplicibus glomeratis. *Fl. succ.*
221. *Dalib. parif.* 77.

Chenopodium foliis ovato-oblongis repande sinuatis
florum racemis glomeratis ex ala solitariis.
cliff. 22. *Hort. cliff.* 85. *Roy. lugdb.* 219.

Chenopodium angustifolium laciniatum minus. *Ta*
inst. 506.

Atriplex angustifolia laciniata. *Bauh. hist.* 2. p.
t. 473.

Atriplex sylvestris secunda. *Tabern. ic.* 427.

Habitat ad Europæ finita. ☉

* * *foliis integris.*

CHENOPODIUM foliis integerrimis rhombico-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. *Fl. suec.* 216, 222. *Mat. med.* 108. *Dalib. parif.* 77. *Vulvaria.*
Chenopodium foliis triangulari-ovatis. Hort. cliff. 84. *Roy. lugdb.* 218.

triplex foetida. Bauh. pin. 119.

ulvaria. Dalech. hist. 543.

abitat in Europæ cultis oleraceis. ☉

CHENOPODIUM foliis integerrimis ovatis, caule decumbente; cymis dichotomis aphyllis axillaribus. *polypermum.*

Chenopodium foliis ovatis integerrimis, caule decumbente. Vir. cliff. 21. *Fl. suec.* 217, 223. *Roy. lugdb.* 218. *Dalib. parif.* 77.

litum foliis ovatis. Hort. cliff. 28.

litum polypermum. Bauh. pin. 118.

olysperon cassiani, bassii, anguillare. Lob. hist. 128.

abitat in Europæ cultis. ☉

CHENOPODIUM foliis lineari-lanceolatis planis integerrimis. *Scoparia.* *Hort. cliff.* 86. *Hort. upf.* 55. *Roy. lugdb.* 220.

Scoparia scoparia. Bauh. pin. 212.

Scoparia. Dod. pempt. 151.

abitat in Græcia, Japonia, China. ☉

CHENOPODIUM foliis subulatis semicylindricis, *maritimum.*
Chenopodium foliis subulatis; superne planis, subtus convexis. Hort. cliff. 86. *Fl. suec.* 218, 224. *Roy. lugdb.* 220.

Chenopodium minus album, semine splendente. Bauh. pin. 289.

Morif. hist. 2. p. 610. f. 5. t. 33. f. 3.

abitat in Europæ maritimis.

CHENOPODIUM foliis lanceolatis subcarnosis, *aristatum.*
integerrimis, corymbis dichotomis aristatis; axillaribus.

Chenopodium foliis lineari-lanceolatis, racemis dichotome ramosis setis terminatis. Act. goett. 1752.

Chenopodium virginicum, foliis linearibus obtusis subcanaliculatis, pedunculis axillaribus dichotomis muticis. Sp. pl. 1. p. 222.

abitat in Sibiria, Virginia. ☉

Spec. plant. pars I.

X

Cau-

Caulis spithameus, inæqualis ramoso patulus, carnosus, lanceolata, obtusa. Corymbi axillares, tomi, folio longiores, terminati spinis inermibus. res sessiles in divaricationibus.

BETA.

- maritima. 1. BETA caulibus decumbentibus.
Beta caulibus decumbentibus, foliis triangularibus tiolatis. *Mill. dict.*
Beta sylvestris maritima. *Bauh. pin. 118. Raj. a p. 127.*
Habitat in Angliæ, Belgii littoribus maris.
- vulgaris. 2. BETA caule erecto.
Beta. *Hort. cliff. 83. Hort. upf. 56. Mat. med. Roy. lugdb. 220.*
- rubra. a Beta rubra vulgaris. *Bauh. pin. 118.*
β. Beta rubra major. *Bauh. pin. 118.*
γ. Beta rubra, radice rapæ. *Bauh. pin. 118.*
δ. Beta lutea major. *Bauh. pin. 118.*
ε. Beta pallide virens major. *Bauh. pin. 118.*
- Cicla. ζ. Beta alba vel pallescens, quæ Cicla officinarum.
pin. 118.
η. Beta communis viridis. *Bauh. pin. 118.*
Habitat - - - - ♂, forte a maritima, in exi prognata.

SALSOLA.

- kall. 1. SALSOLA herbacea decumbens, foliis subulatis, calycibus marginatis axillaribus.
Salsola foliis pungentibus. *Hort. cliff. 86. Fl. svea. 225. Roy. lugdb. 220. Gron. virg. 28.*
Kall spinoso affinis. *Bauh. pin. 289. Morif. hist. 5. t. 33. f. 11.*
Tragum. *Cam. epit. 779.*
Habitat in Europæ littoribus maris. ☉
Planta decumbens. Folia subulata, crassa, spinosa, tus ♂ margine, uti ipse caulis, scabra s. hispida, lyces cincti margine foliaceo.
- Tragus. 2. SALSOLA herbacea erecta, foliis subulatis sp lævibus, calycibus ovatis. *Amæn. acad. 4. p. Kali spinosum cochleatum. Bauh. pin. 289.*

Kali spinosum, foliis longioribus & angustioribus.

Tournef. inst. 247.

Carypis theophrasti. Tabern. hist. 423.

Habitat in Europa australi. ☉

SALSOLA herbacea, foliis subulatis mucronatis, ca- rofacea:
lycibus explanatis.

Salsola foliis conico-subulatis mucronatis, calycibus
corolliformibus obtusis coloratis crenatis. *Hort.*
usp. 55.

Kali humile, alis purpureis florem rosaceum mentien-
tibus. *Buxb. cent.* 1. p. 9. t. 14. f. 2.

Habitat ad Asiæ septentrionalis salinas. ☉

SALSOLA frutescens prostrata, foliis linearibus pi- prostrata.
lofis inermibus. *Am.æn. acad.* 2. p. 346.*

Salsola lignosa, ramis filiformibus ascendentibus, flo-
ribus conglomerato-spicatis. *Læfl. it.* 131.*

Habitat in Asia boreali, Hispania. ☿

SALSOLA frutescens, foliis ovatis acutis carnosis. vermiculata.

Salsola fruticosa, floribus spicatis alternis solitariis.

Læfl. it. 129.*

Kali fruticosum, ericæ folio. *Buxb. cent.* 1. p. 8. t.
14. f. 1?

Kali geniculatum aphyllanthes, gilvis paleaceis floscu-
lis, hispanicum. *Barr. rar.* 501. z. 215.

Habitat in Hispania. ☿

SALSOLA herbacea patula, foliis inermibus. *Guett. Soda.*
Stamp. 426. *Sauv. monsp.* 7.

Kali majus, cochleato semine. *Bauh. pin.* 287.

Kali. *Dod. pempt.* 81.

Kali, *Kali magnum*, sedi medii folio. *Lob. ic.* 394.

Habitat in Europæ australis salis. ☉

SALSOLA diffusa herbacea, foliis teretibus glabris, sativa.
floribus conglomeratis. *Læfl. it.* 132.*

Kali hispanicum supinum annuum, sedi foliis breviori-
bus. *Juss. act. parif.* 1715. p. 74.

Kali minus alterum. *Bauh. pin.* 283.

Habitat in Hispaniæ australis maritimis. ☉

SALSOLA diffusa herbacea, foliis teretibus obtusis hirsuta,
tomentosis.

Menopodium hirsutum. *Sp. pl.* 1. p. 221.

Kali minus villosum. *Bauh. pin.* 289.

- Kali parvum hirsutum. *Bauh. hist. 3. p. 702.*
Habitat in Daniæ, Monspelli maritimis. ☉.
- Salsa. 9. SALSOLA patula herbacea, foliis semiteretibus ob
 ramis reflexis.
 Chenopodium foliis linearibus obtusis subtus con
 caule ramoso: ramis deflexis. *Hort. upf. 55.*
1. p. 221.
 Chenopodium maritimum, foliis sedi teretibus.
cent. 1. p. 21. t. 31. f. 1.
Habitat ad Astracanam. ☉
- altissima. 10. SALSOLA erecta ramosissima herbacea, foliis
 formibus acutiusculis.
 Chenopodium altissimum. *Sp. pl. 221. Hort. upf.*
 Chenopodium altissimum, foliis succulentis.
cent. 1. p. 21. t. 31. f. 2.
 Kali gramineo folio. *Bauh. pin. 289. prodr. 133.*
XVI. 20.
- β- Salsola foliis filiformibus inermibus mucronatis,
 le ramosissimo. *Hort. upf. 56.*
 Lerchea foliis filiformibus acutis. *Hall. gatt. 2.*
Habitat ad Salinas Italiæ, Saxonie, Astracani.
- fruticosa. 11. SALSOLA erecta fruticosa, foliis filiformibus
 tufiusculis.
 Chenopodium foliis linearibus teretibus carnosis
 le fruticoso. *Hort. cliff. 86. Sp. pl. 1. p. 221.*
lugdb. 220. Guett. stamp. 2. p. 425.
 Chenopodium, sedi folio minimo, frutescens per
B. Duham. arb. 1. p. 163. t. 62.
 Lerchea foliis obtusis. *Hall. gatt. 21.*
 Kali species Vermicularis marina arborefcens.
hist. 3. p. 704.
 Anthyllis chamæphithydes frutescens. *Bauh. pin.*
 Sedum minus arborefcens. *Munt. hist. 469.*
Habitat in maritimis Gallie, Hispanie, Persie.
Semina cochleæ forma præcedentes ad Salsolas re
apud Michel. florent. 128.

ANABASIS.

- tamarisci- 1. ANABASIS foliis subulatis, fructibus exsuccis
 folia. Kali fruticosum hispanicum, tamarisci folio. *Ta*
inst. 247.
Habitat in Hispania. ☉

utex ramulis albis, glaberrimis. Folia subulata, riuetra, Tamarisci. Flores subspicati, solitarii, axillares. Calyx triphyllus, major. Petala quinque, ovata, calyce minora. Stamina quinque, corolla longiora. Germen conicum desinens in Stylum subulatum, Stigmatibus tribus, obtusis.

NABASIS aphylla: articulis emarginatis. *Amæn. aphylla. Acad. 2. p. 347. Gron. orient. 73.*

l bacciferum, salicorniæ facie. *Buxb. cent. 1. p. 1. t. 18.*

l geniculatum alterum s. minus. *Bauh. pin. 289.*

itat ad maris Caspii litora & circa Tripolin. *h*

NABASIS foliis subclavatis. *Amæn. acad. 2. p. 347. foliosa.*

l bacciferum, foliis clavatis. *Buxb. cent. 1. p. 19.*

19. f. 1.

itat ad maris Caspii litora. *o*

CRESSA.

RESSA. *Amæn. acad. 1. p. 395. Sauv. monsp. 92. erratica.*

hyllis. *Alp. exot. 157. t. 156. Raj. hist. 215. Magn.*

par. 212.

moelit minima humifusa palustris, herniariæ folio:

ournes. cor. 4.

mæpithys incana, exiguo folio. *Bauh. pin. 249.*

machiaë spicataë purpureæ affinis, flosculis in cacudine caulis, pluribus quasi in nodos junctis. *Pluk.*

m. 236. t. 43. f. 6.

t in Cretæ litoribus falsis, Romæ ad ostia.

TRIANTHEMA.

TRIANTHEMA. *Sauv. meth. 127. Kniph. orig. 4. Portulaca-*

refat. strum.

tulaca curassavica procumbens, capparidis folio,

ore muscoso, capsula bifurca. *Herm. par. 213. t.*

13. Raj. suppl. 506.

tulacæ affinis, folio subrotundo, flore pentapetalo

ilute purpureo. *Sloan. jam. 89. hist. 1. p. 205. Raj.*

ippl. 506.

l curassavicum procumbens, foliis subrotundis.

Tuk. alm. 202. t. 95. f. 4.

itat in Jamaica, Curassao.

res non vidi; an stamina 5-10? an Stylus 1? *?*

GOMPHRENA.

- globosa. 1. GOMPHRENA caule erecto, foliis ovato-latis, capitulis solitariis, pedunculis diphyllis. *cliff. 86. Hort. upf. 57. Fl. zeyl. 115. Vir. ch. Roy. lugdb. 418.*
Amarantho affinis indiae orientalis, floribus comaratis, ocymastri folio. *Breyn. cent. 109. Comm. hort. 1. p. 85. t. 45.*
Flos globosus. *Rumph. amb. 5. p. 289. t. 100. f.*
Habitat in India. ☉
- perennis. 2. GOMPHRENA foliis lanceolatis, capitulis dilis, flosculis perianthio proprio distinctis. Amaranthoides perenne, floribus stramineis raris. *Dill. elth. 24. t. 20. f. 22.*
Habitat in Bonaria. 24
- hispidula. 3. GOMPHRENA caule erecto, capitulis diphyllis, foliis crenatis. *Nin-angani. Rheed. mal. 9. p. 141. t. 72.*
Habitat in Malabaria.
Flores caerulecentes.
- brasiliensis. 4. GOMPHRENA caule erecto, foliis ovato-lanceolatis, capitulis aphyllis globosis pedunculatis. *acad. 4. p. 310.*
Amarantho affinis brasiliensis; glomeratis parvis floribus. *Breyn. cent. t. 52.*
Habitat in Brasilia.
- ferrata. 5. GOMPHRENA caule erecto brachiato, capitulis solitariis terminalibus sessilibus, calycibus sessilibus. *Habitat in America.*
- interrupta. 6. GOMPHRENA caule erecto, spica interrupta. *lugdb. 419.*
Habitat in America.
- flava. 7. GOMPHRENA pedunculis oppositis bifidis terminalibus, capitulo intermedio sessili. *Gomphrena pedunculis ad alas geminatis tricapsulis. Hort. cliff. 27.*
Habitat in Vera cruce.

BOSEA.

- yervamora. 1. BOSEA. *Hort. cliff. 84. Roy. lugdb. 223.*

forte arbor racemosa, folio longiore subtus al-
cante nervis purpureis insignito, flore pentapetalo
irpureo. *Sloan. jam.* 135. *hist.* 2. p. 19. t. 158. f. 3.
ij. dendr. 88.

ex peregrinus horto bosiano yervamora dictus.

alt. hort. 24. t. 10.

itat in Canariis insulis. †

ULMUS.

MUS foliis duplicato-ferratis: basi inæqualibus. *campestris.*
lms fructu membranaceo. *Hort. cliff.* 83. *Fl. sic.*
9, 226. *Mat. med.* 105. *Roy. lugdb.* 223. *Dalib.*
ris. 82.

us campestris & theophrasti. *Bauh. pin.* 246.

us. Dod. pempt. 837.

itat in Europa ad pagos, a Gades in Gestriciam. †

MUS foliis æqualiter ferratis: basi inæqualibus. *americana,*
us fructu membranaceo, foliis simplicissime fer-
tis. *Gron. virg.* 145. *

itat in Virginia. †

MUS foliis æqualiter ferratis: basi æqualibus. *pumila.*

us humilis. *Amm. ruth.* 260.

us pumila, foliis parvis, glabra, cortice fungoso.

uk. alm. 293.

itat in Sibiria. †

N A M A.

MA caule erecto glabro, foliis linearibus, flori- *Zeylanica.*
is racemosis.

a. Amæn. acad. 1. p. 395. *Fl. zeyl.* 117. t. 2. *

isph. orig. 4. *præf.*

ie veronicæ affinis, gratiolæ foliis, maderaspatæ-

Pluk. alm. 22. t. 130. f. 2.

itat in India. ○

MA caule decumbente, foliis obovatis, floribus *jamaicensis.*
litariis.

a reclinata villosa, foliis ovatis, petiolatis mar-
tatis recurrentibus, floribus solitariis. *Brown. jam.*

5. t. 18. f. 2.

itat in Jamaica.

la monopetalâ, cylindrica, quinquecrenata, longitu-
die calycis. *Brown.*

HYDROLEA.

sinosa.

1. HYDROLEA.

Planta lacustris f. palustris spinosa. *Læf. it.* 310.

Habitat in America meridionali. 4

Caules erecti, pedales: Ramis alternis. Folia lanceolata, sessilia, subundulata, viscosa: Spinae axillares patentés. Flores terminales, subsessiles, pauci, caeteri ferti.

HEUCHERA.

mericana.

1. HEUCHERA. *Hort. cliff.* 82. *Gron. virg.* 29. *Roy. lugdb.* 437.

Cortusa americana, flore squalide purpureo. *Hort. parad.* 131. t. 131.

Sanicula f. Cortusa americana spicata, floribus squalide purpureis. *Pluk. alm.* 332. t. 58. f. 3.

Habitat in Virginia. 4

SWERTIA.

crenata.

1. SWERTIA corollis quinquefidis, foliis radicalibus ovalibus.

Swertia. Hort. cliff. 53. *Roy. lugdb.* 433.

Gentiana corollarum laciniis nectario gemino notata. Monnier. obs. 154.

Gentiana palustris latifolia. Bauh. pin. 188.

Gentiana XII. punctato flore. Clus. hist. 1. p. 316.

Habitat in Helvetiæ, Bavaricæ, Gallicæ alpinis. 4

lineariformis.

2. SWERTIA corollis quinquefidis: terminali sexfidis pedunculis longissimis, foliis linearibus.

Gentiana foliis linearibus acuminatis, pedunculis longissimis nudis unifloris oppositis. Gron. virg. 30.

Habitat in Virginia.

obovata.

3. SWERTIA corollis quinquefidis, foliis lanceolatis linearibus.

Habitat in Sibiria. D. Gmelin. ☉

Planta spithamea. Folia lanceolato-linearibus; Ramis alternis, pedunculis unifloris; Corollæ planæ.

orniculata.

4. SWERTIA corollis quadrifidis quadricornibus. *Amoen. acad.* 2. p. 344. *

Habitat in Sibiria, Gmelin; Canada, Kalm. ☉

5. SWERTIA.

ERTIA corollis quadrifidis ecornibus. *Aman. dichotoma.*

*d. 2. p. 345. **

at in Sibiria. D. Gmelin. ☉

GENTIANA.

Corollis quinquefidis subcampaniformibus.

TIANA corollis quinquefidis rotatis verticil- lutea.

s, calycibus spathaceis. Hall. helv. 479.

ana floribus lateralibus confertis pedunculatis,

ollis rotatis. Hort. cliff. 80. Fl. svec. 201, 227.

ut. med. 110. Roy. lugdb. 432. Sauv. monsp. 136.

ana major lutea. Bauh. pin. 187. Fl. lapp. 96.

ana. Cam. epit. 415.

as. Reneal. spec. 64. t. 63.

at in Alpibus Norvegicis, Helveticis, Apenninis,
striacis, Pyrenæis, Tridentinis. 2

TIANA corollis quinquefidis campaniformibus purpurea.

ticillatis, calycibus subspathaceis.

ana corollis campaniformibus verticillatis, foliis

s petiolatis ellipticis. Hall. helv. 479.

ana major purpurea. Bauh. pin. 187.

iana major, flore purpureo. Oed. dan. t. 50.

iana major alia. Cam. epit. 416.

ntha. Reneal. spec. 65.

at in alpibus Helveticis, Pyrenæis, Norvegi-
. 2

a, quam sub nomine Gentianæ majoris luteæ, flo-

us punctis carentibus campanulæ forma C. B. 187.

minit, hujus species erat, lecta a Bursero.

TIANA corollis quinquefidis campanulatis pun- punctata.

itis verticillatis, calycibus quinquedentatis.

iana major, flore punctato. Bauh. pin. 187.

at in Helvetiæ, Sibiræ, Austriæ, Stiræ, Rhe-

e alpinis. 2

s varietatem legit Cl. Gmelinus in Sibiria foliis

eari-lanceolatis, Floribus terminalibus ternis, pe-

nculis propriis, corollis flavis punctis sparsis purpu-
scensibus.

NTIANA corollis quinquefidis campanulatis op- asclepiadea.

istis sessilibus, foliis amplexicaulibus.

tiana foliis ovato-lanceolatis floribus campanula-

in alis sessilibus. Hall. helv. 478.

Gentiana floribus lateralibus solitariis sessilibus, calicibus erectis. Hort. cliff. 80. Roy. lugdb. 432.

Gentiana asclepiadis folio. Bauh. pin. 187.

Dasystephana. Reneal. spec. 67. t. 68.

Habitat in alpinis Helvetiæ, Pannoniæ, Maniæ. 2.

Folia & caulis cruciatim opposita; Calyces longi Corollæ.

Pneumonanthe.

5. **GENTIANA** corollis quinquefidis campanulatis pedunculatis, foliis linearibus.

Gentiana floribus terminalibus raris, corollis simplicatis, foliis linearibus. Hort. cliff. 80. Fl. 202, 228. Roy. lugdb. 432. Dalib. parif. 81.

Gentiana angustifolia autumnalis major. Bauh. pin.

Gentiana palustris angustifolia. Bauh. pin. 188.

Cyana. Reneal. spec. 69. t. 63.

Habitat in Europæ pascuis humidiusculis. 2.

saponaria.

6. **GENTIANA** corollis quinquefidis campanulatis tricosis verticillatis, foliis trinerviis.

Gentiana floribus ventricosis campanulatis erectis quinquefidis, foliis ovato-lanceolatis. Gron. virg.

Gentiana major virginiana, floribus amplis oculicis. Pluk. alm. 166. t. 186. f. 1.

Gentiana virginiana, saponariæ folio, flore cæruleo. Morif. hist. 3. p. 484. f. 1. t. 5. f. 4. car. 1. p. 70. t. 70.

Habitat in Virginia. 2.

villosa.

7. **GENTIANA** corollis quinquefidis campanulatis tricosis, foliis villosis.

Gentiana floribus ventricosis campanulatis erectis quinquefidis, foliis oblongis acuminatis leviter villosis. Gron. virg. 145.

Habitat in Virginia. 2.

acaulis.

8. **GENTIANA** corolla quinquefida campanulata lem excedente.

Gentiana corolla campanulata caulem longitudinè excedente. Hort. cliff. 81. Roy. lugdb. 432. Hall. 477. Sauv. monsp. 136.

Gentiana alpina latifolia, magno flore. Bauh. pin. prodr. 97.

β. *Gentiana alpina angustifolia, magno flore. Bauh. pin. 187.*

Thylacitis. Rencal. spec. 70. t. 68.

Habitat in alpidibus Helveticis, Austriacis, Pyrenaicis. 24

GENTIANA corollis quinquefidis coronatis crenatis, pedunculo terminali longissimo dichotomo. *exaltata.*

Centaurium minus maritimum, amplo flore cæruleo.

Plum. spec. 3. ic. 81. f. 1.

Habitat in America. ☉

* * *Corollis quinquefidis infundibuliformibus.*

GENTIANA corolla quinquefida infundibuliformi *verna.*
caulem excedente, foliis radicalibus contertis majoribus.

Gentiana flore unico tubuloso; foliis ad terram congestis acutis. *Hall. helv. 476.*

Gentiana alpina verna major. Bauh. pin. 188.

Gentianella verna minor. Clus. hist. 315.

Ericoila. Rencal. spec. 75. t. 68.

Habitat in alpidibus Helvetiæ, Austriæ, Rhetiæ, Pyrenæis. 24

GENTIANA corolla quinquefida infundibuliformi *bavarica,*
ferrata, foliis obtusis.

Gentiana foliis ovatis, caule unifloro, flore ferrato.

Hall. helv. 476.

Gentiana caule unifloro, flore hypocrateriformi quinquefido: laciniis subrotundis crenatis. *Hort. cliff. 81.*

Gentianella elegantissima bavarica. Cam. hort. 65. t. 15. f. 2.

Habitat in alpidibus Helvetiæ, Bavaricæ, Sæviæ.

GENTIANA corollis quinquefidis infundibuliformibus acuminatissimis: fauce imberbi mutica, ramis oppositis. *aurea.*

Gentiana alpina pumila, flore aureo. Barr. rar. 3. t.

104. f. 1.

Habitat in alpidibus Burdegalensibus & Lapponiæ Norvegicæ. D. C. Solander. ☉

Caulis erectus, spithameus. Rami ad radicem plures, parvi, & laterales oppositi valde erecti. Folia Radicalia ovata, glabra, parva; Caulina similia, majora, sessilia, obtusiuscula. Flores terminales pauci in capitulum. Calyces angusti, subpedunculati, in lacinias 5 subulatas divisi. Corollæ infundibuliformes, tubo longitudine calycis; Limbo flavo: laciniis

niis 5, valde acuminatis, integerrimis, absque dentibus interjectis.

- nivalls.** 13. **GENTIANA** corollis quinquefidis infundibuliformibus, ramis unifloris alternis.
Gentiana corollis infundibuliformibus quinquefidis ramis alternis unifloris. *Fl. suec.* 204, 231.
Gentiana corolla infundibuliformi: denticulo lacini interposito. *Fl. lapp.* 95. *
Gentiana humillima, caule ramoso, tubo floris longissimo. *Hall. helv.* 475. t. 7. f. 5.
Gentiana alpina æstiva, centaureæ minoris folio. *Burm. pin.* 188.
Gentiana IX. *Oed. dan.* t. 17.
Habitat in Lapponiæ, Helvetiæ, Pyrenæis summis Alpibus. ☉
- aquatica.** 14. **GENTIANA** corollis quinquefidis infundibuliformibus terminalibus sessilibus, foliis margine membranaceis.
Gentiana foliis margine membranaceis basi coadunatis. *Amæn. acad.* 2. p. 343.
Gentiana humilis aquatica verna. *Amn. ruth.* 4. t. 1. f. 1.
Habitat in Sibiria. *Amman.* ☉
- utriculosa.** 15. **GENTIANA** corollis quinquefidis hypocrateriformibus, calycibus plicato-alatis. *Scop. carn.* 299.
Gentiana utriculis ventricosus. *Bauh. pin.* 188.
Gentianella cærulea cordata. *Column. ecphr.* 220. t. 22.
Gentianella annua, azureo flore. *Barr. rar.* 18. t. 4.
Habitat in Alpibus Helvetiæ, Austriæ, Italiæ. ☉
- Exacoides.** 16. **GENTIANA** corollis quinquefidis hypocrateriformibus, calycibus membranaceo-carinatis, caule dichotomo, foliis cordatis.
Centaurium perfoliatum, florum calyce membranaceo ventricoso. *Burm. afr.* 208. t. 74. f. 5.
Centaurium luteum flore amplo, capsula quatuor angulis membranaceis. *Pluk. alm.* 208. t. 275. f. 4. *Seb. m. f.* 1. t. 22. f. 1.
Habitat ad Cap. b. spei. ☉
- Centaurium.** 17. **GENTIANA** corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo.

iana: foliis lineari-lanceolatis, caule dichotomo, rollis infundibuliformibus quinquefidis. *Hort. cliff.*
. Fl. suec. 205, 232. Mat. med. 112. stylis simpli-
us. Vir cliff. 21. Roy. lugdb. 7. Dalib. paris. 81.
 aurium minus. *Bauh. pin. 278.*

iræa. *Renealm. spec. 77. t. 76.*

taurium minus pumilum ramosissimum. *It. æl. 157.*
sen. scan. 10.

aurium minus palustre ramosissimum, flore pur-
 reo. *Vaill. paris. 32. t. 6. f. 1.*

at in Europæ apricis, præsertim maritimis. ☉

aurium palustre minimum, flore inaperto. *Vaill.*
is. 32. t. 6. f. 2. vel huic affinis vel Sarothræ spe-
s ut D. Aymen.

NTIANA corollis quinquefidis infundibulifor- spicata,
 bus, floribus alternis sessilibus.

iana corollis infundibuliformibus quinquefidis la-
 spicatis, foliis lanceolatis. *Sauv. monsp. 132.*

aurium minus spicatum album. *Bauh. pin. 278.*
dr. 130. t. 130. Bauh. hist. 3. p. 353.

aurium minus album. *Tabern. ic. 780.*

aurium minus spicatum, flore rubello. *Tournef.*
. 122.

at in Euganeis & Montspelii, Italiæ pratis hu-
 lis herbosis. ☉

NTIANA corollis quinquefidis infundibulifor- verticillata.
 bus, floribus verticillatis, caule simplicissimo.

aurium minus ad alas floridum. *Plum. spec. 3. ic.*
f. 2.

at in America.

NTIANA corollis quinquefidis infundibulifor- quinquefo-
 bus, caule acutangulo, foliis ovatis amplexicaul- lia.
 us.

at in Pennsylvania. *Kalm.*

a magnitudine & statura sequentis. Caulis indi-
 us, tetragonus angulis membranaceis. Folia ova-
 sessilia, amplexicaulia, trinervia, acuta. Pedun-
 di oppositi, apice ferentes Flores quinque, subpe-
 ellatos. Calyces brevissimi, angusti. Corollæ in-
 dibuliformes, subæruleæ: limbo parvo, fauce
 via.

- aphylla.** 21. GENTIANA corollis quinquefidis hypocratemibibus, caule aphyllis. *Jacq. amer. 17. hist. t. f. 2.*
Habitat in America.
Planta minima filiformis vix ramosa.
- Amarilla.** 22. GENTIANA corollis quinquefidis hypocratemibibus fauce barbatis.
Gentiana corollis hypocrateriformibus fauce barbata Hort. cliff. 81. Fl. suec. 203, 229. Roy. lugdb. Dalib. parif. 81. Mat. med. 111.
Gentiana floribus confertis faucibus membranulata clausis, foliis ovato-acuminatis. Guett. 303.
Gentiana pratensis, flore lanuginoso. Bauh. pin.
Gentiana autumnalis ramosa. Bauh. pin. 188.
Opisantha. Reneal. spec. 71.
Habitat in Europæ pratis. ☉
 * * * *Corollis non quinquefidis.*
- campestris.** 23. GENTIANA corollis quadrifidis fauce barbata
Gentiana corolla hypocrateriformi tubo villis calycis foliis alternis majoribus. Fl. lapp. 94 Fl. 203. β. 230.
Gentiana purpurea minima. Column. ecphr. 1. p. t. 221. Barr. ic. 97. f. 2.
Gentianella alpina verna minor. Bauh. pin. 188.
Erythalla. Renealm. spec. 72.
Habitat in Europæ pratis ficcis. ☉
Præcedenti nimis affinis ☉ fere varietas aut hybrid
- ciliata.** 24. GENTIANA corollis quadrifidis margine ciliatis
Gentiana corollis hypocrateriformibus laciniis marginatis barbatis. Hort. cliff. 81.
Gentiana angustifolia autumnalis minor, floribus latera pilosis. Bauh. pin. 188.
Gentianella cærulea oris pilosis. Bauh. pin. 108.
Gentianella cærulea fimbriata angustifolia autumnalis Column. ecphr. 1. p. 222. t. 221. f. 1.
Habitat in Helvetiæ, Italiæ, Canadæ montibus.
- Cruciata.** 25. GENTIANA corollis quadrifidis imberbibus, lobis verticillatis sessilibus.
Gentiana floribus confertis terminalibus, corollis quadrifidis imberbibus interjecto denticulo. Hort. 81. Roy. lugdb. 432. Dalib. parif. 80.

iana cruciata. *Bauh. pin.* 188.

iana minor. *Cam. epit.* 417.

orrhiza. *Renealm. spec.* 74. t. 73.

tat in Pannoniæ, Apenninorum, Helvetiæ montibus apricis, ad vias, in sterilibus. 2.
rollæ denticuli bifidi sunt.

NTIANA corollis quadrifidis, floribus acaulis, foliis ovatis.

ianoides flore luteo. *Fewill. peruv.* 3. p. 20. t. 14.
tat in Chili.

NTIANA corollis quadrifidis imberbibus, caudibus dichotomo filiformibus.

iana corollis infundibuliformibus quadrifidis, pennis ternis, foliis linearibus. *Sauv. monsp.* 132.

iana caule dichotomo, foliis lineari-lanceolatis, ribus infundibuliformibus quadrifidis longissime dunculatis. *Guett. stamp.* 1. p. 305. *Dalib. paris.* 82.

aurium palustre luteum minimum. *Raj. hist.* 1092.

ull. paris. 32. t. 6. f. 3.

aurium pusillum luteum. *C. B.* 278. *Magn. monsp.* 2.

tat in Gallia. ☉

NTIANA corollis octifidis, foliis perfoliatis. *perfoliata, fl. hisp.* 33.

iana caule dichotomo, foliis connatis, corollis trifidis. *Hort. cliff.* 81. ☉ 496. *Roy. lugdb.* 433.

lib. paris. 82. *Sauv. monsp.* 136. *Læfl. it.* 133. *

aurium luteum perfoliatum. *Bauh. pin.* 278.

oris hist. 2. p. 565. t. 5. f. 26. f. 1, 2.

aurium parvum, flore luteo. *Clus. hist.* 2. p. 180.

ra. Reneal. spec. 80. t. 76.

tat in Gallia, Anglia, Hispania, oriente. ☉

PHYLLIS.

PHYLLIS stipulis dentatis. *Roy. lugdb.* 92.

nobla.

lis. *Hort. cliff.* 87. *Hort. upf.* 57.

ianella canariensis frutescens Simpla nobla dicta.

ll. elth. 405. t. 299. f. 386.

euroides quæ Arbor umbellifera. *Walth. hort.* 11.

5.

tat in Canariis. †

indica.

2. PHYLLIS stipulis integerrimis. *Roy. lugd.*
Habitat in India. †
Flores hujus mihi ignoti sunt.

ERYNGIUM.

foetidum.

1. ERYNGIUM foliis radicalibus subensiformibus
 ratis; floralibus multifidis, caule dichotomo
 Eryngium foliis gladiatis utrinque laxe serratis
 culis subulatis. *Gron. virg.* 30.
 Eryngium foetidum, foliis inferioribus angustis;
 superioribus laciniatis & aculeatis. *Bron.*
 185.

Eryngium americanum foetidum. *Herm. lugd.*
 t. 237.

Eryngium, foliis angustis serratis, foetidum.
jam. 127. *hist.* 1. p. 264. t. 156. f. 3, 4.
Habitat in Virginia, Jamaica, Mexico, Surinam.
Planta foetida, antihysterica, Serpentibus adversa.
pitula cylindrica.

aquaticum.

2. ERYNGIUM foliis gladiatis serrato-spinosis
 indivisis, caule simplici.
 Eryngium foliis gladiatis utrinque laxe serratis
 culis subulatis. *Hort. cliff.* 88. *Roy. lugdb.* 599
 Eryngium foliis gladiatis utrinque laxe serratis
 tantum dentatis subulatis. *Gron. virg.* 14
 Eryngium americanum, yuccæ folio, spinis
 molliusculis. *Pluk. alm.* 13. t. 175. f. 4. *Rej.*
 239. *Morif. hist.* 3. p. 167. f. 7. t. 37. f. 2
 Scorpii spina. *Hern. mex.* 222.

- β. Eryngium lacustre virginianum, floribus, ex
 cæruleis, caule & foliis ranunculi flammeli
Pluk. alm. 137. t. 396. f. 3.
Habitat in Virginia. 2
Facies & folia Bromeliæ minoris, sed hæc ciliis
capillaribus flexilibus mitibus. *Paleæ Flo*
jores sunt.

planum.

3. ERYNGIUM foliis radicalibus ovalibus planis
 natis, capitulis pedunculatis. *Hort. cliff.* 87
upf. 37. *Roy. lugdb.* 92. *Dalib. paris.* 83.
 Eryngium latifolium planum. *Bauh. pin.* 87.
 Eryngium pannonicum latifolium. *Zuf. hist.* 2.
Habitat in Russia, Polonia, Austria, Helvetia.

YNGIUM foliis radicalibus oblongis incisif, cau-
dichotomo, capitulis sessilibus. *Hort. cliff.* 87. pusillum.

ry. lugdb. 93.

YNGIUM planum minus. *Bauh. pin.* 386.

YNGIUM pusillum planum montani. *Clus. hist.* 2. p. 8.

tat in Hispania, Oriente.

YNGIUM foliis radicalibus subrotundis plicatis maritimum.
inolis capitulis pedunculatis. *Hort. cliff.* 87. *Fl.*

ic. 220, 233. *Roy. lugdb.* 93.

YNGIUM maritimum. *Bauh. pin.* 386.

YNGIUM marinum. *Clus. hist.* 2. p. 169. *Cam. epit.* 8.

tat ad Europæ littora arenosa maritima.

YNGIUM foliis radicalibus cordatis oblongis, alpinum.
caulinis pinnatifidis, capitulis subcylindricis.

YNGIUM alpinum cæruleum, capitulis diffaci. *Bauh.*
l. 386.

YNGIUM cæruleum genevense. *Lob. ic.* 2 p. 23.

tat in alpihus Helvetiæ, Italiæ. 24

YNGIUM foliis radicalibus cordatis, caulinis tricuspidatis.
caulinis auriculis retroflexis, paleis tricuspidatis. tum.

næn. acad. 3. p. 405. *

YNGIUM foliis radicalibus ovatis crenatis petiolatis,
capitulis pedunculatis. *Gron. orient* 76.

YNGIUM syriacum ramosius, capitulis minoribus cæ-
ruleis. *Morif. hist.* 3. p. 166. f. 7. t. 37. f. 13.

YNGIUM capitulis psyllii. *Bocc. sic.* 80.

tat in Hispania, Sicilia, Oriente. ♂

YNGIUM foliis amplexicaulibus pinnato-lacinia- campestre.
tis. *Hort. cliff.* 87. *Mat. med.* 114. *Roy. lugdb.* 93.

YNGIUM vulgare. *Bauh. pin.* 386.

YNGIUM campestre vulgare. *Clus. hist.* 2. p. 157.

tat in Germaniæ, Galliæ, Hispaniæ, Italiæ. incul-
-24

YNGIUM foliis trifidis basi subpinnatis. amethyfi-

YNGIUM montanum amethystinum. *Bauh. pin.* 386. num.

Morif. hist. 3. p. 165. f. 7. t. 25. f. 2.

YNGIUM totum cæruleum. *Besl. eyf.* o. 11. t. 8. f. 4.

YNGIUM minus trifidum hispanicum. *Barr. ic.* 36.
acc. mus. t. 71.

Habitat in Styriæ montibus. 24.

Folia linearia, semitrifida, inferne subpinnata, lucrum basi obvallatum setis subulatis interj.

Varietas β minor, involucri foliolis trifidis dist.

HYDROCOTYLE.

- vulgasis.** 1. **HYDROCOTYLE** foliis peltatis, umbellis 1 quefloris.
Hydrocotyle foliis peltatis orbiculatis undiquee ginatis. Hort. cliff. 88. Fl. svec. 221, 234. Roy. 1 93. Hall. helv. 425. Dalib. parif. 83.
Ranunculus aquaticus, cotyledonis folio. Bauh. 180.
Cotyledon aquatica. Lob. ic. 387.
Habitat in Europæ inundatis. 24.
- umbellata.** 2. **HYDROCOTYLE** foliis peltatis, umbellis 1 floribus. *Brown. jam. 185.*
Hydrocotyle repens, flore albo, cotyledonis 1 Gron. virg. 30.
Hydrocotyle maxima, folio umbilicato, floribus umbellam nascentibus. Plum. spec. 7 ?
Cotyledon aquatica. Sloan. jam. 93. hist. 1. p. 1
Erva de capitaon. Marcgr. bras. 27.
Acaricoba. Pif. bras. 90.
Habitat in America.
Planta simillima præcedenti, hinc cum ea mixta; 1 scapo foliis duplo longiore, flosculis non 5, sed 1 bus quam viginti, in umbellam simplicem digestis.
- americana.** 3. **HYDROCOTYLE** foliis reniformibus sublo crenatis. *Læfl. it. 281.*
Habitat in America septentrionali & meridionali.
Plantæ facies primæ & magnitudo. Folia antio vix hiante ad centrum usque dissecta, margine lobos obsolete divisa, quorum singuli tribus minoribus notata. Umbella quinqueflora.
- asiatica.** 4. **HYDROCOTYLE** foliis reniformibus sequi crenatis. *Hort. cliff. 88. Fl. zeyl. 118. Roy. lugdb. Valerianella zeylanica palustris repens, hederæ 1 stris folio. Herm. par. 238. t. 238.*
Ranunculo affinis umbelliferis accedens, cheli minoris folio, zeylanica minor. Pluk. alm. 3 106. f. 5.

Pes equinus. *Rumph. amb.* 5. p. 455. t. 169. f. 1.

Podagam. *Rheed. mal.* 10. p. 91. t. 46.

Habitat in India.

Differt a præcedente marginis denticulis s. crenis aquilibus, consistentia foliorum duplo crassiore & fere incana; petiolis pluribus ad genicula caulis, cum in præcedente folia solitaria.

HYDROCOTYLE foliis linearibus, umbellis multifloris. chinensis.

Habitat in China.

Magnitudo præcedentium; Caulis repens. Folia linearia, lævia, obtusa, plana, sæpius bina ad articulos. Scapi longitudine folii. Umbella multiflora.

SANICULA.

SANICULA foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. *Fl. suec.* 222, 235. *Mat. med.* 115. europæa.

Sanicula flosculis omnibus sessilibus. *Gron. virg.* 147.

Sanicula. *Hort. cliff.* 88. *Roy. lugdb.* 93.

Sanicula officinarum. *Bauh. pin.* 319.

Sanicula. *Cam. epit.* 763.

Habitat in Europæ sylvis montosis. 24

SANICULA foliis radicalibus compositis: foliolis ovatis. *Gron. virg.* 146. canadensis

Sanicula canadensis, amplissimo laciniato folio. *Tournef. inst.* 326.

Habitat in Virginia. 24

Structura ita præcedentis, ut vix differentia, sed planta decuplo sæpe omnibus partibus major.

SANICULA flosculis masculis pedunculatis, hermaphroditis sessilibus. *Gron. virg.* 31. marilandica

Sanicula foliis septilobatis inæqualibus, flosculis masculis pedunculatis. *Hort. ups.* 57.

Sanicula marilandica, caule & ramulis dichotomis, echinis minimis in eodem communi pediculo ternis.

Raj. suppl. 260.

Habitat in Marilandia, Virginia. 24

ASTRANTIA.

ASTRANTIA. foliis quinquelobis: lobis trifidis. major.

Hall. helv. 439.

Astrantia. *Hort. cliff.* 88.

Helleborus niger, *paniculæ folio*. *Bauh. pin.* 186.

Veratrum nigrum. *Dod. pempt.* 387.

Habitat in alpibus Helvetiæ, Hetruriæ, Bohemiæ renæis, 21.

minor.

2. **ASTRANTIA** foliis digitatis ferratis.

Astrantia foliis digitatis septenis integris dentatis.

helv. 440.

Helleborus, *paniculæ folio*, minor. *Bauh. pin.*

prodr. 97. *Raj. hist.* 475.

Helleborus minimus alpinus, *astrantiæ flore*. *Bo*

10. t. 6.

Habitat in Alpibus Helvetiæ, Hetruriæ, Pyrenæis

BUPLEURUM.

* *Herbacea.*

rotundifolium.

1. **BUPLEURUM** involucris universalibus nullis

liis perfoliatis. *Hort. upf.* 64. *Mat. med.* 136.

Bupleurum foliis ovatis perfoliatis. *Hort. cliff.*

Roy. lugdb. 109. *Hall. helv.* 437.

Perfoliata vulgatissima arvensis. *Bauh. pin.* 277.

Perfoliata. *Dod. pempt.* 104.

β. *Perfoliata minor*, *ramis inflexis*. *Bauh. pin.* 277.

130.

Perfoliata flore multiplici. *Bauh. pin.* 277.

Perfoliata crispa f. *muscosa*. *Cam. hort. t.* 37.

Habitat inter Europæ australis segetes. ☉

stellatum.

2. **BUPLEURUM** involucellis coadunatis, univ. triphylo.

Bupleurum alpinum, *angustis nervosis foliis*, c.

universaliter leviter inciso. *Hall. helv.* 438. t. 10.

Perfoliata alpina angustifolia media. *Bauh. pin.*

prodr. 129. *Burf. VI.* 5.

Habitat in alpibus Helveticis.

Folia radicalia linearia; summa ovata, lanceolata

lia; involucri universalis foliola ovata, æqualia

tialis 5, coalita ultra medium.

petraeum.

3. **BUPLEURUM** involucellis coadunatis, univ. pentaphyllo.

Bupleurum foliis angustis & nervosis, *umbella univ.*

quinquefolia, peculiari sexfidastellata. *Hall. helv.*

Perfoliata alpina, gramineo folio. *Bauh. pin.* 277

Sedum petraeum, bupleuri folio. *Pon. bald.* 247.

Habitat in alpibus Helvetiæ, Baldi. 24.

Folia linearia, sessilia. Involucris universalis foliola 5, equalia, latiora; partialis 5, coalita ad medium.

BUPLEURUM involucellis pentaphyllis orbiculatis, universali triphylo ovato, foliis amplexicaulibus cordato-lanceolatis. angulosum.

Perfoliata alpina angustifolia major, folio anguloso.

Bauh. pin. 277. *prodr.* 129. *Burf. VI.* 4.

Perfoliata alpina angustifolia minor. *Bauh. pin.* 277. *prodr.* 129. *Burf. VI.* 6.

Habitat in Pyrenæis, β. in Vallesis alpibus. 24

Planta affinis maxime 2, uti patuit ex *Burseri* collectione, licet involucris partialis foliola in hac distincta. In varietate β. folia angustissima striata, in α. vero lanceolata, nec nervoso-striata.

BUPLEURUM involucellis pentaphyllis ovatis: longifolium universali subpentaphyllo, foliis amplexicaulibus.

Bupleurum foliis imis petiolatis, superioribus ovatis perfoliatis. *Hall. helv.* 437.

Perfoliata montana latifolia. *Bauh. pin.* 277.

Perfoliata montana. *Cam. hort.* 120. t. 38.

Habitat Gœttingæ, inque monte Jura Helvetiæ.

Folia ovata, profunde amplexicaulia: radicalia petiolata; Involucris univers. 3. vel pentaphyllum; partiale pentaphyllum, longitudine floscolorum.

BUPLEURUM involucellis pentaphyllis acutis, universali subpentaphyllo, foliis lanceolatis, caule flexuoso. falcatum.

Bupleurum foliis radicalibus pedunculatis: summo subrotundo, caulinis linearibus sessilibus. *Guett. stamp.* 59.

Bupleurum foliis petiolatis falcato-ellipticis acutis. *Hall. helv.* 439.

Bupleurum folio subrotundo s. vulgatissimum. *Bauh. pin.* 278.

Bupleurum. *Riv. pent.* 44.

Auricula leporis umbella lutea. *Bauh. hist.* 3. p. 200. f. 1.

Triophyllum. *Cord. hist.* 69.

Habitat in Misniæ, Vallesis sepibus. 24

Involucrum universale pentaphyllum, sæpe diphyllum, inæquale; partiale pentaphyllum, mucronatum. Umbella parva. Caulis altus flexuosus.

- odontites. 7. **BUPLEURUM** involucellis pentaphyllis acutis, versali triphylo, flosculo centrali altiore, et divaricatis.
 Bupleurum foliis gramineis, calyce peculiari quinifido aristato rigido. *Hall. helv.* 438.
 Perfoliata minor angustifolia, bupleuri folio. *L. pin.* 277.
 Perfoliata minima, bupleuri folio. *Column. ecphr.* 84. t. 247.
Habitat in alpinis Vallisæ; in Italiæ rupibus, et in is. ☉
 Folia linearilanceolata. Caulis ramosissimus, et latus, divaricatus ramis basi nodosis. Involucrum niversi subpentaphyllum: foliolis latioribus tripartitis venosis acutis; partiale pentaphyllum simile; flosculi 9: intermedii petiolus duplo altior.
- semicompositum. 8. **BUPLEURUM** umbellis compositis simulque simplicibus. *Amzn. acad.* 3. p. 405. *
Habitat in Hispania. ☉
 Affine *B. Odontiti*, vix tamen pro varietate habendum.
- ranunculoides. 9. **BUPLEURUM** involucellis pentaphyllis lanceolatis longioribus: universali triphylo, foliis caulinis lanceolatis.
 Bupleurum foliis amplexicaulibus, inferioribus linearibus, summo cordato-oblongo. *Hort. cliff.* 104. t. *h. l.* 427. *Roy. lugdb.* 110.
 Perfoliata alpina angustifolia minima. *Bauh. pin. prodr.* 130. *Burf. XVI.* 8.
 Perfoliatum gramineum helveticum alpinum pumilifacie ranunculi. *Lob. illustr.* 137. *Park. theatr.* t. 338.
Habitat in Helvetia, et Pyrenæis. 21
 Folia Radicalia linearia, acuta; Caulina lanceolata, sessilia.
- rigidum. 10. **BUPLEURUM** caule dichotomo subnudo, in lucris minimis acutis.
 Bupleurum foliis lanceolatis rigidis: radicalibus ovatis, caulinis acutis. *Roy. lugdb.* 110. *Sauv. monsp.*
 Bupleurum folio rigido. *Bauh. pin.* 278.
 Bupleurum alterum latifolium. *Dod. pempt.* 633.
Habitat Monspeli. 24

Folia Radicalia lato-lanceolata, nervosa, rigida. Caulis dichotomus, subnudus: foliolis minutissimis, linearibus, acutis. Umbellæ terminales, bi-f. trifidæ, totidem foliolis acerosis. Umbellulæ parvæ, sex-floræ.

BUPLEURUM umbellis simplicibus alternis pentaphyllis subtrifloris. *tenuissimum*

Bupleurum foliis linearibus acutis sessilibus. Hort. cliff. 104. Roy. lugdb. 110.

Bupleurum tertium minimum. Column. ecphr. 1. p. 85. t. 247. Morif. hist. 3. p. 300. f. 9. t. 14. f. 4.

Bupleurum angustissimo folio. Bauh. pin. 278.

Habitat in Germania, Anglia, Gallia, Italia. ☉

Caulis ramosissimus; Ramis alternis. Folia linearia, acuta. Umbellulæ axillares, parvæ.

BUPLEURUM caule erecto paniculato, foliis linearibus, involucris triphyllis, involucellis pentaphyllis. *junceum.*

Bupleurum annuum angustifolium. Magn. monsp. 42. Allion. nic. 192.

Bupleurum minus angustifolium monspeliense. Raj. hist. 474.

Bupleurum angustifolium. Dod. pempt. 474.

Habitat in Gallia, Italia. ☉

Caulis sexpedalis, junceus, levis: Ramis alternis, erectis. Folia graminea, bifaria, lævia, lactescentia. Involucrum lanceolatum, longitudine umbellæ. Involucella minora. Umbella radiis 4. umbellula 5. f. 6. flosculis luteis.

* * *Frutescentia.*

BUPLEURUM frutescens, foliis amplexicaulibus dentatis subtus villosis. *villosum.*

Perfoliata foliis oblongis sinuosis subtus incanis. Burm. afr. 196. t. 71. f. 2.

Habitat in Æthiopia. ☿

BUPLEURUM frutescens, foliis ovatis integerrinis. *fruticosum*

Bupleurum, foliis obverse ovatis in petiolum attenuatis.

Hort. cliff. 104. Roy. lugdb. 109. Sauv. monsp. 60. Gron. orient. 77.

Seseli æthiopicum, salicis folio. Bauh. pin. 161.

Sese'i æthiopicum, frutex. *Dod. pempt.* 312.

Habitat in Galliæ australis & Orientis saxosis
mis. †

Frutice-
gens.

15. BUPLEURUM frutescens, foliis linearibus, in
lucro universali partialique. *Amæn. acad.* 4. p. 90
Læfl. it. 134. *

Bupleurum hispanicum arborescens, gramineo fr
Journes. infl. 310.

Bupleurum fruticans angustifolium hispanicum.
rar. 623. t. 1255.

Habitat in Hispaniæ collibus. †

difforme.

16. BUPLEURUM frutescens, foliis vernalibus
compositis planis incis, æstivalibus filiformi
angulatis trifidis.

Bupleurum foliis radicalibus pinnato-incis, ca
fasciculatis tetragonis. *Roy. lugdb.* 110.

Bupleurum frutescens, foliis ex uno puncto plu
juncis tetragonis. *Burm. afr.* 195. t. 71. f. 1?

Habitat in Æthiopia. †

Folia hyemalia *Petroselinii*, æstivalia *Spartii*. In
crum foliolis subulatis, pluribus, basi connexis,
cescentibus; involucella foliolis quinis.

ECHINOPHORA.

spinosa.

1. ECHINOPHORA foliolis subulato-spinosis inter
rimis.

Echinophora foliis decompositis. *Wach. ultr.* 200.

Caucalis caule lignoso, foliolis subulato-spinosis
gerrimis. *Roy. lugdb.* 96. *Sauv. monsp.* 258.

Crithmum maritimum spinosum. *Bauh. pin.* 288.

Crithmum spinosum. *Dod. pempt.* 705.

Habitat ad littora maris, præsertim mediterranei. †

tenuifolia.

2. ECHINOPHORA foliolis incis inermibus.

Echinophora foliis supradecompositis. *Wach. ultr.* 1

Caucalis caule lignoso, foliis incis, *Roy. lugdb.* 9

Pastinaca sylvestris angustifolia, fructu echin
Bauh. pin. 151.

Pastinaca echinophora apula. *Column. ecephr.* 1. p.
t. 101.

Habitat in Apuliæ maritimis apricis, salsis. †

TORDYLIUM.

TORDYLIUM involucris umbella longioribus. *Hort. syriacum.*
cliff. 90. Hort. upf. 58. Roy. lugdb. 95. Sauv. meth.
230. Gron. orient. 78.

ordylium syriacum humilius, femine granulato ma-
 jore. *Morif. hist. 3. p. 317. f. 9. t. 16. f. 7.*

igidium foliis pastinacæ latifoliæ. *Bauh. pin. 151.*
abitat in Syria. ☉

TORDYLIUM involucris partialibus longitudine officinale.
 florum, foliolis ovatis laciniatis. *Hort. cliff. 90.*
Hort. upf. 58. Roy. lugdb. 95. Mat. med. 145. Sauv.
monsp. 230.

eli creticum minus. *Bauh. pin. 161.*

eli creticum. *Dod. pempt. 314.*

abitat in Narbona, Italia, Sicilia. ☉

TORDYLIUM umbellulis remotis, foliis pinnatis: *apulum.*
 pinnis subrotundis laciniatis. *Hort. cliff. 90. Roy.*
lugdb. 94.

ordylium apulum minimum. *Column. ephr. 1. p.*
122. t. 124.

eli creticum minimum. *Bauh. pin. 161.*

abitat in Italiæ, Apuliæ incultis.

umbellulæ singulæ flosculi marginales tres majores s. ra-
diati.

TORDYLIUM umbellis confertis radiatis, foliolis *maximum.*
 lanceolatis inciso-ferratis. *Hort. cliff. 90. Roy. lugdb.*
94. Sauv. monsp. 230, 259.

ordylium. *Riv. pent. 1.*

caucalis maxima, sphondylji aculeato femine. *Bauh.*
pin. 152.

caucalis major. *Clus. hist. 2. p. 101.*

eseli creticum majus, *Bauh. pin. 161.*

abitat in Italiæ ruderatis sepibus.

TORDYLIUM umbellis confertis nudiusculis; fo- *latifolium.*
 liis pinnatis: foliolis lanceolatis inciso-ferratis. *Mill.*
dist. t. 8.

caucalis umbella universali trifida: partialibus penta-
 spermis, foliis pinnatis ferratis. *Hort. cliff. 91. Roy.*
lugdb. 95. Dalib. paris. 84. Sauv. monsp. 236. Gron.
orient. 80.

caucalis arvensis echinata latifolia. *Bauh. pin. 152.*

- Lappula canaria latifolia.* *Bauh. hist.* 3. p. 81.
Habitat in Gallia, Italia, Oriente inter segetes.
- Anthriscus. 6. **TORDYLIUM** umbellis confertis, foliis lanceolatis pinnatifidis. *Hort. cliff.* 90. *Fl.* 224, 236. *Roy. lugdb.* 94.
Caucalis umbella conferta, foliolis ovato-lance pinnatifidis. *Guett. stamp.* 1. p. 81.
Caucalis semine aspero, flosculis rubentibus. *Ban* 152. *prodr.* 80.
Caucalis minor, flore rubente. *Morif. hist.* 3. p. f. 9. t. 14. f. 8.
Habitat in Europæ septentrionalis arvis ruderalis
- nodosum. 7. **TORDYLIUM** umbellis simplicibus sessilibus, minimis exterioribus hispida.
Caucalis umbellis sessilibus simplicibus. *Hort.* *Hort. cliff.* 91. *Roy. lugdb.* 95. *Dalib. parif.* 85
Caucalis nodosa, echinato semine. *Bauh. pin* *prodr.* 80. *Bauh. hist.* 3. p. 83.
Habitat in Gallia, Italia ad vias. ☉

CAUCALIS.

- grandiflora. 1. **CAUCALIS** involucris pentaphyllis: foliolo duplo majore. *Hort. cliff.* 91. *Roy. lugdb.* 95. *monsp.* 258.
Caucalis involucro universali pinnatifido, partibus indivisis, umbella multifida. *Fl. svec.* 225. *parif.* 84.
Caucalis arvensis echinata, magno flore. *Ban* 152.
Echinophora flore magno. *Riv. pent.* 25.
Echinophora pycnocarpus. *Column. ecphr.* 1. t. 94.
Habitat in Europa australiori inter segetes.
- daucoides. 2. **CAUCALIS** involucro universali longitudine bellæ lanceolato.
Caucalis dauci sylvestris folio, echinato magno. *Magn. monsp.* 292.
Habitat Montpelii. D. Sauvages.
Folia supradecomposita Dauci vulgaris. Involucro universale pentaphyllum: foliolis lanceolatis, longitudo totius umbellæ, acuminatis. Involucra parva lato-lanceolata, lateribus membranacea,

losculi copiosi albi : hermaphroditi 3 in radio ; flo-
ulis disci , s. masculis parvis , æqualibus ; radii
sculis petalis maximis bipartitis albis. In præce-
nte involucrum umbella dimidio brevius ☉ radii
tala rotundiora.

JCALIS involucro universali monophyllo , par- mauritanica
libus triphyllis. *Mähr. E. N. C.* 1742. vol. 6. p.

11. †

alis mauritanica vulgari similis , sed femine majo-
. *Walth. hort.* 127.

rat in Mauritania.

JCALIS umbellis trifidis umbellulis trispermis , platycarpus
volucris triphyllis. *Hort. cliff.* 61. *Hort. upf.* 58.
ry. lugdb. 95. *Sauv. monsp.* 258.

alis monspelica ehinata , magno fructu. *Bauh.*
t. 153.

nophora altera asperior platycarpus. *Col. ecphr.* 1.
95. t. 94.

tat in Italia , Monspelii. ☉

JCALIS umbellis patentibus , foliolis partialibus orientalis.
pradecompositis laciniatis : lacinulis linearibus.
ry. lugdb. 95.

alis orientalis altissima , folio ferulæ. *Tournef.*
t. 23.

tat in Oriente. ♂

JCALIS feminum aculeis triglochidibus unci- leptophylla
tis : pilis verticillatis hispidis. *Guett. stamp.* 80.
alib. paris. 85.

alis involucro universali monophyllo , laciniis fo-
rum perangustis. *Hall. helv.* 448.

alis arvensis ehinata , parvo flore & fructu.
uh. pin. 152.

nophora tertia leptophyllon purpurea. *Column.*
shr. 1. p. 96. t. 97.

tat in Gallia , Italia , Anglia. ♂

A R T E D I A.

FEDIA feminibus squamatis. *Hort. cliff.* 89. squamata.
ort. upf. 58. *Roy. lugdb.* 96. *Gron. orient.* 81.

asia orientalis , anethi folio , femine eleganter cre-
to. *Tournef. cor.* 22. *itin.* 3. p. 298. *

Gingidium foeniculi folio. *Bauh. pin.* 151. *Raj. hist.* 466.

Gingidium rauwolffii. *Cam. hort.* 67. t. 16.
Habitat in Libano. ☉

DAUCUS.

- carota.* 1. DAUCUS seminibus hispidis, petiolis subtus
fis. *Hort. cliff.* 89. *Hort. upf.* 59. *Fl. svec.* 223
Mat. med. 142. *Roy. lugdb.* 97. *Gron. virg.* 31.
paris. 85.
Daucus vulgaris. *Clus. hist.* 2. p. 198.
Pastinaca tenuifolia sylvestris dioscoridis. *Ba.*
151.
- β. Pastinaca tenuifolia fativa, radice lutea. *Ba.*
151.
- γ. Daucus fativus, radice atrorubente. *Tournef.*
307.
Habitat in Europæ campis exaridis. ♂
- mauritani-* 2. DAUCUS seminibus hispidis, flosculo centrali
cus. carnosio, receptaculo communi hemisphærico.
Daucus hispanicus, umbella magna. *Tournef. in*
Pastinaca tenuifolia sylvestris, umbella majore
pin. 151?
Habitat in Hispania, Italia, Mauritania. ☉
Similis D. Carotæ, sed Umbella amplior; un-
non ad basin divisa, verum ipsa basi hemisphærico.
Umbellæ in centro flosculus sterilis, carnosus, et
pureus, reliquis longe major. Foliorum petiol-
nervis albis. Caulis magis hirtus.
- Vifnaga.* 3. DAUCUS seminibus nudis. *Hort. cliff.* 89. *Roy.*
97. *Sauv. monsp.* 257. *Gron. orient.* 83.
Gingidium umbella oblonga. *Bauh. pin.* 151.
Gingidium alterum. *Dod. pempt.* 792.
Habitat in Europa australi, Mauritania, Libano
- Gingidium.* 4. DAUCUS radiis involucri planis: laciniis re
Roy. lugdb. 97.
Daucus montanus lucidus. *Tournef. inst.* 307.
Gingidium folio chærophylli. *Bauh. pin.* 151.
Gingidium. *Matth. comm.* 372. t. 373.
Pastinaca tenuifolia marina, foliis obscure vire
& quasi lucidis. *Magn. monsp.* 199.
Pastinaca folio cœnanthes. *Bocc. sic.* 74.
Habitat Monspelii.

DAUCUS feminibus aculeatis.

Medica muricata feminibus aculeatis. *Hort. cliff.* 89.

Sp. pl. 1. p. 242.

Caucalis major daucoides tingitana. *Morif. hist.* 3. p.

308. f. 9. t. 14. f. 4. *Raj. hist.* 469. *Herm. par.* 111. t. III.

muricatus.

Chinophora tingitana. *Riv. pent.* 27.

Caucalis pumila maritima. *Bauh. pin.* 153.

maritimus.

Appula canaria s. *Caucalis maritima*. *Bauh. hist.* 3. p. 81.

Habitat in Mauritania. β. *in littoribus maris* Mediterranei. ♂. ☉

Millimus D. Carotæ Caule, Foliis, Involucris, Involucellis, Umbella per maturitatem contracta; Flosculi umbellularum 3. f. 5. fertiles, reliquis sterilibus; Flores non radiati. Semina cristis 4, longitudinalibus, valde dentatis, ante maturitatem rubris glochidibus.

A M M I.

Ammi foliis inferioribus pinnatis lanceolatis ferratis, superioribus multifidis linearibus. *Hort. upf.* 59.

Ammi laciniis foliorum caulis lanceolatis. *Hort. cliff.*

89. *Roy. lugdb.* 96. *Sauv. monsp.* 232.

Ammi majus. *Bauh. pin.* 159.

Ammi vulgare. *Dod. pempt.* 415.

Habitat in Europæ australis, Orientis vineis, arvis.

glaucifolium.

AMMI foliorum omnium lacinulis lanceolatis. *Guett.*

Stamp. 2. p. 433. * †

Ammi petræum glaucifolium perenne. *Morif. hist.* 3.

p. 295.

Daucus petræus glaucifolius. *Bauh. hist.* 3. p. 58.

Habitat in Gallia. 2

B U N I U M.

BUNNIUM. *Hort. cliff.* 91. *Roy. lugdb.* 107.

Bulbocastanum.

Bunium bulbo globofo. *Sauv. monsp.* 256.

Bulbocastanum majus, folio apii. *Bauh. pin.* 162.

Nucula terrestris. *Lob. hist.* 429.

Habitat in Germaniæ, Angliæ, Galliæ saxosis.

C O N I U M.

CONIUM feminibus striatis. *Hort. cliff.* 92. *Fl. svec.* maculatum.

226, 228. *Roy. lugdb.* 107.

Cicu-

Cicuta major. Bauh. pin. 160.

Cicutaria major vulgaris. Clus. hist. 2. p. 200.

Habitat in Europæ cultis, agris, rudcratis. ♂

africanum. 2. **CONIUM** feminibus aculeatis. *Hort. cliff. Roy. lugdb. 107.*

Caucalis africana, folio minore rutæ. Berk. lug p. 63. t. 53.

Habitat in Africa. ☉

Planta glauca ut Sefeli, foliis Fumaricæ. Un quadrifida: involucri lanceolato, brevi, membranaceo: Umbellulæ multifloræ: invol pentaphyllis, brevibus, acutis. Petala alba, intus carinata, non emarginata. Flosculi masculi. Semina oblonga, muricata, magis quam lata, stylis persistentibus.

Royeni. 3. **CONIUM** feminibus radiato-spinosis. *Roy. lugdb. Habitat - - - -*

SELINUM.

sylvestre. 1. **SELINUM** radice fusiformi multiplici. *Hort 93. Hort. upf. 59. Roy. lugdb. 106.*

Apium sylvestre, lacteo succo turgens. Bau 153.

Tyffelum plinii. Lob. hist. 409. Morif. hist. 3. p. f. 9. t. 17. f. 2.

Habitat in Hærcynia, Gallia. ♀

palustre. 2. **SELINUM** sublaetescens, radice unica. *Hall 443.*

Selinum foliolis & lacinulis oblongo-linearibus. Stamp. 2. p. 70.

Selinum palustre lactescens. Fl. lapp. 110. Fl. 227, 239. Hort. cliff. 92. Roy. lugdb. 116.

Sefeli palustre lactescens. Bauh. pin. 162. prodr. 1. Habitat in Europæ septentrionalis paludibus. ♀

Carvifolia. 3. **SELINUM** caule sulcato acutangulo, invol universali caduco, pitillis fructus reflexis. *Selinum foliolis pinnatim laciniatis. Gmel. fibr. 1 204. t. 48.*

Angelica tenuifolia. Riv. pent. Rupp. jen. 1

*Dill. giff. 137. **

Carvifolia. Bauh. pin. 158.

Habitat in Sibiriae campis a Jacco ad Obium, in Germania. 2.

Caules multi, erecti, tripedales, sulcati, angulis acutis. Folia supradecomposita: foliolis pinnatifidis, mucronatis. Pedunculus sub umbella fere crispatus. Involucrum universale deciduum. Petala alba, non subtus rubra. Semina medio 3 sulcis, Stylis longis reflexis.

SELINUM umbellis confertis, involucro universali reflexo, seminum costis quinque membranaceis. monnierL

*Amæn. acad. 4. p. 269. **

Habitat in Gallia australi. ☉

Serpentis structura in Seminibus; sed habitus & reliqua Selini.

A T H A M A N T A.

ATHAMANTA foliis bipinnatis planis, umbellis hemisphaericis, seminibus hirsutis. *Fl. svec. 229. 240. ** Libanotis.

Libanotis pinnulis circa costam decussatis. Hall. herb.

451. opus. 250.

Libanotis minor, apii folio, minor. Bauh. pin. 157. prodr. 77.

Aucus montanus, pimpinellæ saxifragæ hircinæ folio.

Pluk. alm. 129. t. 173. f. 1.

Habitat in Sveciæ, Germaniæ pratis siccis apricis. 2.

ATHAMANTA foliis subbipinnatis: foliolis deorsum imbricatis, umbellis lenticularibus. condensata.

Habitat in Sibiria. 2.

Radix perennis. Caulis simplex, pedalis, levis, inferne angulatus, superne sulcatus, præsertim pedunculo. Rami duo vel tres, floriferi, ex summis alis foliorum. Petioli canaliculati, basi membranacei, subtus angulati. Folia subbipinnata, foliolis alternatim pinnatifidis lobo infimo majore, unde quasi cruciatæ evadunt: oppositiones ad basin & inferior lacinia se extendit supra folium inferius; subtus nitida. Umbella densissima, utrinque convexa, antequam floret rufescens; flores tamen albi, exceptis antheris fuscis. Petala inflexa. Involucrum universale sæpe deficit & tantum rudimenta ostendit. Partiale longitudine florum. Foliola sunt imbricata, nec remota. Germina villosa, nec hirta. Antheræ & receptacula flosculorum purpurea.

Cervaria.

3. ATHAMANTA foliolis pinnatis decussatis i
angulatis, seminibus nudis.

Athamanta foliis pinnatis pinnatifidis: radicalib
cussatis. *Gmel. sibir.* 2. p. 186.

Selinum foliis radicalibus ovatis inæqualiter se
Hort. cliff. 92. *Hort. upf.* 59.

Daucus montanus, apii folio, major. *Bauh. pin.*

Dauci tertium genus. *Fuch. hist.* 233.

Cervaria. *Riv. pent.* 12.

- β. Selinum foliis simpliciter pinnatis inciso-ang

Hort. upf. 60. * *Sp. pl.* 1. p. 244.

Habitat in Helvetiæ, Austriæ, Alsatia, Gall
vinciæ, Sibiria montibus. 2

Oreofeli-
num.

4. ATHAMANTA foliolis divaricatis. *Fl. svec.*
241.

Selinum foliolis ovato-acutis acute serratis &
Hort. cliff. 92. *Roy. lugdb.* 106.

Selinum foliolis laciniisque oblongo-linearibus
Stamp. 1. p. 70.

Selinum pinnis ad angulos obtusos pinnatis: pi
incisis non serratis. *Hall. helv.* 444. *Fl. svec. n.*

Apium montanum, folio ampliore. *Bauh. pin.* 1.

Apium montanum nigrum. *Bauh. pin.* 153. *Segu.*
p. 31.

Oreoselinum. *Clus. hist.* 2. p. 195. *Riv. pent.* 8.

Habitat in Germaniæ, Galliæ, Angliæ collibus
cis. 2

ficula.

5. ATHAMANTA foliis inferioribus nitidis, un
primordialibus subsessilibus, seminibus pilosis
upf. 60.

Athamanta foliolis multifidis planis, seminibus
fis. *Hort. cliff.* 93. *Roy. lugdb.* 97.

Daucus secundus ficulus, sophiæ folio. *Zan. hist.*

Habitat in Sicilia. 2

Folia inferiora nitida, superiora subvillosa. Cau
besens.

cretensis.

6. ATHAMANTA foliolis linearibus planis h
petalis bipartitis, seminibus oblongis hirsutis
med. 143.

Athamanta foliis capillaribus, seminibus hirsutis
cliff. 93. *Roy. lugdb.* 97.

Libanotis foliis tenuissime pinnatis laciniis pet
Hall. helv. 451. *opusc.* 241.

Daucus alpinus, multifido longoque folio. *Bauh. pin.* 150.

Daucus creticus, semine hirsuto. *Bauh. hist.* 3. p. 56.

Daucus foliis fœniculi tenuissimis. *Bauh. pin.* 150.

Daucus creticus. *Czm. epit.* 536. *Hall. opusc.* 242.

Habitat in Helvetia. 2

ATHAMANTA foliis multipartitis: laciniis linearibus teretiusculis acuminatis. *Roy. lugdb.* 98. annua.

Myrrhis annua, semine striato villosò, incana. *Morif. umb.* 67.

Myrrhis tenuifolia annua cretica, semine lanugine alba pubescente. *Morif. hist.* 3. p. 302.

Habitat in Creta. ☉

ATHAMANTA feminibus membranaceo-striatis, foliis supradecompositis lævibus multifidis. chinensis.

Habitat - - - Chinesem dixit Barthram, qui semina misit ex Virginia.

Foliis angulatus, lævis, erectus, parum flexuosus. Fo-

lia Cherophylli, lævia. Umbella minus expansa, alba.

Semina singula 5 alis longitudinalibus parvis; involucrum duplex. Statura Selini monnieri.

ATHAMANTA foliolis capillaribus, feminibus Meum.

glabris striatis. Hort. cliff. 93. *Hort. ups.* 60. *Mat.*

med. 144. *Roy. lugdb.* 97. *Sauv. monsp.* 256.

Meum foliis anethi. Bauh. pin. 148.

Meum. Dod. pempt. 305.

Habitat in Alpibus Italiæ, Hispaniæ, Helvetiæ. 2

PEUCEDANUM.

PEUCEDANUM foliis quinques tripartitis filiformibus linearibus. officinale.

Peucedanum foliis quinques tripartitis lineari-subulatis integerrimis. Hort. cliff. 93. *Hort. ups.* 60.

Mat. med. 126. *Roy. lugdb.* 98. *Sauv. monsp.* 182,

257.

Peucedanum. Bauh. hist. 3. p. 36. *Raj. hist.* 416.

Peucedanum Germanicum. Bauh. pin. 149.

Peucedanum majus italicum. Bauh. pin. 149.

Habitat in Europæ australioris pratis pingvibus. 2

PEUCEDANUM foliolis linearibus ramosis. *Hort. alpestre. cliff.* 94. *Roy. lugdb.* 98.

Ferula, foliis libanotidis brevioribus, alpestris, bellis amplissimis. *Boerh. lugdb.* 1. p. 65.

Habitat - - -

- Silaus. 3. PEUCEDANUM foliolis pinnatifidis: laciniis positis, involucro universali diphylo. *Hort. cliff. Roy. lugdb.* 98. *Sauv. monsp.* 257. *Leif. hal.* 23. Sefeli pratense. *Bauh. pin.* 162. *Raj. angl.* 3. p. 2. Siler alterum pratense. *Dod. pempt.* 310.

Habitat in Helvetiæ, Narbonæ, Germaniæ, Al
subhumidis.

Caulis bipedalis ♂ *ultra. Foliola lanceolata*,
carinata: extimis coadunatis. Flores lutei,
albidi. ●

- alsaticum. 4. PEUCEDANUM foliolis pinnatifidis: lacinulis fidis obtusiusculis.

Selinum foliolis pinnatim laciniatis: lacinulis tri
obtusis. *Hort. cliff.* 92.

Daucus alsaticus. Bauh. prodr. 77. *Hall. opusc.* 3. Umbellifera alsatica magna, umbella parva sub
Bauh. hist. 3. p. 106. *Raj. hist.* 414.

Habitat in Alsatiæ, Palatinatus *dumetis humidiuscu*

- nodosum. 5. PEUCEDANUM foliolis alternatim multil
Hort. cliff. 94. *Roy. lugdb.* 98.

Silaum (quod *Ligusticum creticum*, folio sceni
caule nodoso. *Tournef. ccr.* 23.) *Boerh. lugdb.* 1. p.

Habitat in Creta.

CRITHMUM.

- maritimum. 1. CRITHMUM foliolis lanceolatis carnosis. *Hort. cliff. Hort. upf.* 61. *Roy. lugdb.* 98. *Sauv. monsp.* Crithnum, *Foeniculum maritimum minus.* *Hort. pin.* 288.

Foeniculum maritimum f. *Empetrum* f. *Calcifraga.*
ic. 392.

Habitat ad oceani Europæi littora. 24

- pyrenaicum. 2. CRITHMUM foliolis lateralibus bis trifidis. *Hort. cliff.* 98. *Roy. lugdb.* 58.

Apium pyrenaicum, *thapsiæ* facie. *Tournef. inst.*

Habitat in pyrenæis.

HASSELQUISTIA.

HASSELQUISTIA. *Amæn. acad.* 4. p. 270. *

ægyptiaca.

Pastinaca orientalis, foliis eleganter incis. *Buxb. cent.*

3. p. 16. t. 27 ?

Habitat in Arabia.

CACHRYS.

CACHRYS foliis bipinnatis, foliolis acutis multifidis, seminibus sulcatis lævibus. *Libanotis*, *Hort. cliff.* 94. *Roy. lugdb.* 99. *Sauv. monf.* 105.

Cachrys femine fungoso sulcato plano minore, foliis peucedani angustis. *Morif. hist.* 3. p. 267. f. 9. t. 1. f. 3. 6.

Libanotis ferulæ folio, femine anguloso. *Bauh. pin.* 158.

Habitat in Sicilia, Monspelii. 2

CACHRYS foliis bipinnatis: foliolis linearibus acutis, seminibus sulcatis hispida. *ficula.*

Cachrys femine fungoso sulcato aspero, foliis peucedani latiusculis. *Morif. hist.* 3. p. 267. f. 9. t. 1. f. 3.

Hippomarathrum creticum. *Bauh. pin.* 147. *prodr.* 76.

Hippomarathrum siculum. *Bocc. sic.* 37.

Habitat in Sicilia, Hispania.

Foliola linearia. Folia *suprema opposita.* Umbella *universalis terminalis, sessilis, involucris involucellisque ramosis.* Reliquæ *umbellæ pedunculatæ, involucris involucellisque simplicibus.* Semina *crassissima, sulcata, hispida.*

FERULA.

FERULA foliis linearibus longissimis simplicibus. *communis.* *Hort. cliff.* 95. *Hort. upf.* 61. *Roy. lugdb.* 99. *Sauv. monsp.* 257.

Ferula femina plinii. *Bauh. pin.* 148.

Ferula. *Dod. pempt.* 321.

Habitat in Europa australi. 2

FERULA foliis supradecompositis: foliolis lanceolato-linearibus planis. *glauc.* *Hort. cliff.* 95. *Roy. lugdb.* 99.

Ferula folio glauco, femine lato oblongo. *Bauh. hist.*

3. P. 45.

Habitat in Sicilia, Italia. 2

FERULA foliolis laciniatis: lacinulis tridentatis *tingitana.* *inæ.*

inæqualibus nitidis. *Hort. cliff.* 95. *Hort. upj*
Roy. lugdb. 99.

Ferula tingitana, folio latissimo lucido. *Herm*
165. t. 165.

Habitat in Hispania, Barbaria. ♂

Ferulago. 4. **FERULA** foliis pinnatifidis: pinnis linearibus
nis trifidis. *Hort. cliff.* 95. *Roy. lugdb.* 99.

Ferula latiore folio. *Morif. hist.* 3. p. 309. f. 9.
f. 1.

Ferulago latiore folio. *Bauh. pin.* 148.

Habitat in Sicilia.

orientalis. 5. **FERULA** foliorum pinnis basi nudis, foliolis
ceis. *Hort. cliff.* 95. *Roy. lugdb.* 100.

Ferula orientalis, folio & facie cachryos. *To*
cor. 22. *itin.* 3. p. 239. t. 239.

Habitat in Oriente.

meoides. 6. **FERULA** foliorum pinnis utrinque appendic
foliolis fetaceis. *Hort. cliff.* 95. *Roy. lugdb.* 100.

Laserpitium orientale, folio mei, flore luteo.
nes. cor. 23.

Habitat in Oriente.

mediflora. 7. **FERULA** foliolis appendiculatis, umbellis su
libus.

Ferula foliorum alis utrinque auctis: foliolis li
bus integerrimis, umbellis terminatricibus sul
libus. *Roy. lugdb.* 100. *Hort. upj.* 61.

Libanotis ferulæ folio & semine. *Bauh. pin.* 151

Panax asclepium, ferulæ facie. *Lob. ic.* 783.

Habitat in Europa australi, Istria. 24

canadensis. 8. **FERULA** lucida canadensis. *Gron. virg.* 147.
upj. 61.

Habitat in Virginia. 24

Affa foetida. 9. **FERULA** foliolis alternatim sinuatis obtusis.
med. 118.

Affa foetida disgunensis umbellifera ligustico ;
Kæmpf. amæn. 535. t. 536.

Habitat in Persia. 24

LASERPITIUM.

latifolium. 1. **LASERPITIUM** foliolis cordatis inciso-se
Hort. cliff. 96. *Fl. svec.* 230, 242. *Mat. med*
Roy. lugdb. 101. *Hall. helv.* 440.

notis latifolia altera f. vulgatio. *Bauh. pin.* 157.

notis latifolia major. *Bauh. pin.* 157.

li æthiopicum herba. *Dod. pempt.* 312.

at in Europæ nemoribus siccis. 2.

SERPITIUM foliolis trilobis incis.

trilobum.

notis latifolia, aquilegiæ folio. *Bauh. pin.* 257.

odr. 83.

elica foliolis tripartitis: lobis superne incis ob-

lis. *Roy. lugdb.* 104.

sticum rauvolfii, foliis aquilegiæ. *Bauh. 3. p.* 148.

uk. *phyt.* 223. f. 7.

at in Gargano monte. 2.

SERPITIUM foliolis cuneiformibus furcatis.

gallicum.

rpitium foliolis ramulosis sessilibus. *Roy. lugdb.* 101.

rpitium foliolis quinquelobis. *Hort. cliff.* 96.

rpitium gallicum. *Bauh. pin.* 156. *Raj. hist.* 426.

rpitium foliis angustioribus dilute virentibus con-

catim dispositis. *Raj. hist.* 426.

rpitium e regione massiliæ allatum. *Bauh. hist.* 3.

137.

at in Europa australi. 2.

SERPITIUM foliolis lanceolatis integerrimis ses-

angustifo-
lium.

ibus. *Hort. cliff.* 96. *Roy. lugdb.* 102.

rpitium angustifolium majus, segmentis longiori-

s & indivisis. *Morif. hist.* 3. p. 321. f. 9. t. 19. f. 9.

rpitium foliis longioribus dilute virentibus con-

catim positis. *Pluk. alm.* 207. t. 198. f. 4.

at in Europa australi. 2.

SERPITIUM foliolis lanceolatis integerrimis:

prutenicum

timis coalitis. *Hort. cliff.* 96. *Bæhm. lips.* 208.

rpitium foliis radicalibus patentissimis. *Roy. lugdb.*

3.

rpitium daucoides prutenicum, viscoso semine.

Cyn. cent. 167. t. 84.

rpitium minus. *Rivin. pent.* 1. 23. *Rupp. jen.* 277.

all. gætt. 177.

at in Borussia, Lipsiæ. 2.

tus *Selini Caruifoliæ*, sed *Semina pubescentia.*

SERPITIUM foliolis ovali lanceolatis integerrimis

Siler.

s petiolatis. *Hort. cliff.* 96. *Mat. med.* 124.

sticum quod *Seseli officinarum.* *Bauh. pin.* 162.

montanum. *Morif. hist.* 3. p. 276. f. 9. t. 3. f. 1.

at in Austria, Helvetia, Gallia. 2.

- peucedanoides. 7. **LASERPITIUM** foliolis lineari-lanceolatis venis striatis distinctis. *Amæn. acad.* 4. p. 310. *
- Laserpitium peucedanoides*, foliorum segmentis at-
tissimis. *Segu. veron.* 3. p. 227. t. 17.
- Laserpitium exoticum*, lobis angustissimis inter
Pluk. alm. 207. t. 96. f. 2.
- Habitat in Baldi valle Vaccaria.* 24
- feruacuum. 8. **LASERPITIUM** foliolis linearibus.
- Cachrys orientalis*, ferulæ folio tenuiore, fructu
plano. *Tournef. cor.* 23. it. 2. p. 121. t. 121.
- Habitat in Oriente.*
- Folia quinquepinnata, valde supradecomposita, et
stiffima, linearia, levia, laxa. Semina a:is exar
- Chironium. 9. **LASERPITIUM** foliolis oblique cordatis, per
hirsutis.
- Panax Heracleum.* *Morif. hist.* 3. p. 315. f. 9. t. 17.
- Panax pastinacæ* folio. *Bauh. pin.* 156.
- Panaces peregrinum.* *Dod. pempt.* 309.
- Habitat Montpelii.* 24
- Folia integra, cordata, lobo superiore breviora,
nata, obtusa. Petioli valde hirsuti. Involuc-
parvum, tam universale, quam partiale; hinc
versa a *Pastinaca Costina.*

HERACLEUM.

- sphondylium. α. **HERACLEUM** foliolis pinnatifidis. *Hort. cliff.*
Fl. svec. 231, 243. *Roy. lugdb.* 113.
- Sphondylium vulgare hirsutum.* *Bauh. pin.* 157.
- β. *Sphondylium hirsutum*, foliis angustioribus.
pin. 157. *prodr.* 83. *Riv. pent.* 5.
- Habitat in Europæ nemorosis.* ♂
- fibiricum. γ. **HERACLEUM** foliis pinnatis: foliolis quinque
termediis sessilibus, corollulis uniformibus.
upf. 65. *
- Pastinaca foliis simpliciter pinnatis:* foliolis pin-
dis. *Gmel. sibir.* 1. p. 218.
- Habitat in Sibiria.* ♂
- Flores hujus viridi-lutei, at prioris albi.*
- Panaces. 3. **HERACLEUM** foliis pinnatis; foliolis quinque
termediis sessilibus, floribus radiatis. *Hort. upf.*
Heracleum foliolis palmatis serratis. *Hort. cliff.*
Roy. lugdb. 113.

leum foliis pinnatifidis. *Gmel. sibir. 1. p. 213.*

κ sphondylii folio f. *Heracleum. Bauh. pin. 157.*

at in Apenninis, Sibiria. ♂

ACLEUM foliis pinnatis utrinque scabris, flo- austriacu
ris radiatis.

idylium alpinum parvum. *Bauh. pin. 157. prodr.*

Burf. VIII: 21.

at in Alpibus Austriæ.

pedalis. Folia pinnata, foliolis 5, ovato-oblan-

sessilibus, serratis, utrinque scabris, parum inci-

petiolis inferne membranaceis. Umbella alba,

ata. Difert a tertia parvitate, foliis non subtus

entosis, nec extimis coadunatis; foliolis demum

is integris.

ACLEUM foliis simplicibus, floribus radiatis. alpinum.

idylium alpinum glabrum. *Bauh. pin. 157. prodr.*

t. 83.

idylium montanum glabrum, albo flore. *Barr.*

15.

at in Helvetiæ Alpibus, innotuit C. Bauhino

5.

nudus, Folia figura Rubi Chemæmori f. Ficus.

LIGUSTICUM.

LIGUSTICUM foliis multiplicibus: foliolis super- Levisticum

ncisis. *Hort. cliff. 97. Hort. upf. 62. Mat. med.*

Roy. lugdb. 104. Sauv. monsp. 261.

icum vulgare. *Bauh. pin. 157.*

icum vulgare. *Morif. hist. 3. p. 275. f. 9. t. 3.*

t in Apenninis Liguriæ. 24

LIGUSTICUM foliis biternatis.

icum foliis duplicato-ternatis. *Hort. cliff. 97. Fl.*

232, 244. *Roy. lugdb. 104. Gron. virg. 31.*

icum humilius scoticum. *Pluk. alm. 217. t. 96.*

1 maritimum. *Fl. lapp. 107.*

maritimum scoticum. *Herm. par. 227. t. 227.*

t ad littora maris in Anglia, Svecia, Canada, 24

LIGUSTICUM foliis decompositis incis: radica- cornubiens

s ternatis lanceolatis integerrimis. *Amæn. acad.*

310. †

Smyrnum tenuifolium nostras. Raj. suppl. 254 an p 209. t. 8.

Saxifraga cornubiæ. Pet. herb. t. 26. f. 9.

Habitat in Cornubiâ.

eloponnesiacum. 4. **LIGUSTICUM** foliis multiplicato pinnatis: f pinnatim incis. *Hort. cliff. 97. Roy. lugd Sauv. monsp. 250.*

Cicutaria latifolia foetida. Bauh. pin. 161.

Seseli peloponnesense. Cam. epit. 514.

Habitat in Peloponnesiacis & Rhæticis monti morosis. ♂

ustriacum. 5. **LIGUSTICUM** foliis bipinnatis: foliolis cotibus incis. integerrimis.

Seseli montanum, cicuta folio, glabrum. Bæ 161.

Seseli 1 montanum pannonicum. Clus. hist. 2. p.

Habitat in Austriæ alpinis.

eregrinum. 6. **LIGUSTICUM** umbellæ primariæ involucro nullo, lateralibus basi membranaceis: radiis mosis.

Habitat in Lusitania. ♂

Caulis bipedalis rigidus angulatus levis. Folia composita: summa ternata: Foliolis tripartitis: cuneatis incis glabris petroselini, sed majoribus. lateribus membrana alba. Involucrum universi bellis triplo brevius: radiis linearibus, basi utriusque membranaceis, vix ramosis. Umbella prima sine nullum involucrum habet. Involucella 1 longitudine umbellulæ. Petala flavescencia, emarginata. Filamenta corolla longiora, antheris. Germina levia, vix striata.

ANGELICA.

Archangelica. 1. **ANGELICA** foliorum impari lobato. *Fl. lap Fl. vec. 233, 245. Mat. med. 120. Hort. cl Roy. lugdb. 103.*

Angelica sativa. Bauh. pin. 155.

Angelica major. Dod. pempt. 318.

Habitat in Alibus Lapponiæ, ad rivulos. ♂

Umbella universalis copiosa, radiis angulatis; F globosa. Involucrum saepe unifolium; Involucro lyphylla, linearia, reflexa. Petala ovata, acuridia, caduca. Stamina alba.

GELICA foliis æqualibus ovato-lanceolatis ser- sylvestris.
 tis. *Hort. cliff.* 97. *Fl. svec.* 234, 246. *Mat. med.*
 1. *Gron. virg.* 31. *Hall. hely.* 444. *Roy. lugdb.* 103.
 elica sylvestris major. *Bauh. pin.* 155.
 elica sylvestris. *Dod. pempt.* 318. *Fl. lapp.* 102.
 tat in Europæ frigidioris subhumidis sylvaticis. 2
GELICA extimo foliorum pari coadunato: fo- atropurpu-
 lo terminali petiolato. *Roy. lugdb.* 103. rea.
 elica canadensis atropurpurea. *Corn. canad.* 198. t.
 9.
 tat in Canada.

GELICA foliolis æqualibus ovatis inciso-ferratis. lucida.
ort. cliff. 97. *Hort. upf.* 62. *Roy. lugdb.* 103.
 elica lucida canadensis. *Corn. canad.* 196. t. 197.
oris. hist. 3. p. 281. f. 9. t. 3. f. 8.
 tat in Canada. ♂

SIUM.

M foliis pinnatis, umbellis terminalibus. *Hort. latifolium.*
f. 98. *Fl. svec.* 235, 247. *Roy. lugdb.* 104. *Hall.*
v. 435.
 latifolium. *Bauh. pin.* 154.
Riv. pent. 78.
 1. *Apium palustre*, foliis oblongis. *Bauh. pin.*
 4.
 tat in Europæ rivulis ♂ ad ripas paludosas. 2

M foliis pinnatis, umbellis axillaribus sessilibus. nodiflorum.
ort. cliff. 98. *Fl. svec.* 2. n. 248. *Roy. lugdb.* 105.
uv. monsp. 231.
 aquaticum procumbens, ad alas floridum. *Morif.*
t. 3. p. 283. f. 9. t. 5. f. 3.
 tat in Europa ad ripas fluviorum,
 usum universale in hac specie sæpe deest.

M foliis pinnatis, floralibus ternatis. *Hort. cliff.* Sifarum.
Hort. upf. 62. *Roy. lugdb.* 104.
 um germanorum. *Bauh. pin.* 155.
 um. *Dod. pempt.* 681.
 tat in China? 2

M foliis ferratis pinnatis: rameis ternatis. *Ninfi.*
Mat. med. 117. †

Sifarum montanum coræense, radice non tub
Kampf. amæn. 817. t. 818.

Habitat in China. 2.

rigidius. 5. SIUM foliis pinnatis: foliolis lanceolatis
 gerrimis.

Pimpinella foliolis lanceolatis glabris acuminat
 us integerrimis, rarius serratura notatis. *Gron.*

Oenanthe maxima virginiana, pæoniæ femina
Morif. hist. 3. p. 288. f. 11. t. 7. f. 1.

Habitat in Virginia. 2.

Caulis rigidulus. Folia pinnata oppositionibus 5
 impari. Foliola lanceolata, rigidula, versu
 dentibus aliquot. Petioli canaliculati. Flores

Falcaria. 6. SIUM foliolis linearibus decurrentibus connat
 cliff. 98. *Roy. lugdb. 105. Sauv. monsp. 232.*

Eryngium arvense, foliis serratis. *Bauh. pin.*

Ammi perenne repens, *Morif. hist. 3. p. 294.*
 8. f. 1.

Habitat in Flandria, Helvetia, Bohemia, 4
 Gallia, Oriente. 2.

græcum. 7. SIUM foliis omnibus bipinnatis. *Hort. cliff. 98.*
lugdb. 105.

Ligusticum græcum, folio apii. *Tournef. cor.*

Habitat in Græcia.

ficulum. 8. SIUM foliis radicalibus ternatis, caulinis bip
Roy. lugdb. 105.

Myrrhis foliis pastinacæ læte virentibus.
cor. 22.

Daucus, pastinacæ folio, ficulus. *Zan. hist. 71*
Habitat in Sicilia.

SISON.

Amomum. 1. SISON foliis pinnatis, umbellis erectis. *Roy*
105. Sauv. monsp. 232.

Sison foliis pinnatis. *Hort. cliff. 98.*

Sison quod Amomum officinis nostris. *Bauh. p.*

Petroselinum macedonicum fuchsii. *Dod. pen.*

Habitat in Angliæ humectis lutosis.

segetum. 2. SISON foliis pinnatis, umbellis cernuis. *Roy*
105. Hort. upf. 62.

terrestre, umbellis rarioribus. *Morif. hist.* 3. p. f. 9. t. 5. f. 6.

ut in Angliæ agris inter segetes. ♂

N foliis ternatis. *Hort. cliff.* 99. *Gron. virg.* 147. canadense. *lugdb.* 106. *Kalm. it.* 3. p. 259.

his canadensis trilobata. *Morif. hist.* 3. p. 201. f. 11. f. 4.

his canadensis. *Riv. pent.* t. 53.

ut in America septentrionali. ♀

Radicalia ternata, serrata: folio medio trifido; radicalibus bifidis. Caulina ternata, serrata, lanata, lucida, Umbella quadrifida, inæqualis, nu-

Umbellulæ subseptemfloræ, involucello minimo. ala alba, æqualia.

N foliis tripinnatis: radicalibus linearibus; caulibus setaceis: stipularibus longioribus. Ammi.

foliolis caulinis subcapillaribus. *Hort. upf.* 63. *t. med.* 140.

culum lusitanicum minimum acre. *T. Shaw. afr.* t. 232.

in lacinulis foliorum caulibus capillaribus. *Hort. cliff.* *Roy. lugdb.* 96.

in parvum, foliis fœniculi. *Bauh. pin.* 159.

in *Cam. epit.* 522.

ut in Lusitania, Apulia, Ægypto. ☉

Radicalia linearia, supradecomposita, plana: foliis sessilibus, replicato-imbricatis; Caulina supraposito-pinnata, setacea: ex his quæ vaginam olarem terminant trichotoma, reliquis longiora.

N repens, umbellis bifidis. *Fl. svec.* 2. n. 249. *It.* inundatum. t. 397. *

foliis submersis capillaribus, emeris pinnatis. *lugdb.* 105. *Sauv. meth.* 232.

minimum, foliis imis ferulaceis. *Morif. hist.* 3. 23. f. 9. t. 9. f. 5.

minimum umbellatum, folio varians. *Pluk. phyt.* f. 3.

ut in Europæ inundatis.

N foliolis verticillatis capillaribus.

in foliolis setaceis verticillatis, radice napiformi. *v. monsp.* 168.

verticilla-
tum.

- Bunium bulbis oblongis. *Sauv. monsp.* 256.
 Oenanthe foliis pinnatis: foliolis lineariter
Dalib. parif. 90.
 Daucus pratensis millefolii palustris folio. **R**
 150.
 Daucus pratensis. *Dalech. hist.* 718.
 Carvi foliis tenuissimis, asphodeli radice.
inst. 90.
Habitat in Gallia, Pyrenæis. 2
 Involucrum huc universale & partiale. **F**
ticillatim in petiolo communi disposita.

BUBON.

- macedoni-
cum. **1.** BUBON foliolis rhombeo-ovatis crenatis,
 • numerosissimis. *Hort. cliff.* 95. *Hort. upf.* 1
med. 133. *Roy. lugdb.* 100.
 Apium macedonicum. *Bauh. pin.* 154.
 Petroselinum macedonicum. *Lob. ic.* 708.
Habitat in Macedonia, Mauritania. ♂
- Galbanum. **2.** BUBON foliolis rhombeis dentatis glabris
 umbellis paucis. *Hort. cliff.* 95. *Mat. med.* 1
lugdb. 100.
 Anisum africanum fruticescens, folio anisi,
 rum. *Pluk. alm.* 31. t. 12. f. 2.
 Ferula africana galbanifera, folio & facie.
Herm. par. 163. t. 163.
Habitat in Æthiopia. ♀
- gummife-
rum. **3.** BUBON foliolis glabris: inferioribus rho-
 ratis; superioribus pinnatifidis tridentatis. **R**
 100.
 Ferula africana galbanifera, folio myrrhidi
hort. 2. p. 115. t. 58.
Habitat in Æthiopia. ♀
- rigidius. **4.** BUBON foliolis linearibus. *Hort. cliff.* 95. **R**
 100.
 Ferula durior f. rigidis & brevissimis foliis. **I**
 2. p. 84. t. 76. *Barr. rar.* 61. t. 77.
Habitat in Sicilia. 2

CUMINUM.

CUMINUM *Mat. med.* 139.

Cuminum.

Cuminum femine longiore. *Bauh. pin.* 146.

Cuminum fativum. *Cam. epit.* 518.

Cuminum in Ægypto, Æthiopia. ☉

OENANTHE.

OENANTHE stolonifera, foliis caulinis pinnatis fistulosa. *fistulosa.*
 Oenanthemibibus fistulosis.

Oenanthem the foliis caulinis fistulosis teretibus. *Hort.*

99. *Fl. svec.* 236, 250. *Roy.; Lugdb.* 108. *Hall.*
 432.

Oenanthem the aquatica. *Bauh. pin.* 162. *it. scan.* 243.

Oenanthem the. *Riv. pent.* 66.

Oenanthem t in Europæ fossis paludibus. 2

OENANTHE foliis omnibus multifidis obtusis sub-crociata.
 alibus. *Hort. cliff.* 99. *Fl. svec.* 237, 251. *Roy.*
 b. 107.

Oenanthem the chærophylli foliis. *Bauh. pin.* 162.

Oenanthem the cicutæ facie, succo viroso crocante. *Lob.*
 326. *Act. angl.* 1747. n. 480. p. 235. t. 3.

Oenanthem t in Europæ paludibus. 2

Oenanthem le univers. radii angulati. *Involucrum univ. poly-*
llum magnum.

OENANTHE umbellarum pedunculis marginali-prolifera.
 longioribus ramosis masculis. *Hort. upf.* 63.

Oenanthem the flosculis disci sessilibus, radii pedunculo ra-
 to elevatis. *Vir. cliff.* 24. *Roy. lugdb.* 108.

Oenanthem the flosculis radiantibus umbellarum proliferis.
it. cliff. 99.

Oenanthem the prolifera apula. *Bauh. pin.* 163. *Morif. hist.*
 p. 289. f. 9. t. 7. f. 5.

Oenanthem at in Sicilia, Apulia. 2

Oenanthem le universalis radii laterales, 3 f. 4 divaricati,
 horizontales, flosculis masculis. *Disci flosculi subsessi-*
, conferti in hemisphaerium, hermaphroditi.

OENANTHE fructibus globosis. *Hort. cliff.* 99. *globulosa.*
y. lugdb. 108.

Oenanthem the lusitanica, femine crassiore globoso. *Tour-*
ist. inst. 313.

Oenanthem t in Lusitania.

- pimpinelloides. 5. **OENANTHE** foliis radicalibus cuneatis fissis; linis integris linearibus longissimis canaliculatis. *cliff.* 99. *Roy. lugdb.* 103. *Sauv. monsp.* 259. Oenanthe apii folio. *Bauh. pin.* 162. Oenanthe pastinacæ sylvestris folio, semine atris. *Bauh. pin.* 162. Oenanthe aquatica pimpinellæ saxifragæ divisura. *alm.* 268. t. 49. f. 4. mala. *Habitat* Monspelii ♂ in Europa australi. Caulis semipedalis, angulatus. Folia Radicalibus no Petroselinis, sed crassiora, bipinnata, latis cuneiformibus, incisis, divisis. Caulis nus composita, vix bipinnata: foliis linearibus canaliculatis, longissimis. Umbella inæqualis volucrum universale partialiaque subulata. Corollæ albæ, parum radiatæ.

PHELLANDRIUM.

- aquaticum. 1. **PHELLANDRIUM** foliorum ramificationibus varicatis. *Phellandrium.* *Hort. cliff.* 100. *Fl. svec.* 238, 250. *lugdb.* 108. *Vod. pempt.* 591. *Cicutaria palustris tenuifolia.* *Bauh. pin.* 161. β. *Millefolium aquaticum umbellatum, coriandri.* *Bauh. pin.* 216. *Millefolium aquaticum.* *Matth. diose.* 2. p. 484. *Habitat* in Europæ fossis. ♂ Varietas β. in fluviis amplioribus profundioribus. *Raj. angl.* 3. p. 216.
- Mutellina. 2. **PHELLANDRIUM** caule subnudo, foliis bipinnatis. Sefeli caule vix ramoso, umbella purpurea, pinnis acute multifidis. *Hall. helv.* 431. *Meum alpinum, umbella purpurascente.* *Bauh. pin.* 148. *Hall. opusc.* 288. *Mutellina.* *Bauh. hist.* 3. p. 66. *Cam. epit.* 8. *Habitat* in Helvetia, Carniola. 2. *Folia Chærophylli.* *Involucella longitudine larum.*

CICUTA.

- virens. 1. **CICUTA** umbellis oppositifoliis, petiolis majoribus obtusis.

Hort. cliff. 100. *Mat. med.* 129. *Fl. svec.* 239 ;
Roy. lugdb. 109.

aquatica. Fl. lapp. 103.

erucæ folio. Bauh. pin. 154.

ut in paludibus Europæ sterilibus. 24

JTA ramis bulbiferis.

bulbifera.

foliorum lacinulis capillaribus, caule angulato.

m. virg. 31.

liferà aquatica, foliis in minutissima & plane
illaria segmenta divisis. *Raj. suppl.* 260.

et in Virginia, Canada.

JTA foliorum ferraturis mucronatis, petiolis maculata.
nbranaceis apice bilobis.

odium foliolis lanceolatis acuminatis ferratis.

m. virg. 32.

lica caribæarum elatior, olufatri folio, flore al-
, seminibus luteis striatis, cumini odore & sapore.

k. alm. 31. t. 76. f. 1.

lica virginiana, foliis acutioribus, semine striato
odore, cumini sapore & odore. *Morif. hist.* 3. p. 281.

at in Virginie aquosis.

Æ T H U S A.

HUSA. *Hort. cliff.* 100. *Fl. svec.* 240, 254. Cynapium.

v. lugdb. 109. *Hall. helv.* 433.

a minor, petroselino similis. *Bauh. pin.* 160.

aria fatua. *Lob. ic.* 280.

at inter Europæ olgra. ☉

C O R I A N D R U M.

LIANDRUM fructibus globosis. *Hort. cliff.* fativum.

x. Hort. ups. 63. *Mat. med.* 135. *Roy. lugdb.* 109.

iv. monsp. 260.

ndrum majus. *Bauh. pin.* 158.

ndrum. *Cam. epit.* 523.

at in Italiæ agris. ☉

LIANDRUM fructibus didymis. *Hort. cliff.* 100. testiculatum

y. lugdb. 109. *Sauv. monsp.* 260.

ndrum minus testiculatum *Bauh. pin.* 158. *Pluk.*

t. 120. t. 169. f. 2.

ndrum minus odorum. *Bauh. hist.* 3. p. 91.

β. Co-

- β. *Coriandrum sylvestre foetidissimum. Bauh. pin. Segu. veron. 2. p. 28.*
Habitat in Europæ australis agris. ☉
 Odor *C. sativo virosior. Caulis angulatus. U*
sæpius simplex, rarius composita. Involucra
versale unifolium; Partialia nulla. Petala
diata. Antheræ purpurascens. Germina infu
dyma.

SCANDIX.

- odorata. 1. SCANDIX feminibus sulcatis angulatis. *Hort. cliff. 101. Hort. upf. 64. Roy. lugdb. 111. umbellif*
fero masculino.
 Myrrhis major, Cicutaria odorata. *Bauh. pin. 1*
 Myrrhis. *Dod. pempt. 701.*
Habitat in alpinis Alvarniæ, inque confinibus agri
venetici. ☉ Vicentini.
- Pecten. ♀ 2. SCANDIX feminibus lævibus rostro longissimo
cliff. 101. Hort. upf. 64. Roy. lugdb. 111.
 Scandix, semine rostrato, vulgaris. *Bauh. pin. 1*
 Pecten veneris. *Cam. epit. 302.*
Habitat inter Germaniæ ☉ Europæ australior
tes. ☉
- Cerefolium. 3. SCANDIX feminibus nitidis ovato-subulatis,
 lis sessilibus lateralibus. *Hort. cliff. 110. F*
242, 255. Mat. med. 137. Gron. virg. 3
Lugdb. 111.
 Chærophyllum feminibus lævibus, umbellis ad
 sessilibus. *Bæhm. lips. 492.*
 Chærophyllum sativum. *Bauh. pin. 152.*
 Chærefolium. *Dod. pempt. 700.*
Habitat in agris ☉ arvis Europæ australioris. ☉
- Anthriscus. 4. SCANDIX feminibus ovatis hispida, corol
 formibus, caule lævi.
 Scandix feminibus hispida. *Hort. cliff. 101. F*
241. Roy. lugdb. 111. 242, 256.
 Myrrhis sylvestris, feminibus asperis. *Bauh. p*
 Myrrhis sylvestris æquicolorum. *Column. esph*
110. t. 112.
Habitat in Europæ aggeribus terrenis. ☉

NDIX feminibus subulatis hispida, floribus ratis, caulis lævibus. australis.

lix feminibus rostratis patulis pedunculo brevibus. *Sauv. monsp.* 260.

lix cretica minor. *Bauh. pin.* 152.

lix, femine rostrato, italica. *Bauh. prodr.* 78.

amarathrum. *Col. ecphr.* 1. p. 89. t. 90.

at in G. Narbonensi, Italia, Creta. ☉

NDIX feminibus subcylindricis hispida, caule nodoso, geniculis tumidis.

ophyllum articulis tumidis, umbella universali.

ida. *Hort. cliff.* 102. *Roy. lugdb.* 112.

olium annuum nodosum, femine aspero majore.

ris. hist. 3. p. 303. f. 9. t. 10. f. 4.

his nodosa annua, femine aspero. *Morif. blas.*

3.

at in Sicilia. ☉

s scaber aculeis mollibus, reflexis: articulis superincrustatis. Umbella radiis 2 f. 3. Umbellulæ 5 f. 6. Fructus longi, cylindrici, utrinque usi, scabri.

NDIX feminibus pedunculo villosa breviori. grandiflora.

Roy. lugdb. 111.

lix orientalis, flore maximo. *Tournef. cor.* 23.

at in Oriente.

NDIX feminibus nitida ovato-subulata, foliis compositis. procumbens.

olium virginianum procumbens, fumarie foliis.

ris. hist. 3. p. 303. f. 9. t. 11. f. ult.

at in Virginia.

CHÆROPHYLLUM.

EROPHYLLUM caule striato geniculis tumi- sylvestre.
sculis. *Fl. svec.* 2. n. 257.

ophyllum flosculis omnibus fertilibus, caule nali. *Sp. pl.* 1. p. 258.

ophyllum feminibus lævibus nitida, petiolis is æqualibus. *Hort. cliff.* 101. *Fl. svec.* 243.

Roy. lugdb. 112. *Mat. med.* 143.

ophyllum sylvestre perenne, cicutæ folio, *urnef. inst.* 114. *Fl. lapp.* 104.

his sylvestris, feminibus lævibus. *Bauh. pin.*

Cicutaria vulgaris. *Dod. pempt.* 701.

Habitat in Europæ pomariis ☉ *cultis.* 24.

Caulis subfulcatus. Pedunculus communis teres tala integra, plana, exteriora majora.

bulbosum. 2. **CHÆROPHYLLUM** caule lævi : geniculis dis. *Leyf. hal.* 258.

Chærophyllum foliis supradecompositis : caulibus lævibus superne incrassatis. *Hort. upf.*

Chærophyllum radice turbinata carnosa. *Hort.* 102. *Roy. lugdb.* 112.

Cicutaria bulbosa. *Bauh. pin.* 161.

Myrrhis annua, femine striato lævi, tuberosa : coniophyllon. *Pluk. alm.* 249. t. 206. f. 2.

Myrrhis foetens. *Riv. pent.* 49.

Habitat in Germania, Hungaria, Helvetia, Italia. ♂

Radix turbinata f. obovata. Caulis sexpedalis, rufo-fusco-maculatus : articulis glabris apice tibus, at infimis hispidis. Folia incisa, supra petiolis ☉ carina pilis albis vagis subtus ad involucella foliolis 5 f. 7, subulatis, inaequalibus basi fere coadunatis. Petala alba, obcordata, in lina. Flosculi disci nonnulli abortientes.

temulum. 3. **CHÆROPHYLLUM** caule scabro : geniculis midis.

Chærophyllum caule maculato : geniculis tenuibus. *Hort. cliff.* 102. *Fl. svec.* 244, 258. *Roy. lugdb.* *Gort. gebr.* 59.

Chærophyllum sylvestre. *Bauh. pin.* 152.

Myrrhis annua vulgaris, caule fusco. *Morif.* 1 p. 302. f. 9. t. 10. f. 7.

Habitat ad Europæ arvos, vias ☉ *sepes.* ♂

Umbellæ virgines dormientes cernuæ. Umbellæ medio abortientes.

aureum. 4. **CHÆROPHYLLUM** caule æquali, foliolis in seminibus coloratis striatis.

Myrrhis perennis alba minor, foliis hirsutis, fl. aureo. *Morif. umb.* 282. *Rupp. jen.* 3. p. 282.

Myrrhis radice lignosa perenni, foliis hirsutis, fl. flavis obscure striatis. *Hall. gætt.* 184.

Habitat in Germania. 24

ÆROPHYLLUM caule æquali, foliolis incisis hirsutum.
 scutis, seminibus subulatis.

ærophyllum foliolis dissectis, petiolis ramiferis uni-
 versalibus utrinque membrana auctis. *Hort. cliff.* 101.
Roy. lugdb. 111. *Sauv. monsp.* 262.

refolium latifolium hirsutum album & rubrum.

Morif. hist. 3. p. 304. f. 9. t. 10. f. 6.

cutaria latifolia hirsuta. *Bauh. hist.* 3. p. 182.

cutaria palustris latifolia alba. *Bauh. pin.* 161.

cutaria palustris latifolia rubra. *Bauh. pin.* 161.

yrthis palustris. *Riv. pent.* 50.

yrthis seminibus strictis longissimis. *Hall. helv.* 453.

yrthis broccenbergensis. *Bauh. pin.* 161. *Hall. opusc.*
 32.

all montanum, cicutæ folio, subhirsutum. *Bauh.*
pin. 161. *prodr.* 85.

nat in Alpibus Helvetiæ. 24

ÆROPHYLLUM caule æquali, foliolis corda- aromaticum
 serratis integris.

ærophyllum foliolis lanceolato-ovatis ferratis inte-
 gris. *Hort. cliff.* 102. *Roy. lugdb.* 112.

folium, rugoso angelicæ folio, aromaticum. *Bocc.*
of. 2. p. 29. t. 19.

elica podagrariæ folio. *Riv. pent.* - - -

elica sylvestris hirsuta inodora. *Bauh. pin.* 156.
prodr. 82.

nat in Lusatia, Misnia. 24

ara & Folia Æropodii Podagrariæ. Flores pleri-
 que masculi; pauci hermaphroditi.

ÆROPHYLLUM fruticosum. arborefcens.

ta arbor virginiana. *Pluk. mant.* 49.

taria arbor virginiana. *Raj. suppl.* 257.

nat in Virginia. 5

frutescens. Folia Chærophylli sylvestris, ampla,
 rad-composita, pinnis potentiſſimis, levia, inciso-
 rata. Umbellæ tenues, albæ; involucre partiali.
 osculi omnes fertiles.

IMPERATORIA.

ERATORIA. *Hort. cliff.* 103. *Hort. ups.* 65. Ostruchium.
et. med. 122.

ratōria. *Bauh. pin.* 155.

Magiftrantia. Cam. epit. 592.

*Habitat ad radices Alpium Helvetiæ, Auftriæ, I
niæ. 24*

*Involucrum uno alterove foliolo tenuiffimo. Folia
radialia oppofita: ftipula petiolaris membranacea
tricofa, una intra alteram.*

SESELI.

**Pimpinelloides. 1. SESELI caule declinato, umbellæ nubilibus
tibus.**

Habitat in Europa australiore. 24

*Radix perennis. Folia pinnata, pinnis multifi
gmentis alternis: hæc etiam alternatim feftæ,
tis linearibus, planis extrorfum verfis. Caulis
radialis, teres, ante florescentiam decumbens,
post florescentiam ferme erectus foliolo uno alterove:
membranaceo, fpathæformi, oblongo; e quo
folium simplex. Umbellæ ante florescentiam
ut in Pimpinella faxifraga: involucro univer
fo; partiali lineari angufto, longitudine fere
lulæ. Semina ovalia ftriis 3. elevatis.*

**montanum. 2. SESELI petiolis ramiferis membranaceis obli
tegris, foliis caulinis anguftiffimis. Hort. di
Roy. lugdb. 112. Dalib. parif. 92. Sauv. mon
Meum latifolium adulterinum. Bauh. pin. 148
Saxifraga montana minor Italica, foliis in
partes divifis. Merif. hift. 3. p. 272.**

Habitat in Galliæ, Italiæ collibus. 24

*Carvifolia Vaill. parif. t. 5. f. 2. Caulis pedalis
levis. Folia Radicalia breviora, dancina,
ta, ad costam sæpe cruciata, foliolis fubtri
Caulina vagina petiolari integra, pinnata:
ternatis: pinnis tripartitis, linearibus acuti
remotiusculis, longioribus, canaliculatis. U
pedicellis brevibus. Semina pubefcentia. I
fequenti proxima.*

**glaucum. 3. SESELI petiolis ramiferis membranaceis obli
tegris: foliolis fingularibus binatisque c
latis lævibus petiolo longioribus. Guett. fu
Fœniculum fylvestre, glauco folio. Tournes. i
Daucus, glauco folio, fimilis fœniculo tortuofo
hift. 3. p. 16.**

aga montana minor glauca & rigidior. Morif.

3. p. 273.

at in Gallia. 24

*s ante explicationem purpurascens, explicati albi
eris purpurascens.*

LI petiolis rameis membranaceis ventricosis ^{annuum.}
marginatis. *Hort. cliff. 103. Roy. lugdb. 112. Sauv.*
sp. 256.

culum sylvestre annuum, tragofelini odore, um-

la alba. Vaill. paris. 54. t. 9. f. 4.

otis tenuifolia germanica. Bauh. pin. 158. Burf.

at in Pannonia, Gallia, Germania. ☉

*striatus, spithameus ☉ ultra, striatus. Folia
mata, laciniata. Flores albicanti-subviolacei.*

LI petiolis membrana destitutis. *Roy. lugdb. Ammoldes.*

culum lusitanicum minimum acre. Tournef. inst.

*aga annua acris, millefolii terrestris folio te-
limo. Morif. hist. 3. p. 272.*

oides. Bauh. pin. 159. Morif. hist. 3. p. 295.

at in Lusitania, Italia. ☉

*parva, ramosissima. Folia fere Millefolii. Um-
bræ multæ radiis 4 s. 5, divaricatis in ambitu ☉
3. parvis in disco; absque involucrio. Involu-
cræ radiis 2 s. 3, parvis. Petala alba, retusa.
heræ subviolaceæ. Semina striata.*

LI petiolis ramiferis membranaceis oblongis ^{pumillum.}
gris: foliolis ternatis linearibus subcarnosis pe-
l longitudine. *Gerard.*

s montanus, multifido folio, felini semine.

2. pin. 150.

culum minimum patulum. Clus. hist. 2. p. 200.

at in Austria, Gallo-provincia.

*parva, tota umbellis paniculata. Folia pinnata:
lis ternatis.*

LI caule alto rigido, foliolis linearibus fasci- ^{tortuosum.}
tis.

the striata rigida. Hort. cliff. 99. Sauv. monsp.

massiliense, fœniculi folio. Bauh. pin. 101.

Foeniculum tortuosum, Bauh. hist. 3. p. 16.

Habitat in Europa australi. 24

Caulis rigidus, quasi lignosus, foliis multoties
Foliola partialia, non duo tantum opposita,
pius quatuor: interioribus minoribus, unde
culata.

Turbith. 8. SESELI involuacro universalis monophyllo, fem
striatis villosis stylatis. Amæn. acad. 4. p. 311

Seseli tertium. Bærh. lugdb. 1. p. 50.

Thapsia rœniculi folio. Bauh. pin. 148.

Habitat in Europa australi. 24

Hippomara
thrum. 9. SESELI involucrellis connato-monophyllis.
Daucus montanus multisido brevique folio.
pin. 150.

Hippomarathrum. Riv. p. nt. 66. Rupp. jen. 3.
Ham. aust. 82. *

Habitat in Austria.

Folia bipinnata: primis trifidis, linearibus.
junceus, glaucus, ut tota planta. Suprem
tantum vagina constant. Involucrum universi
lum; Involucella monophylla, pelvisformia,
crenata s. foliolis in unum connatis, quia
omnibus umbellatis differt. Germina sessilia. C
allæ sæpe subtus purpurascens.

pyrenæum.

SESELI foliis duplicato-pinnatis; foliolis
acutis, involucris setaceis umbellula longior.
Carvi alpinum. Bauh. pin. 158. prodr. 84. Burj
36.

Habitat in Pyrenæis.

Caulis pedalis, teres, striatus. Folia radicali
cato-pinnata, laxa, parum divaricata: Folic
natis, longitudinaliter incisis, acuminatis, cum
bus; Folium in caule sæpe unicum, ex ca
exit ramus; petioli radicales simplices; cauli
membranaceus Umbella universalis nuda,
pedunculis circiter octo; partialis conferta,
ma, uniformis: involuacro polyphyllo, setace
giore umbellulis.

saxifragum.

11. SESELI caule filiformi divaricato, foliis
to-ternatis linearibus, umbellis subsexfidis.

Pimpinella saxifraga tenuifolia. Bauh. pin. 160
84. Burj. VIII. 5.

pinella tenuifolia. Riv. pent.

tat ad Lacum Genevensem, inque Germania.
ta pedalis. Caulis filiformis, ramosus & subra-
fus, divaricatus, teres, tenuis. Folia parva, du-
icato-ternata, linearia, raro lobata. Umbellæ nu-
sculæ, pedunculis sex sæpius; umbellulæ involucriatæ
sculis sex ad octo: involucrella setacea.

SELI caule elongato geniculis callosis, foliis du- elatum.
 icato-pinnatis: pinnis lanceolato-linearibus distan-
 nus.

rus montanus, folio fœniculi longiore. Magn.
nsp. 294.

m montanum, folio tenuiore. Bauh. pin. 153.
tat in Austria, Gallia.

is (ex Horto) humanæ altitudinis, lævis, geni-
is callosis albidis. Foliola glauca, lineari-lanceo-
1; ad radicem majora; in caule pauca, laxiora.
nbellæ respectu plantæ paucioribus radiis & par-
Flores albi.

THAPSIA.

THAPSIA foliolis dentatis villosis basi coadunatis. villosa.

ort. cliff. 105. Roy. lugdb. 113.

Thapsia latifolia villosa. Bauh. pin. 148.

Thapsia. Clus. hist. 2. p. 192.

tat in Hispania, Lusitania, Galloprovincia, Ce-
Monspeliensi. 2.

Thapsia & Folia villosa sunt

THAPSIA foliolis multifidis basi angustatis. Hort. foetida.

F. 105. Roy. lugdb. 113.

Thapsia carotæ folio. Bauh. pin. 148.

Thapsia carotæ effigie. Bauh. hist. 3. p. 187. Morif.

. 3. p. 319. f. 9. t. 18. f. 7.

tat in Hispania. 2.

THAPSIA foliis digitatis: foliolis bipinnatis seta- Aclepium.
 -multifidis. Hort. cliff. 106, Roy. lugdb. 113.

Thapsia foliis pinnatifidis linearibus ad pedunculum

munem radiatis. Roy. lugdb. 114.

Thapsia tenuifolia, petiolis radiatis. Morif. hist. 3. p.

. f. 9. t. 18. f. 9.

Thapsia Turbit garganicum, semine latissimo. hist. 2. p. 50.

Panax Afclepium, semine folioso. Bauh. pin. 151

Panax Afclepium apulum. Column. ecphr. 1. t. 86.

Habitat in Apulia, Oriente. 24

Folia digitata, foliolis bipinnatis capillaceis.

trifoliata.

47 THAPSIA foliis ternatis ovatis.

Sium folio infimo cordato, caulinis ternatis, bus crenatis. Gron. virg. 31.

Habitat in Virginia,

Semina singula gaudent alis 5, longitudinalibus, & naceis, & involucria nulla sunt uti in precedente qua genere conjungo, quamvis facie diversam.

PASTINACA.

fativa.

1. PASTINACA foliis simpliciter pinnatis. *Hort. 105. Hort. upf. 66. Fl. svec. 2. n. 259. Mat. 130. Roy. lugdb. 114. Gort. gelr. 60.*

Pastinaca sylvestris latifolia. Bauh. pin. 155.

β. Pastinaca fativa latifolia. *Bauh. pin. 155.*

Habitat in Europæ australioris ruderatis & pasca

Opopanax.

2. PASTINACA foliis decompositis pinnatis. *Mat. med. 131. Roy. lugdb. 114.*

Panax Costinum. Bauh. pin. 156.

Panax Heracleum. Morif. hist. 3. p. 315. f. 9. f. 2.

Habitat in Italia, Sicilia.

SMYRNIUM.

perfoliatum

1. SMYRNIUM foliis caulinis simplicibus am caulibus. *Hort. cliff. 104. Hort. upf. 66. Roy. 114.*

Smyrnum peregrinum rotundo f. oblongo

Bauh. pin. 154. prodr. 82.

Smyrnum amani montis. Dod. pempt. 698.

Habitat in Italia, Creta. ♂

ægyptiacum

2. SMYRNIUM foliis floralibus binis simplicibus datis integerrimis. *Amæn. acad. 4. p. 270. **

Habitat in Agypto.

Olusatrum.

3. SMYRNIUM foliis caulinis ternatis petiolatis. *Hort. cliff. 105. Roy. lugdb. 114. Saw. 262.*

oselinum theophrasti f. Smayrnum dioscoridis.

uh. pin. 154.

oselinum. *Dod. pempt. 698.*

at in Scotia, Wallia, Gallia, Hispania, Bel-

). ♂

a *Radicalia triternata: caulina ternata: suprema op-*
sita ternata. Foliorum vaginæ lacerato-ciliatæ. In-
cludella brevissima. Flores disci masculi; radiales
amphroditi.

YRNium foliis pinnatis ferratis: posticis ter- aureum.
tis, flosculis omnibus fertilibus.

podium foliis caulinis summis novenis. *Hort.*

ff. 107. Roy. lugdb. 115.

elica acadienfis, flore luteo. *Dod. act. 55. Raj.*

l. 1368.

elica humilior & minor, flore luteo. *Morif. hist.*

p. 281.

yrnium foliis caulinis decompositis acuminatis.

on. virg. 148.

rnium aureum, lobis ternis quinisve, marianum.

uk. mant. 173.

at in America boreali.

YRNium foliis caulinis duplicato-ternatis inte- integerrim-
gerrimis. mum.

rnium foliis caulinis ternatis petiolatis: foliolis

longo-ovatis integerrimis. *Gron. virg. 148.*

at in Virginia. 24

is *sesquipedalis, levis, parum ramosus. Folia fere*
pilegiæ, triternata, oblongo-ovata, glabra, integer-
na, glauco-viridia. Flosculi disci umbellularum
sculi.

ANETHUM.

ETHUM fructibus compressis: *Hort. cliff. 106. graveolens.*

ort. upf. 66. Mat. med. 146. Roy. lugdb. 116.

hum hortense. *Bauh. pin. 147.*

at inter Lusitaniæ & Hispaniæ segetes. ©

ETHUM fructibus ovatis. *Hort. cliff. 106. Hort. Foeniculum.*

f. 66. Mat. med. 147. Roy. lugdb. 116.

iculum dulce. *Bauh. pin. 147.*

iculum vulgare germanicum. *Bauh. pin. 147.*

- γ. *Fœniculum vulgare italicum*, semine oblongo acuto. *Bauh. pin.* 147.
 δ. *Fœniculum sylvestre*. *Bauh. pin.* 147.
Habitat in Narbonæ, Aremorjæ, Maderæ *et* cretaceis. ♂

CARUM.

- Carvi. 1. CARUM. *Dod. pempt.* 299. *Fl. lapp.* 105. *Fl.* 245, 260. *Mat. med.* 138. *Hort. cliff.* 106. *lugdb.* 116. *Hall. helv.* 428.
Carum pratense, *Carvi officinarum*. *Bauh. pin.* 1
Habitat in Europæ borealis pratis. ♂

PIMPINELLA.

- saxifraga. 1. PIMPINELLA foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis; summis linearibus.
Pimpinella foliolis subrotundis. *Fl. svec.* 246. *Mat. med.* 125.
Pimpinella. *Hort. cliff.* 106. *Roy. lugdb.* 115.
Pimpinella saxifraga minor. *Bauh. pin.* 160.
 β. *Pimpinella saxifraga major altera*. *Bauh. pin.* 159.
 major. γ. *Pimpinella saxifraga major*, umbella candida. *pin.* 159.
 δ. *Pimpinella saxifraga major*, umbella rubente. *pin.* 159.
 hircina. ε. *Pimpinella saxifraga tenuifolia*. *Bauh. pin.* 159.
Habitat in Europæ pascuis siccis. 2
Has inter α — ε limites non reperi; β enim sat solo latiori produxit γ.
 glauca. 2. PIMPINELLA foliis supradecompositis, caulibus gulato ramosissimo.
Tragofelinum foliis tenuissime divisis; pinnulis mis tripartitis. *Hall. helv.* 430. *
 Sefeli petiolis ramiferis membranaceis oblongis gris: foliolis binatis ternatisque. *Guert. stan p.* 34. ?
Habitat in Helvetia, Gallia, Italia.
Caret involucellis, quo a Sefeli differt.
 peregrina. 3. PIMPINELLA foliis radicalibus pinnatis crebris summis cuneiformibus incis. *Anisum foliis radicalibus pinnatis*. *Hort. cliff. Hort. upf.* 67. *Roy. lugdb.* 115. *Sauv. meth.* 2.
 A

apium peregrinum, foliis subrotundis. *Bauh. pin.* 153.
 Daucus tertius dioscoridis. *Column. ecphr.* 1. p. 108.
 t. 109.

Habitat in Italix pascuis sterilibus. 24

PIMPINELLA foliis radicalibus trifidis incis. *Anisum.*
 Anisum foliis radicalibus simplicibus. *Hort. cliff.* 107.

Hort. upf. 67. *Mat. med.* 141. *Roy. lugdb.* 116.

Anisum herbariis. *Bauh. pin.* 159.

Anisum vulgare. *Clus. hist.* 2. p. 202.

Cuminum semine rotundiore & minore. *Bauh. pin.*
 146. *Raj. extr.* 63.

Habitat in Ægypto. ☉

A P I U M.

APIUM foliolis caulinis linearibus, involucellis mi- *Petrosell-*
 nutis. *Hort. cliff.* 108. *Hort. upf.* 67. *Mat. med.* 127. *num.*
Roy. lugdb. 116.

apium hortense, Petroselinum vulgo. *Bauh. pin.* 153.

apium hortense. *Dod. pempt.* 694.

Apium vel Petroselinum crispum. *Bauh. pin.* 153.

Habitat in Sardinia juxta scaturigines. ♂

APIUM foliolis caulinis cuneiformibus, umbellis *graveolens.*
 sessilibus. *Hort. cliff.* 107. *Fl. suec.* 248, 262. *Mat.*
med. 128. *Roy. lugdb.* 115.

apium palustre s. Apium officinarum. *Bauh. pin.* 154.

Apium dulce, Celleri italorum. *Tournef. inst.* 305.

Habitat in Europæ humectis, præsertim maritimis. ♂

Æ G O P O D I U M.

ÆGORODIUM foliis caulinis summis ternatis. *Hort. Podagaria.*
cliff. 107. *Fl. suec.* 247, 263. *Roy. lugdb.* 115.

angelica sylvestris minor. s. erratica. *Bauh. pin.* 155.

herba gerardi. *Dod. pempt.* 320.

Habitat in Europa ad sepes inque pomariis 24

folia summa opposita sunt.

TRIGYNIA.

R H U S.

RHUS foliis pinnatis obtusiuscule serratis ovalibus *Coriaria.*
 subtus villosis. *Mat. med.* 150.

Rhus

Rhus foliis pinnatis ferratis. Hort. cliff. 110. upf. 68. Roy. lugdb. 243. Savv. monsp. 227. orient. 91.

Rhus folio ulmi. Bauh. pin. 414.

Rhus coriaria. Dod. pempt. 779.

Habitat in Europa australi, Syria, Palestina. §

typhinum. 2. RHUS foliis pinnatis lanceolatis argute ferratis tus tomentosus. *Amæn. acad. 4. p. 311.*

Rhus virginianum. Bauh. pin. 517. Dill. elth. 323. t. 243. f. 314. Catesb. p. 4. t. 4.

Habitat in Virginia. §

javanicum. 3. RHUS foliis pinnatis ovatis acuminatis ferratis tus tomentosus.

Habitat in China. Osbeck.

glabrum. 4. RHUS foliis pinnatis ferratis lanceolatis nudis. *Kalm. it. 2. p. 211.*

Rhus foliis pinnatis ferratis. Gron. virg. 148. noveb. 63.

Rhus virginicum, panicula sparsa, ramis patulis. Dill. elth. 323. t. 243. f. 314. Catesb. p. 4. t. 4.

Rhus angustifolium. Bauh. pin. 414.

Sumach angustifolium. Bauh. prodr. 158. Burf. 77.

Habitat in America septentrionalis altioribus ad Sepes. §

Vernix. 5. RHUS foliis pinnatis integerrimis, petiolo inæquali. *Mat. med. 151. Kalm. it. 2. p. 211.*

Rhus foliis pinnatis integerrimis. Hort. cliff. Hort. upf. 68. Gron. virg. 148. Roy. lugdb. Cold. noveb. 64.

Toxicodendron foliis alatis, fructu rhomboide. elth. 390. t. 292. f. 377.

Arbor americana, alatis foliis, succo lacteo venosa. Pluk. alm. 45. t. 145. f. 1.

Arbor venenata. Kalm. it. 2. p. 211.

Arbor Poyson-wood-Tree. Act. angl. n. 367. p. Site f. Sitz-dsiu. Kæmpf. amæn. 791. t. 792.

Habitat in America septentrionali, Japonia. §

Copullinum 6. RHUS foliis pinnatis integerrimis, petiolo naceo articulado. *Roy. lugdb. 24. Mat. med. 1.*

elatior, foliis impari-pinnatis, petiolis membraeis articulatis. *Gron. virg.* 149.

virginianum, lentisci foliis. *Raj. hist.* 1799.

oblongiorum similis americana, gummi candidum fundens non serrata, foliorum rachi medio.

Pluk. alm. 318. t. 55. f. 1.

at in America septentrionali. \S

JS foliis pinnatis quinatis integerrimis subrotundis glabris. *Amæn. acad.* 5. p. 395. * *Metopium.*

plum foliis subrotundis pinnato-quinatis, racemis ribus. *Brown. jam.* 177. t. 13. f. 3.

binthus maxima, pinnis paucioribus majoribus ue rotundioribus, fructu racemoso sparso. *Sloan.*

t. 167. *hist.* 2. p. 90. t. 199. f. 3. *Raj. dendr.* 51.

onia fructu corallino, flore pentapetalo. *Plum. ic.* 61. *at in America.* \S

JS foliis ternatis: foliolis petiolatis ovatis nudis egerrimis, caule radicante. *Hort. cliff.* 110. *Gron.*

radicans.

g. 33. *Roy. lugdb.* 244. *Kalm. it.* 2. p. 296, 214.

codendron amplexicaule, foliis minoribus glabris. *ll. elth.* 390.

oxicodendron rectum, foliis minoribus glabris.

ll. elth. 389. t. 291. f. 375.

at in Virginia, Canada. \S

JS foliis ternatis: foliolis petiolatis angulatis pubescentibus, caule radicante. *Toxicodendrum.*

; foliis ternatis: foliolis petiolatis ovatis acutis pubescentibus; nunc integris, nunc sinuatis. *Gron.*

g. 149.

codendron triphyllum, folio sinuato pubescente.

Turnef. inst. 611.

; canadensis. *Munt. phytogr.* t. 60.

a trifolia canadensis. *Cornut. canad.* 96. t. 97.

urr. ic. 228.

or trifolia venenata virginiana, folio hirsuto. *Raj.*

t. 1799.

at in Virginia, Canada. \S

que hæc \S antecedens dioica, utraque in tenellis utris caule radicat.

IUS foliis ternatis: foliolis petiolatis ovatis remotissime ferratis subtus tomentosis. *Amæn. acad.*

Cominia.

p. 395. *

Cominia arborea, foliis undulatis pinnato-ternis floribus minimis, racemis terminalibus. *Brown.* 205.

Baccifera indica trifolia, fructu rotundo monopyno. *Sloan. Jam. 170. hist. 2. p. 100. t. 208. f. 1. hist. 1593.*

Malago Maram. *Rheed. mal. 5. p. 49. t. 25.*

Habitat in Indiis. h

tomentosum 11. RHUS foliis ternatis: foliolis subpetiolatis rhombicis angulatis subtus tomentosis.

Rhus foliis ternatis: foliolis ovatis utrinque acutatis: lateralibus petiolatis. *Hort. cliff. III.*

Rhus foliis ternatis: foliolis petiolatis ovatis acutatis. *Vir. cliff. 25. Roy. lugdb. 244.*

Rhus africanum trifoliatum majus, foliis obtusis & ciliatis hirsutis pubescentibus. *Pluk. alm. 319. t. f. 7.*

Vitex trifolia minor indica serrata. *Comm. hort. 279. t. 92.*

Habitat ad Cap b. Spei. h

Cobbe. 12. RHUS foliis ternatis: foliolis ovatis acuminatis ratis, pedunculis tomentosis.

Rhois trifoliata frutex saluaccensis, floribus julibus. *Pet. mus. 678. Raj. dendr. 58.*

Kobbe. *Fl. zeyl. 441.*

Habitat in Zeylona. h

angustifolium 13. RHUS foliis ternatis: foliolis petiolatis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis. *Hort. III. Roy. lugdb. 244.*

Rhus africanum trifoliatum majus, foliis subtus acutatis & margine incis. *Pluk. alm. 319. t. f. 6.*

Rhus fruticosum, foliis trifidis linearibus acuminatis. *Burm. afric. 251. t. 91. f. 1.*

Habitat in Æthiopia. h

lucidum. 14. RHUS foliis ternatis: foliolis sessilibus cuneatis lœvibus. *Vir. cliff. 25. Hort. cliff. III. f. upf. 68. Roy. lugdb. 243.*

Rhus africanum trifoliatum minus glabrum, splendente folio subrotundo integro. *Pluk. alm. 319. t. f. 9.*

arborëum trifoliatum latifolium. *Burm. afr.* 252.
91. f. 2.

trifolia minor indica rotundifolia. *Comm. hort.*
p. 181. f. 93.

at ad Cap. b. Spei. †

US foliis simplicibus obovatis.

us foliis obverse ovatis. *Hort. cliff.* 112. *Roy.*
ib. 243. *Gron. orient.* 92.

us coriaria. *Dod. pempt.* 780.

ouilea f. Coccoyria. *Bauh. pin.* 415.

at in Lombardia Italiæ & ad radices Apenni-
um, in Carniola. †

æ paniculæ filiformes, pilosæ, longiores pedicel-
Baccæ glabræ, referentes dimidium fructus *Bur-*
pastoris.

Cotinus.

VIBURNUM.

URNUM foliis integerrimis ovatis: ramifica- *Tinus.*
tibus venarum subtus villosoglandulosis.

num foliis ovatis integerrimis. *Hort. upf.* 69.
v. monsp. 136.

Hort. cliff. 109.

1. 2. 3. *Clus. hist.* 1. p. 49.

is *Tinus* f. *sylvestris*: trium generum. *Bauh.*
3. p. 418.

is *sylvestris*, corni feminæ foliis subhirsutis. *Bauh.*
461.

us *sylvestris*, foliis venosis. *Bauh. pin.* 461.

us *sylvestris*, folio minore. *Bauh. pin.* 461.

at in Lusitania, Hispania, Italia. †

JRNUM foliis integerrimis lanceolato-ovatis. *nudum.*

foliis ovatis in petiolos terminatis integerrimis.
m. virg. 33.

at in Virginia. †

in hac nudæ, in præcedenti involucratæ.

JRNUM foliis subrotundis crenato-serratis gla- *prunifolium*
Gron. virg. 33.

num canadense glabrum. *Vaill. act.* 1722. p. 200.

ilus *prunifolia virginiana* non spinosa, fructu ni-
ante. *Pluk. alm.* 249. t. 46. f. 2.

at in Virginia, Canada. †

- dentatum. 4. **VIBURNUM** foliis ovatis dentato-ferratis pl
Habitat in Virginia. †
- Lantana. 5. **VIBURNUM** foliis cordatis ferratis venosis
tus tomentosis. *Vir. cliff.* 25. *Hort. ups.* 68.
lugdb. 242. *Sauv. monsp.* 136.
Viburnum. *Hort. cliff.* 107.
Viburnum vulgo. *Bauh. pin.* 249.
Lantana. *Dod. pempt.* 701.
Habitat in Europæ australioris sepibus argillofis.
- acerifolium. 6. **VIBURNUM** foliis lobatis, petiolis lævibus.
Opulus. *Gron. virg.* 149.
Habitat in Virginia. †
- Opulus. 7. **VIBURNUM** foliis lobatis, petiolis glandulol
Opulus. *Hort. cliff.* 109. *Fl. svec.* 249, 264.
lugdb. 243.
Sambucus aquatica, flore simplici. *Bauh. pin.* 4.
Sambucus palustris. *Dod. pempt.* 846.
- roseum. β. **Sambucus aquatica,** flore globofo pleno. *Bau*
456.
Habitat in Europæ pratis humidiusculis. †
- Lentago. 8. **VIBURNUM** foliis ferrulatis ovatis acuminat
bris, petiolis marginatis.
Habitat in Canada. *Kalm.* †
Folia crassa Tini, glabra, denticulis minimis sen
petiolis longitudinaliter marginatis. Gemma ta
lis subulata, basi ventricosa.
- Cassinoides. 9. **VIBURNUM** foliis ovatis crenatis glabris,
lis eglandulatis carinatis.
Viburnum phillyreæ folio. *Duham. arb.* 2. p. 3.
Cassine foliis ovato-lanceolatis ferratis oppositis
duis, floribus corymbosis. *Mill. dict.* t. 83. f.
Cassine vere perquam similis arbuscula, phil
foliis antagonistis. *Pluk. mant.* 40. *Angl. horu*
t. 20.
Habitat in America septentrionali. †
Folia infima obovata; proxima ovata; superiora l
lata.

CASSINE.

- Peragua. 1. **CASSINE** foliis oblongis ferratis.
Cassine. *Hort. cliff.* 72. *Mat. med.* 153. *Roy.*
242.

trus foliis subrotundis dentatis, flore ac fructu
remoso. *Burm. afr.* 239. t. 85.

urea capensis, folio celastri. *Dill. clth.* 315. t.
5. f. 305.

ex æthiopicus, alaterni foliis. *Seb. thes.* 1. p. 46.
9. f. 5.

at in Æthiopia. §

SINE foliis subovatis integerrimis.

Mauroœnia

ocœnia. *Hort. cliff.* 108.

gula sempervirens, folio rigido subrotundo. *Dill.*
146. t. 121. f. 147.

us capensis, fructu rubro, folio fere obtuso. *Pet.*
1. t. 57. f. 4.

us africana, foliis plerumque in summo sinuatis,
ctu rubro. *Pluk. alm.* 49. t. 158. f. 2.

at in Æthiopia. §

SAMBUCUS.

IBUCUS cymis trifidis, stipulis foliaceis, cau- Ebulus.
herbaceo.

ucus caule herbaceo simplici. *Vir. cliff.* 25. *Fl.*
251, 265. *Mat. med.* 149. *Hort. cliff.* 110. *Roy.*
db. 245.

ucus humilis f. Ebulus. *Bauh. pin.* 456.

us. *Fuchf. hist.* 65.

bucus humilis f. Ebulus folio laciniato. *Bauh. pin.*
5.

at in Europa. 24

IBUCUS cymis quinquepartitis, foliis sub-bi- canadensis.
natis, caule frutescente.

at in Canada. *D. Kalm.* 24

a inter *S. Ebulum* & *nigram*, habitus *S. nigræ*, at
iâ pinnata: foliolis inferioribus ternatis, omnibus
gis ovatis. Fruticat, sed plerumque perit supra ter-
s hyeme. Cymæ structura uti in *nigra*. Stipulæ
formes, truncatæ, ut in *S. nigra*; nec in foliola ex-
isa, ut in *Ebulo*.

IBUCUS cymis quinquepartitis, caule arboreo. nigra.

ucus caule arboreo ramofo, floribus umbellatis.
y. lugdb. 243. *Fl. svec.* 250, 265. *Mat. med.* 148.

ucus caule perenni ramofo. *Hort. cliff.* 109.

ucus fructu in umbella nigro. *Bauh. pin.* 456.

Sambucus. *Dod. pempt.* 845.

B. Sambucus fructu in umbella viridi. *Bauh. pin.*

laciniata. γ. Sambucus lacinato folio. *Bauh. pin.* 456. *Dod.* 845.

Habitat in Germania, Japonia. ♀

racemosa. 4. **SAMBUCUS** racemis compositis ovatis, ca boreo.

Sambucus caule arboreo ramoso, floribus rac
Roy. lugdb. 243. *Sauv. monsp.* 222.

Sambucus racemosa rubra. *Bauh. pin.* 456.

Sambucus racemosa, acinis rubris. *Bauh. hist.* 1.

Habitat in Europæ australis montibus. ♀

SPATHELIA.

simplex. 1. **SPATHELIA.**

Spathe caudice simplici, fronde pinnata comosa
simplicissimo laxo terminali. *Brown. jam.*

Aceri aut Paliuro affinis arbor caudice non r
foliis forbi, floribus racemosis purpureis,
tribus membranulis alato. *Sloan. jam.* 128. *ki*
28. t. 171. *Raj. dendr.* 94.

Habitat in Jamaica. ♀

STAPHYLEA.

pinnata. 1. **STAPHYLEA** foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 112.
upf. 69. *Roy. lugdb.* 436.

Staphylodendron. *Dalech. hist.* 102.

Pistacia sylvestris. *Bauh. pin.* 401.

Habitat in Europæ australioris succulentis.

Styli duo, Fructus bilocularis.

trifolia. 2. **STAPHYLEA** foliis ternatis. *Hort. cliff.* 112.
lugdb. 437. *Cold. noveb.* 62.

Staphylodendron triphyllum, vasculo tripartito.
vrg. 34.

Staphylodendron virginianum trifoliatum. *Hern.*
230.

Pistacia virginica sylvestris trifolia. *Morif. blæ*

Habitat in Virginia. ♀

Hæc trigyna est.

TAMARIX.

gillica. 1. **TAMARIX** floribus pentandris. *Hort. cliff.* 111.
lugdb. 436. *Sauv. monsp.* 45.

Tamarix pedunculis nudis, floribus pentandris. Hort. upf. 69 Mat. med. 154.

Tamarix altera, folio tenuiore, f. gallica. Bauh., pin. 485.

Tamariscus narbonensis. Lob. ic. 218.

Habitat in Gallia, Hispania, Italia. ♀

TAMARIX floribus decandris. *Hort. cliff. 111. Roy. germanica. lugdb. 436.*

Tamarix fruticosa, folio crassiore, f. germanica. Bauh. pin. 485.

Tamariscus germanica. Lob. ic. 218.

Habitat in Germaniæ locis inundatis. ♀

TURNERA.

TURNERA floribus sessilibus petiolaribus, foliis baulmifolia, si biglandulosis.

Turnera foliis serratis, petiolis floriferis. Vir. cliff. 20. Hort. cliff. 112. t. 10. Roy. lugdb. 434. Sp. pl. 1. p. 965.

Turnera frutescens ulmifolia. Plum. gen. 15. Mart. cent. 49. t. 49.

Astus urticæ folio, flore luteo, vasculis trigonis. Sloan, jam. 86. hist. 1. p. 202. t. 127. f. 4, 5. Raj. dendr. 492.

Turnera frutescens, folio longiore & mucronato. Mart. cent. 49. t. 49.

Habitat in Jamaica, ♂ in America calidiora. ♂

TURNERA floribus sessilibus petiolaribus, foliis Pumilea, eglandulosis. *Amæn. acad. 5. p. 395. **

Pumilea minima hirsuta, foliis angustis profunde serratis. Brown, jam. 188.

Jamaæ Cistus luteus, foliis parvis serratis. Pet. gaz. 59. t. 38. f. 9.

Jamaæ Cistus urticæ folio, flore luteo. Sloan, jam. 87. hist. 1. p. 202. t. 127. f. 6.

Habitat in Jamaica. ☉

TURNERA floribus pedunculatis axillaribus, foliis cistoides, apice serratis.

umilea subhirsuta simplex, foliis linearibus crenatis.

Brown, jam. 189.

elanthemoides. Barh. lugdb. 2. p. 269.

Helianthemum betonicæ folio, caule hirsuto. *l*
Spec. 7. icon. 150. f. 1.

Chamæcistus caule hirsuto, folio oblongo angust
nuato, flore luteo pediculo insidente. *Sloan. jam*
hist. 1. p. 202. t. 127. f. 7.

Habitat in America meridionali, Jamaica, Surinam

Radix fibrosa. Caulis digitalis, simplicissimus, et
pilosus. Folia subpetiolata, lanceolata, versus ap-
paucis crenis notata, subtus tomentosa. Pedunculi
lares, solitarii, uniflori, geniculo notati, longius
floris. Calyx tomentosus.

TELEPHIUM.

- imperati.* 1. **TELEPHIUM** foliis alternis. *Hort. ups. 70.*
Telephium foliis oblongo-ovatis, racemis ter-
terminalibus. Vir. cliff. 20. Hort. cliff. 73. Royl.
434.
Telephium repens, folio non deciduo. Bauh. pin.
Telephium legitimum. Clus. hist. 2. p. 67.
Cistus folio majoranæ. Bauh. pin. 405.
Habitat in Gallo-provincia. 4.
- oppositifol-* 2. **TELEPHIUM** foliis oppositis. †
um. *Telephium myosotidis foliis amplioribus conjug*
Shaw. afric. 572. f. 572.
Habitat in Barbaria.

CORRIGIOLA.

- littoralis.* 1. **CORRIGIOLA.** *Hort. ups. 70.*
Corrigiola caule fasciculis florum terminato. Hort
112. Roy. lugdb. 420. Hall. helv. 391.
Polygonum littoreum minus, flosculis spadiceo-
cantibus. Bauh. pin. 281. prodr. 131. Moris. hist.
593. J. 5. t. 29. f. 1.
Habitat in Gallia, Germaniæ littoribus arenosis. O

PHARNACEUM.

- Cerviana.* 1. **PHARNACEUM** pedunculis subumbellatis lat
bus æquantibus folia linearia.
Pharnaceum glabrum, pedicellis folia æquant
*Phil. bot. 258. * Sp. pl. 1. p. 272.*
Cerviana. Minuart. monogr. 1.

Trichlis pentastemon, floribus umbellatis. *Hall. gætt.* 26.

Alfina pumila, gallii facie, foliis glaucis. *Amm. ruth.* 84.

Alfina Saxifraga, ind. orient. foliis circa caulem radiatis, flore herbido & muscoso. *Pluk. mant.* 9. t. 332. f. 11.

Spergula purpurea minima. *Buxb. cent.* 3. p. 33. t. 62. f. 2.

Habitat Rostockii, in Russia, Hispania, Asia. ☉

PHARNACEUM pedunculis communibus longissimis, foliis linearibus. *Hort. cliff.* 492. * *Roy. lugdb.* 221.

Habitat in Africa.

Figura forte habetur in *Pluk. phyt.* 304. f. 4.

PHARNACEUM pedunculis unifloris lateralibus, Mollugo, foliis linearibus.

Mollugo foliis septenis linearibus. *Hort. cliff.* 28.

Alfina procumbens, gallii facie, africana. *Herm. lugdb.* 19. t. 21.

Rubia stellaris s. *Asperula minor* humisparsa, flosculis albis, æthiopica. *Pluk. mant.* 163. t. 331. f. 4.

Habitat in Æthiopia.

PHARNACEUM racemis bipartitis terminalibus, foliis obcordatis. *Amæn. acad.* 6. afr. 6. * cordifolium.

Habitat ad Cap. b. spei.

ALSINE.

ALSINE petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Fl. media.* lapp. 186. *Fl. svec.* 369, 267. *Hort. cliff.* 173 *Gron. virg.* 161. *Roy. lugdb.* 449.

Alfina media. *Bauh. pin.* 250.

Alfina minor. *Dod. pempt.* 29.

Habitat in Europæ cultis. ☉

ALSINE foliis setaceis, calycibus aristatis, petalis mucronatis, integris brevibus.

Arenaria foliis setaceis mucronatis, corollis brevissimis, calycibus inferne mucronatis. *Sp. pl.* 1. p. 424.

Alfina foliis fasciculatis tenuissimis durisque, petalis integris. *Hall. helv.* 389. t. 7. f. 2. *Segu. ver.* 3. p. 173.

Habitat in Helvetia.

Stamina huic 5. Segu. l. c.

- segetalis. 3. **ALSINE** petalis integris, foliis filiformibus.
Spergula foliis filiformibus unum latus spectantibus
 stipulis membranaceis vaginantibus, pedunculis
 bellatis. *Guett. stamp. 299. Dalib. parif. 133.*
Alfne segetalis, gramineis foliis unum latus spectantibus.
Vall. parif. 8. t. 3. f. 3.

Habitat Parisiis. ☉

Vigiliæ hujus ab hora 3 in 9. Seguier.

DRYPIS.

- spinosa. 1. **DRYPIS.** *Ger. emac. 1312.*
Drypis italica aculeata, floribus albis umbellatis compositis.
Mich. gen. 24. t. 23.
Drypis theophrasti f. angullaræ. *Dalech. hist. 14*
Lob. ic. 789. Tabern. ic. 144. Bauh. hist. 3. p. 381
Spina alba foliis vidua. *Bauh. pin. 388.*
Carduus foliis tenuissime spinosis ad instar juniperi.
Morif. hist. 3. p. 161, f. 7. t. 32. f. 8.
Habitat in Mauritania, Italia. ♂
 Caules primi procumbentes, tetragoni, brachiati, perne dichotomi. Folia subulata, subtrigona, multinata; dichotomiæ lanceolata, utrinque tridentata; corollæ coronatæ Silenes, purpurascetes. Capitulum circumscissæ. *D. Mygind.*

BASELLA.

- rubra. 1. **BASELLA** foliis planis, pedunculis simplicibus.
Basella. *Rheed. mal. 7. p. 45. t. 24. Fl. zeyl. 119.*
Cuscuta foliis subcordatis. *Hort. cliff. 39.*
Gandola rubra. *Rumph. amb. 5. p. 417.*
Habitat in India. ♂. ☉
- alba. 2. **BASELLA** foliis ovatis undatis, pedunculis simplicibus folio longioribus.
Basella flore albo & caulibus viridibus. *Thran. carol.*
Gandola alba. *Rumph. amb. 5. p. 417.*
Mirabili peruvianæ affinis tinctoria, betæ folio, & dens. *Fluk. alm. 252. t. 63. f. 1.*
Habitat in China, Amboina. ♂
Caulis herbaceus, sed perennans.

ASELLA foliis subcordatis, pedunculis confertis ramosis.

lucida

abitat in India. ☉

Quæ nimium sunt hæ tres Species, sed constantes se servant in hortis.

SAROTHTA.

SAROTHTA. *Amæn. acad. 3. p. 11. Kalm. it. 2. Gentianol- des.*

Antiana caule ramisque ramosissimis, foliis subulatis minimis. Gron. virg. 29.

Scoparium minus spicatum, angustissimo folio, f. scoparium marilandicum novum. Pluk. mant. 43. t.

324. f. 4.

abitat in Virginie, Pensylvanie apricis glareosis.

Antiana inaperta an hujus generis?

TETRAGYNIA.

PARNASSIA.

PARNASSIA. *Fl. lapp. 108. Fl. suec. 252. 268. Hort. cliff. 113. Roy. lugdb. 420. Hall. helv. 316. Dalib. paris. 96.*

Ramen parnassi albo simplici flore. Bauh. pin. 309.

Epatica alba. Cord. hist. 53.

Prota rotundifolia palustris, flore unico ampliore.

Morif. hist. 3. p. 505. f. 12. t. 10. f. 3.

abitat in Europæ uliginosis. 24

EVOLVULUS.

EVOLVULUS foliis subrotundis, caule repente, floribus subsessilibus. *nummularius.*

Convolvulus nummularius. Sp. pl. 157.

Convolvulus minor repens, nummulariæ folio, flore ceruleo. Sloan. jam. 58. hist. 1. p. 157. t. 99. f. 2.

Raj. suppl. 382.

Convolvulus herbaceus repens, foliis subrotundis, floribus singularibus axillaribus. Brown. jam. 153.

abitat in Jamaica, Barbados pratis.

EVOLVULUS foliis cordatis obtusis mucronatis petiolatis villosis, caule diffuso, pedunculis unifloris. *gangeticus*

*Amæn. acad. 4. p. 306. n. 121. **

abitat in India.

- alfinoides. 3. **EVOLVULUS** foliis obcordatis obtusis petio-
pilosis, caule diffuso, pedunculis trifloris. *Fl.*
76.
Convolvulus foliis ovatis obtusis, caule filif-
Hort. cliff. 68.
Anagallis hirsuta minor, foliis alternis, floribus
tariis. *Burm. zeyl.* 11. t. 6. f. 1. & t. 9. f. 1.
Vistnu-clandi. *Rheed. mal.* 11. p. 131. t. 64.
Habitat in Malabaria, Zeylona, Bismagaria, Bah
- linifolius 4. **EVOLVULUS** foliis lanceolatis villosis sessili-
caule erecto, pedunculis trifloris longis. *Syst*
10. p. 923. *Amæn. acad.* 4 p. 306. n. 122. *
Convolvulus herbaceus erectus, foliis linearibus
dunculis longis tenuissimis bibracteatis alar
Brown. jam. 152. t. 10. f. 2.
Habitat in Jamaica. ☉
- tridentatus. 5. **EVOLVULUS** foliis lineari-cuneiformibus tric-
datis: basi dilatata dentatis. *Sp. pl.* 157.
Convolvulus minor procumbens, acetosellæ folli
cuspidatis. *Pluk. mant.* 117. t. 167. f. 5.
Sendera-Clandi. *Rheed. mal.* 11. p. 133. t. 65.
8. Convolvulus indicus barbatus minor, foliorum
cibus lunulatis. *Pluk. alm.* 117. t. 276. f. 6.
Habitat in India.

PENTAGYNIA.

ARALIA.

- arborea. 1. **ARALIA** caule arboreo, foliis simplicibus, ut
læ universalis radiis uniglandulosis. *Amæn. ac*
p. 369. *
Aralia arborea, foliis nitidis oblongo-ovatis, um
laxa radiis singulis glandula notatis. *Brown. jam.*
Hedera arbor, folio hastato. *Plum. spec.* 18. ic. 1.
Habitat in Jamaica. †
- spinosa. 2. **ARALIA** arborefcens, caule foliolisque acul
Vir. cliff. 26. *Gron. virg.* 34.
Aralia caule aculeato. *Hort. cliff.* 113. *Roy. lugd*
Angelica arborefcens spinosa f. Arbor indica f
folio, cortice spinoso. *Comm. hort.* 1. p. 89. t. 47
hist. 1798.

Christophoriana arbor aculeata virginienſis. *Pluk. alm.* 98. t. 20.

Habitat in Virginia. †

RALIA caule petiolisque aculeatis, foliolis in- chinenſis.
mibus villoſis.

Rutex aquoſus mas. *Rumph. amb.* 4. p. 105. t. 44.?

Habitat in China. *Osbeck.* †

aulis ſimplex, aculeis ſpinoſiſſimus, nudus, in ſummitate tantum folioſus. Petioli compoſiti, tripartiti, aculeati, villoſi. Folia partialia pinnata & inſuper foliola ad ramificationes petioli. Foliola ſ. pinnae ovatae, serratae, ſubtus praesertim villoſae, duplo majores, quam in praecedente. Panicula ramaſa umbellulis numeroſis. Differt itaque a praecedenti, quod nulli aculei foliolis per diſcum ſecundum venas adſperſi: quod folia non glabra ſed duplo majora. Habitus etiam diverſus.

RALIA caule folioſo herbaceo laevi *Hort. upſ.* 70. racemosa.
Cold. noveb. 67.

Ralia racemis umbelliferis lateralibus. *Vir. cliff.* 26.

Ralia ex alis florifera. *Hort. cliff.* 113. *Roy. lugdb.* 92.

anaces carpimon ſ. racemosa canadenſis. *Corn. canad.* 74. t. 75. *Barr. ic.* 705.

Christophoriana canadenſis racemosa & ramaſa. *Morif. hiſt.* 1. p. 9. f. 1. t. 2. f. 9.

Habitat in Canada. †

RALIA caule nudo, foliis binis ternatis. *Hort. cliff.* nudicaulis.
113. *Gron. virg.* 34. *Roy. lugdb.* 94.

Ralia caule nudo, radice repente. *Cold. noveb.* 66.

Christophoriana, virginiana zarzae radicibus furculoſis & fungoſis. *Pluk. alm.* 98. t. 238. f. 5.

Habitat in Virginia. ſimillima (forte eadem) in Java. †

aulis breviffimus & fere nullus. Folia duo, decompoſita petiolis longis: Folium ternatum: Foliolis pinnatis: pinnae quinque, serratae. Scapus inter duo folia ortus, aphyllus, trifidus, ſ. umbellulas tres ferens.

BARRERA.

BARRERA.

Erica capitata ſ. nodiflora, corioſo foliis rectis, aethiopia. *Pluk. mant.* 69. t. 346. f. 7.

Habitat in Æthiopia. †

Frutex; Rami per spatia determinata conferti, erufescentes adpersi pilis albis. Folia alterna, approximata, ovato-lanceolata, integerrima, pilis velut ciliata; Capitula florum terminalia; Simil est habitu Diosmæ ciliate.

STATICE.

Armeria. 1. **STATICE** scapo simplici capitato, foliis lineari
*Hort. cliff. 115. Fl. suec. 253, 269. Gron. virg.
Roy. lugdb. 194.*

*Limonium aphyllocaulon gramineum globosum. M
hist. 3. p. 601. f. 15. t. 1. f. 29.*

*Caryophyllus montanus major, flore globofo. I
pin. 211.*

β. *Cariophyllus montanus minor. Bauh. pin. 211.
Habitat in Europæ & Americæ septentrionalis
pis. 24*

Limonium. 2. **STATICE** scapo paniculato tereti, foliis lævibus
*Statice caule nudo ramoso. Hort. cliff. 115. Fl.
254, 270. Gron. virg. 150. Roy. lugdb. 192.*

Limonium maritimum majus. Bauh. pin. 192.

β. *Limonium maritimum minus, oleæ folio. Bauh.
192.*

γ. *Limonium maritimum minimum. Bauh. pin.
prodr. 99. Bocc. sic. 25. t. 19.*

Habitat in Europæ & Virginix maritimis.

cordata. 2. **STATICE** scapo paniculato, foliis spathulatis re
Sauv. monsp. 15. Allion. nicæns. 162.

*Limonium maritimum minus, foliis cordatis.
pin. 192. prodr. 99.*

*Limonium minimum cordatum f. folio retuso.
ic. 805.*

Habitat ad maris Mediterranei littora. 24

echiodes. 4. **STATICE** scapo paniculato tereti, foliis tuberculatis
*Statice foliis obverse-ovatis verrucosis, caule ramoso
nudo. Sauv. monsp. 15.*

*Limonium minus annuum, bullatis foliis. Magn. 1
157. t. 156.*

Habitat Monspelii. ☉

reticulata. 5. **STATICE** scapo paniculato prostrato, ramis
bus retroflexis nudis, foliis cuneiformibus.

rice foliis obverse-ovatis, ramis nudis humifusis, intricatis. *Sauv. monsp.* 15.

onium minus, virgulis retiformiter se invicem imbricatis. *Pluk. alm.* 221. t. 42. f. 4.

onium reticulatum. *Raj. hist.* 396. *Bocc. flc.* 82. t. 44. *Etat in Melita.*

ATICE scapo dichotomo ancipiti, foliis lanceolatis mucronatis, floribus aggregatis. *speciosa.*

onium foliis lanceolatis mucronatis radicalibus, acule ancipiti dichotomo, stipulis simplicibus. *Hort. f.* 71. *Gmel. fibir.* 2. p. 221. t. 91. f. 1.

onium floribus elegantissimis. *Raj. hist.* 397.

onium elatius, plantaginis foliis procumbentibus aculeum terminatis, floribus albis in capitula congestis. *Amm. ruth.* 129.

bitat in Tataria. ♂

Species etiam in hac indivisi sunt.

ATICE scapo dichotomo, foliis lanceolatis mucronatis, floribus alternis distantibus. *Gmel. fibir.* 2. p. 223. t. 92. *tatarica.*

onium orientale, plantaginis folio, floribus umbellatis. *Tournef. cor.* 25. *Boerh. lugdb.* 1. p. 76. t. 76.

onium elatius, plantaginis foliis procumbentibus aculeum terminatis, floribus albis spicatis. *Amm. ruth.* 130.

bitat in Tataria. ♂

ATICE scapo paniculato, foliis subulatis mucronatis. *Echinus.*

onium foliis caulinis subulatis pungentibus. *Roy. lugdb.* 192.

onium orientale frutescens, caryophylli folio in cauleum rigidissimum abeunte. *Tournef. cor.* 25.

onium cespitosum, foliis aculeatis. *Buxb. cent.* 2. p. 18. t. 10.

onium græcum, juniperi folio. *Tournef. cor.* 25.

minus s. Tragacantha altera. *Alp. exot.* 57. t. 56.

bitat in Græciæ & Mediæ desertis.

lia imbricata, subulata, supra plana, margine scabra, apice mucronato-spinosa; inferiora reflexa.

ATICE scapo ramoso flexuoso, corymbis terminalibus, foliis nervosis. *flexuosa.*

Statice foliis ovalibus muticis nervosis, caule alternatim ramofo flexuoso, corymbis ternis. *Gmel. sibir. 2. p. 217. t. 89. f. 1.*

Habitat in Sibiria.

- fruticosa. 10. **STATICE** caule fruticoso: superne nudo capitulis sessilibus, foliis lanceolatis vaginantibus. *Statice foliis e lanceolato-linearibus: caulinis vaginantibus, capitulis alternis sessilibus. Gmel. p. 216. t. 88. f. 2. 3.*

Habitat in Sibiria. D. Gmelin. 5

- monopetala. 11. **STATICE** caule fruticoso folioso, floribus raris, foliis lanceolatis vaginantibus. *Statice foliis caulinis lanceolato-linearibus. Hort. 116. Roy. lugdb. 192.*

Linonium lignosum. Bocc. sic. 34, 35. t. 16, 17.

Habitat in Sicilia.

Gallas sepe fert ex Phalæna. Reaum. inf. 3. t. 1-4.

Linonium hispanicum, multifido folio. Tournef. 342. etiam monopetalum est.

- ferulacea. 12. **STATICE** caule fruticoso ramofo, ramulis catis paleis apice pilo terminatis.

Linonium ferulaceo folio. Griseb. lust. Morif. hist. 15. t. 1. f. 23. Pluk. alm. 221. t. 28. f. 4.

Habitat in Barbaria, Lusitania, Hispania. Alström. Caules teretes, sublignosi, nudi paleis alternis, paucis. Ramuli ramosissimi, fasciculati, filiformes, imbricati paleis minutissimis, apice setula terminatis. Flores imbricati, ascendentes, secundi, lutei.

- aurea. 13. **STATICE** caule fruticoso folioso ramofo, subulatis.

Statice caulibus fruticosis teretiusculis, foliis latis caulinis, floribus ex corymbofo fasciculis. Gmel. sibir. 2. p. 218.

Linonium maritimum humile, ephedræ facie, cibus florum aureis. Aem. ruth. 132. t. 18. f. 2. Habitat in Dauriæ campis montosis.

- pinna. 14. **STATICE** caule herbaceo, foliis radicalibus natim pinnato-sinuatis: caulinis ternis tripartitis subulatis decurrentibus. *Hort. upf. 71. Gron. 96.*

ce foliis caulinis decurrentibus. *Hort. cliff.* 116.
 onium peregrinum, foliis asplenii. *Bauh. pin.* 192.
 onii species. *Rauv. itin.* 313. t. 314.
 onium rauwolfianum. *Chif. cur.* 33. t. 33.
 onium africanum, caule elato, foliis integris hirsutis, petalo pallide flavo, calyce amœne purpureo. *Mart. cent.* 84. t. 48.
 onium caulibus alatis, asplenii foliis minus asperis, calycibus acutioribus flavescens. *Shaw. vic.* 363.
in Sicilia, Palæstina, Africa. ♂
et a Caule ramisque inferne teretibus, nec alatis. Foliis minus sinuatis. γ. Caulium alis membranaceis ægris & bracteis obtusis glabris, nec acutis hispidis.

LINUM.

* *foliis alternis.*

LINUM calycibus capsulisque mucronatis, petalis unguiculatis, foliis lanceolatis alternis, caule subfoliario. *mum.*
 in ramis foliisque alternis lineari-lanceolatis, radice annua. *Hort. cliff.* 114. *Roy. lugdb.* 433. *Philos. t.* 261. *
 in foliis alternis lanceolatis integerrimis, calycibus acuminatis angulatis, capsulis mucronatis. *Hort. f.* 71. *Mat. med.* 156.
 in arvense. *Bauh. pin.* 214. *Raj. hist.* 1073.
 in sativum. *Bauh. pin.* 214.
 in sativum humilius, flore majore. *Bærh. lugdb. p.* 284.
 in sativum latifolium africanum, fructu majore. *Bournef. inst.* 339.
in hodie inter segetes Europæ australis. ☉
 in cis margines interiores subciliati.
 LINUM calycibus capsulisque obtusiusculis, foliis perenne.
 ternis lanceolatis integerrimis. *Mill. dict. t.* 166. f. 2.
 in foliis alternis lanceolatis integerrimis, calycibus apice obtusis, capsulis muticis. *Hort. upf.* 72.
 in perenne, ramis foliisque alternis lineari-lanceolatis. *Hort. cliff.* 14. *Roy. lugdb.* 434. *Sauv. monsp.* 53.
 in perenne majus cæruleum, capitulo majore. *Tort. hist.* 2. p. 573.

Linum sylvestre cæruleum perenne erectius, i
capitulo majore. *Raj. angl. 3. p. 362.*

Habitat in Sibiria & Cantabrigiæ. 2

viscosum.

3. LINUM foliis lanceolatis pilosis quinquenervi
Linum sylvestre latifolium, caule viscoso, sic
bro. *Bauh. pin. 214. Raj. hist. 1074.*
*Habitat in montibus Bononiensibus, Sumario, &
vindelicorum, Ingolstadii. 2*

hirsutum.

- 4 LINUM calycibus hirsutis acuminatis, sessili
ternis, caule corymbofo.
Linum sylvestre latifolium hirsutum cæruleum.
*pin. 339. Mortf. hist. 2. p. 573. f. 5. t. 26. f.
hist. 1073.*

Linum sylvestre latifolium. *Clus. hist. 1. p. 317.*
Habitat in Austriæ, Tataria editis graminosis.
*Simillimum L. nodifloro, sed Caulis teres; et
liata s. hirsuta, latiora: caulina alterna; rama
sita. Flores sessiles, alterni. Calyces foliate
gi. Folia ramea s. floralia & Calyces cilia
brevissimis, glandulosis, præsertim versus apicem.*

carbonense.

5. LINUM calycibus acuminatis, foliis lac
sparsis striatis scabris acuminatis, caule ter
ramoso.
Linum sylvestre cæruleum, folio acuto. *Ba
214. prodr. 107. Raj. hist. 1073.*
Linum sylvestre angustifolium, cæruleo amplo
Magn. monsp. 161. Sauv. monf. 54.
*Habitat in Galloprovincia, Montpelii, unde B
attulit C. Bauhino. 2*
Calyces magni, lanceolati, latere membranacei,
exquisitissime acuminati & quasi mucrone subul
structi.

venisfolium

6. LINUM calycibus acuminatis, foliis sparsis l
setaceis retrorsum scabris.
Linum perenne, foliis angustioribus, calyce a
Hall. helv. 371.
Linum sylvestre angustifolium, flore magno.
pin. 214.
Linum sylvestre V. angustifolium. *Clus. hist. 1. p. 1*
β. Linum sylvestre angustifolium, flore magno, l
cæruleo. *Tournef. inst. 340.*

Linum sylvestre angustifolium, flore magno violaceo.
Tournef. inst. 340.

Linum sylvestre angustifolium, flore magno lineis
purpureis distincto. *Tournef. inst. 340.*

Linum sylvestre angustifolium, flore magno cæruleo
& velut cinereo. *Tournef. inst. 340.*

Linum sylvestris V. angustifolii aliud genus. *Clus. hist. 1.*
p. 318.

Linum sylvestre angustifolium, floribus dilute purpu-
rascentibus vel carneis. *Bauh. pin. 214.*

Linum sylvestre VI. angustifolium. *Clus. hist. 1. p.*
318.

Linum oxyphyllum multicaule. *Boer. mus. 2. p. 169.*
t. 125.

Linaria, capillaceo folio, altera. *Bauh. pin. 213.*

Linum angustifolium album, ramusculis per terram
sparsis. *Tournef. inst. 340.*

Linum sylvestre, angustis & densioribus foliis, flore
minore. *Bauh. pin. 214.*

Habitat in Galliæ, Helvetiæ, aridis herbosis. 2.

Calyces ovati, valde acuminati, uti *Folia aculeis mi-*
nutissimis serrati.

LINUM calycibus rotundatis obtusis, foliis lineari- austriacum.
bus acutis.

Linum sylvestre angustifolium, foliis rarioribus. *Bauh.*
pin. 214.

Linum sylvestre II. *Tabern. ic. 822.*

Habitat in Austria inferiore.

LINUM calycibus acutis alternis, capsulis muticis, virginia-
panicula filiformi, foliis alternis lanceolatis; radi- num.
calibus ovatis.

Linum ramis foliisque alternis lanceolatis sessilibus
nervo longitudinali instructis. *Gron. virg. 35.*

Habitat in Virginia, Pennsylvania,

Caulis filiformis, pedalis, paniculatus. Folia radicalia

ovalia, integerrima, lævia; caulina alterna, lanceo-
lata. Flores alterni: pedunculis brevissimis. Caly-
ces acuti. Capsulæ globosæ, muticæ; Corollæ luteæ.

LINUM calycibus subserrato-scabris lanceolatis flavum.
subsessilibus, panicula ramis dichotomis.

Linum sylvestre latifolium luteum. *Bauh. pin. 214.*

Linum latifolium luteum. Bauh. hist. 3. p. 454.

Linum sylvestre III. latifolium. Clus. hist. 1. p. 3.

Habitat in Austria.

strictum.

10. **LINUM** calycibus subulatis, foliis lanceolatis mucronatis: margine scabris.

Linum foliis asperis umbellatum luteum. Magn. 164. Raj. hist. 1076 Sauv. monsp. 53.

Lithospermum, linariæ folio, monspeliensium. pin. 259.

Passerina lobelii. Bauh. hist. 3. p. 454.

Habitat in Monspeli, Hispaniæ, Siciliæ squalida

Planta corymbosa, stricta. Folia margine scabra; ces subulati; fructu duplo longiores.

suffruticosum.

11. **LINUM** foliis linearibus acutis scabris, caulis suffruticosis.

Linum angustifolium fruticosum valentinum; foliis digidis & aculeatis. Tournes. inst. 340.

Habitat in Regno Valentino. §

arborescens.

12. **LINUM** foliis cuneiformibus, caulibus arborescentibus.

Linum arborescens. Alp. exot. 19. t. 13.

Habitat in Creta, Italia. ¶

campanulatum.

13. **LINUM** foliorum basi utrinque puncto glanduloso.

Linum foliis imis spathulatis, floribus luteis. monsp. 76.

Linum sylvestre luteum, foliis subrotundis. Bauh. 212. Tournes. inst. 340. Magn. char. 261.

Rapunculus nemorosus angustifolius, parvo folio. Bauh. pin. 93.

Campanula lutea linifolia montis lupi, flore vobis. Lob. ic. 414.

Campanula linifolia lutea. Bauh. hist. 2. p. 817.

Habitat in Galloprovinciæ montibus, Monspeli in monte lupi. ¶

Caulis simplices, digitales, angulati, terminati; Floribus tribus, magnis, pedunculatis. Calyces lanceolati, acuminati.

maritimum.

14. **LINUM** calycibus ovatis acutis muticis, foliis lanceolatis: inferioribus oppositis.

*Linum caule simplici, ramis foliisque inferioribus oppositis; lineari-lanceolatis. Hort. cliff. 114. * Lugdb. 434. Sauv. monsp. 147.*

1 foliis ovatis, floribus racemosis. *Guett. stämp.*
1. 499.

1 maritimum luteum. *Bauh. pin.* 214.

1 luteum narbonense. *Bauh. hist.* 3. p. 454. *Raj.*
1074.

1 sylvestre. *Dod. pempt.* 534.

ut in Austria ad *Thermas badenses*, *Monspeli*
n Oriente, ut E in Italia ad *stagna marina*.

tota glaberrima. *Calycis foliola ovata, acuti-*
u.

NUM calycibus acutis, foliis lineari-lanceolatis gallicum.
ernis, paniculæ pedunculis bifloris.

1 foliis lineari-lanceolatis, pedunculis bifidis,
ibus luteis. *Sauv. monsp.* 53.

1 sylvestre minus, flore luteo. *Bauh. pin.* 214.

at *Monspeli*.

1 interdum tria, sæpius quinque observata a *D.*
vages.

* * *Foliis oppositis.*

NUM foliis oppositis lineari-lanceolatis, floribus africanum
ninalibus pedunculatis. *Roy. lugdb.* 434.

n africanum luteum, foliis conjugatis. *Boerh.*
ib. 1. p. 284.

at in Africa.

NUM foliis floriferis oppositis lanceolatis, flori- nodiflorum
alternis sessilibus, calycibus longitudine folio-

1. *Hort. cliff.* 114.

n luteum ad singula genicula floridum. *Bauh.*

214. *Morif. hist.* 2. p. 574. f. 5. t. 26. f. 11. *Raj.*
1026.

n luteum sylvestre latifolium. *Column. ecphr.* 2.
19. t. 80.

at in Italiæ pratis argillofis.

3. *angulatus, lævis, bifidus f. trifidus.* Folia u-
que ad basin glandula ovata fusca: caulina, alterna
æolata, lævia; ramea opposita, angustiora. Flo-

alterni, sessiles. Calyx linearis, foliaceus, lon-
gitudine foliorum. Corolla flavescens. Capsula glo-
1, acuminata.

NUM foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule di- catharticus n
otomo, corollis acutis. *Hort. cliff.* 372. *Fl. svec.*

3, 271. *Mat. med.* 157. *Roy. lugdb.* 434.

spec. plant. pars I.

C c

Li-

Linum pratense, flosculis exiguis. *Bauh. pin.* 272.
 Spergula bifolia, lini capitulis. *Loef. pruss.* 261.
Habitat in Europæ septentrionalis pascuis jun-
tis. ☉

- Radiola. 19. LINUM foliis oppositis, caule dichotomo, flo-
 tetrandris tetragynis. *Hort. cliff.* 114. *Fl. suec.*
 272. *Roy. lugdb.* 434.
 Chamæ Linum vulgare. *Vaill. parif.* 33. t. 4. f. 4.
 Linocarpum, serpilli folio, multicaule & multifo-
Mich. gen. 23. t. 21.
 Radiola vulgaris serpillifolia. *Raj. angl.* 3. p. 161.
 f. 3.
 Polygonum minimum f. Millegrana minima.
pin. 282.

Habitat in Europæ sabulo inundato. ☉

- quadrifolli- 20. LINUM foliis quaternis.
 um. Linum africanum, rubiæ foliis quaternis stellatis
suppl. 525.
Habitat in Æthiopia.

- verticilla- 21. LINUM foliis verticillatis.
 tum. Linum sylvestre, flore cæcio, foliis verticillatis
mus. 2. p. 49. t. 42. *Raj. suppl.* 524. *Barr. rus.*
 t. 1226.

Habitat in Italia. ☉

Calyces ☿ *folia superiora villosa.*

ALDROVANDA.

- vesiculosa. 1. ALDROVANDA. *Mont. act. bonon.* 2. p. 3. p.
 t. 12.

Lenticula palustris indica, foliis subrotundis bil-
 pillamentis ad imum barbatis. *Fluk. Am.* 211.
 f. 6.

Habitat in Italiæ ☿ Indiæ paludosis. D. Monti.

DROSER A.

- rotundifolia 1. DROSER A scapis radicatis, foliis orbiculatis
lapp. 109. *Fl. suec.* 257, 273. *Mat. med.* 158. f.
 120. *Gron. virg.* 35. *Roy. lugdb.* 120.

Ros folis folio rotunda. *Bauh. pin.* 357.

Saliflora f. Ros folis. *Thal. herc.* t. 9. f. 1.

Habitat in Europæ, Asiæ, Americæ paludibus.

OSERA scapis radicatis, foliis oblongis. *Fl. lapp.* longifolia
10. *Fl. svec.* 258, 274. *Roy. lugdb.* 417.

foliis folio oblongo. *Bauh. pin.* 357.

trora f. Sponsa folis f. Ros folis f. Rorella. *Thal.*

rc. 116. t. 9. f. 2.

itat in Europa ubique cum precedente; an itaque
tis diversa species?

OSERA scapis radicatis, foliis subulatis subtus lusitanica,
convexis, floribus decandris

foliis lusitanicus, foliis alphodeli minoris. *Morif.*

ft. 3. p. 620. *f.* 15. t. 4. *f.* 4. *Pluk. alm.* 323. t. 117.

2. *Raj. suppl.* 551.

itat in Lusitania.

eris *Droseræ* esse Speciem negat *Rajus*. Stamina

ut 10 constantia observavit *Alstræmer*; adeoque

calis diceretur, si flores essent umbellati & fo-

rum proprietas non detineret cum Capsula umilo-

lari.

OSERA scapis radicatis, foliis lanceolatis.

capensis.

sera foliis ad radicem longissimis, floribus spica-

tis. *Burm. afr.* 209. t. 75. f. 1.

folis africanus, foliis prælongis, caule nudo al-

limo. *Raj. suppl.* 515.

folis africanus, folio lato & longo. *Herm. afr.* 19.

itat in Æthiopia.

OSERA caule simplici folioso, foliis lanceolatis. cistiflora.

mæn. acad. 6. *afr.* 7. *

sera foliis ad caulem oblongis alternis, flore am-

lo purpureo. *Burm. afr.* 210. t. 75. f. 2.

folis folio angusto, flore amplo. *Breyn. prodr.* 3.

22. f. 2.

folis africanus, cisti flore albo, caule folioso.

aj. suppl. 515.

itat ad Cap. b. spei.

OSERA caule ramoso folioso, foliis linearibus. indica.

L. zeyl. 121.

folis ramosus, caule folioso. *Burm. zeyl.* 207. t.

t. f. 1.

ca-puda. *Rheed. mal.* 10. p. - - t. 20.

itat in India.

C R A S S U L A.

- coccinea. 1. **CRASSULA** foliis planis cartilagineo-ciliatis connato-vaginantibus. *Vir. cliff.* 26. *Hort. cliff.* *Roy. lugdb.* 454.
Cotyledon africana frutescens, flore umbellato cineo. *Comm. rar.* 24. t. 24. *Brädl. succ.* 5. t. 50.
Cotyledon africana frutescens, flore carneo at *Breyn. prodr.* 3. p. 30. t. 20. f. 1.
Habitat in Æthiopia. †
- perfoliata. 2. **CRASSULA** foliis lanceolato-subulatis sessi-connatis plano-canaliculatis: subtus convexis. *cliff.* 116. *Roy. lugdb.* 455.
Crassula altissima perfoliata. *Dill. elth.* 114. t. 113. *Müll. ic.* 108.
Aloe africana caulescens perfoliata glauca & nonosa. *Comm. præl.* 74. t. 23.
Habitat in Æthiopia. †
- subulata. 3. **CRASSULA** caule herbaceo, foliis subulatis tibus patentibus. †
Sedum africanum umbellatum album. *Herm.* 550. t. 552.
Habitat in Æthiopia. ☉
- tetragona. 4. **CRASSULA** foliis subulatis obsolete tetra-
Hort. cliff. 116. * *Roy. lugdb.* 455.
Cotyledonoides africanum. *Brädl. succ.* 5. p. 11. f. 41.
Habitat in Æthiopia. †
Caulis levis, tripedalis. Folia opposita, patentia incurvata. Pedunculus terminalis, nudus, Cyma trifida, ramosissima, fastigiata. Corollæ: Antheris purpureis.
- centauroi-
des. 5. **CRASSULA** caule herbaceo dichotomo, foliis sessilibus, pedunculis unifloris. *Aman. afr.* 8. *
Sedoides africana annua centauroides. *Herm. para*
Habitat in Æthiopia. ☉
- dichotoma. 6. **CRASSULA** caule herbaceo dichotomo, foliis ovato-lanceolatis, pedunculis unifloris. *Aman.* 6. *af.*

Sedum africanum annuum, centaurii minoris folio, flore aureo. *Herm. lugdb.* 550. t. 553. *

Habitat in Æthiopia. ☉.

CRASSULA caule herbaceo erecto, ramis dichotomis foliis oppositis obovatis strigosis, pedunculis unifloris. *Amæn. acad.* 6. afr. 9. *

Habitat in Æthiopia.

CRASSULA caule herbaceo prostrato, foliis oppositis ovatis gibbis imbricatis, floribus sessilibus foliariis. *Amæn. acad.* 6. afr. 10. *

Picoides africana annua minima muscosa. *Herm. par.* 170.

Habitat in Æthiopia. ☉

CRASSULA foliis oppositis obtuse ovatis integerrimis: hinc angustioribus. *Hort. cliff.* 496. *Roy. lugdb.* 455.

Crassula anacampserotis folio. *Dill. elth.* 115. t. 97. f. 114.

Habitat in Æthiopia. †

CRASSULA foliis oppositis ovalibus planiusculis distinctis ciliatis, corymbis terminalibus. *Hort. cliff.* 496. *Roy. lugdb.* 455.

Crassula caulescens, foliis sempervivi cruciatis. *Dill. elth.* 116. t. 98. f. 116.

Habitat in Æthiopia. †

CRASSULA foliis oppositis patentibus connatis scabris ciliatis, caule retrorsum scabro.

Crassula mesembryanthemi facie, foliis longioribus asperis. *Dill. elth.* 117. t. 99. f. 117.

Cotyledon africana frutescens, foliis asperis angustis acuminatis, flore virescente. *Mart. cent.* 24. t. 24.

Habitat in Africa?

CRASSULA foliis serrato-dentatis planis alternis, caule simplicissimo, floribus pendulis. *Hort. cliff.* 497. * *Roy. lugdb.* 455.

Crassula foliis oblongis acutis dentatis, flore ex alis solitario flavo. *Burm. afr.* 58. t. 24. f. 1.

Cotyledon, flore luteo, media. *Herm. lugdb.* 191.

Habitat in Æthiopia.

CRASSULA foliis subulatis radicalibus, caule nudicaulis. *Hort. cliff.* 116. *Roy. lugdb.* 455.

Crassula cespitosa longifolia, *Dill. elth.* 116. t. 91
115.

Habitat in Æthiopia. 4

punctata. 14. **CRASSULA** foliis oppositis ovatis punctatis c
tis: inferioribus oblongis.

Crassula caule flaccido, foliis connatis cordatis su
lentis, floribus confertis. *Mill. dict.*

Teiophium frutescens, floribus spicatis minimis, l
triangulari crasso. *Raj. suppl.* 118?

Habitat in Æthiopia. *Burmannus.*

*Caulis teres, levis, simplex. Folia opposita, disti
oblonga, sessilia, carnosia, excavato punctata, si
convexa, tenerrime ciliata: Fleralia ovata. Cor
axillares, brevissimi, fastigiati. Corollæ campanu
albæ, limbo reflexo. Antheræ purpureæ.*

orbicularis. 15. **CRASSULA** caule flaccido prolifero determi
folioso foliis patentissimis imbricatis. *Hort.*
496. *Roy. lugdb.* 455.

Crassula orbicularis repens, foliis sempervivi.
elth. 119. t. 100. f. 118.

Habitat in Æthiopia. 4

pellucida. 16. **CRASSULA** caule flaccido repente, foliis oppo
Crassula, portulacæ facie, repens. *Dill. elth.*
t. 100. f. 119.

Habitat in Æthiopia.

Portulacaria 17. **CRASSULA** ? foliis obovatis oppositis, i
arboreo.

*Anacampseros caule arboreo, foliis cuneiformibu
positis Hort. cliff.* 207. *Hort. upf.* 147.

Crassula portulacæ facie arborescens. Dill. elth.
t. 101. f. 120.

Habitat in Æthiopia. 5

*Frustrificatio quantum novi, nondum detecta est; i
me seduceret habitus, si Crassula non esset. N
hanc, ut excitem alios in flores ejus inquirere, i
datur Cap. b. spei adeundi occasio.*

SIBBALDIA.

proeumbens. 1. **SIBBALDIA** procumbens, foliolis tridentatis. *Fl*
111. *Fl. svec.* 260, 275. *Hall. helv.* 342. *Roy.*
276.

ragariæ sylvestri affinis planta, flore luteo. *Sibb. scot.*
2. p. 25. t. 6. f. 1. *Oed. dan.* t. 32.

pentaphylloides fruticosum minimum procumbens, flore luteo. *Pluk. alm.* 284. t. 212. f. 3.

Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ, Scotiæ. 24

SIBBALDIA erecta, foliolis linearibus multifidis. *erecta.*

pentaphylloides foliis tenuissime laciniatis, flosculis carneis. *Amm. ruth.* 112. t. 15.

Habitat in Sibiria. D. Gmelin.

P O L Y G Y N I A

M Y O S U R U S.

MYOSURUS.

minimus.

Myosurus foliis integerrimis. *Hort. cliff.* 117. *Fl. svec.*
261, 276. *Roy. lugdb.* 492.

Iolosteo affinis Cauda muris. *Bauh. pin.* 190.

Cauda muris. *Dod. pempt.*

Habitat in Europæ collibus apricis aridis. ☉



Classis VI.

HEXANDRIA

MONOGYNIA.

BROMELIA.

Ananas.

1. **BROMELIA** foliis ciliato-spinosis mucronatis, ca comosa.
Bromelia foliis spinosis, fructibus connatis caulem genibus. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upf.* 73. *Roy. lugdb.*
Carduus brasilianus, foliis aloës. *Bauh. pin.* 384.
Ananas acostæ. *Comm. hort.* 1. p. 109. t. 57.
Ananas aculeatus, fructu ovato carne albida. *T. Thuret.* t. 2.
Anassa. *Rumph. amb.* 5. p. 227. t. 81.
Kapa-Tsiakka. *Rheed. mal.* 11. p. 1. t. 1, 2, 3.
 β. *Ananas aculeatus*, fructu pyramidato: carne at *Tournef. inst.* 653.
 γ. *Ananas aculeatus*, fructu conico: carne aurea. *l. spec.* 20.
 δ. *Ananas lucide virens*, folio vix serrato. *Dill. elth.* t. 21. f. 22.
Ananas non aculeatus Pitta dictus. *Plum. spec.* 20.
Habitat in nova Hispania, Surinamo. 24

Pinguin.

2. **BROMELIA** foliis ciliato-spinosis mucronatis, cemo terminali.
Bromelia foliis aculeatis, racemo laxo terminali. *l. cliff.* 129. *Roy. lugdb.* 25. *Brown. jam.* 193. n.
Ananas americana sylvestris altera minor. *Pluk.* 1. 29. t. 258. f. 4.
Pinguin. *Dill. elth.* 320. t. 240. f. 311.
Habitat in Jamaica, Barbados. 24

Inermis.

3. **BROMELIA** acaulis, floribus aggregatis sessilibus subradicalibus. *Jacq. amer.* 18.
Bromelia foliis ciliato-spinosis mucronatis, pan diffusâ. *Sp. pl.* 1. p. 285.
Bromelia foliis spinosis oblique recurvis, fructibus permis racemosis. *Hort. upf.* 73.
Karatas foliis altissimis angustissimis & aculeatis. *gen.* 10.²

aguata-acanga. *Pis. bras.* 190. t. 191.
 exocotl f. Manguel. *Hern. mex.* 272. *Morif. hist.*
 t. f. 4. t. 22. f. 7.

bitat in America meridionali. 24
 ctus inter folia aculeata ad ipsam radicem locata, ut
 difficillime ob spinas recurvatas eruatur.

LOMELIA foliis ferrato-spinosis obtusis, spicis al- lingulata.
 ernis.

lomelia ramosa & racemosa, foliis arundinaceis fer-
 atis. *Plum. gen.* 26. ic. 64. f. 1.
 bitat in America meridionali. 24

LOMELIA foliis radicalibus dentato-spinosis, cau- nudicaulis.
 linis integerrimis.

lomelia pyramidata, aculeis nigris. *Plum. gen.* 46.
 c. 62.
 bitat in America meridionali. 24

TILLANDSIA.

TILLANDSIA culmo paniculato. utriculata.
 tillandsia foliis basi conniventibus in utriculum. *Hort.*
tiff. 129.

scum caryophylloides maximum, flore tripetalo pal-
 ide luteo, semine filamentoso. *Sloan. jam.* 76. *hist.*
 t. p. 88. *Raj. suppl.* 405.

sci modo arboribus indicis adnascens. *Baub. pin.*
 123.

aguata multiplici spica, flore albo. *Plum. gen.* 10.
 bitat in America meridionalis arboribus. 24

TILLANDSIA foliis superne ferrato-spinosis, spica ferrata,
 comosa.

tillandsia parasitica maxima, foliis amplioribus obtu-
 is ciliato-subspinosis, racemo pyramidato. *Brown.*
am. 195.

aguata clavata & spicata, foliis ferratis. *Plum.*
gen. 10. ic. 75. f. 1.
 bitat in America meridionali.

TILLANDSIA foliis lanceolato-lingulatis integerrimis: basi ventricosus. lingulata.
Jacq. hist. 62.

tillandsia media parasitica, foliis oblongis obtusis, flo-
 ribus comosis terminalibus. *Brown. jam.* 194.

aguata latifolia & clavata. *Plum. gen.* 10. ic. 74.
 C c 5 Vi

Viscum caryophylloides maximum, capitulis immitate conglomeratis. Sloan. jam. 77. hist. 1. p. t. 120. Ray. suppl. 105.

Habitat in Americæ meridionalis arboribus vetustis.

tenuifolia.

4. **TILLANDSIA** foliis filiformibus integerrimis, ca simplici laxa. *Roy. lugdb. 25. Jacq. hist. t. 6.*

Tillandsia parasitica parva, foliis tenuissimis et spica breviori simplici disticha. Brown jam. 1.

Renealmia spica multiplici angustifolia, flore cæ Plum. gen. 37. ic. 238. f. 2.

Viscum caryophylloides minus, foliorum imibus apicibus subrubicundis, flore tripetalo purp semine filamentoso. Sloan. jam. 77. hist. 1. p. 122. f. 1.

Habitat in Americæ meridionalis arboribus.

paniculata.

5. **TILLANDSIA** foliis radicalibus brevissimis, subnudo, ramis subdivisis ascendentibus.

Tillandsia parasitica major, foliis attenuatis basitricosis, racemo laxo spatioso assurgenti. Brown 194.

Renealmia ramosissima, foliis variegatis & circum Plum. gen. 27. ic. 237.

Habitat in America meridionali.

polystachia.

6. **TILLANDSIA** culmo spicis imbricatis lateralibus
Viscum caryophylloides angustifolium, floribus leis. Catesb. car. 2. p. 89. t. 89?

Renealmia spica multiplici, flore albo. Plum. gen.

β. Renealmia, spica multiplici, alia angustifolia. gen. 37.

Habitat in America calidiore.

monostachia

7. **TILLANDSIA** foliis linearibus canaliculatis, culmo simplici imbricato, spica simplicibus
Renealmia non ramosa squamata, & floribus nix Plum. gen. 37. ic. 238. f. 1.

Habitat in America meridionali.

recurvata.

8. **TILLANDSIA** foliis subulatis scabris reclinatorum unifloris, glumis bifloris. *Roy. lugdb. 25.*
Tillandsia parasitica parva pruinosa, scapo tenui. Brown. jam. 194.

Viscum caryophylloides minus, foliis pruinæ

candicantibus, flore tripetalo purpureo, femine filamentoso. *Sloan. jam. 77. hist. 1. p. 190. t. 121. f. 1. Raj. suppl. 406.*
abitat in Jamaicae arboribus.

GILLANDSIA filiformis ramosa intorta scabra. *usneoides.*
Hort. cliff. 129. Gron. virg. 36. Barr. æquin. 99. Roy. lugdb. 25.

enealmia parasitica, caule filiformi ramoso geniculato longissimo, foliis subulatis. *Brown. jam. 192.*

iscum caryophylloides tenuissimum e ramis arborum musci in modum dependens, foliis pruinæ instar candicantibus, flore tripetalo, femine filamentoso. *Sloan. jam. 77. hist. 1. p. 191. t. 122. f. 2. 3. Raj. suppl. 406.*

uscuta, ramis arborum innascens, caroliniana, filamentis lanugine tectis. *Pluk. alm. 126. t. 26. f. 5. amanbaya. Marogr. bras. 46. Fet. gaz. t. 62. f. 12.*
abitat in Virginiae, Jamaicae, Brasiliæ arboribus.

enealmiæ Plumieri solo fructu, eoque minus diverso, differunt ab ejusdem Caraguatis, consultius visum hæc duo genera combinare, quam difficile & tamen ambigue distinguere.

BURMANNIA.

BURMANNIA spica gemina. *Burm. zeyl. 50. t. 20. f. disticha.*
1. Fl. zeyl. 128.

burmannia spica duplici. *Hort. cliff. 128. Roy. lugdb. 125.*

lanta zeylanica aquatica, lato & brevi gramineo folio. *Raj. suppl. 559.*

abitat in Zeylonæ paludosis.

BURMANNIA flore gemino.

burmannia flore duplici. *Hort. cliff. 128.*

burmannia scapo bifloro. *Gron. virg. 36.*

abitat in Virginiae paludosis.

biflora.

TRADESCANTIA.

TRADESCANTIA erecta lævis, floribus conge- *virginiana.*
 stis.

radescantia. *Hort. cliff. 127. Hort. upf. 73. Gron. virg. 36. Roy. lugdb. 37.*

Ephe-

Ephemerum phalangoides tripetalum non repens
ginianum gramineum. Moris. hist. 3. p. 605. f. 1
2. f. 4.

Allium f. Moly virginianum. Bauh. pin. 506.
Habitat in Virginia. 2

malabarica. 2. *TRADESCANTIA erecta lævis, pedunculis fo-*
riis longissimis.

Tali-pulli. Rheed. mal. 9. p. 123. t. 63.
Habitat in Malabarica.

geniculata. 3. *TRADESCANTIA hirsuta procumbens. Jacq. 4*
18. hist. t. 64.

Ranunculus f. Damasonium repens, parnassizæ f
villosis. Plum. ic. 116. f. 2.
Habitat in America meridionali.

PONTEDERIA.

ovata. 1. *PONTEDERIA foliis ovatis, floribus capitatis*
Narukila. Rheed. mal. 11. p. 67. t. 34. Raj. suppl.
Habitat in Malabarizæ aquosis. 2

cordata. 2. *PONTEDERIA foliis cordatis, floribus spicatis*
Pontederia floribus spicatis. Hort. cliff. 133. G
virg. 37. Roy. lugdb. 37. Cold. noveb. 69.

Gladiolus lacustris virginianus cæruleus, sagittæ f
Pet. gaz. 1. t. 1. f. 12.

Sagittæ similis planta palustris virginiana, spica fo
cærulea. Moris. hist. 3. p. 618. f. 15. t. 4. f. 8.

Plantagini aquaticæ quodammodo accedens, flor
cæruleis hyacinthi spicatis. Plum. mant. 152. t. 349.
Habitat in Virginia aquosis. 2

hastata. 3. *PONTEDERIA foliis hastatis, floribus umbell*
Pontederia floribus umbellatis. Fl. zeyl. 129.

Sagittæ quodammodo similis planta maderaspatana
ribus medio caule quasi ex utriculo prodeunti
Fluk. alm. 326. t. 220. f. 8. Moris. hist. 3. p. 61
15. t. 4. f. 7.

Carimgola. Rheed. mal. 11. p. 91. t. 44.
Habitat in India. 2

HÆMANTHUS.

coccineus. 1. *HÆMANTHUS foliis linguiformibus planis l*
bus, Roy. lugdb. 42.

Hæmanthus foliis obtusis basi truncatis. *Comm. hort.*
2. p. 127. t. 64.

Larcissus indicus puniceus. *Ferr. cult.* 137.

Larcissus indicus serpentarius. *Hern. mex.* 885. t. 899.
Habitat ad Cap. b. spei. 2.

HÆMANTHUS foliis linguiformibus ciliatis. ciliaris.
bulbium africanum sphaericum, floribus obsolete puni-
ceis minoribus. *Herm. lugdb.* 375.

Bulbus oblongus æthiopicus, foliis guttatis & cili in-
star pilosis. *Breyn. cent.* t. 39.

Habitat ad Cap. b. spei. *Burmannus.* 24

Bulbus magnus. Folia præcedentis, sed ciliata (ut in
Amaryll. guttata, cui folia angustiora & fere nar-
cissina): Cilia in hac fascia, in *Amaryllide pallida*.
Flores nobis non protulit; ex herbario Oldenlandi,
in quo flores *Hæmanthi* eidem paginæ cum foliis adglu-
tinati, hujus generis judicio.

HÆMANTHUS foliis lanceolato-ovatis undulatis puniceus.
erectis. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upf.* 38. *Roy. lugdb.*
42.

Hæmanthus colchici foliis, perianthio herbaceo. *Dill.*
elth. 167. t. 140. f. 2. *Trew. chret.* 44.

Iyacintho affinis africana, caule maculato. *Seb. mus.* 1.
p. 20. t. 12. f. 1, 2, 3.

Satyrium e guinea. *Swert. flor.* 1. p. 62. f. 3. *Morif.*
hst. 3. p. 491. f. 12. t. 12. f. 11. *Rudb. elys.* 2. p.
210. f. 3.

Habitat in Guinæa. 24

HÆMANTHUS foliis linearibus carinatis. *Mill.* carinatus.
dist. t.

Habitat ad Cap. b. spei. 24

GALANTHUS.

GALANTHUS. *Hort. cliff.* 134. *Hort. upf.* 73. *Roy. nivalis.*
lugdb. 35.

Leucojum bulbosum trifolium minus. *Bauh. pin.* 56.

Erangelia. *ReNeal. spec.* 97. t. 96.

Habitat ad radices Montium Veronæ, Tridenti, Car-
niolæ, Viennæ. 24

LEUCOJUM.

- vernum.** 1. **LEUCOJUM** spatha uniflora, stylo clavato.
Leucojum. Hort. cliff. 135. Hort. upf. 74. Roy. lugdb.
Leucojum bulbosum vulgare. Bauh. pin. 55. R
elyf. 2. p. 95. f. 1.
Leucojum bulbosum. Cluf. hist. 1. p. 169.
Habitat in Germaniæ, Helvetiæ, Italiæ umbrosis,
ad rivulos.
- æstivum.** 2. **LEUCOJUM** spatha multiflora, stylo clavato.
Leucojum bulbosum majus i. multiflorum. Bauh. pin.
Leucojum bulbosum serotinum majus. 1. Cluf. hij
p. 170.
Polyanthemum. Renealm. spec. 99. t. 100.
Habitat in Pannonia, Hetruria, Monspeli. 4
Folia hujus lata ut in L. verno, nec filiformia ut i
autumnali.
- autumnale.** 3. **LEUCOJUM** spatha multiflora, stylo filiformi
Læfl. it. 136.
Leucojum bulbosum autumnale. Bauh. pin. 56.
Leucojum bulbosum autumnale tenuifolium. Cluf.
1. p. 170.
Tricophyllum. Reneal. spec. 101. t. 100.
Habitat in Luitania. 4

NARCISSUS.

- Poëticus.** 1. **NARCISSUS** spatha uniflora, nectario rotato
 viscido scariofo crenulato. *Hort. upf. 74*
Narcissus foliis ensiformibus, floris nectario re
brevissimo. Hort. cliff. 134. Roy. lugdb. 35. 1
monf. 17.
Narcissus albus, circulo purpureo. Bauh. pin. 48.
Narcissus medio purpureus. Dod. p. mpt. 223.
- β. *Narcissus medio purpureus multiplex. Bauh. pin.*
Habitat in G. Narbonenſi, Italia. 4
- Pſeudo Nar-** 2. **NARCISSUS** spatha uniflora, nectario campan
ciffus. erecto crispo æquante petala ovata.
Narcissus foliis ensiformibus, florum nectario lon
dine petalorum. Hort. cliff. 134. Hort. upf. 74.
monsp. 17.
Narcissus sylvestris pallidus, calyce luteo. Bauh. pin.
Narcissus luteus sylvestris. Dod. pempt. 227. f. 1
 β. *N.*

iffus sylvestris multiplex, calyce carens. *Bauh.*

54.

iffus luteus sylvestris, duplici f. triplici tubo au-

Bauh. pin. 54.

et in Galliæ, Angliæ, Hispaniæ, Italiæ nemor-

is. 24

LCISSUS spatha uniflora, nectario campanulato *bicolor.*
gine patulo crispo æquante petala.

iffus albus, calyce flavo, alter. *Bauh. pin.* 52.

iffus major totus luteus, calyce prælongo. *Bauh.*

52. *Rudb. elys.* 2. p. 71. f. 9.

et in Europa australi. 24

et N. Pseudo-Narcisso, sed Petala alba; Necta-
rii saturate luteum, majus: limbo patulo, undulato,
vato.

LCISSUS spatha uniflora, nectario obconico e- *minor.*
to crispo sexfido æquante petala lanceolata.

iffus parvus totus luteus. *Bauh. pin.* 53. *Rudb.*

2. p. 72. f. 11.

iffus sylvestris pallidus minimus. *Barr. ic.* 976.

o-Narcissus minor hispanicus latifolius. *Clus. hist.*

p. 165.

codium minus. *Bauh. hist.* 2. p. 597.

et in Hispania. 24

et maxime N. Pseudo-Narcisso, sed triplo omni-
partibus minor. Scapus vix striatus. Spatha vi-
s. Flos magis nutans. Petala basi inter se distin-
ta, lanceolata, recta, nec obliqua aut ovata. Nec-
tarii margo sexfidus, undulatus, crispus.

LCISSUS spatha uniflora, nectario cylindrico *moschatus.*
incato subrepando æquante petala oblonga.

iffus totus albus, nutante flore, longa tuba. *Barr.*

945, 946, 954, 953, 921, 922.

iffus albus, calyce flavo, moscari odore. *Bauh.*

l. 52. *Rudb. elys.* 2. p. 69. f. 6. & 73. f. 15, 16.

iffus flavus, tubo rotundo. *Bauh. pin.* 52. *Rudb.*

f. 2. p. 68. f. 3. 4.

et in Hispania. 24

trium cylindricum, ore obsolete repando, non denta-
tum aut crispo.

LCISSUS spatha multiflora nectario campanula- *calathinus.*
subcrenato æquante petala, foliis planis.

Nar-

Narcissus angustifolius flavus, magno caule. *Bauh.*

51. *Rudb. elys. 2. p. 60. f. 5.*

Narcissus IX. angustifolius 1. *Clus. hist. 1. p. 15*

Habitat in Europa australi, Oriente. 2.

Simillimus N. Tazettæ, sed Petala paulo majore acutiora. Nectarium longitudine petalorum.

Tazetta.

7. NARCISSUS spatha multiflora, nectario crenulato truncato brevior petalis, foliis planis.

Narcissus foliis ensiformibus, florum nectario crenulato erecto petalis longe brevior. *Hort. clus.*

Narcissus medio luteus, copioso flore: odore

Bauh. pin. 50. Rudb. elys. 2. p. 57. f. 11.

Narcissus luteus polyanthos lusitanicus. *Bauh.*

Narcissus latifolius, flore profus albo 1, 2. *Clus. 1. p. 155.*

Habitat in G. Narbonensis, Lusitaniz, Hispaniis ritimis subhumidis. 2.

Nectarium triplo brevius est petalis.

oderus.

8. NARCISSUS spatha submultiflora, nectario crenulato sexfido lævi dimidio brevior petalis.

acad. 4. p. 311.

Narcissus polyanthos, flore minore stellato toto

Rudb. elys. 2. p. 60. f. 7.

Habitat in Europa australi. 2.

Flos luteus, triplo major flore N. Tazettæ, spatha uniflora ♂ multiflora. Nectarium non tantum, sed ore diviso lobis sex obtusis.

trandrus.

9. NARCISSUS spatha subuniflora nectario crenulato crenulato, dimidio brevior petalis, flibus ternis.

Narcissus juncifolius, albo flore reflexo. *Clus. 1.*

Narcissus albus, oblongo calyce. *Bauh. pin. 53.*

elys. 2. p. 72. f. 12.

Habitat in Pyrenæis. 2.

Magnitudo N. poetici, sed folia dimidio angustior canaliculata. Spatha (mihi) uniflora. Corolla nivea. Petala ovato-oblonga. Nectarium crenulatum, corolla dimidio brevius, margine recto iliter crenulato. Stamina tria (mihi ut Clusio sex, quæ tamen in quibusdam vidi individua theræ luteæ, nectario breviora.

10. N

NARCISSUS spatha submultiflora, nectario cam- trilobus.
 panulato subtrifido integerrimo, dimidio breviorē
 petalis.

rcissus angustifolius pallidus, calyce flavo. *Bauh.*
pin. 51. *Rudb. elyf.* 2. p. 61. f. 3.

bitat in Europa australi. 2.

ilis N. Jonquillæ, sed *Nectarium cylindricum*, longi-
 tudine plus, quam dimidiæ petalorum, non crispum, sed
 obsolete trilobum.

NARCISSUS spatha multiflora, nectario hemi- Jonquilla.
 phærico crenato, breviorē petalis, foliis semitere-
 bus.

rcissus foliis subulatis, florum nectario brevissimo.

Hort. cliff. 134. *Roy. lugdb.* 35. *Sauv. mon.* p. 19.

rcissus juncifolius luteus minor. *Bauh. pin.* 51.

rcissus juncifolius, oblongo calyce luteus major.

Bauh. pin. 51.

rcissus juncifolius minor & 2. *Clus. hist.* 1. p. 159.

bitat inter Hispaliā & Gades, inter Guadaloupanā

& Toletum, inque Oriente locis uliginosis. 2.

NARCISSUS spatha uniflora, nectario brevissimo serotinus.
 expartito. *Læfl. it.* 19.

rcissus albus autumnalis minimus. *Bauh. pin.* 51.

Rudb. elyf. 2. p. 64. f. 8.

rcissus serotinus. *Clus. hist.* 1. p. 162.

rcissus autumnalis minor. *Clus. hist.* p. 251. t. 252.

bitat in Hispania, Italia, Barbaria 2.

NARCISSUS spatha uniflora, nectario turbinato *Bulboedi-*
 petalis majore, genitalibus declinatis *um.*

rcissus foliis subulatis, nectario maximo patulo,

genitalibus declinatis. *Hort. cliff.* 134. *Roy. lugdb.* 35.

rcissus montanus alter, flore fimbriato. *Bauh. pin.*

53.

rcissus montanus juncifolius, calyce aureo. *Bauh.*

pin. 53. *Rudb. elyf.* 2. p. 75. f. 5. 7.

pseudo-Narcissus juncifolius 2, flavo flore. *Clus. hist.* 1.

t. 166.

bitat inter Ulyssiponem & Hispaliā. 2.

PANCRATIUM.

PANCRATIUM spatha uniflora, petalis reflexis, zeylanicum.

Fl. Zeyl. 126.

i Spec. plant. pars I.

Dd

Nar-

Narcissus zeylanicus, flore albo hexagono odo
Herm. lugdb. 691. t. 693. Comm. hort. 1. p. 7
38. Rudb. clyf. 2. p. 179. f. 7.
 Liliium indicum. *Rumph. amb. 6. p. 161. t. 70. f. 2*
 Catulli-pola. *Kheed. mal. 11. p. -t. 40.*
Habitat in India. 2

- mexicanum. 2. PANCRATIUM spatha biflora. *Hort. cliff.*
Roy. lugdb. 34.
 Pancratium mexicanum, flore gemello candido.
elth. 299. t. 222. f. 289.
Habitat in Mexico. 2
- caribæum. 3. PANCRATIUM spatha multiflora, foliis lanc-
 tis. *Hort. cliff. 123. Brown. jam. 194. n. 1.*
 Narcissus americanus, flore multiplici albo hexa-
 odorato. *Comm. hort. 2. p. 173. t. 87.*
 Narcissus totus albus latifolius polyanthos major
 ratus. *Sloan. jam. 115. hist. 1. p. 244. Mart.*
27. t. 27.
Habitat in Jamaica, Caribæis. 2
- maritimum. 4. PANCRATIUM spatha multiflora, petalis pl
 foliis lingulatis. *Mill. dict. t. 197.*
 Narcissus maritimus. *Bauh. pin. 54.*
 Lilio-Narcissus albus maritimus minor. *Morif. h.*
*p. 365. f. 4. t. 10. f. 28. **
 Hemerocallis valentina. *Clus. hist. 1. p. 167.*
Habitat in Hispaniæ maritimis circa Valentian
infra Monspelium. 2
- carolinanum. 5. PANCRATIUM spatha multiflora, foliis linea-
 staminibus nectarii longitudine.
 Lilio-Narcissus polyanthos, flore albo. *Catesb. ca*
p. 5. t. 5.
Habitat in Jamaica, Carolina. 2
- illyricum. 6. PANCRATIUM spatha multiflora, foliis ensif-
 bus, staminibus nectario longioribus. *Roy. lugd*
 Pancratium foliis ensiformibus, spatha multiflora,
 ribus magnis candidis fragrantibus. *Trew. .*
t. 27
 Narcissus illyricus liliaceus. *Bauh. pin. 55. Seb.*
1. p. 17. t. 8. f. 1.

onarcissus hemerocallidis facie. *Besl. eyft. vern. 3.*
16. f. 1.

itat in Illyria? 24

NCRATIUM spatha multiflora, foliis ovatis amboinense
ervosis petiolatis.

cissus amboinensis, folio latissimo subrotundo.
omm. hort. 1. p. 77. t. 39. Rudb. clyf. 2. p. 238.

17.

ncratium foliis ovatis acuminatis petiolatis, spatha
ultiflora, floribus minoribus candidis fragrantibus.

rev. ehret. t. 28.

a sylveitris. *Rumph. amb. 6. p. 160. t. 70. f. 1.*

itat in Amboina.

CRINUM.

INUM foliis ovato lanceolatis acuminatis sessili- latifolium
us planis.

vanna-pola-tali. *Rheed. mal. 11. p. 77. t. 39. Rudb.*
cyf. 2. p. 91. f. 12.

itat in Asiæ arenosis. 24

ia 3. f. 4. digitos transversos lata, a basi sensim
tenuata. Antheræ filiformes, lineares, incumben-
s, longitudine dimidii filamenti s. corollæ.

INUM foliis carinatis. *Fl. zeyl. 127. Mill. dict. asiaticum.*
110. *Osb. it. 94.*

um zeylanicum bulbiferum & umbelliferum. *Herm.*
gdb. 682. t. 683. Rudb. clyf. 2. p. 182. f. 10.

ix toxicaria. *Rumph. amb. 11. p. 155. t. 69.*

itat in Malabaria, Zeylona, America. 24

si intra capsulas generantur.

INUM corollarum apicibus introrsum ungviculatis. americanum
um. *Hort. cliff. 127. Hort. upf. 76. Roy. lugdb. 37.*

o-Asphodelus americanus sempervirens maximus
olyanthus albus. *Comm. rar. 14. t. 14. Dill. elth.*
24. t. 160. f. 195.

io-Asphodelus americanus sempervirens minor
bus. *Comm. rar. 15. t. 15.*

itat in America. 24

INUM foliis subanceolatis planis, corollis ob- africanum.
fis.

Polyanthes floribus umbellatis. Vir. cliff. 29. Hort. 126. Roy. lugdb. 27. Mill. dict. t. 210.

Hyacinthus africanus tuberosus, flore cæruleo unilato. Breyn. prodr. 1. p. 39. icon. 23. t. 10. Cohort. 2. p. 133. t. 67. Seb. thes. 1. p. 29. t. 19. f. 4.

Hyacintho affinis, tuberosa radice, africana, umbæ cærulea inodora. Pluk. alm. 187. t. 155. f. 1.

Habitat in Æthiopia. 24

AMARYLLIS.

capensis. 1. **AMARYLLIS** spatha uniflora remotissima, corolla æquali, staminibus pistilloque rectis. *Amer. acad. afr. 11. **

Sifyrinchium indicum. Cornut. canad. 168. Mori. hist. p. 421. f. 4 t. 23. f. 9. Rudb. elyf. 2. p. 236. f. 17
Habitat ad Cap. b. Spei. 24

lutea. 2. **AMARYLLIS** spatha uniflora, corolla æquali, staminibus declinatis. *Hort. cliff. 135. Roy. lugdb. 2*
Narcissus autumnalis major. Clus. hist. 1. p. 164.
Colchicum luteum 1. majus. Bauh. pin. 69.
Habitat in Hispania, Italia, Thracia. 24

Aramasco. 3. **AMARYLLIS** spatha uniflora, corolla æquali, pistillo declinato. *Hort. cliff. 135. Gron. virg. 36. lugdb. 36.*

Lillio-Narcissus virginianensis. Catesb. car. 3. p. 12. t.

Lillio-Narcissus vernus angustifolius, flore purpureo scente. Barr. ic. 994.

Lillio-Narcissus liliflorus carolinianus, flore albo fragulari cum rubedine diluto. Pluk. alm. 220. t. 43.

Lillio-Narcissus indicus pumilus monanthos albus. rif. hist. 2. p. 266. f. 4. t. 24. f. 4.

Habitat in Virginia. 24

formosissima. 4. **AMARYLLIS** spatha uniflora, corolla inæquali, staminibus tribus genitalibusque declinatis. *Hort. cliff. Hort. ups. 75. Act. stockh. 1742. p. 93. t. 6. Roy. lugdb.*

Lillio-Narcissus jacobæus, flore sanguineo nuda
Dill. eth. 195. t. 162. f. 196.

Narcissus jacobæus major. Rudb. elyf. 2. p. 89. f. 10
Habitat in America meridionali, innotuit europæis 1592

Squamæ totidem quot filamenta, e receptaculo ortæ, in
mentorum basi arte adfident; an sic in reliquis?

- AMARYLLIS** spatha multiflora, corollis campanulatis æqualibus undulatis, genitalibus declinatis. *reginæ.*
Mill. dict. t. 24.
 ilium americanum, puniceo flore, Belladonna dictum. *Herm. par. 194. t. 194.*
Habitat in Caribæis.
Differt ab A. Belladonna marginibus petalorum undulatis, nec ad unguis recurvatis.
- AMARYLLIS** spatha multiflora, corollis campanulatis æqualibus ungue reflexis, genitalibus declinatis. *Belladonna*
Hort. cliff. 135. Roy. lugdb. 36. Mill. dict. t. 23.
 ilio-Narcissus polyanthos, flore incarnato: fundo ex luteo albescente. *Sloan. jam. 115. hist. 1. p. 244. Seb. thes. 1. p. 25. t. 17. f. 1.*
 ilium rubrum. *Merian. surin. 22. t. 22.*
Habitat in Caribæis, Barbados, Surinama. 24
- AMARYLLIS** spatha multiflora, corollis revolutis, genitalibus erectis. *famiensis.*
Hort. upf. 75.
 amaryllis spatha multiflora, corollis æqualibus patentissimis revolutis, genitalibus longissimis. *Hort. cliff. 131. Roy. lugdb. 36.*
 Narcissus japonicus, rutilo flore. *Corn. canad. 157. t. 158. Rudb. elys. 2. p. 23. f. 14. Ehret. select. t. 9. f. 3. Kämpf. amæn. 872. Seb. mus. 1. t. 17. f. 3.*
 ilium sarniense. *Dugl. monogr. t. 1. 2.*
Habitat in Japonia, nunc in Sarnia insula Angliæ. 24
- AMARYLLIS** spatha multiflora, corollis campanulatis æqualibus, genitalibus declinatis, scapo terti ancipiti. *zeylanica.*
Roy. lugdb. 36.
 ilio-Narcissus zeylanicus latifolius, flore niveo externe linea purpurea striato. *Comm. hort. 1. p. 73. t. 37. Rudb. elys. 2. p. 181. f. 9.*
 Tulipa javana. *Rumph. amb. 5. p. 30. t. 105.*
 ilio-Narcissus africanus, scillæ foliis, flore niveo linea purpurea striato. *Ehret. pict. 5. f. 2. Trew. ehret. t. 13.*
Habitat in Zeylona. 24
- AMARYLLIS** spatha multiflora, corollis campanulatis æqualibus, genitalibus declinatis, scapo compresso longitudine umbellæ. *longifolia.*
Roy. lugdb. 36. Ehret. pict. t. 13.

Lilium africanum humile longissimis foliis, polyanthos saturato colore purpurascens. *Herm. parisi* 195. t. 195.

Habitat in Æthiopia. 24

orientalis. 10. **AMARYLLIS** spatha multiflora, corollis inæqualibus, foliis lingviformibus. *Rütt. canon.* 215.

Amaryllis spatha multiflora, foliis ovato-oblongis obtusis. *Roy. lugdb.* 37.

Lilio Narcissus indicus maximus sphaericus, floribus plurimis rubris liliaceis. *Morif. hist.* 2. p. 568. f. 41. 10. f. 35.

Narcissus indicus orientalis. *Swert. flor.* 31. f. 1.

Brunsvigia. *Heist.*

Habitat in India. 24

ciliaris. 11. **AMARYLLIS** spatha multiflora, foliis ciliatis.

Habitat in Æthiopia.

Folia plana, linearia, pollicis latitudine, bipalmari longitudine, adeoque figura Amaryllidis, non verò Hemanthi, sed margine undique ciliata, ciliis albiculis nec ferrugineis; adeoque longe recedit ab Hemanthi ciliari; neutra tamen nobis floruit.

BULBOCODIUM.

vernum. 1. **BULBOCODIUM** foliis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 41

Bulbocodium. *Hort. cliff.* 133.

Colchicum vernum hispanicum. *Bauh. pin.* 69. *Rad. clyf.* 2. p. 128. f. 2.

Colchicum vernum. *Cus. hist.* 2. app. 203.

Habitat in Hispania. 24

APHYLLANTHES.

monspeliensis. 1. **APHYLLANTHES.** *Hort. cliff.* 493. *Sauv. monsp.*

Aphyllanthes monspeliensium. *Lob. adv.* 190. *Bauh. hist.* 3. p. 336.

Caryophyllus cæruleus monspeliensium. *Bauh. pin.* 209. *Morif. hist.* 2. p. 562. f. 5. t. 25. f. 12.

Habitat Monspeliæ prope Castelneuf locis montosis & xosis sterilibus.

2. *Radix repens.* Culmi nudi, simplices, cineræ basi nigrescens uti *Juncus.* *Gluma bivalvis, biflora; Gluma propria etiam bivalvis. Juncus esset, si Corolla caret*

A L L I U M.

* *Foliis caulinis planis.*

LIUM caule planifolio umbellifero, umbella Ampeloprasum.
 obovata, staminibus tricuspидatis, petalis carina scabris.
 im staminibus alterne trifidis, foliis gramineis,
 ribus sphaerice congestis, radice laterali solida.
all. all. 5. opusc. 344.

um radice laterali solida, foliis linearibus, caule
 erecto, umbella subglobosa. *Roy. lugdb. 40.*

um sphaerico capite, folio latiore s. Scorodoprasum
 alterum. *Bauh. pin. 74. Rudb. elys. 2. p. 151.**

odoprasum latifolium spontaneum italicum, flos-
 cus dilute purpureis odoratis. *Mich. gen. 25. t. 24.*
 5.

in Oriente, inque insula Holms Angliae. 2.
 ina corolla paulo longiora.

LIUM caule planifolio umbellifero, staminibus Porrum.
 icuspидatis, radice tunicata. *Hort. upf. 77. Mat.*
d. 165.

um staminibus alterne trifidis, foliis gramineis,
 ribus sphaerice congestis, radice tunicata cauli
 recumbente. *Hall. all. 7.*

um radice ambiente tunicata oblonga solitaria.
ort. cliff. 136. Roy. lugdb. 40.

um commune capitatum. *Bauh. pin. 72.*

um sativum latifolium. *Bauh. pin. 72.*

tat - - -

is nimium praecedenti $\text{\textcircled{E}}$ forte sola varietas. Pe-
 la carina scabra.

LIUM caule planifolio umbellifero, umbella glo- lineare.
 bosa, staminibus tricuspидatis corolla duplo longi-
 oribus.

um staminibus alterne trifidis, radice tunicis reti-
 culatis obducta. *Hall. all. 9.*

um caule tereti folioso, foliis linearibus planis,
 umbella globosa, staminibus corolla longioribus.
mel. fibir. 1. p. 56. t. 13. \text{\textcircled{E}} 14. f. 1.

in Sibiria.

LIUM caule planifolio umbellifero staminibus rotundum.
 icuspидatis, umbella subglobosa, floribus latera-
 libus nutantibus.

Allium staminibus alterne trifidis, spica sphaerica
 liis gramineis, radice multiplici. *Hall, opusc.*
n. 8.

Allium montanum, capite rotundo. *Bauh. pin. 79.*

Scorodoprasum latifolium spontaneum italicum,
 bus dilute purpureis odoratis. *Mich. gen. 25.*
f. 1.

Habitat in Europa australiori 21.

Vitærialis, 5. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbel-
 lundata, staminibus lanceolatis corolla longioribus
 foliis ellipticis. *Mat. med. 163.*

Allium foliis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis.
Roy. lugdb. 39.

Allium radice oblonga reticulo obducta. *Hall, all. 18.*

Allium montanum latifolium maculatum. *Bauh. pin. 79.*

Allium anguinum. *Cam. epit. 329.*

Habitat in Alpibus Helvetiæ, Italia.

Huic Folia in toto genere latissima colchici.

subhirsutum 6. ALLIUM caule planifolio umbellifero, foliis
 rioribus hirsutis, staminibus subulatis. *Osb. u.*

Allium foliis radicibus subhirsutis, caulinis planis
 floribus umbellatis. *Hall, all. 18.*

Allium foliis lanceolato-linearibus, florum umbellatis
 fastigiata. *Roy. lugdb. 39.*

Moly angustifolium umbellatum. *Bauh. pin. 75.*

Moly dioscoridis. *Clus. hist. 1, p. 192.*

Habitat in Africa, Italia, Hispania, Oriente.

magicum. 7. ALLIUM caule planifolio umbellifero, ramulis
 bifido staminibus simplicibus,

Allium caule tereti, propagine ex ala. *Hort. cliff.*
Roy. lugdb. 39 Sauv. monsp. 18.

Allium foliis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis
 ex ala bulbiferum. *Hall, all. 19.*

Moly latifolium liliflorum. *Bauh. pin. 75.*

Moly indicum, flore purpureo. *Svert. Fl. 61.*

β. Caucason. Lob. ic. 162.

Habitat - - -

*Caulis teres, nudus, pedalis, infirmus. Folia ramosa
 canaliculata, ampla, obtusa. Capitulum bulbiferum
 Sauv.*

obliquum. 8. ALLIUM caule planifolio umbellifero, staminibus
 filiformibus flore triplo longioribus, foliis obli-

lium radice tunicata, foliis planis linearibus caulis, capitulo umbellato. *Gmel. sibir. 1. p. 49. t. 9.*
abitat in Sibiria.

ulis bipedalis, teres, Folia alterna, plano-canaliculata, obliqua: Vaginis teretibus, Umbella globosa; Spatha globosa, purpurea, acuminata. Petala ovata, erecta, concava, flava carina viridi. Filamenta alba, corolla duplo longiora. Anthera lutea. Germen subglobosum.

LIUM caule subplanifolio umbellifero, staminibus subulatis longioribus, umbella globosa, foliis linearibus subconvexis. ramosum.

Ullum scapo nudo tereti farto, foliis semicylindricis, staminibus corolla longioribus. *Gmel. sib. 1. p. 52. t. 9. f. 1.*

abitat in Sibiria. G. Demidoff.

ulis ferme bipedalis, teres. Folia alterna, planiuscula, canaliculata, subtus convexa, margine obtusa. Umbella globosa. Petala ovata, purpurascens carina saturatiore. Filamenta purpurea, corolla parum longiora. Anthera violacea. Germen subrotundum: maculis 3, viridibus. E medio caule ex ala folio opposita. Ramus nudus, longitudine caulis.

ALLIUM caule planifolio bulbifero, bulbo composito, staminibus tricuspideatis. *Hort. upf. 76. Mat. med. 164.* faticum.

Uium radice bulbo multipartito, capitulo bulbifero, foliis linearibus. *Hort. cliff. 137. Roy, lugdh. 39.*

Uium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, capite bulbifero, radicibus in unum bulbum congruentibus. *Hall, all. 1.*

Uium faticum. *Bauh. pin. 73.*

Uium. *Cam. epit. 328.*

abitat in Sicilia.

ALLIUM caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis: vaginis ancipitibus, staminibus tricuspideatis. *Hort. upf. 77.* Scorodoprasum.

Uium capitulo bulbo erecto, foliis planis subcrenatis: vaginis ancipitibus. *Fl. svec. 266, 278. * It. el. 60.*

Uium montanum bicorne latifolium, flore dilute purpurascens. *Bauh. pin. 74. Rudb. elys. 2 p. 155. **

- β. Allium staminibus alterne trifidis, capite bulbifera scapo ante maturitatem contorto. *Hall. all. 2.*
 Allium sativum alterum s. Allioprasum caulis si-
 circumvoluto. *Bauh. pin. 73.*
 Alii genus Ophioscorodon dictum quibusdam.
hist. 2. p. 559.
 Porrum radice laterali cordata solida, pedunculo
 voluto, capite bulbifero. *Hort. cliff. 136.*
Habitat in Oelandia, Dania, Pannonia.

- arenarium. 12. ALLIUM caule planifolio bulbifero, vaginatis
 tibus, spatha mutica, staminibus tricuspida-
 tis. *Scan. 227. Fl. svec. 2. n. 279. **
 Allium staminibus alterne trifidis, capite bulbifera
 foliis gramineis leviter serratis. *Hall. all. 3.*
 Allium montanum bicorne latifolium, flore dilu-
 idescente. *Bauh. pin. 74.*
 Porrum planifolium, staminibus alterne trifidis
 bella bulbifera, *Rupp. hall. 154. t. 2. f. 2.*
Habitat in Thuringia; in Falstria Scaniae.
Caulis ante anthesin cernuus.

- carinatum. 13. ALLIUM caule planifolio bulbifero, staminibus
 subulatis. *Fl. svec. 2. n. 281.*
 Allium umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis
 natis. *Hall. all. 27. t. 1. f. 2.*
 Ampeloprasum proliferum. *Lob. ic. 156. **
 β. Allium montanum bicorne angustifolium, flore
 te purpurascens. *Bauh. pin. 74.*
 Allium s. Moly montanum 2. *Clus. hist. 1. p.*
Habitat in Germania.

* *Foliis caulinis teretibus.*

- sphaerocephalon. 14. ALLIUM caule teretifolio umbellifero, foliis
 teretibus, staminibus tricuspida-
 tis corolla longa
 Allium staminibus alterne trifidis, foliis si-
 mica sphaerica non bulbifera suaverubente
 opusc. 353. n. 10.
 Allium montanum, capite rotundo. *Bauh.*
Rudb. elys. 1. p. 157. f. 7.
 Allium s. Moly montanum, purpureo flore
hist. 1. p. 195.
 Alii genus forte Scorodoprasum alterum. *B*
2. p. 564.

Protoprasum montanum junçifolium, capite rotundo dilute janthino, floribus paucis. *Mich. gen.* 25. t. 24. f. 2.

abitat in Italia, Sibiria, Helvetia.

ALLIUM caule subteretifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus simplicibus corolla longioribus, spatha subulata. parviflorum.

abitat in Europa australi. 2.

varies A. sphaerocephali. Bulbus oblongus, tunicatus. Caulis teres, striatus, foliosus. Folia longitudine fere caulis, subulata. Umbella globosa: Floribus minimis. Petalis exterioribus ovatis, trifloribus; interioribus duplo longioribus, lanceolatis, purpureis. Stamina simplicia, corolla longiora, uti etiam Stylus. Spatha subulata, corolla longior, diaphylla. Adeoque simillimum *A. sphaerocephalo*, sed Stamina simplicia.

ALLIUM caule subteretifolio umbellifero, pedunculis exterioribus brevioribus, staminibus tricuspatis. *Hort. upf.* 78. descendens.

lium staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, capite suave rubente sphaerico non bulbifero, radice laterali. *Hall. all.* 8.

lium staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, capite sphaerico non bulbifero atropurpureo. *Hall. all.* 8. II. t. 2. f. 1.

lium f. *Moly latifolium*, capite sphaerico, flore purpureo. *Rudb. elys.* 2. p. 160. f. 20.

oly atropurpureum. *Rudb. elys.* 2. p. 165. f. 13.

abitat in Helvetia.

ALLIUM caule teretifolio umbellifero, umbella fastigiata subsexflora, petalis acutis, staminibus simplicibus, foliis setaceis. moschatum.

lium foliis teretibus caulinis, floribus umbellatis. *Hall. all.* 17.

oly moschatum, capillaceo folio. *Bauh. pin.* 76. *rodr.* 28. t. 28. *Rudb. elys.* 2. p. 166. f. 14. * *Sauv. nonsp.* 10.

abitat in Galloprovinciæ, Narbonæ, Hispaniæ spricis elevatis.

ALLIUM caule subteretifolio umbellifero, floribus pallens, pen-

pendulis truncatis, staminibus simplicibus coæquantibus.

Allium umbella non bulbifera lutea, vagina b foliis teretibus. *Hall. all.* 21.

Allium montanum bicorne, flore pallido odore
pin. 75.

Gethioides sylvestre. *Colum. ecphr.* 2. p. 6. t. 7.

Habitat in Italia, Hispania, Monspelli, Panno

Caulis bipedalis, teres, levis. Folia alterna, setia, fistulosa, heptagona, erecta. Spatha subulata
vosa. Corolla campanulata, truncata, alba.

obovatis, obtusissimis, erectis, concavis, carina

Stamina simplicia, longitudine petalorum. Flores

a florescentia pendent. Stylus vix ullus, post
excrescens, brevissimus.

Flavum.

19. ALLIUM caule teretifolio umbellifero, foliis
pendulis, petalis ovatis, staminibus corollariis.

Allium foliis teretibus, vagina bicorni, umbella
pendula. *Hall. opusc.* 24.

Allium juncifolium bicorne luteum. *Rudb. ely.*
157. f. 6.

Habitat Monspelli. 2.

Simillimum *A. pallescens*; Sed differt Petalis ovatis
simis, nec obovatis albidis. Staminibus 3 pistilla
rolla duplo longioribus, nec brevioribus.

paniculatum.

20. ALLIUM caule subteretifolio umbellifero,
culis capillaribus effusis, staminibus simplicibus
tha longissima.

Allium foliis teretibus, vagina bicorni, umbella
dula suave purpurea. *Hall. opusc.* 386. n. 25.

Allium montanum bicorne. floribus triquetris
reis pedunculis longis & reflexis. *Segu. ver.* 1

Habitat in Sibiria, Austria, Italia, Oriente. 2.

Folia subulata, canaliculata. Flores peduncularibus,
longissimis, laxis. Petala purpurea, ta, longitudine
staminum. Spatha apice subulata
gissimo.

vincale.

21. ALLIUM caule teretifolio bulbifero, staminibus
tricuspidatis.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis
bulbifero, radice multiplici. *Hall. all.* 1

Allium sylvestre campestre purpurascens. *Bauh.*

um campestre juncifolium capitatum purpurascens
ajus. *Bauh. pin.* 74.

rum sylvestre vinearum. *Bauh. pin.* 72.

rum sylvestre, gemino capite. *Bauh. pin.* 72.

itat in Germania.

utulum arctum bulbis acuminatis recurvis, sepe in lon-
iora acumina crinitis. Corollæ parvæ, violacæ. Sta-
mina setis duabus, longis, extra florem eminentibus.

LLIUM caule teretifolio bulbifero, foliis sca- oleraceum,
ris semiteretibus subtus sulcatis, staminibus sim-
licibus.

um umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis tere-
bus. *Hall. all.* 23. f. 4.

ia capitulo bulboso prolifero, foliis semiteretibus
ovemangularibus scabris fistulosis. *Fl. suec.* 265,
80. *

rum radice solida, caule erecto, capitulo bulbife-
o. *Roy. lugdb.* 40. *Gort. geldr.* 69.

um montanum bicorne, flore exalbido. *Bauh. pin.*

itat in Suecia, Germania.

* * * *Foliis radicalibus, scapo nudo.*

LLIUM scapo nudo ancipiti, foliis linearibus nutans.
lanis, staminibus tricuspидatis. *Hort. ups.* 80.

um staminibus alterne trifidis, foliis latissimis, ca-
pite spherico, radice laterali solida. *Hall. all.* 6.

um scapo nudo ancipiti, antequam floruerit nu-
tante, foliis ensiformibus: hinc paullo convexiori-
us. *Gmel. sibir.* 1. p. 55. t. 18.

itat in Sibiria.

itat ætate ☉ solo præ reliquis, ut vix dignoscatur.

LLIUM scapo nudo tereti, foliis subulatis, um- Ascaloni-
bella globosa, staminibus tricuspидatis. cum.

ia foliis subulatis, radicibus oblongis conglobatis.
Hort. cliff. 36. *Hort. ups.* 79.

ia ascalonica. *Morif. hist.* 2. p. 283. f. 4. t. 14. f. 3.

ia sterilis. *Bauh. pin.* 72.

itat in Palæstina. *Hasselquist.* 24

era fere *A. Schænoprasi*. Scapus subnudus, teres,
nitidus ☉ ultra. Spatha membranacea. Um-

bella globosa, floribus *A. Schænoprasi* minoribus.
petala erecta, ovato-lanceolata, cærulea, carina a-

tre.

trocærulea. Stamina longitudine petalorum: nis latissimis apice trifidis. Antheræ flavæ, stigmate obtuso.

- senescens. 25. ALLIUM scapo nudo ancipiti, foliis line subtus convexis lævibus, umbella subrot flaminibus subulatis. *Hort. upf.* 79.
Allium caule ancipiti teretiusculo, foliis ensiformi hic paulo convexioribus. *Gmel. sibir.* 1. p. 11. f. 2.
Allium foliis linearibus, florum umbella subgl *Roy. lugdb.* 39.
Allium radice bulbosa, foliis gramineis, umb recta non bulbifera, vaginis brevissimis. *Hall.* 297. *all.* 16. n. 2.
Allium montanum, foliis narcissi, majus. *p.n.* 75.
Habitat in Sibiria, Sicilia. 24.
Petala erecta, a se invicem dehiscentia s. distant naliculata, inflexa. Folia obliqua & Stamina la paullo longiora huic, non vero sequenti.
- nigrum. 26. ALLIUM scapo nudo tereti, foliis linearibus erecta, petalis erectis, spatha mucronata
Allium montanum bicorne latifolium, flore dilute purpurascente. *Rudb. elyf.* 2. p. 160. *Burf.*
Habitat Algeriæ inque Galloprovincia.
Simile *A. senescenti*, sed duplo majus. *Folia* linearia. *Flores* quadruplo majores. *Petala* ovata. *Stamina* lanceolata, corolla breviora, ovata, acuminata, vix ad basin in duas partes divisa.
- angulosum. 27. ALLIUM scapo nudo ancipiti, foliis linearibus naliculatis subtus subangulatis, umbella fr *Hort. upf.* 79. *
Cepa scapo nudo subangulato sarcto, foliis linearibus subtus angulosis, flaminibus corolla breviora *Gmel. sibir.* 1. p. 58. t. 14. f. 2.
Allium radice senescente lignosa transversa, erecta. *Hall. all.* 16.
Allium petræum umbelliferum. *Bauh. hist.* 2. t. 564.

lium montanum, foliis narcissi, minus. *Bauh. pin.* 75.
abitat in Sibiria, Germaniæ humidiusculis. 2
 illa interdum subtus vix angulata, at Scapus super-
 ne parum angulato-friatus; Petala interiora apice
 patentia, omnia lateribus conniventia.

ALLIUM scapo nudo tereti, foliis linearibus, ca- canadense.
 pitulo bulbifero. *Kalm. it.* 3. p. 79.
abitat in Canada. 2

dix perennis. Folia linearia, plana, lævia, reſta,
 ſpithamea. Scapus ſubnudus, teres, lævis, vix
 foliis longior. Spatha ovata, mucronata, acutiufcu-
 la. Capitulum ex bulbis. Floſculi pauci, pedicel-
 lati, albi: Petalis ovalibus. Stamina ſimplicia,
 longitudine corollæ. Antheræ ruſeſcentes.

ALLIUM scapo nudo femicylindrico, foliis lan- urſinum.
 ceolatis petiolatis, umbella ſaſtigiata.
 lium foliis lanceolatis, scapo nudo femicylindra-
 ceo, bulbo ſetis obvallato. *Fl. ſvec.* 263, 277. *Is.*
otl. 169. *

lium foliis radicalibus petiolatis, floribus umbellatis.
Roy. lugdb. 39. *Hall. all.* 21. *Gmel. fib.* 1. p. 49.
 lium ſylveſtre latifolium. *Bauh. pin.* 74.
 lium urſinum. *Fuchſ. hiſt.* 739. *Cam. epit.* 330.
abitat in Europæ ſeptentrionalioris nemoroſis, rori-
is. 2

ALLIUM scapo nudo, foliis triquetris, ſtaminibus triquetrum.
 mplicibus.

lium caule triangulo. *Tourneſ. inſt.* 385. *Roy. lugdb.*

9-
 lium prætenſe, folio gramineo, flore profuſo albo,
 adice oblonga. *Rudb. elyſ.* 2. p. 159. f. 16.

ly parvum, caule triangulo. *Bauh. pin.* 75.

ly caule & foliis triangularibus. *Park. par.* 142. 1.
 43. f. 4

abitat in Hiſpania. 2

is triquetra latere interiore canaliculato.

ALLIUM scapo nudo inferne ventricoso longiore Capa.

olliis teretibus. *Hort. upſ.* 77. *Mat. med.* 166.

lium ſtaminibus alterne trifidis, caule ad terram
 ventricoso. *Hall. all.* 10.

Cepa scapo nudo ventricoso foliis longiore, et
depressa. *Hort. cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 40.

Cepa vulgaris. *Bauh. pin.* 71.

Habitat - - -

Moly.

32. ALLIUM scapo nudo subcylindrico, foliis
latis sessilibus, umbella fastigiata. *Hort. ups.* 76.

Allium foliis radicalibus sessilibus lanceolatis,
bus umbellatis. *Roy. lugdb.* 38. *Hall. all.* 29.

Allium foliis lanceolatis, umbella laxa. *Hort. cliff.*

Moly latifolium luteum, odore allii. *Bauh. pin.*

Moly flavo flore. *Sivert. flor.* 1. t. 60. f. 2.

Moly montanum latifolium, flavo flore. *Clus. ap.*

Habitat in Hungaria, Baldo, Monspeli, Pyrenæ

Petala patentia, tria exteriora magis patentia, inter-

recta.

roseum.

33. ALLIUM scapo nudo umbellifero, pedicellis
vibus, petalis ovalibus, staminibus brevissimi-
lis linearibus.

Allium roseum. *Syst. nat.* 296. n. 9.

Allium foliis ensiformibus, radice bulbillis et
floribus amplis umbellatis. *Sauv. monsp.* 42.

Allium sylvestre s. Moly minus, roseo amplo

Magn. monsp. 11. t. 10. *Rudb. elys.* 2. p. 166.

Habitat Monspeli, Pedemonti in vineis. 24

Folia linearia, plana, longitudine vix Scapi. S-

teres, nudus. Spatha obtusa. Umbellæ radii

culares floribus breviores. Petala obovato-oblong-

tusa, atropurpurea, magna. Stamina simplicia

brevissima. Bulbi ad Fructum nulli. Flores non

quam in reliquis.

fistulosum.

34. ALLIUM scapo nudo folia adæquante, foli-
retibus ventricosis. *Hort. ups.* 78.

Allium staminibus simplicibus, caule medio ve-
ro. *Hall. all.* 13.

Cepa scapo longitudine foliorum, foliis venti-
radice oblonga. *Hort. cliff.* 136. *Roy. lugdb.* 4

Cepa oblonga. *Bauh. pin.* 71. *Dod. pempt.* 687.

Habitat in - - -

Schænopra-
tum.

35. ALLIUM scapo nudo folia adæquante, foli-
tibus subulato-filiformibus. *Hort. ups.* 78.

Allium staminibus simplicibus, foliis radicalibus
tibus scapi longitudine. *Hall. all.* 14.

scapis foliisque subulatis teretibus fistulosis æquas, spathis globosis. *Fl. svec.* 264, 282. *It. æl.* 64.

scapo longitudine figuraque foliorum, foliis filiformibus, spathis globosis. *Hort. cliff.* 136. im sectivum juncifolium. *Bauh. pin.* 72.

monoprasum. *Dod. pempt.* 689.

scapis foliisque teretibus, capitulis pyramidatis. *Æl. sibir.* 1. p. 59. t. 15. f. 1.

palustris altissima. *Buxb. cent.* 4. p. 27. t. 45.

at in alpestribus Sibirix, Oelandix, locis rupestri-

LILIUM scapo nudo tereti inani, foliis subulatis tenuissimum orbibus, capitulis laxis paucifloris. *Gmel. sibir.*

2. 61. t. 15. f. 2, 3.

at in Sibiria.

LILIUM scapo nudo subnullo, capsulis cernuis, is planis ciliatis. Chame Moly.

humile, folio gramineo. *Bauh. pin.* 75. *Rudb.*

2. p. 166. f. 15.

æ Moly, an Moly diofcoridis. *Column. ceph.*

2. t. 326.

at in Italia.

LILIUM.

LILIUM foliis sparsis, corollis campanulatis: intus candidum. orbis. *Hort. cliff.* 120. *Hort. ups.* 80. *Mat. med.* 173.

1. *lugdb.* 30. *Gron. orient.* 105.

1 album, flore erecto, vulgare. *Bauh. pin.* 76.

1 candidum. *Dod. pempt.* 197.

1 album, floribus dependentibus, f. p. regri-

um. *Bauh. pin.* 76.

1 album, caule plano compresso. *Gron. orient.* 106.

1 album, foliis pulchri & ignoti species. *Bauh. pin.* 76.

at in Palæstina, Syria, Gades. 2

LILIUM foliis sparsis, corollis campanulatis erectis: bulbiferum.

1 album, scabris. *Hort. cliff.* 120. *Hort. ups.* 80. *Roy.*

1. 31. *Gmel. sibir.* 1. p. 41. *Gron. orient.* 104.

1 purpureo-croceum majus. *Bauh. pin.* 76.

1 purpureo-croceum, flore pleno.

1 purpureo-croceum minus. *Bauh. pin.* 77.

1 phoeniceum. *Bauh. pin.* 77.

Spec. plant pars I.

E e

æ Li-

- ε. *Lilium bulbiferum latifolium majus*. *Bauh. pin.* 77.
 ζ. *Lilium bulbiferum angustifolium*. *Bauh. pin.* 77.
 η. *Lilium bulbiferum minus*. *Bauh. pin.* 77.
 θ. *Lilium bulbiferum incanum*. *Bauh. pin.* 77.
Habitat in Italia, Austria, Sibiria. 24

pomponium 3. **LILIUM** foliis sparsis subulatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upf.* 81. *l. lugdb.* 31. *Mill. dict. t.* 165. *f.* 2.

Lilium radice tunicata, foliis sparsis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Gmel. fibir.* 1. *p.* 42.

Lilium rubrum angustifolium. *Bauh. pin.* 78.

Lilium rubrum præcox. *Clus. hist.* 1. *p.* 133.

β. *Lilium miniatum odoratum angustifolium.* *Bauh. pin.* 79. *Rudb. elyf.* 2. *p.* 176. *f.* 3.

γ. *Lilium brevi & gramineo folio.* *Bauh. pin.* 79.

Habitat in Pyrenæis, Sibiria. 24

Folia linearia, acuta, triquetra, canaliculata, sp. Nectarii rima valde dentata.

chalconi- 4. **LILIUM** foliis sparsis lanceolatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upf.* 81. *l. lugdb.* 31.

cum,

Lilium byzantinum miniatum. *Bauh. pin.* 78.

Lilium rubrum f. miniatum byzantinum. *Clus. hist.* 1. *p.* 131.

β. *Lilium byzantinum miniatum polyanthos.* *Bauh. pin.* 78.

γ. *Lilium purpureo-sanguineum, flore reflexo.* *Bauh. pin.* 78.

Hemerocallis chalconica. *Lob. ic.* 169.

Habitat in Persia, Platina Carniolæ. 24

Racemus ante florescentiam vix incurvatus ut in Hemerocallis. Caulis usque ad apicem Foliis vestitus confertus.

superbum. 5. **LILIUM** foliis sparsis lanceolatis, floribus ramis pyramidatis reflexis, corollis revolutis. *Mill. dict.* 8.

Lilium, foliis sparsis, multiflorum, floribus reflexis, fundo aureo limbo aurantio punctis nigricantibus pedunculis singulis uno foliolo. *Trew. chret.* 2. 1

Lilium f. Martagon canadense, flore luteo punctis. *Catesb. car.* 2. *p.* 56. *t.* 56.

Habitat in America septentrionali. 24

- LILIUM** foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upf.* 81. *Gmel. fibir.* 1. p. 44. *Roy. lugdb.* 31. Martagon.
- Lilium**, floribus reflexis, montanum. *Bauh. pin.* 77.
- Lilium** sylvestre. *Dod. pempt.* 201.
- Lilium**, floribus reflexis, alterum hirsutum. *Bauh. pin.* 78.
- Habitat in Hungaria, Helvetia, Sibiria, Lipsiæ.* 24
- LILIUM** foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis campanulatis. canadense.
- Lilium** angustifolium, flore flavo maculis nigris distincto. *Tournef. inst.* 371. *Barr. rar.* 778. t. 125.
- Lilium** Martagon canadense maculatum. *Morif. hist.* 2. p. 408. f. 4. t. 20. f. 9. *Rudb. clyf.* 2. p. 177. f. 5.
- Lilium** f. Martagon canadense, floribus magnis flavis non reflexis. *Catesb. car.* 3. p. 11. t. 11.
- Habitat in Canada.* 24
- LILIUM** foliis verticillatis, floribus erectis, corolla philadelphica campanulata, petalis unguiculatis. cum.
- Lilium** foliis verticillatis brevibus, corollis campanulatis, unguibus petalorum angustioribus, floribus erectis. *Mill. dict.* t. 165. f. 1.
- Habitat in Canada.* 24
- Simillimum est L. camtschatcensi, sed ejus petala ovata sessilia; hujus unguibus oblongis distinctis; separandum itaque secundum vivi autoptam Millerum.*
- LILIUM** foliis verticillatis, flore erecto, corolla camtschatcensis campanulata, petalis sessilibus. *Am. acad.* 2. p. 348. *.
- Habitat in Canada, Camtschatca.*

FRITILLARIA.

- FRITILLARIA** racemo comoso inferne nudo, foliis imperialis. liis integerrimis. *Hort. upf.* 82.
- Petilium** foliis caulinis. *Hort. cliff.* 119. *Roy. lugdb.* 30.
- Lilium** f. Corona imperialis: genus. *Bauh. pin.* 79.
- Tufai. Clus. hist.* 1. p. 127, 128.
- Habitat in Persia? Constantinopoli venit in Europam circa 1570.* 24
- FRITILLARIA** racemo comoso inferne nudo, foliis regia. liis crenatis.

Corona regalis, lili folio crenato. *Dill. elth.* 110. 1.
f. 109.

Habitat ad Cap. b. Spei.

perfica. 3. FRITILLARIA racemo nudiusculo, foliis obli-
Hort. upf. 82.

Fritillaria racemo nudo terminali. *Hort. cliff.* 119.

Fritillaria radice rotunda. *Roy. lugdb.* 30.

Lilium perficum: *Bauh. pin.* 79. *Rudb. etys.* 2. p. 1.
f. 1.

Lilium susianum. *Clus. hist.* 1. p. 130.

Habitat in Persia? e Susis venit in Europam 1573.

*Folia infima sunt bina, f. terna, f. quaterna verticillata
opposita.*

pyrenaica. 4. FRITILLARIA caule multifloro, foliis infimis
positis. *Hort. cliff.* 81.

Fritillaria flore minore. *Bauh. pin.* 64.

Fritillaria pyrenæa. *Clus. hist.* 2. p. 256. *posth.* 10.

Habitat in Pyrenæis. 2.

Meleagris. 5. FRITILLARIA caule subunifloro, foliis opposi-
tatis. *Hort. upf.* 81. *Fl. svec.* 2. n. 283.

Fritillaria e foliorum alis florens. *Hort. cliff.* 119.

Fritillaria radice depressa. *Roy. lugdb.* 30.

Fritillaria præcox purpurea variegata. *Bauh. pin.*

Meleagris. Rencal. spec. 147. t. 146.

β. Fritillaria alba variegata. *Bauh. pin.* 64.

γ. Fritillaria alba præcox. *Bauh. pin.* 64.

δ. Fritillaria serotina atropurpurea. *Bauh. pin.* 64.

Habitat in Gallia, Italia, Austria, Upsaliæ. 2.

UVULARIA.

plexifo- 1. UVULARIA foliis amplexicaulibus.

lia.

Uvularia foliis cordato-oblongis. *Roy. lugdb.* 29.

Smilax perfoliata ramosa, flore albo. *Barr. rar.* 51.
720.

Polygonatum latifolium ramosum. *Bauh. pin.* 71.

Bauh. hist. 3. p. 531. *Morif. hist.* 3. p. 537. f. 121.

f. 11. *Raj. hist.* 665.

Polygonatum latifolium 4 ramosum. *Clus. hist.* 1.
276.

Laurus alexandrina. *Cam. epit.* 935.

*Habitat in Bohemiæ, Silesiæ, Saxonæ, Delphin-
montibus.* 2.

ULARIA foliis perfoliatis. *Amæn. Acad. 2. p. perfoliata.*

7.
 laria caule perfoliato. *Gron. virg. 37. Cold. no-*
b. 74.

laria folio integerrimo. *Roy. lugdb. 29.*

laria. *Hort. cliff. 121.*

rgonum ramosum, flore luteo, majus. *Corn. canad.*

3. Moris. hist. 3. p. 538. f. 13. t. 4. f. 12.

rgonatum latifolium perfoliatum brasilianum. *Bauh.*

n. 303. prodr. 139. Bursf. XVII. 61.

itat in Virginia, Canada. *Plantæ Burseri ex Tou-*
nambault Brasiliæ a pharmacopæo allatæ, & C. B.
mmunicatæ, videntur mihi omnes ex Canada fuisse.

ULARIA foliis sessilibus.

sessilifolia.

laria foliis sessilibus, flore unico. *Cold. noveb. 73.*

itat in Canada. *Kalm.*

itus præcedentis; Caulis bifidus, uniflorus. Folia
 nceolato-ovata, alterna, at ubi Flos ex altero ra-
 o exit, folia bina adsunt. Pedunculus nudus.

GLORIOSA.

ORIOSA. *Hort. cliff. 121. Fl. zeyl. 122.* Roy. superba.*

gdb. 29.

thonica malabarorum. *Herm. lugdb. 688. t. 689.*

luk. alm. 249. t. 116. f. 3.

um zeylanicum superbum. *Comm. hort. 1. p. 69. t.*

5. Rudb. elyf. 2. p. 178. f. 7.

ndoni. *Rheed. mal. 7. t. 107. f. 57.*

itat in Malabar. 24

ERYTHRONIUM.

YTHRONIUM. *Hort. cliff. 119, Gmel. sib. 1. Deus canis.*

. 39. t. 7. Roy. lugdb. 30.

is canis latiore rotundioreque folio. *Bauh. pin. 87.*

ns caninus. *Dod. pempt 203.*

ns canis angustiore longioreque folio. *Bauh. pin.*

7.

ythronium foliis ovato-oblongis glabris nigro-
 maculatis. *Gron. virg. 151. flore flavo.*

bitat in Liguria, Allobrogibus, *Augustæ Taurino-*
 um, Sibiria, Virginia. 24

TULIPA.

- sylvestris.* 1. TULIPA flore subnutante, foliis lanceolatis.
Svec. 2 n. 284.
 Tulipa minor lutea italica. *Bauh. pin.* 63.
 Tulipa minor lutea gallica. *Bauh. pin.* 63. *Sauv.* 306.
Habitat Monspelii, inque Apenninis, Londini. !
 Distinguitur a sequente: Caule altiore, Foliis acutioribus, Floris colore luteo subtus virescente, p
 acutioribus, Scapo versus florem inflexo & au
 rescentiam nutante. Sed præprimis staminum
 mentis basi valde attenuatis, & supra basim
 is. Petala interiora margine hirsuta sunt, &
 odor.
- galsneriana.* 2. TULIPA flore erecto, foliis ovato-lanceolatis
 Tulipa scapo triphylo, foliis ovato-lanceolatis.
upf. 82.
 Tulipa. *Hort. cliff.* 118. *Roy. lugdb.* 31. *Fl. suec.*
 Tulipa (genus fere totum). *Bauh. pin.* 57.
 Tulipa turcarum. *Cord. hist.* 213.
Habitat in Cappadocia, unde in Europam 1559
 snero auctore. 2
- breyntiana.* 3. TULIPA caule multifloro-polyphylo, foliis
 ribus.
 Sifyrinchium, ex phœniceo suaververubente flore,
 picum. *Breynt. cent.* t. 36. *Rudb. clyf.* 2. p. 13.
Habitat in Æthiopia. 2
 Folia caulina 6. f. 7, alterna, lineari-lanceolata
 prema sensim breviora. Flores ad apicem, 3.
 minores quam plantæ Breyntii cultæ. Petal
 angustata. Stylus nullus.

ALBUCA.

- major.* 1. ALBUCA foliis lanceolatis.
 Ornithogalum canadense petalis alternis patentib
 terioribus erectis. *Sp. pl.* 1. p. 308.
 Ornithogalum luteo-virens indicum. *Corn. cana*
Rudb. clyf. 2. p. 140. f. 7. *Raj. hist.* 1154.
hist. 2. p. 423. f. 4. t. 24. f. 7.
Habitat ad Cap. b. Spei. 2
- minor.* 2. ALBUCA foliis subulatis.

Ornithogalum africanum, flore viridi altero alteri innato. *Herm. parad.* 209. t. 209.
Habitat ad Cap. b. Spei. 24

H Y P O X I S.

HYPOXIS pilosa, capsulis ovatis.

erecta.

Ornithogalum hirsutum scapo angulato, pedunculis umbellatis villosis. *Sp. pl.* 1. p. 306.

Ornithogalum scapo bifloro. *Roy. lugdb.* 31.

Ornithogalum vernum luteum, foliis angustis hirsutis. *Gron. virg.* 37.

Ornithogalum virginianum luteum. *Pet. gaz.* 1. t. 1. f. 3.

Ornithogalum herbaceum luteum parvum virginianum, foliis gramineis hirsutis. *Pluk. alm.* 272. t. 350. f. 12.

Habitat in Virginia, Canada. 24

HYPOXIS pilosa, capsulis clavatis. *Aman. acad.* 5. p. 396. * decumbens.

Ornithogalum, foliis gramineis, floribus geminatis, pedunculis longissimis alaribus. *Brown. jam.* 195.

Anthericum sessile, foliis linearibus planis, caule decumbente. *Mill. dict.* t. 39. f. 2.

Crocus foliis & radice scorzonerae. *Plum. ic.* 108. f. 1.
Habitat in America meridionali. 24

HYPOXIS tubis florum longissimis. †

fascicularis.

Allium sylvestre f. *Möly minus*, amplo flore. *Ruffel. alep.* 34. t. 2.

Habitat ad Aleppo. 24

HYPOXIS pilosa acaulis, fructificationibus subradicalibus. † sessilis.

Ornithogalli virginici facie herba tuberosa carolinensis. *Dill. elth.* 298. t. 220. f. 287.

Habitat in Carolina. 24

ORNITHOGALUM.

* *staminibus omnibus subulatis.*

ORNITHOGALUM scapo anguloso diphylo, pedunculis umbellatis simplicibus. *Fl. svec.* 270, 285. luteum.

Ornithogalum scapo diphylo, pedunculis simplicibus terminalibus, filamentis omnibus subulatis. *Hort. cliff.* 124. *Roy. lugdb.* 31.

- Ornithogalum luteum. *Bauh. pin. 71.*
 Pyrochiton. *Reneal. spec. 91. t. 90.*
Habitat in Europæ culis, maellis. 24
- nimum. 2. ORNITHOGALUM scapo angulato diphylo,
 dunculis umbellatis ramosis. *Fl. suec. 271. 286.*
 Ornithogalum luteum minus. *Bauh. pin. 71.*
 Hypoxis. *Reneal. spec. 92.*
Habitat in Europæ cultis oleraceis.
- pyrenaicum 3. ORNITHOGALUM racemo longissimo, filame
 lanceolatis, pedunculis floriferis patentibus aq
 libus: fruct feris scapo approximatis.
 Ornithogalum racemo longissimo, filamentis dilat
 linearibus, capsulis erectis. *It. scan. 220.*
 Ornithogalum spica longissima, filamentis triangul
 bus. *Hall. herb. 294. Gron. orient. 110.*
 Ornithogalum angustifolium majus, floribus ex
 virescentibus. *Bauh. pin. 70. Rudb. elyf. 2. p.
 f. 3.*
 Ornithogalum majus. *Clus. hist. 1. p. 187.*
 Ornithogalum pyrenaicum. *Clus. cur. 21.*
 Stachyoides. *Reneal. spec. 93. t. 90.*
*Habitat in Alpibus Helveticis, Genevensibus, P
 naicis, Carniolæ 24*
- narbonense. 4. ORNITHOGALUM racemo oblongo, filame
 lanceolatis membranaceis, pedunculis floribus
 patentibus. *Amæn. acad. 4. p. 312. **
 Ornithogalum majus spicatum, flore albo. *Bauh.
 70.*
 Ornithogalum narbonense. *Dod. pempt. 222.*
Habitat in Galliæ australis & Italiæ agris. 24
- comosum. 5. ORNITHOGALUM racemo brevissimo, bra
 lanceolatis longitudine florum, petalis obtusis,
 mentis subulatis. *Amæn. acad. 4. p. 312. **
 Ornithogalum spicatum s. comosum, flore lacteo. *l
 pin. 70. Rudb. elyf. 2. p. 135. f. 1.*
 Ornithogali lactei species major. *Besl. cysl.*
Habitat - - - - 24
- latifolium. 6. ORNITHOGALUM racemo longissimo, foliis
 ceolato-ensiformibus.
 Ornithogalum latifolium & maximum. *Bauh. pin.
 Ori*

thogalum vel Liliū alexandrinum, floribus albis
numerabilibus. *Swert. floril.* 58.

rat in Arabia, Ægypto.

pedalia plus quam duos pollices lata. 24

NITHOGALUM racemo conico, floribus nu- pyramidalis.
rosis adscendentibus. *Roy. lugdb.* 32.

thogalum angustifolium spicatum maximum. *Bauh.*
70. *Rudb. elyf.* 2. p. 134. f. 4.

thogalum lacteum maximum. *Besl. cyst. vern.* 5. t.
f. 2.

rat in collibus Lusitaniæ. 24

* * *Staminibus alternis emarginatis.*

NITHOGALUM floribus corymbosis, pedun- arabicum.
lis scapo humilioribus, filamentis subemarginatis.
y. lugdb. 32.

thogalum umbellatum maximum. *Bauh. pin.* 69.
db. elyf. 2. p. 130. f. 1.

thogalum arabicum. *Clus. hist.* 11. p. 186. *Besl.*
f. vern. 5. t. 12. f. 1.

nomphale. *Reneal. spec.* 89. t. 90.

rat Alexandria Ægypti, ad Cap. b. spei. 24

na connata. *Hall. gert.* 81.

NITHOGALUM floribus corymbosis, pedun- umbellatum
lis scapo altioribus, filamentis emarginatis. *Hort.*
f. 124. *Hort. upf.* 84. *Roy. lugdb.* 32. *Gron.*
ent. 111.

thogalum umbellatum medium angustifolium.
uh. pin. 70.

armon. *Reneal. spec.* 88. t. 87.

rat in Germania, Gallia, Oriente. 24

NITHOGALUM floribus fecundis pendulis, nutans.
Statio stamineo campaniformi.

thogalum floribus fecundis pendulis, filamentis
is emarginatis. *Hort. cliff.* 124. *Hort. upf.* 84.
y. lugdb. 32.

thogalum exoticum, magno flore minori innato.
uh. pin. 70. *Rudb. elyf.* 1. p. 137. f. 12.

thogalum neapolitanum. *Clus. app.* 2. p. 9. t. 9.

rat in Italia Neapoli innotuit circa 1570. 24

NITHOGALUM foliis cordato-ovatis. *Roy. capense.*
db. 31. *It. scan.* 73. *

Ornithogalum africanum, plantaginis roseæ folio,
dice tuberosa. *Comm. hort. 2. p. 175. t. 88.*

Ornithogalo affinis radice tuberosa, cyclaminis
flore pallide cæruleo. *Breyn. cent. t. 41. l.*
elyf. 1. p. 138. f. 14.

Habitat ad Cap. b. Spei. 24

Stamina connexa in cylindrum.

SCILLA.

- maritima. 1. **SCILLA nudiflora, bracteis refractis.**
Scilla radice tunicata. Hort. cliff. 123. Hort. 24
Mat. med. 162. Roy. lugdb. 32.
Scilla vulgaris, radice rubra. Bauh. pin. 73.
Scilla hispanica. Clus. hist. 1. p. 171.
 β. *Scilla radice alba. Bauh. pin. 73. Seb. mus. 1. l.*
f. 4, 5.
Habitat ad Hispaniæ, Siciliæ, Styriæ litora arenæ
Folia lanceolata, stricta. Scapus ante folia, le-
mus, multiflorus. Flores albi: Bractææ lineari
teolata, refractæ genu in medio, sursum flexæ,
tus calcaratæ.
- Lilio-Hya- 2. **SCILLA radice squamata. Hort. cliff. 123.**
 cinthus. *lugdb. 32.*
Hyacinthus stellaris, folio & radice lilii. Bauh. pi
Habitat in Biscatia, Aquitania, Hispania, Pyrenæ
- italica. 3. **SCILLA corymbo conferto hemisphærico.**
Scilla radice solida, floribus corymbosis confertis
Hort. cliff. 123. Roy. lugdb. 32.
Hyacinthus stellaris spicatus cinereus. Bauh. pin
Hyacinthus stellaris italicus. Besl. cyst. vern. 42.
Hyacinthus stellatus cinerei coloris. Clus. hist. 1. p.
Habitat - - - 24
- peruviana. 4. **SCILLA corymbo conferto conico.**
Hyacinthus indicus bulbosus stellatus. Bauh. pin
Rudb. elyf. 1. p. 37. f. 1.
Hyacinthus stellatus peruanus. Clus. hist. 1. p. 11
Eriophorus peruvianus. Clus. hist. 1. p. 173.
Habitat in Lusitania. 24
Radix tunicata, lanuginosa. Sauv. Scapus teres
rollæ senescentes recurvatæ, petalorum marg
recurvatis.

LLA floribus lateralibus alternis subnutantibus. *amœna.*
rt. cliff. 123. Roy. lugdb. 33.

inthus stellaris cœruleus amœnus. *Bauh. pin. 46.*
ib. clyf. 2 p. 34. t. 7.

inthus stellaris bizantinus, *Besl. exst. vern. 43. f. 2.*
at forte Bizantii, unde venit in Europam 1590. 24

LLA radice solida, floribus erectiusculis paucibus. *bifolia:*
Hort. cliff. 123. Roy. lugdb. 33. Sauv.
nsp. 18.

inthus stellaris bifolius germanicus. *Bauh. pin. 45.*

inthus cœruleus mas minor. *Fuchs. hist. 837.*

cinthus stellatus, albo flore. *Clus. hist. 1. p. 184.*

at in Gallia, Germania. 24

sæpe 4, altitudine æquales.

LLA foliis filiformibus linearibus, floribus *autumnalis.*
conobosis, pedunculis nudis adscendentibus longitudi-
ne floris.

radice solida, foliis setaceis, floribus *tastigiatis,*
pedunculis arcuatis ex ala tuberculi mammillaribus.
ett. stamp. 131. Dalib. parif. 102.

radice solida, scapo multifloro, floribus capi-
is. Sauv. monsp. 19.

inthus stellaris autumnalis minor. *Bauh. pin. 47.*

inthus autumnalis minor. *Clus. 1. p. 185.*

at in Hispania, Gallia, Veronæ, solo glareoso. 24

LLA folio teretiüsculo, latere subspicato. *unifolia,*
us monophyllus, flore albo. Bauh. hist. 2. p. 622.
at in Lusitania.

CYANELLA.

CYANELLA.

Capensis.

at ad Cap. b. spei. Royen. Burmannus. 24

ra Scilla. Flores irregulares.

ASPHODELUS.

ASPHODELUS caule folioso, foliis triquetris stri- *luteus.*
is. Hort. cliff. 127. Hort. upf. 83. Roy. lugdb. 33.

asphodelus luteus flore & radice. *Bauh. pin. 28.*

asphodelus femina. *Cam. epit. 372.*

at in Sicilia. ♂

Corollæ sexpartita: . petalis 4 in cruce[m] dispo
duobus intra superiora tria petala positis. St
declinata, quor[um] tria breviora.

fistulosus. 2. ASPHODELUS caule nudo, foliis strictis sub
striatis subfistulosis. *Hort. cliff.* 83. *
Asphodelus caule nudo, foliis strictis. *Roy. lugd*
Asphodelus foliis fistulosis. *Bauh. pin.* 29.
Asphodelus minor. *Clus. hist.* 1. p. 197.
Habitat in Gallo - Provincia, Hispania, Creta.

ramosus. 3. ASPHODELUS caule nudo, foliis ensifor
carinatis lævibus. *Mat. med.* 172.
Asphodelus caule nudo, foliis laxis. *Hort. clij*
Roy. lugdb. 24. *Sauv. monsp.* 20.
Asphodelus albus ramosus mas. *Bauh. pin.* 28.
Asphodelus albus non ramosus. *Bauh. pin.* 28
Asphodelus. 1. 2. *Clus. hist.* 1. p. 197.
Habitat in Narbona, Lusitania, Hispania, Itali
fria. 24

ANTHERICUM.

* *Phalangium foliis canaliculatis, filamentis glai*

serotinum. 1. ANTHERICUM foliis planiusculis, scapo u
Bulbocodium foliis subulato-linearibus. *Roy. lu*
Sp. pl. 1. p. 294.

Bulbocodium alpinum juncifolium, flore unic
albo extus squalide rubente. *Raj. angl.* 3.
t. 17. *f.* 1.

Pseudo-Narcissus gramineo folio. *Bauh. pin.* 51
27. *Rudb. elys.* 2. p. 64. *f.* 9. *Burf. III.* 41

Habitat in alpibus Angliæ, Helvetiæ, Taure
diensis, Wallæiæ. 24

Scapus bracteis *f.* foliis 3 *f.* 4, lanceolatis, a
minutis, vaginantibus absque Spatha. Flos inf

græcum. 2. ANTHERICUM foliis planis, scapo simpli
ribus corymbosis.

Bulbocodium græcum, myosotidis flore.
cor. 50.

Habitat in Oriente. Burmannus. 24

Bulbus. Folia linearia, glabra, longitudine fe

Scapus simplex Foliis 3 *f.* 4, brevioribus.
bus terminalis, subquinqueflorus: pedunculo

unifloro ; lateralibus bifloris. Corolla alba A. n. 104. Stamina corolla breviora & Stylus flaminibus brevior.

ERICUM foliis planis , scapo ramoso , *co-* *revolutum.*
 lis revolutis.

odelus foliis compressis asperis , caule patulo.

urnes. inst. 343.

at - - - - - 24

ERICUM foliis planis , scapo ramoso , *co-* *ramosum.*
 lis planis , pistillo recto.

ericum foliis planis , corollis planis deciduis. K.

*. 178. * Fl. svec. 267 , 289.*

ericum caulibus ramosis , foliis planis. Guett.

p. p. 129.

gium , parvo flore , ramosum. Bauh. pin. 29.

gium majus. Cam. epit. 580.

t in Europæ australioris rupibus calcareis. 24

ERICUM foliis planis , scapo simplicissimo , *Lillago.*

illis planis , pistillo declinato. Hort. upf. 83. It.

104. Fl. svec. 2. n. 290.

ericum caulibus non ramosis , foliis planis. Guett.

2. I. p. 128.

gium , parvo flore , non ramosum. Bauh. pin.

Morif. hist. 2. p. 333. f. 4. t. 1. f. 10.

gium non ramosum. Lob. ic. 48.

in Helvetia , Germania , Gallia. 24

ERICUM foliis planis , scapo simplicissimo , *Lillastrum.*

illis campanulatis , staminibus declinatis.

ocallis Lillastrum scapo simplici , corollis hexa-

is campanulatis. Hort. cliff. 128. Sp. pl. 1. p.

Hall. helv. 290.

gium magno flore. Bauh. pin. 29.

gium allobrogicum majus. Clus. cur. app. alt.

gium. Dalech. hist. 852.

in Alpibus Helveticis , Allobrogicis. 24

hujus naturalis Species est , sed quis character

Bulbine foliis carnosis , Filamentis barbatis.

ERICUM foliis carnosis teretibus , caule *frutescens*

no.

An-

Anthericum caulescens, foliis pulposis teretibus
 latis supine convexo-planis. *Wach. ultr.* 305
 Bulbine caulescens. *Hort. cliff.* 122. *Roy. lugdb.*
 Phalangium capense caulescens, foliis cepitiis
Dill. elth. 310 t. 231. f. 298.
Habitat ad Cap. b. Spei. 5

alooides. 8. ANTHERICUM foliis carnosis subulatis planis.
Hort. upf. 83.

Anthericum foliis pulposis lanceolato-subulatis
 excavatis. *Wach. ultr.* 304.

Bulbine acaulis. *Hort. cliff.* 123. *Roy. lugdb.* 33

Phalangium capense sessile, foliis aloeformibus
 posis. *Dill. elth.* 312. t. 232. f. 300.

Habitat ad Cap. b. Spei. 4

Aphodelodes. 9. ANTHERICUM foliis carnosis subulatis
 strictis. *Hort. upf.* 83.

Anthericum acaule, foliis pulposis teretibus
 supine convexo-planis. *Wach. ult.* 305.

Habitat in Æthiopia. 4

Folia vix striata, sed stricta, margine aspera,
 versus alterum latus gibbifera.

annuum. 10. ANTHERICUM foliis carnosis subulatis
 teretibus scapo subracemoso. *Hort. upf.* 83. *

Anthericum acaule, foliis setaceis caule angustis
Wach. ultr. 305.

Habitat in Æthiopia. ○

hispidum. 11. ANTHERICUM foliis carnosis compressis
 Aphodelus caule seminudo ramoso, foliis planis
 ceolatis. *Mill. dict.* t. 56?

Habitat ad Cap. b. Spei. 4

Radix fibrosa. Folia subcarnosa, compressa, &
 semipedalia, recurvata, hispida undique
 pilosis. Scapus simplex, hispidus. Racemus
 lanceolatis, longitudine pedicellorum hispidis,
 dicelli. Flores albi carina viridi. *Anthera* in

* * * *Nartheicum foliis ensiformibus.*

offisragum. 12. ANTHERICUM foliis ensiformibus,
 lanatis. *Fl. svec.* 268, 287. *Gmel. sibir.* 1. p.
 18. f. 2.

ericum scapo folioso laxè spicato, filamentis vilis. *Fl. lapp.* 136. *Roy. lugdb.* 45.

hecium. *Mahr. E. N. C.* 1742. p. 389. t. 5. f. *Wach. ultr.* 303. *Gort. gelr.* 69.

lo-Asphodelus palustris anglicus. *Bauh. pin.* 29.

odelus luteus palustris. *Dod. pempt.* 208.

tat in Europæ borealis uliginosis. 2

ATHERICUM foliis ensiformibus, perianthiis calyculatum lobis, filamentis glabris, pistillis trigynis. *Fl. svec.*

9. 288. *It. gotl.* 194, 221. *Gmel. fib.* 1. p. 13. t. 18. f. 2.

ericum filamentis lævibus, perianthio trifido.

ort. cliff. 140. *Gron. virg.* 39.

ericum scapo nudo capitato, filamentis glabris.

lapp. 139. t. 10. f. 3.

ngium alpinum palustre, iridis folio. *T. Segu.*

2. p. 61. t. 14.

lo-Asphodelus alpinus. *Bauh. pin.* 29.

tat in alpihus Helvetiæ, Lapponiæ, Sibiria. 2

is nullum in tota classe Liliacea difficilius deter-

natur: 12 ossifragum & 13 calyculatum habitu

o ita uniuntur, ut demta fructificatione vix di-

guantur, at Species 13 gerit Stamina glabra,

ricarpium subglobosum, Stigmata tria sine stylis

Perianthium trivalve. Species 12. annectitur

ciebus 7, 8, 9, 10, 11. Stamimbus hirsutis, at

fert Germine pyramidato, Seminibus paleaceis,

olla persistente. Species 1 — 6. differunt a spe-

bus 7 — 10. Stamimbus glabris, habitu Aspho-

i, adeoque vel sub uno eodemque genere traden-

, vel etiam sub quatuor distinctis: a. 1. — 6.

7 — 11. γ. 8; δ. 12, 13. proponendæ; hoc dum

et, difficillime character specierum a obtineretur.

LEONTICE.

NTICE foliis pinnatis: petiolo communi sim- Chryfogo-
ci. *Hort. cliff.* 122. *Gron. orient.* 113. num.

topetalum foliis costæ simplici innascentibus. *Tour-*
cor. 49.

topetalo affinis, foliis quernis. *Bauh. pin.* 324.

vis. hist. 2. p. 285. f. 4. t. 5. f. 3.

ogonum dioscoridis. *Rauv. itin.* 119. *Raj. hist.*

6.

it inter Græciæ segetes. 2

- Leontopetalum.** 2. **LEONTICE** foliis decompositis: petiolo com-
trifido. *Hort. cliff.* 122. *Gron. orient.* 114.
Leontopetalon foliis costæ ramosæ innascentibus. 7
nes. cor. 49.
Leontopetalon. *Bauh. pin.* 324. *Cam. epit.* 565. *M.*
hist. 2. p. 285. f. 3. t. 15. f. 6. *Raj. hist.* 1326.
Habitat in Apulia, Hetruria, Creta. 2.
- Thaliætroides.** 3. **LEONTICE** folio caulino triternato (27), fl
biternato (9).
Leontice foliis supradecompositis. *Gron. virg.* 1;
Cold. noveb. 75.
Habitat in Virginia. 2.
Modus crescendi Epimædii. Caulis nudus, termi-
natus
Foliis tribus, patentibus, petiolatis: Petiolus 1
folio trifidus, adnatis novem foliolis, quorum late-
ra duo, sessilia, biloba; intermedium petiolatum, tri-
bilobum; infra divisuram primam caulis exserit e-
tiam folium Petiolos tres: singulis simplicibus
phyllis, infra quos Racemus simplex cum duobus
calicibus.
- Leontopetaloides.** 4. **LEONTICE** foliis simplicibus tripartito-multif-
corollis monopetalis calyculatis. †
Leontopetaloides. *Amm. act.* 8. p. 211. t. 113.
Habitat in India.
*Habitus hujus generis, at flos videtur satis di-
verse an sufficienter pro distincto genere, determinari
non potest.*

ASPARAGUS.

- officinalis.** 1. **ASPARAGUS** caule herbaceo erecto, foliis set-
osis, stipulis duabus interioribus, una exteriori
svæc. 272, 291. *Mat. med.* 169. *Hort. cliff.* 121. 1
lugdb. 28.
- maritimus.** 2. **Asparagus maritimus**, crassiore folio. *Bauh. pin.* 4.
3. **Asparagus sylvestris**, tenuissimo folio. *Bauh. pin.*
- altilis.** 4. **Asparagus sativa.** *Bauh. pin.* 489.
Asparagus. *Cam. epit.* 259.
Habitat in Europæ arenosis. 2.
Caulis herbacei, erecti, paniculati. Stipulæ solæ
exteriores 3 binæ interiores minores, inter
Folia terna, raro 4 f. 5, linearia, sed in summi-
mis, ubi nulli flores; at in infimis ramulus. Pedu-

gemi, laxi, uniflori, penduli, geniculo articulado.
Corolla campanulata, petalis interioribus longioribus.

ASPARAGUS caule inermi, ramis declinatis, foliis declinatis, setaceis. *Roy. lugdb. 29.*

Habitat in Africa.

ASPARAGUS aculeis solitariis, foliis ensiformibus falcatis. *Fl. zeyl. 123. **

Asparagus foliis falcatis ex uno puncto numerosis.

Burm. zeyl. 36. t. 13. f. 2.

Habitat in Zeylona. †

ASPARAGUS aculeis solitariis, ramis reflexis retrofractisque, foliis fasciculatis. *retrofractus,*

Asparagus frutescens, foliis fasciculatis setaceis terminalibus, ramis reflexis retrolexis. *Hort. cliff. 121. **
Roy. lugdb. 28.

Asparagus africanus tenuifolius, viminalibus virgis, foliis laricis adinstar ex uno puncto numerosis stellatim positis. *Pluk. amalth. 40. t. 375. f. 3.*

Habitat in Africa. †

ASPARAGUS aculeis solitariis, caule erecto, ramis filiformibus, foliis fasciculatis. *asiaticus.*

Asparagus aculeis alternis, ramis solitariis filiformibus, foliis setaceis fasciculatis lateralibus. *Hort. cliff. 122. **
Roy. lugdb. 28.

Habitat in Asia.

ASPARAGUS spinis retroflexis, ramis flexuosis, foliis fasciculatis angulatis muticis deciduis. *albus.*

Asparagus aculeis solitariis, ramulis flexuosis binis oppositis spinosis foliosis, foliis fasciculatis. *Roy. lugdb. 29.*

Asparagus aculeatus, spinis horridus. *Bauh. pin. 490. Gorduba tertia. Clus. hist. 2. p. 178.*

Habitat in Lusitania, Hispania. †

ASPARAGUS caule inermi fruticoso, foliis aciformibus rigidulis perennantibus mucronatis æqualibus. *acutifolius*

Asparagus foliis aciformibus pungentibus, caule fruticoso inermi. *Sauv. monsp. 45.*

Asparagus foliis acutis. *Bauh. pin. 490.*

Asparagus sylvestris. *Cam. epit. 260.*

Habitat in Lusitania, Hispania, Oriente. †

- aphyllus. 8. ASPARAGUS aphyllus, spinis subulatis striatis qualibus divergentibus. *Hort. cliff. 122. Roy. bot. Asparagus aculeatus alter tribus aut quatuor spinis eundem exortum. Bauh. pin. 490. Corduba altera. Clus. hist. 2. p. 178.*
 β. Asparagus creticus fruticosus, crassioribus & tribus aculeis, magno fructu. *Tournef. inst. 96. Habitat in Sicilia, Hispania, Lusitania. †*
- capensis. 9. ASPARAGUS spinis lateralibus terminalibus ramis aggregatis, foliis fasciculatis. Asparagus foliis quibus setaceis, spinis terminalibusque, ramulis ternis quaternisque. *cliff. 121. Asparagus aculeatus, triplici spina surrectus. Plin. 54. t. 15. f. 4. Habitat ad Caput b. Spei. †*
- sarmentosus. 10. ASPARAGUS foliis solitariis lineari-lanceolato caule flexuoso, aculeis recurvis. *Fl. zeyl. 10. Asparagus aculeatus zeylanicus maximus sarm. Herm. lugdb. 62. t. 650. 63. Raj. hist. 1877. Schadaveli Kelangu. Kheed. mal. 10. p. 19. Habitat in Zeylona. † Affinis maxime Medeolæ asparagoidi.*
- verticillatus. 11. ASPARAGUS foliis verticillatis. † Asparagus orientalis, foliis gallii. *Tournef. com. Buxb. cent. 5. app. 47. t. 37. Habitat in Oriente, circa Derbentum & alibi.*
- graminifolius. 12. ASPARAGUS foliis linearibus striatis, scapulo cernoso. *Habitat in Asia. Statura Antherici phalangii. Folia graminea, striata, spithamæa. Scapus vix foliis longior. res ad singulos dentes racemi 4. f. 5, pedicellis ipso brevioribus, quasi e gluma obtusa proceduntibus.*
- terminalis. 13. ASPARAGUS inermis, foliis alternis lanceolatis, racemo terminali composito. *Terminalis. Rumph. amb. 4. p. 79. t. 34. Habitat in India. † Folia fere Cannæ. Racemus terminalis ex aliquot cernis ramosis. Pedicelli alterni, solitarii, florebus res, cincti ad basin quasi gluma obtusa. Alibi dicitur*

4. **ASPARAGUS?** caudice simplici, foliis ensiformi. Draco.
 bus mucronatis subcarnosis imbricatis patentibus.
Cordylina foliis inermibus integerrimis flaccidis. Roy.
lugdb. 22.
Palma foliis longissimis pendulis, absque pedunculis e
 caudice glabro enatis. *Boerh. lugdb.* 2. p. 169.
Draco arbor. *Bauh. pin.* 503. *Clus. hist.* 1. p. 1.
Habitat in India orientali. †
Fructificationem, quam etiamnum Ulyssipone & in Hi-
spania producit, non obtinui, Flores Asparagi similes
retulit Læffing.

CONVALLARIA.

* *Lil. conv. T. corollis campanularis.*

- **CONVALLARIA** scapo nudo. *Fl. lapp.* 113. *Fl. svec.* majalis.
 273, 292 *Mat. med.* 167. *Hort. cliff.* 124. *Roy. lugdb.* 26
Gmel. sibir. 1. p. 34.
Lilium convallium album. *Bauh. pin.* 304.
Lilium convallium alpinum. *Bauh. pin.* 304.
Lilium convallium latifolium. *Bauh. pin.* 304.
Habitat in Europa septentrionali. †

* * *Polygonata T. corollis infundibuliformibus.*

- **CONVALLARIA** foliis verticillatis. *Fl. lapp.* 114. verticillata.
Fl. svec. 275, 293. *Hort. cliff.* 125. *Roy. lugdb.* 26.
Polygonatum angustifolium non ramosum. *Bauh. pin.* 303.
Polygonatum alterum. *Doi. penpt.* 345.
Polygonatum angustifolium ramosum. *Bauh. pin.* 304.
Habitat in Europæ septentrionalis saltibus, præcip-
uiis. †

- **CONVALLARIA** foliis alternis amplexicaulis, Polygoni-
 caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris. tum.
Mat. med. 168. *Gmel. sibir.* 1. p. 34. *Phil. bot.* 218.
Convallaria foliis alternis, floribus axillaribus. *Fl. svec.*
 274, 294. *Hort. cliff.* 124. *Gron. virg.* 37. *Roy. lugdb.* 26.
Convallaria foliis alternis, pedunculis pendulis uni-
floris. *Sauv. monsp.* 42.
Polygonatum floribus ex singularibus pedunculis. *Bauh.*
pin. 3. p. 530.
Polygonatum latifolium flore majore odoro. *Bauh.*
pin. 303.

Habitat in Europæ septentrionalis præcipitiis, rubus. 24

multiflora. 4. CONVALLARIA foliis alternis amplexicaulibus caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris. *P. bot. 218. Fl. svec. 2. p. 295.*

Convallaria foliis alternis, pedunculis pendulis multifloris. *Sauv. monsp. 42.*

Polygonatum latifolium maximum. *Bauh. pin. 303.*

Polygonatum latifolium. 1. *Clus. hist. 1. p. 275.*

Habitat in Europæ septentrionalis præcipitiis, rupibus.

* * * Smilaces *T. corollis rotatis.*

racemosa. 5. CONVALLARIA foliis sessilibus, racemo terminali composito.

Convallaria racemo composito. *Roy. lugdb. 26.*

Convallaria foliis alternis, racemo terminali. *H. cliff. 125. Gron. virg. 38.*

Polygonatum racemosum. *Corn. canad. 36. t. 37.*

Polygonatum ramosum & racemosum spicatum. *A. rif. hist. 3. p. 537. f. 13. t. 4. f. 9.*

Polygonatum racemosum americanum, ellebori foliis amplissimis. *Pluk. alm 301. t. 311. f. 2.*

Habitat in Virginia, Canada. 24

stellata. 6. CONVALLARIA foliis amplexicaulibus plurimis Polygonatum virginianum erectum spicatum, flore lato. *Morif. hist. 3. p. 536. f. 13. t. 4. f. 7.*

Polygonatum canadense spicatum fertile. *Corn. canad. 33. t. 33.*

Habitat in Canada. 24

trifolia. 7. CONVALLARIA foliis amplexicaulibus ternis, racemo terminali simplici.

Convallaria floribus racemosis, foliis ovatis oblongis caulinis. *Gmel. sibir. 1. p. 36. t. 4.*

Phalangium veratri foliis. *Amm. ruth. 137.*

Habitat in Sibiria silvis. 24

simplex. 8. CONVALLARIA foliis cordatis. *Fl. lapp. 113. svec. 276, 296. Hort. cliff. 125. Roy. lugdb. 1. Gmel. sibir. 1. p. 35.*

Lilium convallium minus. *Bauh. pin. 304.*

Gramen parnassii. *Cam. epit. 744.*

Habitat in Europæ borealis pratis depressis, asperis. 2

POLIANTHES.

IANTHES.

ianthes floribus alternis. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upf.*

tuberosa.

Fl. zeyl. 225.

ianthus indicus tuberosus, flore narcissi. *Bauh. pin.*

Rudb. elyf. 2. p. 39. f. 4.

ianthus indicus tuberosus flore hyacinthi orientalis.

Bauh. pin. 47. *Rudb. elyf.* 2. p. 38. f. 2.

ianthus indicus, tuberosa radice. *Clus. hist.* 1. p. 176.

a nocturna. *Rumph. amb.* 5. p. 285. t. 98.

at in Iava, Zeylona. 24

HYACINTHUS.

hyacinthus corollis campanulatis sexpartitis apice non scriptus

revolutis. *Hort. cliff.* 125. *Roy. lugdb.* 27. *Sauv.*

isp. 17.

hyacinthus, oblongo flore, cæruleus major. *Bauh. pin.* 43.

at in Angliæ, Galliæ, Hispaniæ, Italiæ nemo-

us. 24

bractæ junctæ sunt sepius floribus longiores, 3 binæ. Petalorum apice revoluta. Stigma guttula madidum.

hyacinthus corollis campanulatis sexpartitis, cernuus.

cernuus cernuo.

hyacinthus hispanicus. *Clus. hist.* 1. p. 177.

hyacinthus, oblongo flore suaviter rubente, minor.

Boh. pin. 44?

at in Hispania. 24

differt cum H. non scripto habitu 3 facie, quamvis minor; differt vero Foliis magis linearibus minus lanceolatis, erectioribus; Racemo magis nutante; Corollis incarnatis nec cæruleis, teretioribus, cum talorum lateribus ad basin minus plano-patentibus, c. dorso linea elevata notatis, minusque revolutis quamvis reflexa) quam in illo, Pistillum demum unguibus brevius est. Bractæ, binæ saturatius incarnatæ.

hyacinthus corollarum exterioribus petalis sub-ferotinus.

hyacinthus obsoleto flore. *Bauh. pin.* 44.

hyacinthus, obsoleto coloris, hispanicus ferotinus.

Clus. hist. 1. p. 177, 178.

at in Hispania, Mauritania. 24

Racemus secundus. Flores tristi colore, nec tamen non ambrosiacci. Corollæ sex-fida: laciniis 3 alternis exterioribus fere ad basin usque separatis recurvæ que.

viridis.

4. HYACINTHUS corollarum exterioribus laciniis subulatis longissimis.

Habitat ad Cap b Spei; vivam atuit D. Burmannus. Statura H. amethystini; sed Corollæ virides: Laciniis tribus exterioribus alternis duplo longioribus toto sæ subulatis in acumen angustissimum.

amethystinus.

5. HYACINTHUS corollis campanulatis semisextilibus cylindricis. *Hort. ups. 85*

Hyacinthus, oblongo cæruleo flore, minor. Bauh. p. 44. Ruib. elys. 2. p. 27. f. 8.

Hyacinthus minor hispanicus angustifolius. Bauh. l. 2 p. 587. Clus. cur. app. alt.

Habitat in Hispania? 2.

orientalis.

6. HYACINTHUS corollis infundibuliformibus semisextilibus basi ventricosis. *Hort. ups. 85. Hort. cliff. 13*

Koy. lugdb. 27 Gron orient. 115.

Hyacinthus orientalis, (spec. 1. — 15) & plenus (1. — 1. Bauh. pin. 44.

Hyacinthus orientalis major & minor. Dod. pempt. 51 Habitat in Asia, Africa. 2.

Muscari.

7. HYACINTHUS corollis ovatis omnibus æqualibus. *Hort. cliff. 126. Hort. ups. 85. Koy. lugdb. 28.*

Hyacinthus racemosus moschatus. Bauh. pin. 43.

Muscari obsoletiore flore. Clus. hist. 1. p. 178.

Habitat in Asia, ultra Bosphorum, inde in Europam te 1554. 2.

monstrosum.

8. HYACINTHUS corollis subovatis. *Vir. cliff. 13*

Koy. lugdb. 28.

- β- Hyacinthus floribus paniculatis monstrosis. *Hort. cliff. 126.*

Hyacinthus panicula cærulea. Pauh. pin. 42.

Hyacinthus fannesi, panicula comosa. Col. ecphr. p. 10. t. 12.

Habitat - - - primum inventa in agro Papiensi, & ju Boran Gallæ. 2.

Videtur sequentis sola varietas?

HYACINTHUS corollis angulato - cylindricis: summis comosus.
 mis sterilibus longius pedicellatis.

Hyacinthus corollis globosis: summis pedunculatis, foliis ensiformibus. *Sauv. monsp.* 17.

Hyacinthus comosus major purpureus. *Bauh. pin.* 42.

Hyacinthus. *Cam. epit.* 798.

habitat in Galliæ & Europæ australis agris. 5

HYACINTHUS corollis globosis uniformibus, botryoides.
 foliis canaliculato-cylindricis strictis.

Hyacinthus corollis globosis. *Hort. cliff.* 126. *Hort. ups.* 85. *Roy. lugdb.* 28.

Hyacinthus corollis globosis, foliis in cylindrum convolutis. *Sauv. monsp.* 19.

Hyacinthus racemosus cæruleus major. *Bauh. pin.* 42.

Hyacinthus botryoides purpureus III. *Clus. hist.* I. p. 181.

Hyacinthus botryoides cæruleus amœnus. *Lob. ic.* 108.

habitat in Italia.

differt Floribus inodoris & foliis erectis a sequenti, cui Flores odori & Folia patenti decumbentia carinata.

HYACINTHUS corollis ovatis: summis sessilibus, foliis laxis. *Sauv. monsp.* 17. racemosus.

Hyacinthus racemosus cæruleus minor juncifolius *Bauh. pin.* 43.

Hyacinthus botryoides I. *Clus. hist.* I. p. 181.

habitat in Europa australi. 4

HYACINTHUS corollis sexpartitis: petalis tribus exterioribus brevioribus. Orchioides.

Hyacinthus orchioides africanus. major. bifolius maculatus, flore sulphureo obsoleto majore *Breyn. prodr.* 3 p. 24 t. 11. f. 1, 2, 3.

Hyacinthus angustifolia maculata. *Buxb. cent.* 3. p. 10. t. 16.

Hyacinthus hyacinthoides, foliis caule & floribus maculatis. *Buxb. cent.* 3. p. 12. t. 20.

habitat in Æthiopia. 4

folia duo, paniculata, ovato-oblonga. Racemus Floribus copiosissimis, violaceis. Corollæ vix ad basim sexpartitæ: Petala exteriora alterna ovata, breviora; interiora, obovata, longiora.

HYACINTHUS corollis lanatis, caule ramoso. lanatus.

Roy. lugdb. 27.

habitat - - - -

A L E T R I S.

- farinosa. 1. ALETRIS acaulis, foliis lanceolatis membranacae
 floribus alternis.
*Aletris. Amæn. acad. 3. p. 11. **
Hyacinthus caule nudo, foliis linguiformibus acur-
tis dentatis. Gron. virg. 38.
Hyacinthus floridanus spicatus. Pluk. amalt. 11
437. f. 2.
Habitat in America septentrionali. 24.
- capensis. 2. ALETRIS acaulis foliis lanceolatis undulatis, l
 ovata, floribus nutantibus.
Habitat ad Cap. b. spei. 24
- Hyacinthol-
 des, 3. ALETRIS acaulis, foliis lanceolatis carnosis, l
 bus geminatis.
Aloë hyacinthoides floribus sessilibus horizontalib
fundibuliformibus æqualibus limbo revolutis. S
321.
Aloë foliis lanceolatis planis rectis radicalibus. 1
cliff. 132. Hort. upf. 85. Fl. zeyl. 130.
Katu Kapel. Rheed. mal. 11. p. 83. t. 42 ?
- Zeylanica. α. Aloë zeylanica pumila, foliis variegatis. Comm.
 2. p. 41. t. 21. Pluk. alm. 19. t. 256. f. 5.
Aloë foliis exterioribus lanceolatis planis erectis
calibus, interioribus longissimis subulatis arc
Roy. lugdb. 23.
- guineensis. β. Aloë guineensis, radice geniculata, foliis e vir
 atro undulatis variegatis. Comm. hort. 2. p.
 21. præl. 84. t. 33.
Habitat α in Zeylona, β, in Guinea. 24.
Flores non vidi; figura corollæ Hyacinthi; etiam
germinis n. clariferis tribus. æntiqua tamen hujus
ris videtur; varietas α foliis quibusdam long
subulatis compressis, ab altera β foliis lanceolatis
bus differt, nec tamen specie videtur aliena.
- fragrans. 4. ALETRIS caulescens, foliis lanceolatis laxis.
Aloë africana arborescens, floribus albicantibus
grantissimis. Comm. hort. 2. p. 7. t. 4. 3 1. p. 93.
Habitat in Africa. 5

Y U C C A.

- gloriosa. 1. YUCCA foliis integerrimis. Vir. cliff. 29.
Yucca foliis margine integerrimis. Hort. cliff.
Hort. upf. 88. Roy. lugdb. 29.

ca foliis aloës. *Bauh. pin.* 91.

ca indica, foliis aloës. *Barr. rar.* 70. t. 1194.

ca ylyline foliis pungentibus integerrimis. *Roy. lugdb.* 22.

ca *tat in* Canada, Peru. †

CCA foliis crenulatis strictis.

aliofolia.

ca foliis crenulatis. *Vir. cliff.* 29.

ca foliorum margine crenulato. *Hort. cliff.* 120. α.

ca arborefcens, foliis rigidioribus rectis serratis.

ll. elh. 435. t. 323. f. 416.

ca, yuccæ foliis, caulefcens. *Pluk. alm.* 19. t. 256.

4

ca americana, yuccæ folio, arborefcens. *Comm.*

el. 64. t. 14.

ca *tat in* Jamaica, Vera Cruce. †

CCA foliis crenatis nutantibus.

draconis.

ca foliorum margine crenulato. *Hort. cliff.* 130. β.

ort. upf. 88.

ca draconis folio serrato. *Dill. elh.* 437. t. 324 f.

7. *Comm. præl.* 42. 67. t. 16.

ca coni arbori affinis americana. *Bauh. pin.* 506.

ca ylyline foliis pungentibus crenatis. *Roy. lugdb.* 22.

ca *tat in* America. †

CCA foliis serrato-filamentosis.

filamentosa.

ca foliis lanceolatis acuminatis integerrimis margi-

-filamentosis. *Gron. virg.* 152. *Trew. ehret.* t. 37.

ca foliis filamentosis. *Morif. hist.* 2. p. 419.

ca virginiana, foliis per marginem apprime filatis.

Pluk. alm. 396.

ca *tat in* Virginia. †

A L O E.

OE floribus pedunculis cernuis corymbosis sub- perfoliata.
-cylindricis.

ca foliis caulnis dentatis amplexicaulibus vaginan-

-ous. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upf.* 86. *Roy. lugdb.* 23.

ca è africana caulefcens, foliis magis glaucis caulem

implectentibus & in mucronem obtusiozem desinen-

-ous. *Comm. præl.* 68. t. 17. *rar.* 44. t. 44.

ca è africana caulefcens, foliis minus glaucis, dor-

-parte suprema spinosa. *Comm. præl.* 69. t. 18.

ca è africana caulefcens, foliis glaucis latioribus &

caudique spinosis. *Comm. præl.* 70. t. 19.

2. Aloë africana caulescens, foliis glaucis breviter
 foliorum summitate interna & externa nonnihil
 nosa. *Comm. præl.* 73. t. 22. *rar.* 45. t. 45.
3. Aloë africana caulescens, foliis glaucis: dorso in
 spinoso. *Comm. præl.* 71. t. 20; *hort.* 2. t. 13.
gert. 71. *
4. Aloë africana caulescens, foliis glaucis breviter
 foliorum parte interna & externa nonnihil sicut
Comm. præl. 71. t. 21.
- Aloë africana caulescens, foliis glaucis caulibus
 plectentibus. *Comm. hort.* 2. p. 27. t. 14.
5. Aloë africana caulescens, foliis spinosis maculis
 utraque parte albicantibus notatis. *Comm. hort.*
 9. t. 5.
6. Aloë africana caulescens perfoliata glauca & no-
 nosa. *Comm. præl.* 74. t. 23.
7. Aloë africana, foliis glaucis: margine & dorso
 superiore spinosis, flore rubro. *Comm. præl.* 75
hort. 2. p. 23. t. 12.
8. Aloë africana maculata spinosa major. *Dill. elth.*
 t. 14. f. 15.
9. Aloë africana maculata spinosa minor. *Dill. elth.*
 t. 14. f. 16.
10. Aloë africana mitriformis spinosa. *Dill. elth.* 21.
 f. 19.
11. Aloë succotrina angustifolia spinosa, flore purpureo
Comm. hort. 1. p. 91. t. 48.
- Aloë americana, ananæ floribus suave rubentibus
alm. 19. t. 240. f. 4.
- humilis.* 12. Aloë foliis erectis subulatis radicatis undique in
 spinosis. *Hort. cliff.* 131. *Roy. lugdb.* 24.
- Aloë africana humilis, spinis inermibus & verrucosis
 obsita. *Comm. præl.* 77. t. 26. *rar.* 46. t. 46.
- Habitat in Æthiopia.* ̄
- Plantam 2 ad hanc speciem pertinere docuere flores,*
vis habitu videatur aliena.
- vera.* 13. Aloë foliis spinosis confertis dentatis vaginatis
 planis maculatis. *Hort. cliff.* 130. *Hort. upl.* 86.
med. 160. *Roy. lugdb.* 22. *Brown. jam.* 197.
- Aloë vulgaris. *Bauh. pin.* 286.
- Kadanaku s. Catevala. *Rheed. mal.* 11. p. 7. t. 3.
- Habitat in Indiis, Africa, at 14. in Italiæ, Siciliæ*
Melitæ testis, muris. ̄

eræ inflorescentia & Flores omnino *A. perfoliata* e-
que gemina varietas, quamvis Corolla fere minus
vifa mihi apparuit.

OE floribus pedunculatis cernuis racemosis pri- variegata,
maticis: ore patulo æquali.

foliis canaliculatis trifariam imbricatis radicatis
ectis: angulis cartilagineis ternis. *Hort. cliff.* 132.
Hort. upf. 87. *Roy. lugdb.* 24.

æ africana humilis, foliis ex albo viridi variegatis.
mm. præl. 79. t. 28. *rar.* 27. t. 27. *Till. pis.* 7. t. 7.
itat in Æthiopiæ argillofis. 2

OE floribus pedunculatis pendulis ovata-cylindri- disticha,
curvis.

foliis linguiformibus patulis distichis. *Hort. cliff.*
2. *Hort. upf.* 86. *Roy. lugdb.* 23.

æ africana, flore rubro, folio maculis albicantibus
utraque parte notato. *Comm. hort.* 2. p. 15. t. 8.

æ africana flore rubro, folio triangulari & verru-
s albicantibus ab utraque parte notato. *Comm. hort.*
p. 17. t. 9.

æ africana sessilis, foliis carinatis verrucosis. *Dill.*
h. 22. t. 18. f. 20. *Mill. dict.* t. 19.

æ africana, foliis planis conjugatis carinatis verru-
dis, caule & flore corallii colore. *Mart. cent.* 11.
11.

æ africana arborescens montana non spinosa, folio
ngissimo plicatili, flore rubro. *Comm. hort.* 2. p. 5.

3.
itat in Africæ rupibus. 5.

OE floribus sessilibus ovatis crenatis: segmentis spiralis,
terioribus conniventibus.

foliis ovatis acuminatis caulinis quinquefariam
imbricatis. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upf.* 87. *Roy.*
gdb. 23.

æ africana erecta rotunda, folio parvo & in acu-
en acutissimum exeunte. *Dill. elth.* 16. t. 13. f. 14.
mm. præl. 83. t. 32.

itat in Africæ campestribus. 5

OE floribus sessilibus triquetris bilabiatis: labio in- retusa,
riore revoluto.

foliis rhomboidalibus ventricosus quinquefariam
posi-

positis radicatis triquetris plano exstantibus.
cliff. 132. Hort. upf. 87. Roy. lugdb. 24.

Aloë africana, brevissimo crassissimoque folio
viridi. *Comm. hort. 2. p. 11. t. 6. Till. pis. 6.*
Habitat in Africæ argillofis. 24

viscosa.

6. ALOE floribus sessilibus infundibuliformibus
tis: lacinis quinque revolutis: summa erect
Aloë foliis caniculatis trifariam imbricatis:
apice reflexo-patulis. *Hort. cliff. 132. Hort.*
Roy. lugdb. 23.

Aloë africana erecta triangularis & triangulari
f. scolo. *Comm. præl. 82. t. 31. Till. pis. 16. t.*
elth. 15. t. 13. f. 13.

Habitat in Æthiopiæ campestribus. 24

pumila.

7. ALOE floribus sessilibus bilabiatis: labio fi
erectiore, inferiore recurvato.

Margariti- a. Aloë foliis ovato-subulatis acuminatis tuberc
fera. tilagineis undique adspersis. Hort. cliff. 13
lugdb. 24.

Aloë africana, folio in summitate triangulari,
ritifera, flore subviridi. *Comm. hort. 2. p. 1*

Aloë africana margaritifera, folio undique ven
merosissimis. *Bradl. succ. 3. p. 1. t. 21.*

β. Aloë africana margaritifera minor. *Comm. ho*
21. t. 11. Dill. elth. 19. t. 16. f. 17.

γ. Aloë africana margaritifera minima. *Comm. 1*
Dill. elth. 20. t. 16. f. 18.

Arachnoides. δ. Aloë africana humilis arachnoidea. Comm.
t. 27.

ε. Aloë foliis ovato-lanceolatis carnosis apice tri
angulis inerme dentatis. *Hort. cliff. 131. 1*
86. Roy. lugdb. 24.

Aloë africana minima atroviridis, spinis herb
merosis ornata. *Boerh. lugdb. 2. p. 131. t. 1*
succ. 3. p. 12. t. 30.

Habitat in Æthiopiæ campestribus. 24

Flores in hoc genere specierum certissimi indic
gunt Margaritiferam & Arachnoideam.

Uvaria.

8. ALOE floribus sessilibus reflexis imbricati
ticis.

Aloë foliis linearibus radicalibus membranace
cliff. 133. Roy. lugdb. 23.

loë africana, follo triangulâri longiffimo & anguffiffimo, floribus lutelis fœtidis. *Comm. hort. 2. p. 29. t. 15. Seb. thef. 1. p. 29. t. 19. f. 3.*
habitat ad Cap. b. Spel. 24.

A G A V E.

GAVE foliis dentato-spinofis, fcapo ramofo. *Amœn. americana. acad. 3. p. 22.*

ave foliis spinofodentatis mucronatifque. *Hort. pf. 81.*

œ foliis lanceolatis dentatis fпина terminatis radicalibus. *Hort. cliff. 130. Roy. lugdb. 22.*

œ folio in oblongum mucronem abeunte. *Bauh. pin. 286.*

itat in America calidiore. *Cortufus plantam primus in Europa habuit 1561. (Cam. hort. 11.) hodie ab Sepes in Lufitania. 5*

AVE foliis dentatis, ftaminibus corollam æquanvivi-
 bus.

americana polygonâ. *Comm. præf. 65. t. 15.*

americana. *Rumph. amb. 5. p. 273. t. 94.*

itat in America.

er. Aloë americana fobolifera. *Herm. lugdb. 16. 17.*

AVE foliis dentato-spinofis, fcapo fimpliciffimo, virginica.
 moen. *acad. 3. p. 22.*

foliis lanceolatis fпина cartilagineâ terminatis,
 ribus alternis feffilibus. *Amœn. acad. 3. p. 22.*

itat in Virginia. 24

AVE foliis integerrimis. *Amœn. acad. 3. p. 22. fœtida.*

foliis integerrimis patientifculis aculeo termina-
 ra, radice caulefcente. *Hort. cliff. 132.*

americana viridi rigidiffimo & fœtido folio, Piet
 ta indigenis. *Comm. hort. 2. p. 35. t. 18.*

americana, radice tuberofâ, minor. *Pluk. alm. t. 258. f. 2.*

itat in Curaffao. 5

ALSTROEMERIA.

TROEMERIA caule erecto. *Amœn. acad. 6. p. pelagica*
 He-

Hemerocallis floribus purpurascensibus macul
will. peruv. 2. p. 711. t. 5.

Habitat in Peru & Lima. 24.

Folia resupinata, Flores pulcherrime variegati.

Ligta.

2. ALSTROEMERIA caule ascendente. †
Hemerocallis floribus purpurascensibus striatis
peruv. 2. p. 710. t. 4.

Habitat in Lima.

Salifita.

3. ALSTROEMERIA caule volubili †
Hemerocallis scandens, floribus purpureis.
peruv. 2. p. 713. t. 6.

Habitat in Lima.

HEMEROCALLIS.

flava.

1. HEMEROCALLIS corollis flavis.
Hemerocallis scapo ramoso, corollis mon
Hort. upf. 88.
Hemerocallis radice tuberosa, corollis mon
Hort. cliff. 128. Roy. lugdb. 26.
Hemerocallis radice tuberosa, corollis monop
teis. Gmel. sibir. 1. p. 37.
Lilio-Asphodelus luteo flore. Clus. hist. 1. p. 1.
Lilium luteum, asphodeli radice. Bauh. pin.
Habitat in Sibiria, Hungariae campis uliginos

fulva.

2. HEMEROCALLIS corollis fulvis.
Lilio Asphodelus puniceus. Clus. hist. 1. p. 1.
Lilium rubrum, asphodeli radice. Bauh. pin.
Habitat in China. 24.
Specie diversa haec esse videtur, nec tamen
tiam reperi; haec major, illa minor; haec fla
vis, illa flavis; haec Maturationis, illa Gross
mense floret.

A C O R U S.

Calamus.

1. ACORUS. Roy. lugdb. 6. Fl. svec. 277, 29
med. 16.

vulgaris.

2. Acorus verus s. Calamus aromaticus offi
Bauh. pin. 34. Hort. cliff. 137.
Typha aromatica, clava rugosa. Morif. hist. 2
f. 8. t. 13. f. 4.

Acorus asiaticus, radice tenuiore. *Herm. lugdb.* 9. *verus.*
Fl. zeyl. 132.

Acorum. *Rumph. amb.* 5. p. 178. t. 72. f. 1.

Waambu. *Rheed. mal.* 11. p. 99. t. 60.

Habitat in Europæ, s. in Indiæ fossis paludosis. 2

ORONTIUM.

ORONTIUM. *Amen. acad.* 3. p. 17. t. 1. f. 3. * *aquaticum.*

Kalm. it. 3. p. 54.

rum folio enervi ovato. *Gron. virg.* 113.

rum fluitans, pene nudo. *Banist. virg.* 1924. *Catech.*
car. 1. p. 82. t. 82.

Habitat in Virginæ, Canadæ paludibus, scaturigini-
bus. 2

CALAMUS.

CALAMUS.

Rotang.

rundo zeylanica spinosissima major, fructibus rotun-
dis scabris acidis. *Burm. zeyl.* 36. *Fl. zeyl.* 468.

rundo nucifera Rotang dicta, fructu spadicei colo-
ris striis purpureis venuste tessulato. *Pluk. alm.* 52.

rundo Rotang dicta. *Pis. mant.* 188.

fructus cannæ de Benghala. *Bauh. pin.* 405.

Sieru Tsiurel. *Rheed. mal.* 12. p. 121. t. 64, 65.

almjuncus Calapparius. *Rumph. amb.* 5. p. 88. t. 51.

almjuncus niger. *Rumph. amb.* 5. p. 101. t. 52.

almjuncus albus. *Rumph. amb.* 5. p. 101. t. 53.

almjuncus verus. *Rumph. amb.* 5. p. 105. t. 54.

almjuncus viminalis. *Rumph. amb.* 5. p. 108. t. 55.

almjuncus equestris. *Rumph. amb.* 5. p. 110. t. 56. &
 57. f. 1.

almjuncus zalacca. *Rumph. amb.* 5. p. 115. t. 57. f. 2.

almjuncus Draco. *Rumph. amb.* 5. p. 114. t. 58. f. 1.

Habitat in Indiæ sylvis juxta fluentia. 5

JUNCUS.

* *Culis nudis.*

JUNCUS culmo subnudo tereti mucronato, panicu- *acutus.*

la terminali, involucrio diphylo spinoso.

ncus culmo pungente, panicula ex folii solitarii a-
xilla. *Sauv. monsp.* 9.

ncus panicula universalis culmo brevior infime co-
arcta, secundariis paululum laxis, capsulis triquetro-
subovatis nitentibus. *Guett. stamp.* 2. p. 412.

Jun-

- Juncus acutus*, capitulis *sorghii*. *Bauh. hist.* 2. p. *Morif. hist.* 3. p. 232. f. 8. t. 10. f. 15.
- β. *Juncus panicula* universali culmo longiore, se-
riis laxis longe pedunculatis: media præcipue.
Stamp. 2. p. 412.
Juncus acutus maritimus anglicus. *Raj. hist.*
Morif. ibid. f. 14.
Habitat in Angliæ, Galliæ, Italiæ maritimis p-
sis. 24
- conglomera- 2. JUNCUS culmo nudo stricto, capitulo laterali
tus, *lugdb.* 44. *Fl. svec.* 278, 298.
Juncus lævis, panicula non sparsa. *Bauh. pi-*
theatr. 183.
Juncus lævis, panicula conglomerata. *Scheuch.*
343.
Juncus. *Cam. epit.* 780.
Habitat in Europæ borealis uliginosis. 24
- effusus. 3. JUNCUS culmo nudo stricto, panicula laterali
lugdb. 44. *Fl. svec.* 279, 299.
α. *Juncus culmo nudo acuminato ad basin squam-*
floribus sessilibus. *Fl. lapp.* 116. *Hall. helv.* 254
Juncoides alpinum, flosculis junci glomeratis
fuscis. *Scheuch. hist.* 323.
β. *Juncus culmo nudo acuminato ad basin squam-*
floribus pedunculatis. *Fl. lapp.* 117. *Gron. v. v.*
Juncus lævis, panicula sparsa, major. *Bauh. pi-*
theatr. 182. *Scheuch. gram.* 341.
Juncus lævis. *Dod. pempt.* 606.
Habitat in Europæ uliginosis, α in alpihus. 24
- inflexus. 4. JUNCUS culmo nudo: apice membranaceo l-
vo panicula laterali.
Juncus culmo nudo, paniculam arcuatim teg-
Sauv. monsp. 9.
Juncus, acumine reflexo, major. *Bauh. pin.* 12. |
184. *Morif. hist.* 3. p. 233. f. 8. t. 10. f. 25. *B.*
204. *Hall. helv.* 252.
β. *Juncus*, acumine reflexo, alter. *Bauh. pin.* 12. |
22. *Scheuch. gram.* 345.
γ. *Juncus panicula* universali laterali culmo longior
cundartis sparsis. *Guett. Stamp.* 412.
Juncus acutus panicula sparsa. *Bauh. pin.* 11.
Habitat in Europa australi. 24

JUNCUS culmo nudo filiformi nutante, panicula filiformis. laterali. *Roy. lugdb.* 44. *Gron. virg.* 152. *Fl. succ.* 280, 300.

Juncus parvus, calamo supra paniculam longius producto. *Raj. angl.* 3. p. 432. *Fl. lapp.* 118.

Juncus lævis, panicula sparsa, minor. *Bauh. pin.* 12. *theatr.* 183. *Scheuch. gram.* 347. t. 7. f. 1.

Habitat in Europæ uliginoso-paludosis turfosis. 24

JUNCUS culmo nudo, foliis floribusque tribus terminalibus *Fl. lapp.* 119. *Fl. succ.* 281, 301. *Roy. lugdb.* 43. *Hall. helv.* 253.

Juncus, acumine reflexo, minor & trifidus. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 22. t. 22. *theatr.* 186.

Juncoides alpinum trifidum. *Scheuch. gram.* 325.

Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Pyrenæis. 24

JUNCUS culmo nudo, foliis setaceis, capitulis glomeratis aphyllis. *Fl. succ.* 282, 302.

Juncus foliis setaceis, culmo nudo, capitulis glomeratis terminalibus. *Roy. lugdb.* 44.

Juncus montanus palustris. *Raj. hist.* 1303. *Fl. lapp.* 121.

Juncus ramen junceum, foliis & spica junci. *Bauh. pin.* 5.

Juncus ramen junceum, semine acuminato. *Læf. pruis.* 15. t. 29.

Habitat in Europæ borealis cespitosis. 24

* *Culmis foliosis.*

JUNCUS foliis nodoso-articulatis, petalis obtusis, articulatus. *Fl. succ.* 285, 303.

Juncus foliis articulosis, panicula inæquali, capitulis sessilibus, capsulis subulatis triquetris. *Roy. lugdb.* 43.

Juncus foliis articulosis, floribus umbellatis. *Tournef. inst.* 247. *Fl. lapp.* 120.

Juncus ramen junceum, folio articulato, aquaticum. *Bauh. pin.* 5. *prodr.* 12. *theatr.* 76. *Scheuch. gram.* 331.

Juncus ramen junceum, folio articulato, cum utriculis. *Bauh. prodr.* 12. *Scheuch. gram.* 333.

Juncus alpinus, folio articulato. *Scheuch. gram.* 333.

Juncus ramen junceum, folio articulato, sylvaticum. *Bauh. pin.* 5. *theatr.* 75. *Voisif. hist.* 3. p. 227. f. 8. t. 9.

f. 1. *Scheuch. gram.* 334.

Spec. plant. pars I.

Gg

ð: Jun-

8. Junci foliosi, foliis per ficitatem nodosis. *Mind*
38. n. 1. - 13.
Habitat in Europæ aquosis. 24
- nodosus. 9. JUNCUS foliis nodoso-articulatis, petalis
natis.
Juncus foliosus minor, pericarpis ovatis, ameri
Gron. virg. 15.
Gramen junceum elatius, pericarpis ovatis. *Pfl*
179. t. 92. f. 9.
Gramen junceum virginianum, calyculis paleac
corne. *Morij. hist.* 3. p. 228. f. 8. t. 9. f. 11.
Habitat in America septentrionali. 24
Simillimus J. articulato, sed Flores magis cu
capitulis rarioribus, majoribus & paniculae rari
plices, nec supradecompositi; imprimis disti
petalis in acumen subulatum protrahis.
- bulbosus. 10. JUNCUS foliis linearibus canaliculatis, capsi
tulis. *Fl. svec.* 284, 304. *Mees. frif.* 160.
Juncus foliis linearibus canaliculato concavis, c
triangularibus *Guett. flamp.* 1: 4.
Juncus foliis angulatis, culmo subnudo, panici
minali prolifera, capitulis ovatis. *Roy. lugdb.*
Juncus parvus cum pericarpis rotundis. *Bauh.*
p. 522.
Juncus repens apocarpos minor. *Barr. ic.* 114
Gramen junceum, foliis & spica junci. *Bauh.*
theatr. 78. *Scheuch, gram.* 322.
Gramen junceum, junci sparsa panicula. *Mor*
3. p. 227. f. 8. t. 9. f. 11.
Habitat in Europæ pascuis sterilibus & ad vias.
Radix repens, densa. Culmi filiformes, subco
Folia linearia, lævia, subtus convexa & j
supra canaliculata. Folium florale longitudi
nymbi. Corymbus communis & partiales
les. Capsulæ ovatae, fusca, nitida.
- bufonius. 11. JUNCUS culmo dichotomo, foliis angulati
ribus solitariis sessilibus. *Roy. lugdb.* 43 *Fl. sv*
305 *Hall. helv.* 254. *Gort. in gr.* 52.
Juncus palustris humilior, panicula laxissima.
jen. 130. *Fl. lupp.* 122.

nen nemorosum, calyculis paleaceis, erectum.
Heuch. gram. 327.

nen nemorosum, calyculis paleaceis. *Bauh. pin. theatr. 100.*

osteum. *Lob. ic. 18.*

nen nemorosum, calyculis paleaceis, repens
Heuch. gram. 329.

nen nemorosum, calyculis paleaceis, species
era procerior. *Scheuch. gram. 328.*

nen bufonium erectum angustifolium majus. *Barr. 264.*

nen holosteum alpinum minimum. *Bauh. pin. 7. odr. 64. theatr. 101.*

nen juncoides minimum anglo-britannicum. *Raj. gl. 3. p. 434.*

itat in Europæ inundatis. ☉

headed cobweb mushroom. *Pet. gaz. 51. f. 7. hujus fans, paucis lecta.*

NCUS foliis fetaceis depressiusculis, pedunculis *Aygius,*
minis terminalibus, glumis solitariis subbifloris.
itat in Sveciæ paludibus, cæspitosis sylvaticis pro-
ndis. 24

ni *Spithamei*, simplices. Folia lineari-subulata,
titudine culmi, erecta, depressa, lævia, tria: 1. ad
dicem. 2. in medio culmi. 3. culmum instar spathe
terminans. Pedunculi duo, terminales: Gluma biflo-
rosculis duobus, sessilibus, gluma longioribus. Pe-
la exteriora angustiora, acutiora, concava, extus
purascentia; Interiora pallida. Stamina filiformia.
antheræ flavæ. Germen majusculum. Stylus albus.
ligmata tria, reflexa.

NCUS folio subulato, gluma biflora terminali. *biglumis.*
*mæn. acad. 2. p. 266. t. 3. f. 3. *. Fl. svec. 2. n. 27.*

itat in Alpibus Lapponicis. *D. Montin. 24.*
ta faciem gerit *Schæni ferruginei.*

NCUS foliis planis, gluma triflora terminali. *triglumis.*
l. Svec. 286; 306.

us gluma triflora culmum terminante. *Fl. lapp. 115. 10. f. 5.*

Juncus exiguus montanus mucrone carens. *Bauh*
12 *prodr.* 22. *theatr.* 183. *Rudb. clyf.* 1. p. 103
Habitat frequens in Alpibus Lapponicis, Turo-
dienli. 4

Pilosus. 15. **JUNCUS** foliis planis pilosis, corymbo
Fl. Suec. 287 308.

Juncus foliis planis, panicula diffusa, peduncul-
literis: floſculis intermediis ſeſſilibus. *Roy. la*
Gramen nemoroſum hirtutum latifolium majus.
pin. 7. *Moriſ. hiſt.* 3. p. 225. f. 8. t. 9. f. 1.

β. *Gramen hirtutum anguſtifolium perenne, lini-*
lis. *Larr. ic* 740.

γ. *Juncus foliis planis, culmo paniculato, florib-*
ſi. *Fl. lapp.* 124.

Gramen hirtutum nemoroſum anguſtifolium al-
paniculis obſcure ruſcentibus. *Scheuch. gra*
t. 6.

δ. *Gramen nemoroſum hirtutum latifolium majus.* *!*
gram. 317.

Gramen hirtutum latifolium maximum, junce-
cula. *Moriſ. hiſt.* 3. p. 225. f. 8. t. 9. f. 2.

ε. *Gramen hirtutum anguſtifolium majus.* *Bauh.*
prodr. 16 *theatr.* 105. *Moriſ. hiſt.* 3. p. 22;
t. 9. f. 3. *Sch. uch. gram.* 318.

ζ. *Gramen hirtutum latifolium minus.* *Bauh. theat*
Habitat in Europæ ſylvis, at varietates β. δ. ε.
Europæ auſtraliſioribus; γ, in Alpibus. 4

niveus. 16. **JUNCUS** foliis planis ſubpilosis, corymbi
brevioribus, floribus ſcaſculatis.

Juncus foliis planis anguſtioribus, panicula um-
foliis brevioribus, floribus longiſſimis albis. *Ha*
237.

Juncoides montanum nemoroſum, flore niveo. *S*
gram. 320.

Gramen hirtutum anguſtifolium minus, paniculis
Bauh. pin. 7. *theatr.* 106. *Moriſ. hiſt.* 3. f. 8
f. 39.

Habitat in Alpibus Bohemicis, Helveticis, Rh
Monſpelii. 4

ſampeſtris. 17. **JUNCUS** foliis planis ſubpilosis, ſpicis ſeſ-
pedunculatiſque. *Fl. Suec.* 288, 309.

s foliis planis, panicula rara, spicis sessilibus pe-
culatisque. *Hort. cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 42.
n. *virg.* 38.

s villosus, capitulis psyllii. *Tournef. inst.* 246.
lapp. 126.

ides villosum, capitulis psyllii. *Scheuch. gram.*

en hirsutum, capitulis psyllii. *Bauh. pin.* 7. *theatr.*

is foliis planis, culmo paniculato, spicis ovatis.
lapp. 127. t. 10. f. 2.

ides hirsutum, capitulo glomerato. *Scheuch.*
n. 312.

en hirsutum, capitulo globoso. *Bauh. pin.* 7.
tr. 104.

is montanum nemorosum villosum latifolium
ius, capitulis florum candidis & splendentibus.
ch. gen. 42.

ides latifolium alpinum glabrum, panicula sub-
ra splendente. *Scheuch. gram.* 314.

en hirsutum elatius, panicula juncea compacta.
angl. 3. p. 416.

ides bohemicum, panicula minore nigricante,
oo super eandem erecto & longius producto,
ch. gen. 42.

it in Europæ pascuis siccioribus. 2.

UCUS foliis planis, spica racemosa nutante. spicatus.
lapp. 125. t. 10. f. 4. *Fl. succ.* 289, 310.

s alpinus latifolius, panicula racemosa nigricante
idula. *Till. pis.* 91.

at in Lapponiæ Alpibus. 2.

ACHRAS.

IRAS floribus solitariis, foliis cuneiformi-lan- mammosa.
latis.

is. *Læfl. it.* 186?

ia, fructu ovato majore. *Plum. gen.* 43.

oxylon inerme, calycibus decaphyllis. *Jacq.*
tr. 15.

s Persica maxima, foliis magnis integris longis,
ctu maximo oblongo scabro: officulo partim ru-
o partim glabro. *Sloan. jam.* 2. p. 124. t. 218.

r americana pomifera, frondosis ramulis, foliis

amplis longioribus obtusis duris & venosis ma
 æquali. *Pluk. alm.* 39. t. 268. f. 2.

Fructus oblongus utrinque acuminatus f. conicu
 vis splendens spadiceus. *Raj. hist.* 1800.

β. *Achras* fructu elliptico scabro majori, floribus
 riis alaribus. *Brown. jam.* 200. t. 19. f. 3?

Habitat in America meridionali. †

Hujus Flores mihi non visi.

Sapota. 2. *ACHRAS* floribus solitariis, foliis ovato-obl
Achras brachiatus diffusus, fructu subrotundo c
 cula mucrone brevi. *Brown. jam.* 200.

Anona foliis laurinis glabris viridi-fuscis, fructu
 re. *Sloan. jam.* 206. *hist.* 2. p. 171. t. 230. *Raj.*
 78. *Catesb. car.* 2. p. 87. t. 87.

β. *Achras* caudice altissimo, fructu minori, semin
 cronato. *Brown. jam.* 201.

Sapota fructu turbinato minori. *Plum. gen.* 43.

Anona maxima, foliis laurinis glabris viridi-f
 fructu minimo. *Sloan. jam.* 206. *hist.* 2. p. 172.
 f. 2. *Raj. dendr.* 79.

Habitat in America meridionali. †

Salicifolia. 3. *ACHRAS* floribus confertis, foliis lanceolato-c
Achras foliis oblongis nitidis utrinque productis
 bus confertis, fasciculis infra frondes sparsis. *L*
jam. 201. t. 17. f. 4.

Salicis folio lato splendente arbor, floribus parv
 lide luteis pentapetalis e ramulorum laterib
 fertim exeuntibus. *Sloan. jam.* 170. *hist.* 2. p.
 206. f. 2.

Habitat in America meridionali. †

RICHARDIA.

scabra. 1. *RICHARDIA.* *Houft. mss.*

Habitat in Vera Cruce. 24

Planta ex stellatis XLIV. Caulis altus, brach
 subarticulatus, obsolete tetragonus, hispida
 rigidiusculis, sparsis, reflexis. Folia lanceolat
 ta, alternatim nervosa, integerrima, subpet
 scabra. Flores in capitula terminalia, passim
 in verticillos congesti; capitula terminalia,
 Foliis 4 vel pluribus, scilicet alternis minoribus
 colluæ ut in *Asperulis*, tenues, longæ, J

♀ & fructus ex 3 seminibus; sic differt a Sperma-
e numero ♂ cæteris.

BURSER A.

BURSER A. Jacq. hist. t. 65.

gummifera.

binthus. *Brownii*. Jacq. amer. 18.

binthus foliis cordato-ovatis pinnatis, cortice læ-
rufescente, floribus masculis spicatis. *Brown. jam.*

5.
binthus major, betulæ cortice, fructu triangulari.
van. jam. 2. p. 89. t. 199. *Catesb. car.* 1. p. 30. t. 30.
cia foliis pinnatis deciduis, foliolis ovatis. *Sp. pl.*
p. 1026.

ruba. *Mat. med.* 535?

itat in America calidiore. †

PRINOS.

NOS foliis longitudinaliter serratis.

verticillatus

os. *Gron. virg.* 39. *

nna major latifolia dentata. *Munt. phyt.* 213. t. 51.
ifolium foliis deciduis. *Duham. arb.* 1. p. 62. t. 23.
itat in Virginia paludibus. †

NOS foliis apice serratis.

glaber.

ne foliis lanceolatis alternis sempervirentibus, flo-
rus axillaribus. *Mill. dict.* t. 83. f. 2.

ne vera floridanorum arbuscula baccifera, alater-
ferme facie, foliis alternatim sitis, tetrapyrene.
tesb. car. 2. p. 57. t. 57.

itat in Canada. *Kalm.* †

r. Foliis alternis, petiolatis, oblongis, consisten-
nus, glabris, versus apicem serraturis utrinque sæpius
nis, acutis, facie ferme *Myricæ*. Pedunculi axil-
ces, parvi, sæpius triflori. Flores non vidi.

BERBERIS.

RBERIS pedunculis racemosis. *Mat. med.* 290. vulgaris.
ron. orient. 120.

beris spinis triplicibus. *Hort. cliff.* 122. *Fl. svec.*

20, 311. *Roy. lugdb.* 438. *Hall. helv.* 424.

beris dumetorum. *Bauh. pin.* 454

beris vulgaris. f. *Crespinus*. *Cam. epit.* 86.

itat in Europæ sylvis, Oriente, Libano. †

Folia prima obovata, serrato-ciliata, inarticulata: pule utrinque dente capillari terminatæ: Caul alterna: horum infimum subpinatifidum dentibus nosis; reliqua mutata in spinas tripartitas. Fecundaria bina, oblonga, serrata, inter folia & spinas intra se occultant minora folia. Ergo F anni presentis, mutatis in spinas, insequentis a pantia prodibunt. An simile in ulla alia?

cretica. 2. BERBERIS pedunculis unifloris.

Berberis cretica, buxi folio. *Tournef. cor.* 49.

Berberis alpina cretica. *Bauh. pin.* 454.

Lycium creticum. *Alp. exot.* 21. t. 20.

Lycium e Candia. *Fon. ital.* 137.

Habitat in Creta. †

LORANTHUS.

Scurrula. 1. LORANTHUS pedunculis unifloris congestis, liis obovatis.

Scurrula. *Sp. pl.* 110.

Vicum vitice innascens. *Camell. lux.* 3. n. 36. *gaz.* t. 63 f. 8.

Habitat in China. †

Frutex parasiticus. Folia opposita, petiolata, integerrima, glabra, altero latere paulo latiora. res axillares, 3—6, propriis pedicellis. Ca inferne attenuata.

americanus, 2. LORANTHUS racemis subramosis æqualibus, ovatis. *Amæn. acad.* 5. p. 396. *

Loranthus americanus. *Sp. pl.* 1. p. 331. *Jacq.* t. 67.

Loranthus racemis, flore coccineo, baccis i *Vaill. act.* 1722. p. 274.

Lonicera flore coccineo, baccis nigris. *Plum. gen. ic.* 166. f. 1.

Scurrula parasitica, foliis ovatis oppositis, rarioribus alaribus. *Brown. jam.* 197.

Habitat in Americæ arboribus. †

occidentalis 3. LORANTHUS racemis simplicibus, floribus irrribus. *Læff. it.* 187. * *Amæn. acad.* 5. p. 396. n.

Scurrula parasitica, foliis majoribus subrotundis, florum simplicibus alaribus. *Brown. jam.* 197.

latioribus & subrotundis foliis, flore purpureo.
Jam. 168. hist. 2. p. 92. t. 200. f. 2. Raj.
 52?

in Americæ arboribus. †

ANTHUS floribus aggregato-capitatis.
 ca pedunculis multifloris, involucris pentaphyl-
 foliis ovato-lanceolatis petiolatis. *Fl. zeyl. 83.**
l. 1. p. 1. 175.

Lonicerioides.

menum surrectum, perficæ foliis, maderaspatata
Fluk. alm. 237. t. 212. f. 5.

ini. *Rheed. mal. 7. p. -- t. 27.*

in Asiæ arboribus. †

huic sæpius pentandri.

ANTHUS racemis trichotomis, pedunculis tri-
 s, floribus æqualibus. *Læfl. it. 187.*

Stelis.

in Cumanæ arboribus. †

FRANKENIA.

FRANKENIA foliis linearibus basi ciliatis.

lavis.

nia foliis confertis. *Roy. lugdb. 452.*

nia foliis aciformibus congestis. *Sauv. monsp. 46.*

floribus solitariis sessilibus, foliis prismaticis
 gularibus. *Guett. stamp. 2. p. 459.*

maritima supina saxatilis glauca ericoides sem-
 irens, flore purpureo. *Mich. gen. 23. t. 22. f. 1.*
 s supina maritima, ericæ facie. *Raj. angl. 3.*

llis repens italica, thymi foliis, rubente flore,
 goni facie. *Fill. pis. 46.*

Vermiculari marinæ non dissimilis planta. *Bauh.*
 3. p. 703.

onum fruticosum supinum ericoides cinereum,
 ni-folio, hispanicum. *Barr. ic. 714. Bocc. mus. 1.*
 t. 11.

onum maritimum minus, foliis serpylli. *Bauh.*
 281.

t in Europæ australis maritimis. 2.

FRANKENIA caulibus hirsutis, floribus fascicula-
 terminalibus.

maritima supina multiflora candida, caulibus
 rtis, foliis quasi vermiculatis. *Mich. gen. 23. t.*
f. 2.

Polygonum creticum; thymi folio. *Bauh. pin. prodr.* 131.

Alfina cretica maritima supina, caule hirsuto, quasi vermiculatis *Tournef. cor.* 45.

Habitat in Apulia, Creta.

pulverulenta.

3. **FRANKENIA** foliis obovatis retusis subtus paratis.

Frankenia foliis ovalibus. Sauv. monsp. 168.

Franca maritima quadrifolia supina, chamæsyces & facie. Mich. gen. 23.

Anthyllis valentina. Clus. hist. 2. p. 186.

Anthyllis marina, chamæsyces similis. Bauh. pin. Habitat in Sufexiæ, Narbonæ, italiæ, Apulioribus. ☉

In ordine Naturali ad XL. referatur.

PEPLIS.

Portula

1. **PEPLIS** floribus apetalis. *Fl. lapp.* 128. *Fl. suev.* 312. *Hall. helv.* 406.

Glaucoides palustre, portulacæ folio, flore purp. Mich. gen. 21. t. 18.

Glaux palustris, flore striato clauso, foliis portulacæ. T. Petit. gen. 43. t. 43.

Glaux aquatica, folio subrotundo. Læf. prof. t. 20.

Glaux altera, subrotundo folio. Vaill. parif. 80. f. 5.

Alfina palustris minor serpillifolia. Bauh. pin. 251. *Habitat in Europæ inundatis.* ☉

tetrandra. 2. **PEPLIS** floribus tetrandris monopetalis. *Jacq.* 18. t. 180. f. 29. *Amæn. acad.* 5. p. 412. *

Amannia hirta, floribus parvis orbiculatis, singularibus ad alas. Brown. jam. 145.

Habitat in Jamaica. ☉

DIGYNIA

VELEZIA,

sigida. 1. **VELEZIA.** *Læf.*

Silene foliis subulatis cauli appressis, calycibus dis intermedio longioribus. Sauv. monsp. 145.

Lyc.

HEXANDRIA DIGYNIA.

475.

is sylvestris minima, exiguo flore. *Bauh. pin. prodr.* 103.

is minima rigida cherleri. *Bauh. hist.* 3. p. 352. *hist.* 997.

is corniculata minor. *Barr. var.* 665. t. 1018. *v. Bocc. mus.* 2. p. 50. t. 43.

t in Europa australi. ☉

ia tenuissima difficillime numerantur; in siccis specibus 5 vidi; at in vivis circiter 6. *Læsting.* Si ordo naturalis sit n. XL, numerus naturalis erit inum sex, si vero XLII, erit quinque.

ORYZA.

ZA. *Bauh. pin.* 24. *theatr.* 479. *Cam. epit.* 192. sativa.

t. *pempt.* 509. *Catesb. car.* 1. p. 14. t. 14. *Hort.*

137. *Mat. med.* 174. *Roy. lugdb.* 58.

ut forte in Æthiopia, colitur in Indiæ paludo-

☉

ATRAPHAXIS.

APHAXIS ramis spinosis. *Hort. cliff.* 138. *Roy.* spinosa. *b.* 409.

ex orientalis, frutex aculeatus, flore pulchro.

urfes. cor. 38. *Buxb. cent.* 1. p. 19. t. 30. *Dill.*

47. t. 40. f. 47.

ut in Media ad urbem Hansen locis glareosis.

a fluvios. †

APHAXIS inermis.

haxis inermis, foliis undulatis. *Hort. cliff.* 137.

v. lugdb. 409.

cula africana repens, folio ad latera crispo, ad

ygona relata. *Dill. elth.* 36. t. 32. f. 36.

ut in Æthiopia? †

undulata.

TRIGYNIA.

FLAGELLARIA.

GELLARIA. *Fl. zeyl.* 133. *. *Amæn. acad.* 1. indica.

98. *Osborn.* it. 276.

uncus lævis. *Rumph. amb.* 5. p. 120. t. 59. f. 2.

nbu-valli. *Rheed. mal.* 7. p. 99. t. 53. *Raj. suppl.*

Ha-

Habitat in Java, Malabaria, Zeylona. b
Frutex humam altitudinem superans. Rami d
Affinitas proxima Calami

RUMEX.

• *Hermaphroditi: valvulis floris granulo notatis.*

- Patientia.** 1. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis inter-
 rimis: unica granifera, foliis cordatis. *Mat.*
 178.
Lapathum hortense, folio oblongo. Bauh. pin. 11
Lapathum sativum. Dod. pempt. 648.
Habitat in Italia. 2
Confer. Lapathum hortense latifolium. Bauh. pin. 2
- sanguineus.** 2. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis inter-
 mis: unica granifera, foliis cordato-lanceo-
Hort. cliff. 138. Hort. upf. 89. Mat. med. 528.
lugdb. 229.
Lapathum folio acuto rubente. Bauh. pin. 115.
Lapathum rubens. Dod. pempt. 650. Cam. epit. 229
Habitat in Virginia. ♂
Valvula exterior floris grano magno globofo rubro
ta, rarius ♂ altera grano minimo.
- crispus.** 3. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis inter-
 graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis.
 Rumex floribus hermaphroditis: valvulis integerr-
 planis, foliis cordato-oblongis. *Hort. cliff. 13*
svcc. 294, 314. Roy. lugdb. 229.
Rumex foliis cordato-oblongis acuminatis inter-
Fl. lapp. 129.
Lapathum folio acuto crispo. Bauh. pin. 115.
Lapathum acutum crispum. Tabern. ic. 436.
Habitat in Europæ humosis. 2
- verticillatus** 4. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis inter-
 mis: omnibus graniferis. foliis lanceolatis: va-
 cylindricis.
Lapathum aquaticum, foliis longis angustis acutis
ribus ad genicula verticillatim congestis. Gron
 39.
Habitat in Virginia. 2
- Britannica.** 5. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis inter-

omnibus graniferis, foliis lanceolatis : vaginis obsoletis. *Mat. med.* 17.

hex aquatica, calycis foliolis omnibus æqualibus, radice exterius nigra vel flava. *Cold. noveb.* 83.

anthum foliis longis latis vix acuminatis costis caulisque rubentibus, radice intus crocea. *Gron.*

fig. 39.

stat in Virginia. 24

Precedenti stipula cylindrica membranacea, fere ad nidium vaginans internodium, in hac vero non eadem, sed ut in Europæis. Pedicelli in priori crassiores, in hac capillares; prior magis spicata, hæc magis paniculata. *Plantam Gron. in Fl. virginica habet a Cl. Authore, quæ non rubra erat caule aut foliis.*

HEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis: unica granifera, foliis radicalibus panduriformibus. *pulcher.*

hex floribus hermaphroditis, foliis lyratis. *Guett. op. 1. p. 7.*

anthum ramis procumbentibus, feminis involucrio cincto, foliis inferioribus instar fidium. *Moris. hist.*

l. 580.

anthum pulchrum bononiense sinuatum. *Bauh. hist.*

l. 988. *Raj. hist.* 174.

stat in Anglia, Gallia, Italia. 24

Caulina lateribus non sinuata, ovato oblonga, inæquali. Rami floriferi recurvati. Calycis valvulæ ovatae, apice obtusæ; harum exterior granulum gerit, reliquæ vero granulum obsoletum habent.

HEX floribus hermaphroditis: valvulis trifido-*ægyptiacus.* baccatis: unica granifera. *Hort. upf.* 89.

hex floribus hermaphroditis, foliis oblongis, valvulis dentatis setaceis longissimis. *Wach. ultr.* 391.

anthum ægypticum, capsula feminis alba & crenata. *L. clth.* 191. t. 158. f. 191.

anthum ægyptiacum annuum, parietariæ foliis, capsula feminis longius barbata. *Till. pisf.* 43. t. 37. f. 1.

stat in Ægypto. ☉

HEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis: perficariolibus graniferis, foliis lanceolatis. *des.*

stat in Virginia. ☉

Planta spithamea, ramossissima. Folia lanceolata, tiolata, lævia, undata, integra: Floris dentibus utrinque tribus longis, omnes teeth pallidis magnis.

maritimus. 9. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis graniferis, foliis linearibus. *Lech. scan. 26. 248. Fl. svec. 2. n. 313.*

Lapathum aquaticum, luteolæ folio. *Tournef.*

Lapathum aquaticum, angustissimo acuminat

Bocc. mus. 2. p. 142. t. 104.

Anthoxanthon. Bauh. hist. 2. p. 987.

Habitat in Europæ littoribus maritimis.

divaricatus. 10. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis graniferis, foliis cordato oblongis obtusis p
tibus.

Lapathum arvense subhirsutum, folio retuso, longius brachiato, capsula seminis crenata.

93. t. 37. f. 2.

Habitat in Italia. ☉

acutus. 11. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis graniferis, foliis cordato-oblongis acutis
Hort. cliff. 138. Mat. med. 176. Fl. svec. 29. Roy. lugdb. 229.

Lapathum acutum s. Oxylapathum. *Bauh. h. 903. Lob. ic. 284.*

Lapathum acutum. *Raj. hist. 175.*

Habitat in Europæ succulentis. 24

obtusifolius. 12. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis graniferis, foliis cordato-oblongis obtusiusculatis.

Lapathum involucro seminis dentato, foliis ora crispula. *Hall. helv. 172.*

Lapathum sylvestre, folio subrotundo, seminis lucris dentatis. *Morif. hist. 2. p. 580.*

Lapathum folio minus acuto. *Bauh. pin. 111.*

Lapathum vulgare, folio obtuso. 1. B. *Raj. l. 1. Cam. epit. 228.*

Habitat in Sudermania, Germania, Helvetia, Anglia. 24

* * *Hermaphroditi: valvulis floris grano destit*

UMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis bucephalophorus.
tudis, pedicellis planis reflexis. *Hort. ups.* 90.

mex fructibus dentatis calyce reflexis, caput bovinum referentibus. *Hort. cliff.* 139.

etofa, ocymi folio, neapolitana. *Bauh. pin.* 114.

etofa, ocymi folio, bucephalophoros. *Col. ecphr.*

. p. 151. t. 150.

bitat in Italia. ☉

res semper terni.

UMEX floribus hermaphroditis: valvulis integer- aquaticus.
imis nudis, foliis cordatis acutis. *Fl. svec.* 2. n. 315.

pathum aquaticum, folio cubitali. *Bauh. pin.* 116.

pathum palustre. *Tabern. ic.* 437.

popalpathum. *Dalech. hist.* 604. *Cam. epit.* 232.

rba britannica. *Munt. brit. t.* 1.

bitat in Europa ad ripas fluviorum & paludum. 24

UMEX floribus hermaphroditis: valvulis lævibus, Lunaria.
caule arboreo, foliis subcordatis. *Vir. cliff.* 32. *Hort.*

cliff. 139. *Roy. lugdb.* 320.

etofa arborescens, subrotundo folio. *Pluk. alm.* 8.

. 252. f. 3.

naria magorum arabum. *Bauh. hist.* 2. p. 994?

bitat in Canariis. ☿

res tripartitus, nec sexpartitus est.

UMEX floribus hermaphroditis geminatis: valvu- vesicarius.
arum alis omnibus maximis membranaceis reflexis,

foliis indivisis. *Hort. cliff.* 130. *Hort. ups.* 90. *Roy.*

lugdb. 230.

etofa americana, foliis longissimis pediculis donatis.

Bauh. pin. 114. *prodr.* 54. *Morif. hist.* 2. p. 583. f. 5.

. 28. f. 7.

bitat in Africa. ☉

UMEX floribus hermaphroditis distinctis, valvu- tingitanus.
s cordatis obtusis integerrimis, foliis hastato-ovatis

foliis.

etofa dentata perennis. *Zanon. hist.* 14.

etofa vesicana tingitana perennis repens, foliis lon-

s sinuatis. *Morif. hist.* 2. p. 583. f. 5. t. 28. f. 8.

pathum maritimum foetidum. *Bauh. pin.* 116.

prodr. 56.

bitat in Barbaria, Hispania. *Alstræmer.* 24

Caules ramosi. Folia petiolata, ovata, acuta subcabra, basi subhastrata, juxta basin erosae sine scaberrima & sine inaequalia. Racemum floribus 5. f. 3. propriis pedicellis ad singulos racemi. Calycis valvulae cordatae, integerrimae

roseus. 19. RUMEX floribus hermaphroditis distinctis: lae alterius ala maxima membranacea, declinatis erosis. *Roy. lugdb. 230.*

Acetosa aegyptia, roseo seminis involucro. *Sib. 5. f. 5.*

Habitat in Aegypto. ☉

Semenum valvulae maximae, unciales, orbiculatae, culae, margine denticulae, apice & basi quod non in R. tingitano.

scutatus. 20. RUMEX floribus hermaphroditis, foliis cchastatis. *Vir. cliff. 32. Hort. cliff. 138. Hort. a Roy. lugdb. 230.*

Acetosa rotundifolia hortensis. *Bauh. pin. 114. hist. 2. p. 583. f. 5. t. 28. f. 9.*

Lapathum androgynum acetosum, foliis sagittatis divergentibus. *Hall. helv. 170.*

Oxalis rotundifolia. *Dod. pempt. 649.*

β. Acetosa scutata repens. *Bauh. pin. 114. prodr. Habitat in Helvetia, Galloprovincia, inter lapidum. 24*

digynus. 21. RUMEX floribus hermaphroditis digynis. *cliff. 138. Fl. jvec. 294, 317. Roy. lugdb. 230*

Rumex foliis orbiculatis emarginatis. *Fl. lapp. 1*

Acetosa rotundifolia alpina. *Bauh. pin. 55. prodr. Oed. dan. t. 14.*

Acetosa repens vestmorlandia, cochleariae folii nihil sinuatis. *Fluk. alm. 8. t. 252. f. 2.*

Acetosa britannica rotundifolia, fructu compresso. *obs. 67. t. 67.*

Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Walli Flos quadrifidus: Calyce diphyllis, Corolla diStaminibus 6 Stylis 2.

* * * *Floribus declinatis.*

alpinus. 22. RUMEX floribus hermaphroditis sterilibus fistisque, valvulis integerrimis nudis, foliis cchastatis rugosis.

Rumex folio pedali cordato, radice repente. Monnier. obs. 165. Sauv. monsp. 111.

Rumex spathum androgynum obtusifolium, spica confertissima. Hall. herb. 170.

Rumex spathum hortense rotundifolium f. montanum. Bauh. pin. 115.

Rumex spathum rotundifolium. Clus. hist. 2. p. 69.

Rumex habarbarum monachorum. Mat. med. 178.

Rumex habitat in Helvetia, Gallia australi. ♂

Rumex aetura & magnitudo Rhei.

RUMEX floribus androgynis: calycibus femineis spinosus, monophyllis: valvulis exterioribus reflexo-uncinatis. Hort. ups. 89.

Rumex imex floribus androgynis, calycibus fructus uncinatis. Hort. cliff. 139. Roy. lugdb. 230.

Rumex ta cretica, semine aculeato. Bauh. pin. 118. prodr. 57.

Rumex ta cretica, semine spinoso. Bauh. hist. 2. p. 962.

Rumex habitat in Creta. ☉

RUMEX floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis: tuberosus, hamis patentibus.

Rumex acetosa tuberosa radice. Bauh. pin. 114.

Rumex talis tuberosa. Dod. pempt. 649.

Rumex habitat in Italia. ♀

Rumex finis nimium R. Acetosae ac si eius hybrida: sed Folia hamis postice magis hiantia & Stipulae longiores. Radix omnino Filipendulae.

RUMEX floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. Acetosa,

Vir. cliff. 32. Hort. cliff. 130. Hort. ups. 89. Fl. suec.

295, 318. Fl. lapp. 130. Mat. med. 529. Roy. lugdb.

231.

Rumex acetosa pratensis. Bauh. pin. 114.

Rumex acetosa pratensis, flore albo. Tournes. inst. 502.

Rumex xalis crispa. Bauh. hist. 2. p. 990. Tabern. ic. 440.

Rumex acetosa montana maxima. Bauh. pin. 114. Scheuch.

alp. 129.

Rumex acetosa montana, lato ari folio rotundo. Bocc. mus.

165. t. 125.

Rumex habitat in Europæ pascuis. ♂ in Alpibus. ♀

RUMEX floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. Acetosella,

Vir. cliff. 32. Hort. cliff. 139. Fl. lapp. 131. Fl.

suec. 296, 319. Roy. lugdb. 231. Gron. virg. 153.

ii Spec. plant. pars 1. H h

Ace-

- Acetosa arvensis lanceolata. *Bauh. pin.* 114.
 Oxalis ovina. *Tabern. ic.* 440.
- β. Acetosa lanceolata angustifolia repens. *Bauh. pin. prodr.* 55.
- γ. Acetosa arvensis minima non lanceolata. *Bauh. pin.* 114.
- δ. Acetosa minor erecta, lobis multifidis. *Bocc. p.* 164. t. 126.
Habitat in Europæ pascuis. & arvis arenosis. 24
- multifidus. 26. RUMEX floribus dioicis, foliis hastatis: auribus palmatis. †
 Acetosa minor erecta lobis multifidis. *Bocc. p.* 164. t. 126.
Habitat in Alpibus Calabriae, Hetruriae, Orientis.
- aculeatus. 27. RUMEX floribus dioicis, foliis lanceolatis petiolatis, fructibus reflexis: valvulis ciliatis.
 Acetosa cretica, semine aculeato. *Bauh. pin.* 114. *prodr.* 55. t. 55.
 Oxalis minor aculeata candida. *Bauh. hist.* 2. p. 1.
Habitat in Creta, Hispania. 24
Similis R. Acetosellæ, sed Folia basi attenuata & hamis. Florum femineorum interiores valvulæ atæ aculeis minimis.

SCHEUCHZERIA.

- palustris. 1. SCHEUCHZERIA. *Fl. lapp.* 133. t. 10. f. 1. & succ. 297, 320. *Roy. lugdb.* 45. *Hall. helv.* Gmel. *sib.* 1. p. 73. *Berg. viadr.* 67.
 Juncus floridus minor. *Bauh. pin.* 112. *prodr. theatr.* 190. *Rudb. etys.* 1. p. 110. f. 2.
 Juncoidi affinis palustris. *Scheuch. gram.* 336.
 Gramen junceum aquaticum, semine racemoso. *pruss.* 114. t. 28.
Habitat in Lapponiæ, Helvetiæ, Borussiae, Sueviae paludosis. 24

TRIGLOCHIN.

- palustre. 1. TRIGLOCHIN capsulis trilocularibus sublinearibus. *Fl. succ.* 298, 321. *Act. Stockh.* 1742. p. 147. f. 1. 2. 3.
 Triglochin fructu tenui. *Fl. lapp.* 134. *Roy. lugdb.* *Hall. helv.* 258.

nen junceum spicatum f. Triglochis. *Bauh. pin. theatr.* 80.

magrostis IV. *Dalech. hist.* 1006.

ago maritima perennis, bulbosa radice. *Mich.*

7. 44.

ago maritima. *Barr. rar.* 55. t. 271.

tat in Europæ inundatis uliginosis. ♂

IGLOCHIN capsulis sexocularibus ovatis. *Fl. maritimum.*

c. 299; 322. *Afl. stockh.* 1742. p. 147. t. 6.

4. 5.

lochis fructu subrotundo. *Fl. lapp.* 135. *Roy.*

Edh. 45. *Gort. gelr.* 76.

ago palustris & maritima perennis, fructu brevior

inque capsulari. *Mich. gen.* 44.

nen spicatum alternum. *Bauh. pin. 6. theatr.* 82.

tat in Europæ maritimis. ♀

MELANTHIUM.

LANTHIUM petalis unguiculatis.

virginicum.

anthium foliis linearibus integerrimis longissimis,

ribus paniculatis. *Gron. virg.* 59.

odelo affinis floridana, ramofo caule, floribus or-

thogali obsoletis. *Pluk. amalth.* 40. t. 434. f. 8.

tat in Virginia. ♀

LANTHIUM petalis sessilibus. *Aman. acad.* 2. *sibiricum.*

349. t. 11. *

thogalum spicis florum longissimis ramosis. *Gmel.*

1. p. 45. t. 8.

tat in Sibiria. ♀

LANTHIUM petalis punctatis, foliis cucullatis. *capense.*

men. acad. 6. *afr.* 12. *

tat ad Cap. b. Spei. ♀

MEDEOLA.

DEOLA foliis verticillatis, ramis inermibus.

virginianæ.

leola foliis stellatis lanceolatis, fructu baccato.

ron. virg. 39. *

m f. Martagon pusillum, floribus minutissime her-

ceis. *Pluk. alm.* 401. t. 328. f. 4.

tat in Virginia. ♀

asparagoides.

2. **MEDEOLA** foliis pinnatis: foliolis alternis.
Asparagus foliis ovato-lanceolatis solitariis. *Hort. cl.* 122. *Roy. lugdb.* 29.
Asparagus africanus scandens, myrti folio. *Till.* 16. t. 12. f. 1. 2.
Laurus alexandrina ramosa, foliis e summitate cauum prodeuntibus. *Herm. lugdb.* 679. t. 631.
Habitat in Æthiopia. 5
 Caules teretes, volubiles, inermes, annui plerumque
 Folia alterna, remota, forte pinnata? Foliola ovato-oblonga, sessilia, nitida, alterna, plerumque ptena. Simillima *Asparago sarmentoso*, sed in his 3 ultra humanam altitudinem ascendens. (rollæ albide, revolute, serotine. Flores pedunculati, penduli, solitarii, ex ala foliorum; Differunt folia ista pinnata ab aliis pinnatis foliis, considerata ut fasciculata, sed distincta 3 rem petiolo communi, omnino ut in *Phyllantho Niruri*.

TRILLIUM.

cernuum.

1. **TRILLIUM** flore pedunculato cernuo.
Paris foliis ternis, flore pedunculato nutante. *C. noveb.* 81.
Solanum triphyllum, flore hexapetalo carneo. *Cat. carol.* 1. p. 45.
Habitat in Carolina. 24

erectum.

2. **TRILLIUM** flore pedunculato erecto.
Paris foliis ternis, flore pedunculato erecto. *Am. acad.* 1. p. 154. *
Solanum triphyllum brasilianum. *Bauh. pin.* 167. p. 91. *Burf. IX.* 12.
Solanum triphyllum canadense. *Corn. canad.* 166 167.
Solano congener triphyllum canadense. *Morif. hisp.* p. 532. f. 13. t. 3. f. 7.
Habitat in Virginia.

sessile.

3. **TRILLIUM** flore sessili erecto.
Paris foliis ternatis, flore sessili erecto. *Gron. virg.*
Solanum virginianum triphyllum, flore tripetaloa purpureo in foliorum sinu, absque pediculo, se *Pluk. alm.* 352. t. 111. f. 6.

Iolanum triphyllum, flore hexapetalo: tribus petalis
purpureis, cæteris viridibus reflexis. *Catesb. car.* 1.
p. 50. t. 50.

Habitat, in Virginia, Carolina. 2

COLCHICUM.

COLCHICUM foliis planis lanceolatis erectis. *Hort.* autumnale.
cliff. 140. *Hort. ups.* 90. *Roy. lugdb.* 41. *Sauv.*
monip. 18. 19. *Bæhm. lips.* 29.

Colchicum commune. *Bauh. pin.* 67.

Colchicum. *Fuch. hist.* 356. 357.

Colchium flore pleno. *Bauh. pin.* 67.

Habitat in Europæ australioris succulentis. 2

COLCHICUM foliis linearibus patentissimis. *Læfl.* montanum.

Colchicum montanum angustifolium. *Bauh. pin.* 68.

Colchicum montanum. *Clus. hisp.* 266. t. 267. *hist.*

1. p. 200.

Habitat in Hispania, Helvetia. 2

Folia una cum floribus autumno erumpunt.

COLCHICUM foliis undulatis patentibus. *Hort.* variegatum
cliff. 140. *Roy. lugdb.* 42.

Colchicum chionense, floribus fritillarizæ instar tessula-
tis, foliis undulatis. *Morif. hist.* 2. p. 341. f. 4. t.

3. f. 7.

Habitat in Chio insula. 2

HELONIAS.

HELONIAS.

bullata,

Helonias foliis radicalibus lanceolatis. *Amæn. acad.* 3.

p. 12. t. 1. f. 1. *

Phemerum phalangoides virginianum, flosculis arbu-
teis bullatis in spicam dispositis. *Pluk. alm.* 135. r.

174. f. 5. *Morif. hist.* 3. p. 606. f. 15. t. 2. f. 1.

Habitat in Pennsylvania paludosis. 2

HELONIAS foliis caulinis fetaceis.

*asphodelol-
des.*

Habitat in Pennsylvania. *Barthram.*

Caulis simplicissimus, bipedalis. Folia alternata s.
sparsa, lineari-fetacea, erecta, lævia, margine sca-
bra. Racemus terminalis, simplex, pedunculis flore
longioribus. Flores albi. Simillima Asphodelo, sed
Styli tres recurvati.

TETRAGYNIA

PETIVERIA.

allioea.

1. PETIVERIA floribus hexandris. *Hort. cliff. Hort. upf. 91. Act. stockh. 1744. p. 287. t. 7.*
 Petiveria foliis oblongo-ovatis, spicis longioribus
 minalibus. *Brown. jam. 274.*
 Verbenæ aut Scorodonæ affinis anomala, flore
 calyce aspero, allii odore. *Sloan. jam. 64. list
 172. Raj. suppl. 287.*
Habitat in Jamaicæ nemorosis. †

octandra.

2. PETIVERIA floribus octandris.
 Petiveria folani foliis, loculis spinosis. *Plum. 9
 ic. 219.*
Habitat in America meridionali. Jacquin. †.
*Simillima P. precedenti, ut vix, nisi ab exercitio
 singuatur. Differt vero Caule brevioris
 Staminiibus octo; Flamentis purpureis, nec
 Foliis rigidioribus & omnino glabris.*

POLYGYNIA.

ALISMA.

Plantago. ▽

1. ALISMA foliis ovatis acutis, fructibus obtusis
 Alisma fructu obtuso trigono. *Fl. lapp. 138. P.
 300; 323. Hort. cliff. 141. Gmel. fib. 1. p.
 Plantago aquatica latifolia. Bauh. pin. 190.
 Plantago aquatica. Cam. epit. 264.*
*Habitat in Europæ aquis & ad ripas fluviorum.
 cuum. †*

savu.

2. ALISMA foliis ovatis acutis, pedunculis umb
 fructibus globosis.
 Damafonium maximum, plantaginis folio, flor
 scente, fructu globoso. *Plum. spec. 7. ic. 11*
Habitat in America meridionali. †

Damafoni-
um.

3. ALISMA foliis cordato-oblongis, floribus hex
 capsulis subulatis.
 Alisma fructu sexcorni. *Hort. cliff. 141. Roy.
 46. Sauv. monsp. 14.*
 Plantago aquatica stellata. *Bauh. pin. 190.*

lantago aquatica minor altera. *Lob. ic.* 301.

amafonium stellatum. *Dalech. hist.* 1058.

abitat in Angliæ, Galliæ aquosis.

LISMA foliis cordatis obtusis, floribus dodecan- cordifolia.
dris, feminibus uncinato-muricatis.

amafonium ramosum, folio cordiformi. *Vaill. act.*

1719. p. 28.

agittaria virginiana, obtusiore lato folio, floribus mi-
noribus albis. *Morif. hist.* 3. p. 618. f. 15. t. 4. f. 6.

anunculus aquaticus, asari foliis, ad nodos umbelli-
ferus. *Plum. spec.* 7. ic. 234. f. 2.

abitat in America australi & septentrionali. 24

ledia inter Alismas & Sagittarias.

LISMA foliis ovatis obtusis, pedunculis solitariis. natans.

Fl. succ. 2. 324.

amafonium repens, potamogetonis rotundifolii folio.

Vaill. act. 1719. p. 29. t. 4. f. 8.

amafonium radículas emittens ex geniculis. *Vaill.*
parif. 46.

anunculus palustris, foliis gramineis & subrotundis.

Petit. gen. 47.

abitat in Galliæ, Sueciæ fossis.

LISMA foliis lineari-lanceolatis, fructibus globofo- Ranuncu-
suarrosis. loides.

lisma fructu globofo undique echinato. *Hort. cliff.*

141. *It. gotl.* 298. *Fl. succ.* 301; 325. *Roy. lugdb.*

46. *Gort. gelr.* 77. *Sauv. monsp.* 14

amafonium angustissimo plantaginis folio: *Vaill. act.*

1719. p. 35.

antago aquatica humilis angustifolia. *Bauh. hist.* 3.

p. 738. *Lob. ic.* 300.

anunculus aquaticus, plantaginis folio angustissimo.

T. Pet. gaz. 41. t. 26. f. 12.

abitat in Gotlandiæ, Belgii, Angliæ, Galliæ fossis.

LISMA foliis subulatis. *Gron. virg.* 153.

subulata.

abitat in Virginia.

Classis VII.

HEPTANDRIA
MONOGYNIA.

TRIENTALIS.

europæa.

1. TRIENTALIS foliis lanceolatis integerrimis.
 Trientalis. *Fl. lapp.* 139. *Fl. suec.* 302.; 326. *Roy. lugdb.* 438. *Hall. opusc.* 123. *Kalm. it.* 2. p. 263.
 Alfine alpina. *Svenkf. siles.* 117.
 Pyrola, alfine flore, europæa. *Bauh. pin.* 191. *prod.*
 Pyrola, alfine flore; minor brasiliiana. *Bauh. pin.* 101. t. (sub *Hermodactyli nomine*) 99. *Burf. X.*
Habitat in Europæ borealis sylvis & juniperetis.

ÆSCULUS.

Hippo Ca-
stanum.

1. ÆSCULUS floribus heptandris. *Hort. upf.* 92.
 Æsculus. *Hort. cliff.* 142. *Roy. lugdb.* 463.
 Castanea folio multifido. *Clus. hist.* 1. p. 7. B
pin. 419.
Habitat in Asia septentrionaliore, unde in Euro
1550. †

Pavia.

2. ÆSCULUS floribus octandris.
 Pavia. *Boerh. lugdb.* 2. p. 260. t. 260. *Hort. angl.*
t. 19. *Hort. cliff.* 143. *Roy. lugdb.* 463. *Trew.*
t. 15. *Mill. ic.* 198. *Duham. arb.* 2. p. 98.
 Saamouna pisonis s. filiquifera brasiliensis arbor,
 tatis foliis ferratis, floribus teuerii purpureis.
alm. 326. t. 56. f. 4.
Habitat in Carolina, Brasilia. †
Capsula hujus glabra, præcedentis muricata. †
in eodem thyrso Masculos & Hermaphroditos
vavit Dav. v. Royen; si ita, Polygama erit.

DIGYNIA.

LIMEUM.

africanum. 1. LIMEUM.

at in Æthiopia. 24

Corrigiolæ s. Telephii. Caules prostrati, densi, spithamæi, angulati, nudi, basi perennantes. Lilia alterna, remota, lineari-lanceolata, parva, petiolata. Corymbi terminales, solitarii, compositi, nudi, longius pedunculati.

TRIGYNIA.

SAURURUS.

Saururus foliis cordatis petiolatis, amentis fo-cernurus.
riis recurvis. Hort. upf. 91.

Saururus foliis profunde cordatis ovato-lanceolatis, cisis solitariis. Hort. cliff. 139. Gron. virg. 40. Roy. db. 8.

Saururus repens, floribus stamineis spicatis, bryoniae ræ folio ampliore pingui. Pluk. alm. 343. t. 117.

4.
at in Virginia. 24

Saururus Squamæ petiolatæ, albæ; at defloratæ virentes, pedicellis incurvatis ad rachin, germi- nibus. Stamina vix numerantur, nisi deflorato- mento persistencia.

EPTAGYNIA.

SEPTAS.

Septas. Amæn. acad. 6. afr. 13. *

Septas nica? species pumila, auriculæ urfi folio glabro. k. mant. 166. t. 330. f. 9.

Septas talis foliis subrotundis crenatis. Roy. lugdb. 538. at ad Cap. b. Spei 24. Dav. v. Royen.

capensis.



Classis VIII.

OCTANDRIA
MONOGYNIA.

TROPÆOLUM.

minus.

1. TROPÆOLUM foliis integris, petalis acuminatis. *Hort. upf.* 93.
 Tropæolum foliis peltatis orbiculatis. *Hort. clij*
 Cardamindum minus & vulgare T. *Fewill. p.*
p. 14. t. 8.
 Nasturtium indicum majus. *Bauh. pin.* 306.
 Nasturtium indicum. *Lob. ic.* 516. f. 2, 1.
Habitat in Peru, Limæ innotuit 1580. per
næum. ☉. 2.

majus.

2. TROPÆOLUM foliis subquinelobis, petalifidis. *Hort. upf.* 93.
 Tropæolum foliis peltatis orbiculatis. *Hort. clij*
 Cardamindum ampliori folio & majori flore. T
peruv. 3. p. 14. t. 8.
 Acriviola maxima odorata. *Boerh. lugdb.* 1. p.
 Viola inodora scandens, nasturtii sapore, maxima.
Herm. lugdb. 628. t. 629.
Habitat in Peru, unde in Europam venit 1684
Bewerningii. ☉. 2.
Flores ante crepusculum fulminant, observante
Linnaea.

peregrinum.

3. TROPÆOLUM foliis palmatis, petalis multifidis.
 Cardamindum quinquefolii folio, vulgo Malli
peruv. 2. p. 756. t. 42.
Habitat in Peru, nondum mihi visum in Europa.

OSBECKIA.

chinensis.

1. OSBECKIA. *Osbeck. it.* 213. t. 2. *
 Echinophora maderaspatana, fideritis non ferrata.
 vofis foliis, fructu capsulari caucalidis æmulum.
alm. 132. t. 173. f. 4.
 Kadali maderaspatanum minus, capsulis pilosis.
suppl. app. 236.

itat in India; in honorem Petr: Osbeck, Sveci,
 a 1751. plantas Chinæ & Javæ periculoso itinere
 lit, legit, examinavit, descripsit, communicavit.
 itus *Melastomæ*. Caulis erectus, brachiatus, acu-
 tetragonus. Folia angusto-lanceolata, trinervia,
 opposita, scabra, subsessilia. Flores terminales ali-
 loti, sessiles, cincli foliis 4 flore longioribus patentibus.

R H E X I A.

EXIA foliis sessilibus ferratis, calycibus glabris. *virginica.*
non. virg. 41.

anus vegetabilis carolinianus. *Pluk. amalth. 8.*

imachia non papposa virginiana, tuberariæ foliis
 rufis, flore tetrapetalo rubello. *Pluk. alm. 235. t.*
52. f. 8.

itat in Virginia.

lis tetragonus angulis membranaceis. Folia opposi-
 ta, sublanceolata, internodiis longiora, sessilia, tri-
 nervia, pilis vagis hispidiuscula, subserrata serratu-
 s setaceis. Pedunculus terminalis, dichotomus.
 Flores solitarii ex dichotomia, subsessiles, petalis
 tbris; Antheris falcatis, luteis.

EXIA foliis cillatis.

mariana.

imachia non papposa, terræ marianæ, leptoneuros,
 ore tetrapetalo rubello, folio & caule hirsutie fer-
 riginea hispidis. *Pluk. mant. 123. t. 428. f. 1.*

itat in Marilandia, Brasilia.

x adpersus setis apice stellatis.

EXIA floribus alternis axillaribus pedunculatis *Acifanthera.*
 quinquefidis. *Amæn. acad. 5. p. 396. **

fanthera erecta ramosa, ramulis quadratis, foliolis
 innerviis ovatis crenatis oppositis, floribus singula-
 bus. *Brown. jam. 217. t. 22. f. 1.*

itat in Jamaica. 24

O E N O T H E R A.

NOTHERA hirta, foliis supra glabris.

hirta.

othera assurgens hirsuta, floribus solitariis. *Brown.*
m. 208 ?

gra frutescens & hirsuta nerii folio, flore magno
 teo. *Plum. spec. 7. ic. 174. f. 2.*

itat in America calidiore. 5

- biennis.** 2. **OENOTHERA** foliis ovato-lanceolatis planis le muricato subvillosis. *Vir. cliff.* 33. *Hort.* Gron. virg. 254 *Roy. lugdb.* 251. *Gort. g. Kalm. it.* 3. p. 5. 9.
Oenothera foliis ovato-lanceolatis denticulatis bus lateralibus in summo caulis. *Hort. cliff.*
Lyfimachia lutea corniculata. *Eauh. pin.* 245.
Morif. hist. 2. p. 271. f. 3. t. 11. f. 7.
Hyoscyamus virginianus. *Alp. exot.* 325. t. 3.
Habitat in Virginia, unde 1614, nunc vulgæ ropæ. ♂
- parviflora.** 3. **OENOTHERA** foliis ovato-lanceolatis planis lævi subvillosis.
Oenothera foliis lanceolatis, capsulis ventricosis. *Zin. gætt.* 199.
Habitat in America septentrionali. ♂
Fruktus apex coronatus margine ostifido, nec fido, uti OE. biennis, cui simillima. Caul adpersus, sed absque tuberculis ad eorum basilia repando - subdentata, minus mollia. Cal suo quadruplo brevior, infra apicem denticulatus, hinc ante explicationem mucrones in hactes. Petalorum latera distantia, dimidio præcedentis petalis. Capsulæ quadrivalves.
- octovalvis.** 4. **OENOTHERA** foliis lanceolato-oblongis acutis planis glabris. *Jacq. amer.* 19. *hist.* t. 70.
Onagra foliis persicariæ angustioribus, flore luteo. *Plum. spec.* 7. ic. 175. f. 1.
Habitat in America.
Plumieri figura etiam OE. parvifloram refert.
- mollissima.** 5. **OENOTHERA** foliis lanceolatis undulatis *cliff.* 33. *Gron. virg.* 42. *Roy. lugdb.* 251.
Oenothera foliis lineari-lanceolatis dentatis, sic medio caule. *Hort. ups.* 144.
Onagra bonariensis villosa, flore mutabili. *Di* 297. t. 219. f. 286.
Habitat in agro Bonariensi. ☉
- fruticosa.** 6. **OENOTHERA** foliis lanceolatis subdentatis, lis pedicellatis acutangulis, raceno pedum
Oenothera florum calyce monophyllo, hinc aperto. *Gron. virg.* 42.

angustifolia, caule rubro, flore minore.
ref. inst. 302.

t in Virginia. ♀

purpurascens, tetraphyllus, sed rumpitur altero
 us & unico latere. Tubus filiformis, angustif-
 . Capsula angulis 4 acutis compressis. Folia
 is denticulata.

OTHERA foliis lanceolatis obtusis glabris sub- pumila.
 olatis, caulibus prostratis, capsulis acutangulis.
 nera foliis radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis
 isis, capsulis ovatis obtusis. *Mill. dict. t.* 188.
 achia filiquosa glabra minor mariana, angustio-
 s foliis. *Fluk. mant.* 123.

achia marilandica parva, foliis angustis acutis.
suppl. 416.

in America septentrionali. ♀

palmaris, herbaceus, teres, flexuosus; divari-
 imus. Folia elliptico-lanceolata, integerrima,
 res axillares; solitarii, erecti, subsessiles. Peta-
 ueta, obcordata, lineata. Capsulae obovatae, ob-
 , octangulares, angulis quatuor latioribus com-
 s, quadrivalvis. Radix perennis.

G A U R A.

RA. *Amæn. acad.* 3. p. 26. *Aët. holmenf.* 1756. biennis.
 22. t. 8. *

achia Chamænerio similis floridana, foliis nigris
 xis, capsulis carinatis in ramulorum cymis. *Fluk.*
th. 139. t. 428. f. 2.

t in Virginia, Pennsylvania. ♂

EPILOBIUM.

* *Staminibus declinatis.*

OBIUM foliis sparsis lineari-lanceolatis, flori- angustifoli-
 inæqualibus um.

ium floribus difformibus, pistillo declinato. *Fl.*
 304; 327.

ium foliis lanceolatis integerrimis. *Fl. lapp.* 146.
cliff. 154. *Roy. lugdb.* 250.

chia Chamænerion dicta angustifolia. *Bauh.*
 245.

β. *Lyfimachia Chamænerion dicta latifolia.* *Ba.*
245.

γ. *Lyfimachia Chamænerion dicta alpina.* *Bauh.*
prodr. 116.

Habitat in Europæ boreali. 24

latifolium.

2. **EPILOBIUM** foliis alternis lanceolato-ovatis inæqualibus.

Habitat in Sibiria. 24

Differt a præcedenti floribus duplo majoribus lanceolato-ovatis, alternis nec sparsis, utriusque visissimo tomento mollissimis. Hæc & a

differunt a sequentibus in non paucis: Flores inæquales petalis integris; Stamina niventia ad Stylum; Pistillum declinatum alterna; Folia erumpentia revoluta contra reliquis.

* * *Staminibus erectis regularibus, petalis bifidis*

hirsutum.

3. **EPILOBIUM** foliis oppositis lanceolatis sempercurrenti-amplexicaulibus. *Hort. cliff.* 145. *Fl. svec.* 328. *Gron. virg.* 154. *Roy. lugdb.* 251.

Lyfimachia siliquosa hirsuta, magno flore. *Ba.*
245.

Lyfimachia purpurea. *Fuchs. hist.* 491.

β. *Lyfimachia siliquosa hirsuta, parvo flore.* *Ba.*
245. *prodr.* 116.

Habitat in Europæ humidiusculis. 24

Planta subhirsuta. Foliorum basi media altioribus.

montanum.

4. **EPILOBIUM** foliis oppositis ovatis dentatis. *Hort. cliff.* 147. *Fl. svec.* 306; 329. *Hort. cliff.* 145. *Roy.*
251.

Lyfimachia siliquosa glabra major. *Bauh. pi.*
Pseudo-Lyfimachium purpureum primum. *Dod.*
85.

Habitat in Europæ montosis.

Caulis mollissimus. Folia glabra.

tetragonum

5. **EPILOBIUM** foliis lanceolatis denticulatis oppositis, caule tetragono. *Sauv. monsp.* 75.

Lyfimachia siliquosa glabra minor. *Bauh. pi.*
Raj. hist. 801.

Lyfimachia minor. *Tabern. ic.* 854.

abitat in Europa. 24

lia tenera macula livida. Summitas, adhuc tenella, mutans.

PILOBIUM foliis oppositis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis; caule erecto. *Fl. svec.* 307; 330. *

ilobium foliis linearibus. *Fl. lapp.* 149. *Roy. lugdb.* 251.

simachia filiquosa glabra angustifolia. *Bauh. pin.* 245.

ilobium foliis lanceolatis, ramose florens. *Fl. lapp.* 148.

abitat in Europæ humidiusculis. β in Alpibus. 24

ALLOBIUM foliis oppositis ovato-lanceolatis integerrimis, siliquis sessilibus, caule repente. *alpinum.*

ilobium foliis ovalibus: superioribus attenuatis. *Fl. svec.* 308; 331.

ilobium foliis ovato-oblongis integerrimis. *Fl. lapp.* 150.

ilobium, foliis ellipticis obtuse lanceolatis, totum leve. *Hali. helv.* 409.

amænerion alpinum, alfine foliis. *Scheuch. alp.* 32. 332.

simachia filiquosa nana, prunellæ foliis. *Bocc. mus.* p. 161. t. 108.

abitat in Alpibus Helveticis, Lapponicis. 24

ens est, primo vere florens germinibus sessilibus.

MELICOCCA.

MELICOCCA. *Jacq. hist.* t. 71.

melicoccus foliis ut plurimum bijugatis ovatis, pennas alatas dispositis. *Brown. jam.* 210.

melicoccus americana costa foliorum appendicibus acuta. *Buk. alm.* 265. t. 207. f. 4.

melicoccus americana foliis alatis bifidis. *Comm. hort.* 1. p. 83. t. 94.

abitat in America meridionali. †

melicoccus americana Cocco hesperidum præ reliquis, ut *Sapindus*, ei simillima.

A M Y R I S.

TYRIS foliis ternatis acutis.

tyris foliis ternatis. *Hort. cliff.* 486.

bijuga.

Elemifera.

Fru-

- Frutëx trifolius resinofus floribus tetrapetalis alb
cemofis. *Catefb. car. 2. p. 33. t. 33. f. 3.*
Cornus racemofa trifolia & quinquefolia, foliis
minulatis. *Flum. spec. 19. ic. 100?*
Habitat in Carolina. †
- maritima. 2. AMYRIS foliis ternatis obtufis. *Jacq. amer. 19.*
Amyris fruticosus minor, foliis orbiculatis veno
nato ternatis, racemis terminalibus. *Brown. jam.*
• *Habitat in America. 24*
- toxicifera. 3. AMYRIS foliis impari pinnatis.
Elemifera foliis pinnatis. *Hort. cliff. 486.*
Toxicodendron foliis alatis, fructu purpureo py
mi fparfo. *Catefb. car. 1. p. 40. t. 40.*
Habitat in Carolina.
- balsamifera. 4. AMYRIS foliis bijugis.
Arboris arboreus, foliis bijugatis ovatis glabris
mis laxis terminalibus. *Brown. jam. 208.*
Lauro affinis terebinthi folio alato, ligno odorato
dido, flore albo. *Sloan. jam. 137. hift. 2. p. 24. t.*
f. 4. Raj. dendr. 88.
Lucinium arbor tiliæ foliis minoribus, americana
Pluk. a.m. 228. t. 201. f. 3.
Habitat in Jamaica. †

GRISLEA.

- fecunda. 1. GRISLEA. *Hort. cliff. 146. Læfl. it. 245.**
Habitat in America calidiore. †

COMBRETUM.

- laxum. 1. COMBRETUM fpicis laxis. *Læfl. it. 308.*
Combretum floribus octandris, fpicis laxis feco
Jacq. amer. 19.
Gaura fruticofa scandens, foliis oppofitis. *L.*
*248.**
Habitat in America meridionali. †
- secundum. 2. COMBRETUM fpicis fecundis. *Jacq. amer. 1*
Habitat in America meridionali. †

ALOPHYLLUS.

- zeylanicus. 1. ALOPHYLLUS. *Fl. zeyl. 140.**
Habitat in Zeylona. †

XIMENIA.

ENIA foliis oblongis, pedunculis multifloris. *americana*
q. amer. 19. hist. t. 177. f. 31. Hort. cliff. 1193.
 lia aculeata, flore villoso, fructu luteo. *Plum.*
6. ic. 261. f. 1.
 et in America. \S

ovato-oblonga, alterna, integerrima, petiolata,
 na ad singulam foliorum axillam. Racemus multi-
 us, inter spinam & ramum.

ENIA foliis ovatis, pedunculis unifloris. *inermis*
 is arborescens, foliis ovatis glabris: vetustiori-
 confertis, petiolis submarginatis, floribus solita-
. Brown. jam. 209.
 et in Jamaica. \S

MIMUSOPS.

MIMUSOPS foliis alternis remotis. *Fl. zeyl. 138. * Bengl.*
 cuspidum. *Rumph. amb. 2. p. 189. t. 63.*
 indorum. *Pluk. alm. 203. Breyn. cent. 20. t. 8.*
Rheed. mal. 1. p. 34. t. 20.
 at in India. \S

MIMUSOPS foliis confertis. *Fl. zeyl. 137. * Kaukl.*
 osiderops macassarensis. *Rumph. amb. 2. p. 19.*
 at in India. \S

JAMBOLIFERA.

JAMBOLIFERA. *Fl. zeyl. 139. * peduncu-*
 lones. *Bauh. pin. 460. lata.*
 at in India. \S

SANTALUM.

SANTALUM. *Mat. med. 183. album.*
 lum verum. *Breyn. ic. 94. t. 5. f. 1.*
 lum album. *Bauh. pin. 392. Rumph. amb. 2. p.*
t. 11.
 at in India. \S

MEMECYLON.

MEMECYLON foliis ovatis. *Fl. zeyl. 136. * capitella-*
 I i Cor- tuni.

Cornus sylvestris, foliis cruceum colorem tingent
flosculis ad foliorum alas globosis. *Burm. zeyl*

t. 30.

Habitat in Zeylona. †

LAWSONIA.

inermis.

1. **LAWSONIA** ramis inermibus. *Fl. zeyl.* 135. *orient.* 47.

Ligustrum ægyptiacum latifolium. *Bauh. pin.* 4

Alhenna f. *Henna arabum.* *Walsh. hort.* 3. t. 4.

Pontaletice. *Rheed. mal.* 4. p. 117. t. 57.

Alcanna arabum. *Bell. itin.* 35.

Cyprus, Henna, Alcanna. *Rauw. itin.* 60. t. 6

Habitat in India, Ægypto. †

Affinis maxime sequenti; ut forte cultura mitior fall

spinosa

2. **LAWSONIA** ramis spinosis. *Fl. zeyl.* 134. *H*
it. 464. *

Rhamnus malabaricus. *Mail anschi. Pluk. alm*
220. f. 1.

Cyprus Rumph. amb. 4. p. 42 t. 17.

Mail-anschi. Rheed. mal. 1. p. 73. t. 40.

Habitat in India. †

VACCINIUM.

* *Foliis annotinis deciduis.*

Myrtillus.

1. **VACCINIUM** pedunculis unifloris, foliis ferru-
vatis deciduis, caule angulato. *Fl. lapp.* 143. *H*
313; 333. Mat. med. 184. *Hort. cliff.* 148.
lugdb. 239. *Hall. helv.* 419.

Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigri
Bauh. pin. 470.

Myrtillus germanica & *Vitis idæa.* *Dalech. hist*
192.

Habitat in Europæ borealis sylvis umbrosis. †

stamineum.

2. **VACCINIUM** pedunculis solitariis unifloris,
ris corolla longioribus, foliis oblongis intege
Vaccinium staminibus corolla longioribus. *Gros*
43.

Vitis idæa americana, longiori mucronato folio
nato, floribus urceolatis racemosis. *Pluk. alm*
t. 339. f. 3.

Habitat in America septentrionali. †

Frutex. Folia oblonga, integerrima. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, filiformes, corolla longiores. Corollæ quinquefidæ, campanulato-patentes. Antheræ 10. Stylus flore longior.

VACCINIUM pedunculis unifloris, foliis integerrimis ovalibus basi ciliatis. uliginosum.

Vaccinium foliis ovalibus integerrimis deciduis. *Fl. svec.* 312; 332.

Vaccinium foliis annuis integerrimis. *Fl. lapp.* 142. *Hall. helv.* 414.

Vitis idæa foliis subrotundis exalbidis. *Bauh. pin.* 470.

Vitis idæa II. *Clus. hist.* I. p. 61. t. 62.

Habitat in Sueciæ borealibus & alpinis, uliginosis. †

VACCINIUM pedunculis simplicibus, foliis integerrimis ovatis subtus tomentosis. album.

Habitat in Pennsylvania. *Kalm.* †

Frutex. Folia ovata, subtus tomentosa. Flores duo vel tres ad apices ramorum: pedunculis aggregatis, brevissimis, nudis.

VACCINIUM pedunculis, simplicissimis unifloris, foliis ovatis mucronatis glabris integerrimis. mucronatum.

Habitat in America septentrionali. *Kalm.* †

Frutex Ramis teretibus, glaucis. Folia elliptica, utrinque glabra, integerrima, mucronata, petioliis canaliculatis insidentia. Pedunculi uniflori, foliis paulo breviores.

VACCINIUM floribus corymbosis ovatis, foliis oblongis acuminatis integerrimis. corymbosum.

Habitat in America septentrionali. *Kalm.* †

Frutex. Folia oblonga, acuta, nervis subtus villosis. Corymbi ex gemmaceo involucre, sessiles. Corollæ cylindræo-ovata, longiores, quam in reliquis. Stamina decem.

VACCINIUM racemis filiformibus foliosis: foliis oblongis integerrimis. frondosum.

Vaccinium foliis ovatis integris deciduis, racemis foliosis. *Gron. virg.* 155. *

Habitat in America septentrionali. †

Frutex. Folia oblonga, integerrima. Racemi infra folia, bracteis longis, parvis. Pedunculi parciales bracteis

Ælis longiores, instructi bracteolis duabus filiformi
Corolla ovato-campanulata. Stamina 10.

Hugustrinum. 8. VACCINIUM racemis nudis, caule fruticoso,
 liis crenulatis oblongis.

Habitat in Pennsylvania. Kalm. 5

Flores in Racemis alternis, numerosis, destitutis
Ælis, s. foliis, qua nota facile distinguitur.

Arctostaphylos.

9. VACCINIUM floribus racemosis, foliis crenu
 ovatis acutis, caule arboreo.

Vitis idæa orientalis maxima, cerasi folio, flore v
gato. Tournef. cor. 42. it. 2. p. 223. t. 223.

β. *Vitis idæa cappadocica maxima, meipili folio,*
variegato. Tournef. cor. 42.

Habitat in Cappadocia. 5

Racemi foliis longiores, infra folia sui, foliolis c
instructi.

* * *Foliis sempervirentibus.*

Vitis idæa. 10. VACCINIUM racemis terminalibus nutantibus
 liis obovatis revolutis integerrimis subtus punct
 Vaccinium foliis obverse ovatis perennantibus. *Fl.*

145. Fl. suec. 314, 334. Mat. med. 185. Hort.
148. Roy. lugdb. 239. Hall. helv. 414. Gort. geh

Vitis idæa foliis subrotundis non crenatis, bacci
bris. Bauh. pin. 470. Oed. dan. t. 40.

Habitat in Europæ frigulioris sylvis macris. 5

Oxycoccus. 11. VACCINIUM foliis integerrimis revolutis ov
 caulibus repentibus filiformibus nudis.

Vaccinium ramis filiformibus repentibus, foliis o
perennantibus. Fl. lapp. 145.

Vaccinium ramis filiformibus, foliis ovatis perenn
bus, pedunculis simplicibus stipula duplici. Fl.
315; 335. Mat. med. 186.

Vitis idæa palustris. Bauh. pin. 471.

Vaccinia palustris. Dod. pempt. 770. Lob. ic. 109

Habitat in Europæ paludibus sphagno repletis. 4
Racemus brevissimus, pedunculis longissimis: bracti
alternis; Corolla revoluta.

hispidulum. 12. VACCINIUM foliis integerrimis revolutis ov
 caulibus repentibus filiformibus hispidis. *Kalm.*

p. 37.

idæa palustris americana, oblongis splendentibus
is, fructu grandiore rubro plurimis intus acinīs re-
o. *Pluk. alm.* 392. t. 320. f. 6.

idæa palustris virginiana, fructu majore. *Raj. hist.*

ut in America septentrionalis paludosis. *24*
ura antecedentis, sed majora omnia, *3* Caulis
mis setaceis imbricatus.

ERICA.

* *Antheris biaristatis.*

2A antheris bicornibus inclusis, corollis inæqua- *vulgata.*
s campanulatis mediocribus, foliis oppositis fa-
tis.

foliis quadrifariam imbricatis triquetris glabris e-
is, corollis inæqualibus calyce brevioribus. *Hort.*

146. *Fl. svec.* 309, 336. *Roy. lugdb.* 442.
vulgaris glabra. *Bauh. pin.* 485. *Fl. lapp.* 147.

myricæ folio hirsuto. *Bauh. pin.* 485.

vulgaris hirsuta. *Raj. angl.* 3. p. 471.

t in Europæ campestribus sterilibus, frequens. *3*
ativa: mediocris, longior, brevior, corolla re-
proportionem ad calycem.

A antheris bicornibus exsertis, corollis globosis *umbellata.*
ellatis, foliis ternis acerosis glabris.

foliis acerosis glabris ternis, corollis ovatis sta-
bus brevioribus terminalibus. *Læfl. it.* 138.

in Lusitania. *3*

ulus habitu *Ericæ vulgaris*. Folia ternia, ace-
brevia, glabra, subtus linea alba notata. Um-
ellæ nulæ absque involucro. Calyx compositus,
olla pallide-cærulea, angulata.

A antheris bicornibus inclusis, corollis campa- *herbacæ.*
is mediocribus secundis, foliis ternis triquetris
is.

procumbens herbacea. *Bauh. pin.* 486.

oris folio 8. *Clus. hist.* 1. p. 44.

in Europa australiori.

A antheris bicornibus inclusis, corollis ovatis cinerea.
osis, foliis ternis glabris linearibus.

Erica foliis linearibus ternis, floribus globosis
giganteis laxe spicatis. *Guett. stamp. 2. p. 110.*

Erica foliis acerosis glabris ternis, corollis ob-
ovatis staminibus longioribus verticillato-racematis.
*Less. it. 137. **

Erica humilis, cortice cinereo arbuti flore. *Bauh.*
486.

Erica coris folio 6. *Clus. hist. 1. p. 47. Oed. dan.*
Habitat in Europa media, Oriente. h

scoparia.

5. *ERICA* antheris bicornibus inclusis, corollis c-
natis longioribus, foliis ternis patentibus,
albis.

Erica erecta, foliis ternis, floribus ad alas fess-
verticillatis. *Sauv. monsp. 170.*

Erica major scoparia, foliis deciduis. *Bauh. pin.*

Erica scoparia, flosculis herbaceis. *Lob. ic. 2. 1*
Sauv. monsp. 46.

Habitat Monspelii, in Hispania, & Europa austr.

castra.

6. *ERICA* antheris bicornibus inclusis, corollis su-
tis mediocribus solitariis, foliis ternis, caule ar-
Erica foliis lineari-subulatis ternis, corollis ovatis
lycibus acutis patulis. *Hort. cliff. 148.*
Habitat in Æthiopia. h

viridi pur-
purea.

7. *ERICA* antheris bicornibus inclusis, corollis
longioribus, racemis corymbosis secundis,
ternis.

Erica foliis lanceolatis oppositis imbricatis, floribus
versu racemosis. *Hort. cliff. 148. Sauv. mansj.*

Erica major, floribus ex herbaceo purpureis.
pin. 485.

Erica corios folio 3. *Clus. hist. 1. p. 42.*

Habitat in Lusitania. h

Tetralix.

8. *ERICA* antheris bicornibus inclusis, corollis
bosis confertis folio longioribus, foliis quater-
natis patentibus.

Erica foliis subulatis ciliatis quaternis, corollis
so ovatis terminalibus confertis. *Hort. cliff. 1.*
svec. 310, 337. Roy. lugdb. 442.

Erica ex rubro nigricans scoparia. *Bauh. pin.*
Habitat in Europæ borealis paludibus cespitosis. h

arborea.

9. *ERICA* antheris bicornibus inclusis, corollis c-

ulatis longioribus, foliis quaternis patentissimis, caule subarborescente tomentoso.

ca erecta, foliis quaternis, floribus spicato-racemosis. *Sauv. monsp.* p. 170. 46.

ca foliis acerofis linearibus patentissimis, corollis rotatis, staminibus brevibus. *Hort. cliff.* 47. *Roy. gdh.* 442.

ca maxima alba. *Bauh. pin.* 485.

cautat in Europa australi. ♀

UICA foliis in summitate quinis, caule procumbente. *Segu. ver.* 280. purpurea
scens.

ca procumbens dilute purpurea. *Bauh. pin.* 486. *Raj.* t. 1715.

ca foliis corios, flore purpureo dilutioris coloris. *Auh. hist.* 1. p. 358.

ca coris folio VII. *Clus. hist.* 1. p. 43.

cautat in Europa australi. ♀

* * *Antheris muticis obtusis emarginatis.*

UICA antheris simplicibus inclusis, corollis ovatis regularibus, floribus terno-racemosis, foliis ternis liatis. ciliaris.

ca foliis ovatis ciliatis ternis, corollis ovatis apice bulbosis irregularibus verticillato-racemosis. *Less.* 138. *

ca hirsuta anglica. *Bauh. pin.* 602.

ca XII. *Clus. hist.* 1. p. 46.

cautat in Lusitania. ♀

ca ta suffruticosa, bipedalis. Folia terna, patentia, filia, ovato-oblonga, acuta, margine-reflexa, ciliaria.

Racemus terminalis, terno verticillatus. Colla magna, ovata, ore contracto inæquali.

UICA antheris bifidis exsertis, calycibus duplicatis imbricatis, floribus acutis corolla longioribus, foliis ternis lævibus.

cautat in Æthiopia. ♀

ca ex albus est.

UICA antheris simplicibus bifidis exsertis, corollis cylindricis, foliis quinis patentibus. multiflora.

ca, foliis corios, multiflora. *Bauh. hist.* 1. p. 356.

ca *ij. angl.* 3. p. 471. *

Erica maxima purpurascens, longioribus foliis. *Pin.* 485.

Erica juniperifolia dense fruticans narbonensis. *hist.* 620. *Garid. aix.* 160. t. 32. *Sauv. monsp.* 4
Habitat in Anglia, G. Narbonensi, Oriente. †

carnea,

14. *ERICA* antheris simplicibus exsertis, corollis
tis sublongioribus, foliis quaternis triangularibus
tentibus glabris.

Erica procumbens, ternis foliis, carnea. *Bauh.*
486.

Erica coris folio IX. *Clus. hist.* 1. p. 44.

Habitat in Pannoniæ, Helvetiæ, Baldi, Trid.
arenosis. †

bruniades.

15. *ERICA* antheris bifidis exsertis, corollis glo
calyce lanato tectis, foliis ternis subciliatis
tibus.

Erica promont. b. spei floribus albidis, staminibus. *Pet. gaz.* 5. t. 2. f. 9.

Eriocephalus bruniades ericæformis monomopat
capitulis globulorum instar interius cavis &
lanugine tectis. *Pluk. mant.* 69. t. 347. f. 9.

Frutex africanus aromaticus, Seb. mus. 2. p. 64.
f. 7.

Habitat in Æthiopia. †

Folia linearia, remota, patula, pilis raris ad
Calyces alba lana.

capitata,

16. *ERICA* antheris bifidis exsertis, corollis glo
calycibus lanatis coloratis, foliis ternis hirtis
Erica carnea promont. cap. spei foliis & floribus. *Pet. gaz.* 5. t. 2. f. 10.

Erica africana, calyce lanuginoso ex viridi luteis
ribus concoloribus exiguis lanugine obsitis. *Seb.*
1. p. 30. t. 20. f. 1.

Erica capitata nodiflora, globulis lanugine ex
virescente obductis. *Raj. dendr.* 98.

Habitat in Æthiopia. †

Dignoscitur floribus globosis, lanugine luteo-vir
ductis.

plukenetii,

17. *ERICA* antheris bifidis exsertis, corollis sub
dricis subtruncatis longioribus, calycibus simpli
foliis ternis linearibus.

Hamæpithys æthiopica, foliis læte virentibus, flore oblongo phœniceo plus quam eleganti f. plusquenetii. *Pluk. mant.* 45. t. 344. f. 3. *Seb. mus.* 2. t. 25. f. 5.

Habitat in Æthiopia. †

olia terna, *linearia*, *conferta*. Flores *pedunculati*, *mutantes*. Calyx *corolla dimidio brevior*, *subulatus*, *carinatus*. Corolla *cylindrica*, *longa*, *ore lævissime quadrifido*. Stamina *fere membranæa*, *linearia*, *obtusata*, *corollæ duplo longiora*.

ERICA antheris bifidis exsertis, corollis clavatis *coccinea*, quadrifidis, calycibus imbricatis, foliis ternis glabris. **rica africana** angustifolia, floribus oblongis tubulosis dependentibus coccineis, cum longissimis filamentis concoloribus. *Kaj. dendr.* 98. *Seb. mus.* 1. p. 32. t. 21. f. 4.

Habitat in Æthiopia. †

atura *E. plukenetii*, sed *Caulis tomentosus*. Folia *linearia*, *brevia*. Pedunculi *crassiores*, *breviores*. Calyx *imbricatus squamis octo*, *ovatis*, *per paria oppositis*, *nec intimis quaternis*. Corolla *præcedentis*, *sed profundius divisa*. Stamina *prioris*, *corollæ duplo longiora*, *nec Antheris distinguendis a filamentis*.

ERICA antheris bifidis exsertis, corollis clavato-cylindricis *curviflora*, curvis solitariis, foliis ternis glabris.

rica foliis linearibus quaternis oppositis villosis, corollis longissimis solitariis. *Hort. cliff.* 148.

rica fruticosa capensis. *Seb. mus.* 1. p. 32. t. 20. f. 4.

Habitat in Æthiopia. †

ERICA antheris bifidis inclusis, corollis clavato-cylindricis *tubiflora*, incurvatis pubescentibus acutis, foliis quaternis ciliatis.

rica spicata, floribus oblongis ex carneo-purpureis. *Pluk. mant.* 67. t. 346. f. 9.

rica africana frutescens. *Seb. mus.* 2. p. 20. t. 19. f. 5.

Habitat in Æthiopia. †

olia linearia, *lævia*: *summa ciliata*. Flores *terminales*, *solitarii*, *sessiles*. Corollæ *purpureæ*, *acuminatæ*, *pubescentes*, *multoties calyce longiores*.

ERICA antheris bifidis inclusis, corollis subclavatis *cerinthoides*, hirtis, floribus aggregatis sessilibus, foliis quaternis *des.* ciliatis.

Erica africana, flore purpureo. *Barth. act. 2.*

Erica coris folio hispido, cerinthoides africana.
cent. 25. t. 33. Seb. mus. 2. t. 22. f. 4. C. t. 34

Habitat in Æthiopia. †

Frutex ramis compositis. Folia quaterna, ob convexa, lævia, subtus sulco exarata, spinulosa. Flores magni, ad latera aggesti in cæssiles. Calyx hirtus pilis albis. Corolla læguinea, pilis albis hirta, ore obsolete quadrifida.

abietina.

22. *ERICA* antheris bifidis inclusis, corollis verso-cylindricis glabris, floribus lateralibus, foliis ternis ciliatis.

Erica foliis subulatis glabris quinis pluribusque cillatis, floribus longissimis terminalibus cæ Hort. cliff. 148.

Erica africana, abietis folio longiore & tenuioribus oblongis saturate rubris. Raj. dendr. 9 mus. 1. p. 31. t. 21. f. 1.

Habitat in Æthiopia. †

Frutex determinate ramosus. Folia quaterna, ob subulata, lævia, canaliculata, acuta. Flores rales, pedunculis solitariis ex alis foliorum. foliolis ovatis, purpureis. Corollæ longæ, E. curvifloræ, sed rectæ, ventricosæ, glab obtusæ.

pentaphylla.

23. *ERICA* antheris bifidis inclusis, corollis ovatis foliis quinis lævibus.

Erica africana frutescens, juniperi folio, flore uri brevissimo. Seb. mus. 1. p. 32. t. 21. f. 2.

Habitat in Æthiopia. †

pubescens.

24. *ERICA* antheris bifidis inclusis, corollis subpubescentibus, foliis quaternis linearibus hinc
Habitat in Æthiopia. †

parviflora.

25. *ERICA* antheris bifidis inclusis, corollis subdis longitudine calycis, foliis quaternis ciliatis
Habitat ad Cap. b. spei. †

Folia linearia, incurvata, hispida. Flores interterminalia conniventia, foliis breviores.

phyloides.

26. *ERICA* antheris bifidis inclusis, corollis ovatis glabris, foliis quaternis linearibus glabris.

tat in Æthiopia. †

patula, lato-linearis, cærinata. Flores ad apicem ramorum quasi umbellati. Calyx ovatus, glaberrimus, coloratus, corolla triplo brevior.

ICA antheris bifidis inclusis, corollis inflatis *halicacaba.*
ximis, foliis ternis linearibus lævibus. *Amæn. acad.*
*afr. 15. **

tat in Æthiopia. †

*ex altis: Ramis purpurascens; Ramulis sub-
tortosis, albis. Folia ternis, confertissima, levia,
petiolis rigide scabra. Pedunculi foliis breviores. Corolla
purpurea, glabra, ab omnibus distincta magnitu-
dine. In facie calycis Physalidis annuæ.*

ICA antheris bifidis inclusis, corollis subovatis *calycina.*
calycibus coloratis æquantibus, foliis ternis lævibus.
*africana humilis, flore albo urceolari, corolla
tubo, calyce amplo. Sch. mus. 2. p. 13. t. 11. f. 7.*

tat in Æthiopia. †

x *Bractee albæ. Corollæ luteæ.*

ICA antheris bifidis inclusis, corollis ovatis *tenuifolia.*
caucibus coloratis æquantibus, foliis oppositis linea-
ribus appressis.

*africana tenuifolia, unedonis flore, foliis longi-
tibus cauli adpressis. Pluk. mant. 68. t. 346. f. 11.*

tat in Æthiopia. †

ICA antheris bifidis inclusis, corollis ovatis sub- *empetrifolia.*
tilibus, foliis quinis obtusis ciliatis.

*africana, cordatis folio, pilosa, flosculis minu-
tissimis purpureis inter ramulos dispersis. Pluk.
mant. 68.*

tat in Æthiopia. †

ICA antheris bifidis inclusis, corollis globosis *pilulifera.*
abris quaternis, foliis quaternis setaceis patulis.

tat in Æthiopia. †

ICA antheris bifidis inclusis, corollis ovatis, ca- *corifolia.*
ucibus planis, bracteis coloratis, foliis ternis glabris.

*a antheris bifidis exsertis, corollis globosis medio-
lobatis, pedunculis triphyllis, foliis quaternis. Syst.
t. 2. p. 355.*

Erica africana glabra fruticosa, coris folio, arbore dilute purpureo. *Seb. mus. 1. p. 32. t. 21*

Erica rosmarini foliis incanis, æthiopica, floribus teis magno calyce inclusis. *Pluk. mant. 68. t. 3*

Erica capensis, coridis folio, flore rubello. *Pluk. mant. 68. t. 3. f. 7.*

Habitat in Æthiopia. h

Caulis fruticosus, compositus. Folia terna, li glabra. Flores terminales s. umbellulæ, sessile. Ææ in singulo pedunculo tres, alternæ, ovate pureæ, magnitudine 3 facie folioli calycini. patens, foliolis ovatis, purpureis. Corolla purpurea.

triflora.

33. *ERICA* antheris bifidis inclusis, corollis subgl subvillosis ternis, pedunculis triphyllis, foliis
Habitat in Æthiopia. h

gnaphalodes.

34. *ERICA* antheris bifidis inclusis, corollis globosis, calycibus duplicibus obtusis.
Habitat in Æthiopia. h

planifolia.

35. *ERICA* antheris bifidis inclusis, corollis campatis, foliis quaternis ciliatis patentibus.
Erica africana hirsuta, thymi foliis ternis. *Pluk. 69. t. 347. f. 1.*
Habitat in Æthiopia. h

paniculata.

36. *ERICA* antheris bifidis inclusis, corollis carlatis subumbellatis, foliis quaternis linearibus læErica tenuifolia, flosculis suave rubellis. *Pluk. 136. t. 279. f. 2.*
Erica africana, angustissimis foliis, flosculis in cillum congestis. *Seb. mus. 2. p. 46. t. 44. f. 4.*
Habitat in Æthiopia. h
Frutex. Folla linearia, erecta, fere lævia. l parvi, purpurei, uti etiam calyces 3 pedunculi, adeo copiosi, ut totam tegant plantam.

spumosa.

37. *ERICA* antheris bifidis inclusis, calycibus trifquamis inflatis inflexis, foliis ternis lævibus.
*acad. 6. afr. 14. **
Erica africana, flore rubro plano. *Seb. mus. 2. t. 9. f. 10. mala.*
Habitat in Æthiopia. h

*Opicas has omnes ad me misit inspiciendas ex Her-
o Oldenlandiano, egregii thesauri, de re herbaria
me meritus, possessor C. Burmannus.*

* * * *obscura.*

ICA racemo terminali, foliis alternis subtus to- dabocil.
tosis.

cantabrica, flore máximo, foliis myrti subtus in-
is. *Tournef. inst.* 603.

f. *Dabeci hibernis. Raj. dendr.* 98.

hibernica, foliis myrti pilosis subtus incanis. *Pet.*

. 42. t. 27. f. 4.

inium cantabricum. *Hudson. angl.* 143.

at in Hiberniæ Gallovidia in montibus Mayo, se-
cespitoso. *h*

ra *h* magnitudo *Andromedæ polifoliæ.* Caulis

icosi, pilosi, ferruginei. Folia alterna, *Andro-*

æ, lanceolata, subpetiolata, lateribus revoluta, sub-

albo tomentosa, supra pilis rarissimis adspersa. Ra-

breviores. Racemus longus, terminalis. Calyx

dripartitus, minimus. Capsula erecta, quadrilo-

iris, quadrivalvis, magna. Flores non vidi, quos

ribant *autoptæ.*

DAPHNE.

* *Floribus lateralibus.*

DAPHNE floribus sessilibus ternis caulinis, foliis Mezereum.
ceolatis deciduis.

ne floribus sessilibus infra folia elliptico-lanceolata.

Lapp. 140. *Fl. svec.* 311, 338. *Mat. med.* 179.

et. cliff. 147. *Roy. lugdb.* 201.

ola folio deciduo, flore purpureo, officinis Lau-

la femina. *Bauh. pin.* 462.

oides. *Cam. epit.* 937.

et in Europæ borealis sylvis. *h*

DAPHNE floribus sessilibus axillaribus, foliis lan Thymolæa.
latis, caulibus simplicissimis.

ne floribus tetrandris secundum caules simplicif-

os. *Sauv. monsp.* 56.

elæa foliis polygalæ glabris. *Bauh. pin.* 463.

elæa alpina glabra, flosculis subluteis ad folio-

ortum sessilibus. *Pluk. alm.* 366. t. 229. f. 2.

Sanamunda viridis vel glabra. *Bauh. prodr.* 1

Sanamunda glabra. *Bauh. hist.* 1. p. 592.

Habitat in Hispania & Monspeli in Horto Dei.

villosa.

3. DAPHNE foliis sessilibus lateralibus solitariis lanceolatis planis ciliatis pilosis confertis.

Thymelæa villosa minor lusitânica, polygonal

Tournef. inst. 594.

Habitat in Lusitania, Hispania, Alstræ ner. †

Frutex ramis alternis. Folia polygoni, lamina vix petiolata, utrinque pilis albis remotis: ribus in pagina superiore, pluribus ad marginem. Ex alis rudimenta plurima foliosa ramulorum de quasi verticillata. Flores angusti, parvibreviores.

Tarton-raira.

4. DAPHNE floribus sessilibus aggregatis axillariis foliis ovatis utrinque pubescentibus nervosis *orient.* 125.

Thymelæa foliis candicantibus & serici instar *Bauh. pin.* 463.

Tarton-Raire galloprovinciæ monspeliensium *ic.* 371.

Habitat in Galloprovinciæ. †

alpina.

5. DAPHNE floribus sessilibus aggregatis lateralis foliis lanceolatis obtusiusculis subtus tomentosis Daphnes aliud rarum, foliis supremis hirsutis *fasc.* 6. t. 3. f. 7.

Thymelæa cantabrica juniperifolia, ramulis pubescentibus. *Tournef. inst.* 595.

Thymelæa floribus inter folia, folio utrinque lanceolato *Hall. helv.* 187. *Sauv. monsp.* 57.

Chamelæa alpina, folio inferne incano. *Bauh. pin.* 1462.

Chamelæa alpina incana. *Lob. ic.* 370.

- β. Chamelæa fabaudica, folio utrinque incano albo. *Raj. hist.* 1588.

Thymelæa, incana, mezerei folio & facie, admodum fragilibus. *Pluk. alm.* 366. t. 229. f.

Habitat in Alpibus Helvetiæ, Genève, Italia, & strizæ. †

laureola.

6. DAPHNE racemis axillaribus, foliis lanceolatis glabris.

ne racemis lateralibus, foliis lanceolatis integris.
rt. cliff. 147. Hort. upf. 94. Mat. med. 180. Sauv.
isp. 57.

cola sempervirens, flore viridi, quibusdam Lau-
 la mas. *Bauh. pin. 662.*

cola. *Dod. pempt. 365.*

at in Anglia, Helvetia, Gallia, Baldo. †

PHNE pedunculis lateralibus bifloris, foliis lan- pontica.
 lato-ovatis.

melæa pontica, citrei foliis. *Tournef. itin. 3. p.*

2. t. 180.

at in Ponto. †

* * Floribus terminalibus.

PHNE capitulo terminali pedunculato, foliis op- indica.
 fitis oblongo-ovatis glabris. *Osb. it. 246.*

at in China. †

ex parvus. Folia opposita, oblongo-ovata, inte-
 rima, glabra. Pedunculus terminalis; brevissi-
 s, apice gerens flores 6. ad 8. sessiles.

PHNE floribus congestis terminalibus sessilibus, Cneorum.
 iis lanceolatis nudis.

ine humifusa, foliis oblongis flores sessiles termi-
 les subcingentibus. *Sauv. monsp. 57. Duham. arb.*

t. 94.

melæa affinis facie externa. *Bauh. pin. 463.*

rum. *Math. hist. 46. Clus. hist. 89.*

at in Helvetia, Hungaria, Pyrenæis, Baldo, L.
Munchhausen. †

APHNE panicula terminali, foliis lineari-lanceo- Grindium.
 tis acuminatis.

hine foliis lanceolatis basi angustioribus, racemo
 ido terminali. *Sauv. monsp. 56.*

hne floribus racemosis, foliis lineari-lanceolatis a-
 uminatis integris. *Guett. stamp. 2. p. 427.*

melæa foliis lini. *Bauh. pin. 463.*

melæa. *Clus. hist. 1. p. 87. Cam. epit. 974.*

itat in Hispania, Italia, G. Narbonensi. †

APHNE floribus terminalibus pedunculatis, folii squarrosa.
 arsis linearibus patentibus mucronatis.

Thymelæa capitata lanuginosa, foliis creberrimis aculeatis. Burm. afr. 134. t. 49. f. 1
Habitat in Æthiopia. h

DIRCA.

- palustris. 1. DIRCA. *Amæn. acad. 3. p. 12. t. 1. f. 7. 1*
p. 88. Duham. arb. 1. t. 212.
Thymelæa floribus albis primo vere erumpentibus oblongis acuminatis, viminibus & cortenacibus. Gron. virg. 155.
Habitat in Virginix paludosis. h

GNIDIA.

- pinifolia. 1. GNIDIA foliis sparsis lineari subulatis, flosculicillatis, floribus aggregatis terminalibus
Rapunculus foliis nervosis linearibus, floribus non galeatis. Burm. afr. 112. t. 41. f.
Habitat in Æthiopia. h
- tomentosa. 2. GNIDIA foliis alternis ovato-lanceolatis.
Habitat in Æthiopia. h
Flores tomentosi, capitati, terminales.
- oppositifolia. 3. GNIDIA foliis oppositis lanceolatis.
Habitat in Æthiopia. h
Frutex ramis rectis Folia opposita, lanceolata, integerrima. Flores terminales, confundibuliformes, tubo villoso, petalis emarginatis.

STELLERA.

- Passerina. 1. STELLERA foliis linearibus, floribus quatuor
Amæn. acad. 1. p. 400. Sauv. mosq. 69.
Passerina foliis linearibus, floribus laxè spicatis in foliorum binorum alis sessilibus. Guett. J Dalib. paris. 118.
Passerina. Bauh. hist. 3. p. 456.
Lithospermum, liniarix folio, germanicum pin. 259.
Linaria alterna botryoides montana. Columna p. 82. t. 80.
Habitat in Italiæ, Galliæ, Germaniæ campis apricis.

TELLERA foliis lanceolatis, floribus quinquesidis. *Amæn. acad.* 1. p. 400. * *Chamaejasme*
hamæjasme radice mandragoræ. *Ann. ruth.* 16. t. 2.
abitat in Sibiria. Gmelin 2.

PASSERINA.

PASSERINA foliis linearibus convexis quadrifariam *filiformis*
 imbricatis, ramis tomentosis.

Passerina foliis linearibus. *Hort. cliff.* 246. t. 11. *
Roy. lugdb. 208.

hymelæa æthiopica fruticosa, foliis in longum striatis,
 furculis valde tomentosis. *Pluk. alm.* 180.

hymelæa æthiopica, *passerinæ* foliis. *Breyn. cent.* 10.
 t. 6.

abitat in Æthiopia. †

PASSERINA foliis carnosis extus glabris, caulibus *hirsuta*
 tomentosis.

hymelæa tomentosa, foliis sedi minoris. *Bauh. pin.*
 461.

namunda 3. *Clus. hist.* 1. p. 89. *Breyn. cent.* t. 19.

eslamoides parvum *dalechampi.* *Bauh. hist.* 1. p. 595.

abitat in Galloprovincia, Italia, Oriente. †

PASSERINA foliis ovatis tomentosis, floralibus *sericea*
 quaternis, caule hirsuto, filamentis bifurcatis. *Amæn.*
acad. 4. p. 313. *

hymelæa sericea, foliis oblongis, floribus tubulosis
 angustissimis. *Burm. afric.* 135. t. 49. f. 2.

abitat in Æthiopia. †

PASSERINA foliis lanceolatis glabris acuminatis ad- *dodecandra*
 pressis, floribus dodecandris sessilibus, staminibus
 quatuor inclusis. *Amæn. acad.* 4. p. 271. *

hymelæa foliis oppositis cruciatis. *Burm. afr.* 127.
 t. 147. f. 1, 2.

abitat in Æthiopia. †

PASSERINA foliis ovatis glabris acutis, floribus ob- *lavigata*
 tusis. *Amæn. acad.* 4. p. 312. *

hymelæa foliis planis acutis, coma & floribus purpu-
 reis. *Burm. afric.* 137. t. 49. f. 2.

abitat in Æthiopia. †

PASSERINA foliis lanceolato-linearibus glabris, flo- *capitata*
 ribus *Spec. plant. pars I.* K k

ribus capitatis: receptaculo incrassato.
6. afr. 16. *

Thymelæa foliis linearibus alternis, floribus et
tiolo copiosis. *Burm. afric.* 133. t. 48. f. 3.

Habitat ad Cap. b. Spei. †

ciliata. 7. *PASSERINA*, foliis lanceolatis subciliatis et
mis nudis.

Passerina foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 146. *R.*
208. *Gron. orient.* 126.

Thymelæa foliis chamæ læ 'minoribus hirsutis
pin. 463.

Thymelæa foliis oblongis acutis ad oras
Burm. afric. 129. t. 47. f. 2.

Sanamunda 1. *Clus. hist.* 1. p. 88.

Erica africana, rusci folio. *Seb. mus.* 2. p. 13.
f. 9.

Habitat in Æthiopia, Hispania, Oriente. †

uniflora. 8. *PASSERINA* foliis oppositis linearibus, flor
litariis terminalibus, ramis glabris.

Thymelæa foliis triquetris cruciatim oppositis,
riceo. *Burm. afr.* 132. t. 48. f. 2.

Thymelæa ramosa, linearibus foliis angustis,
litaro. *Burm. afric.* 131. t. 48. f. 1.

Habitat in Æthiopia. †

LACHNEA.

criscephala. 1. *LACHNEA* capitulis solitariis lanatis, foliis
fariam imbricatis.

Habitat in Æthiopia. †

Folia trigona gibba. Capitula terminalia, fol
tomentosa, cincta lana candida.

conglomerata. 2. *LACHNEA* capitulis confertis, foliis laxis.
Thymelæa africana, polii angustioribus foliis, in

in capitulis summo caule conglomeratis. *Plat.*
179. *Raj. dendr.* 54.

Sanamunda 3. *Clusii* affinis, polii folio. *Breyer.*
18. t. 7.

Habitat ad Cap. b. Spei. †

BÆCKEA.

fratrescens. 1. *BÆCKEA*. *Osbeck. it.* 231. t. 1. *

Habitat in China. † *D. D. Abrah. Bæck S. R. M. Seciæ Archiater, & Amicus noster vere sincerus, e cujus horto sicco purissimas rariores stirpes obtinui-mus, etiam hanc primus nobiscum communicavit.*

Frutex habitu abrotani, ramis virgatis: Ramulis opposi-tis, brevibus, simplicibus. Folia opposita, linearia, acuta, glabra, integerrima. Flores axillares, solita-rii: pedunculo nudo longitudine floris, foliis longe brevior. Perianthium infundibuliforme, quinque-dentatum. Petala 5, subrotunda, calyci inserta. Fi-lamenta 8, quorum 6 paria, & 2 solitaria, brevissi-ma, inflexa. Antheræ subovatæ, parvæ. Germen subrotundum. Stylus filiformis, corolla brevior. Sti-gma capitatum. *Chinensibus Tjongina. Osbeck.*

DIGYNIA.

GALENIA.

GALENIA. *Hort. clif. 150. Roy. lugdb. 209.*

africana.

Sherardia. Pout. epist. 14.

Kali lignosum, flore muscoso, rosmarini folio. Bocc. mus. 150. t. 110.

Atriplex africana lignosa frutescens, rosmarini foliis. Till. pis. 20. t. 15.

Habitat in Africa. †

WEINMANNIA.

WEINMANNIA.

Windmannia fruticosa, foliis subrotundis ferratis per pinnata. pinnas cordato alatas, racemis terminalibus, planis & ramis oppositis. Brown. jarh. 212.

Habitat in Jamaica. †

MOEHRINGIA.

MOEHRINGIA.

Alfina montana, capillaceo folio. Bauh. pin. 251. muscosa. Scheuch. alp. 503. t. 6. Pluk. alm. 23. t. 75. f. 1.

Alfina saxifraga angustifolia minima montana. Col. ephr. 1. p. 292. t. 290.

Alfina tenuifolia muscosa. Bauh. pin. 251. Morif. blef. 10. hist. 2. p. 551. f. 5. t. 23. f. 12.

Habitat in Alpibus Helvetiæ, Italiæ, Austriæ, & Ipelli ad fontes & scaturigines.

TRIGYNIA. POLYGONUM

* *Atraphaxoides caule frutescente.*

- frutescens. 1. **POLYGONUM** caule fruticoso, calycinis duobus reflexis. *Hort. upf.* 95.
Atraphaxis inermis, foliis planis. Hort. cliff. 12
lugdb. 209.
Lapathum orientale, frutex humilis, flore p
Tournef. cor. 38.
Lapathum dauricum montanum fruticans, ru
sparsis. Amm. ruth. 227.
Habitat in Sibiria, Dauria. §

* * *Bistorta spica unica.*

- Bistorta. 2. **POLYGONUM** caule simplicissimo monostoliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Mat.* 150.
Bistorta foliis ovato-oblongis acuminatis Hort. 150. *Hort. upf.* 95. *Roy. lugdb.* 217.
Bistorta major, radice magis intorta. Bauh. p
Bistorta. Cam. epit. 683.
Habitat in montibus Helvetiæ, Austriæ, Galliæ
- viviparum. 3. **POLYGONUM** caule simplicissimo monostoliis lanceolatis.
Bistorta foliis lanceolatis. Fl. lapp. 152. *Fl. S.* 340. *Hort. cliff.* 150.
Bistorta montana minor, radice intorta inodisculis in spicæ cacumine albis sterilibus, infuscæ parte tuberculis proliferis turbinatis punctunda. Amm. ruth. 169.
Bistorta alpina media. Bauh. pin. 192. *Ocd. da*
Bistorta alpina minor. Bauh. pin. 192,
Bistorta alpina minima. Hall. opusc. 234.
Habitat in Europæ subalpinis pascuis duris. ¶

* * * *Persicaria pistillo bifido.*

- virginiana. 4. **POLYGONUM** floribus pentandris semidigressis corollis quadrifidis inæqualibus, foliis ovatis

Perficaria floribus pentandris digynis, corolla quadrifida inæquali. *Wach. ultr.* 258.

Perficaria florum staminibus quinis, stylo duplici, corolla quadrifida inæquali. *Hort. cliff.* 42. *Gron. virg.* 43. *Roy. lugdb.* 216.

Perficaria frutescens maculosa virginiana, flore albo. *Morif. hist.* 2. p. 589. *Raj. hist.* 183.

Habitat in Virginia. 2.

POLYGONUM floribus pentandris semidigynis, staminibus corollæ regulari æqualibus. *Lapathifolium.*

Perficaria floribus pentandris digynis, corolla regulari staminibus æquali. *Wach. ultr.* 257.

Perficaria florum staminibus quinis semidigynis, stylo bifido corollæ regulari æquantibus. *Hort. cliff.* 42.

Perficaria major, lapathi foliis, calyce floris purpureo. *Tournef. inst.* 510. *Raj. suppl.* 119.

Perficaria Hydropiper. *Lob. ic.* 315.

Habitat in Gallia.

POLYGONUM floribus pentandris semidigynis, staminibus corolla longioribus. *amphibium.*

Perficaria florum staminibus quinis corollam superantibus, stylo bifido. *Hort. cliff.* 41. *Roy. lugdb.* 216.

Perficaria floribus pentandris digynis, corolla staminibus brevior. *Fl. fvec.* 318; 341.

Potamogeton falicis folio. *Bauh. pin.* 193.

Habitat in Europa.

POLYGONUM foliis crenatis. † *ferratum.*

Polygonum folio oblongo crenato. *Shaw. afr.* 489.

Habitat in Mauritania.

POLYGONUM floribus pentandris trigynis, foliis lanceolatis. *ocreatum.*

Perficaria spicis longis numerosis, vaginis integris, floribus pentandris trigynis. *Gmel.*

Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.*

Stipulæ sunt vaginæ integræ, ventricosæ, leves, ampliores multo quam caulis. Folia lanceolata, revoluta. Flores racemosi,

POLYGONUM floribus hexandris, semidigynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis. *Hydropiper*

Polygonum foliis lanceolatis, floribus hexandris midigynis. Mat. med 187.

Perficaria floribus hexandris semidigynis. Fl. svec. 343.

Perficaria florum staminibus senis, stylo bifido. H. cliff. 46. *Roy. lugdb.* 216.

Perficaria urens f. Hydropiper. Bauh. pin. 101.

Hydropiper. Dod. pempt. 607.

Habitat in Europæ subhumidis. ☉

Perficaria. 10. POLYGONUM floribus hexandris digynis, fl. ovato-oblongis, foliis lanceolatis, stipulis cili

Perficaria floribus hexandris digynis. Fl. svec. 319.

Perficaria florum staminibus senis, stylo duplici. Cliff. 42. *Gron. virg.* 157. *Roy. lugdb.* 216.

Perficaria mitis. Bauh. hist. 3. p. 779. *Fl. lapp.* 71.

Perficaria mitis maculosa & non maculosa. Bauh. 101.

Perficaria foliis angustissimis pene glabris, spinis interruptis rarissimis, vaginis ciliaribus. Hall. herb. gætt. 29.

β. *Perficaria angustifolia. Bauh. pin.* 101. *prodr.* 43.

γ. *Perficaria foliis subtus tomentosis. Hall. herb. gætt.* 28.

Habitat in Europæ cultis. ☉

Folia subtus tomentosa.

barbatum. 11. POLYGONUM floribus hexandris trigynis, virgatis, stipulistruncatis setaceo-ciliatis, foliis ceolatis.

Perficaria maderaspatana, longiore folio, hirsuta. alm. 288. t. 10. f. 7?

Perficaria foliis ovatis glabris. Krafchen. comm. 1747. p. 375. t. 13?

Perficaria procumbens longissima angustissima maculosa, spica longiori laxiori & graciliore. jam. 48. *hist.* 1. p. 17. t. 3. f. 1.

Velutia-modela-mucy. Rheed. mal. 12. p. 145. (non 76.)

Habitat in China.

Caulis herbaceus, rufus. Stipulæ vaginales laxae, truncatae, ciliatae, setis validis longitudine ipsius stipulae. Spicæ virgatae, longae: bus remotis, tribus ex singula bractea turbinata, lia lanceolata.

POLYGONUM floribus heptandris digynis, foliis ovatis, caule erecto, stipulis hirtis hypocrateriformibus. orientale.

Perficaria florum staminibus sex pluribusque, stylo duplici. *Hort. cliff.* 42. *Hort. upf.* 6. *Roy. lugdb.* 216.

Perficaria foliis ovato-lanceolatis acutis, foliis pentandris, caule erecto. *Mill. dict. t.* 201.

Perficaria orientalis, nicotianæ folio, calyce florum purpureo. *Tournef. cor.* 38. *Comm. rar.* 43. t. 43.

Schovanna-modela muccu. *Rheed. mal.* 12. p. 147. t. 76. (non 77.).

Habitat in Oriente, India. ☉

Indica longe hirsutior est, quam orientalis.

POLYGONUM floribus octandris digynis, pedunculis hispida, foliis lanceolatis, stipulis muticis. pennsylvanicum.

Habitat in Pennsylvania. *Kalm.*

Facies ♂ *habitus* *Fol. Perficariae*, sed majora strictiora omnia. *Caulis* ramosus, angulatus. *Folia* lanceolata, acuminata carina subtus admodum scabra. *Stipulae* truncatae, muticae. *Pedunculi* scabri, setis rigidiusculis apice gluten secernentibus. *Spicae* subracemosae, strobiliculis pedicellatis.

* * * * *Polygonum foliis indivisis, floribus octandris.*

POLYGONUM floribus octandris trigynis axillaribus, foliis ovali-lanceolatis sempervirentibus, caule suffrutescente. maritimum.

Polygonum maritimum latifolium. *Bauh. pin.* 281.

Polygonum maritimum. *Cam. epit.* 691.

Habitat in littoribus M. mediterranei, Orientis, Virginiae. ♀

Affine nimis P. aviculari, ut vix distinguatur, etiam floribus quaternis ♂ *caule hinc planiore; sed majora durioraque omnia. Folia* ovata, coriacea, sempervirentia, exsiccatione caeruleo-virescentia. *Caulis* brevior, durus, perennans.

POLYGONUM floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. aviculare..

Polygonum caule procumbente herbaceo, foliis lanceolatis integerrimis. *Mat. med.* 185.

Polygonum. *Hort. cliff.* 150. *Fl. suec.* 322; 339. *Gron. virg.* 44. *Roy. lugdb.* 215. *Hall. helv.* 182.

Polygonum latifolium. *Bauh. pin.* 281.

β. Polygonum brevi angustoque folio. Bauh. pin. 281.

γ. Polygonum oblongo angusto folio. Bauh. pin. 281.
lapp. 153.

δ. Polygonum angustifoliis, calycibus purpurascēti
Dill. app. 65.

ε. Polygonum erectum humile, foliis orbem.
app. 65.

Habitat in Europæ cultis ruderatis. ☉

erectum. 16. POLYGONUM floribus octandris trigynis ar
ribus, foliis ovalibus, caule erecto herbaceo.

*Habitat in Philadelphia, enata ex seminibus D.
mii.* ☉

articulatum. 17. POLYGONUM floribus octandris trigynis,
cis articulatis paniculatis, stipulis vaginalibus trunc

Habitat in Canada. Kalm. ☉

Radix fibrosa, parva. Caulis pedalis, ramis fu
alternis; subdivisus in paniculam floriferam. S
læ solitariae, vaginales, superne latiores, int
truncatae, nec fissæ. Folia linearia, glabra.
culam terminant Spicæ filiformes, angustissima
bricatæ bracteis vaginalibus, turbinatis, truncati
sinu singulo oritur Pedunculus solitarius, capil
basi articulatus, coloratus, uniflorus. Coroll
carnata, quinquepartita, fundo laxiore quam
aviculari, flaminibus octo, Pistillo stylis 3.

divaricatum 18. POLYGONUM floribus octandris trigynis
mosis, foliis lanceolatis, caule divaricato pa

Helxine foliis lanceolatis, caule diffuso. Hort. u.

*Fagopyrum orientale ramosum & multiflorum,
carix folio. Tournef. cor. 39. Buxb. cent. 2.
t. 31.*

*Perficaria alpina, folio nigricante, floribus all
All. pedem. 41. t. 8.*

*Perficaria alpina altera saxatillis, foliis duri
acutis. Bocc. mus. 2. p. 108. t. 83.*

Habitat in Sibiria, Corsica. 24

* * * * * *Helxine foliis subcordatis.*

chinesic. 19. POLYGONUM floribus octandris trigynis
dunculis scabris, foliis ovatis.

Habitat in India, China.

s flexuosus. Folia ovato-cordata, s. lato-ovata, byra utrinque. Pedunculi hispidi, apice sæpius idi. Flores capitati. Stipulæ vaginales, late, gerrime nec ciliatæ, ovatæ. Flores in capitulis rotundis, pauci, terminales.

LYGONUM foliis triangularibus, caule acuto, stipulis perfoliato-foliosis patentibus subro- perfoliatum
ndis.

at in India. Burmannus.

is P. sagittato & arifolio. Caulis angulatus aculeis parvis recurvis, ut etiam Petioli. Stipulæ non inantes, sed patentes, foliaceæ, ovatæ s. subundæ, integerrimæ. Folia triangularia, basi pannen sinuata, latiora quam longa, interdum pellata. Pedunculi ad apicem caulis, pauciflori, acuti.

LYGONUM foliis sagittatis, caule aculeato. ine caule aculeato, foliis sagittatis. Gron. virg. 44. fagittatum.
ld. noveb. 92.

ine caule erecto aculeis reflexis exasperato. Hort. fl. 151. t. 12. * Roy. lugdb. 211.

triticum similis, angustiori folio, convolvuli modo scandens, caule spinulis deflexis densius obfito. uk. mant. 74. t. 394. f. 5.

ta posterior e novo belgio. Laët. amer. 73. t. 74. tat in Virginia, Marilandia madidis.

LYGONUM foliis hastatis, caule aculeato. triticum similis spinosa scandens, arifolio latiore, arifolium.
ridana. Pluk. amalth. 87. t. 398. f. 3.

ta prior e novo belgio. Laët. amer. 73. tat in Virginia, Florida.

LYGONUM foliis cordato-sagittatis, caule inermi erecto, seminibus subdentatis. tataricum.

kine caule erectiusculo inermi, foliis cordato-sagittatis, seminibus subdentatis. Hort. upf. 96.

kine caule erecto inermi, foliis cordato-sagittatis, minum angulis dentatis. Hort. cliff. 151.

otriticum sibiricum. Aët. stockh. 1744. p. 117.

4.
tat in Tataria. ☉

- Fagopyrum.** 24. **POLYGONUM** foliis cordato - sagittatis , caule erectiusculo inermi , feminum angulis æqualibus
Polygonum caule erectiusculo inermi ramoso , foliis cordato-sagittatis , seminibus lævibus. *Mat. med.*
Helxine caule erectiusculo inermi , foliis cordato-gittatis , seminibus integerrimis. *Hort. upf.* 96.
Helxine caule erectiusculo inermi , foliis cordato-gittatis. *Hort. cliff.* 151. *Fl. svec.* 324, 345. *Roy. h.* 217.
Erysimum cereale , folio hederaceo. *Bauh. pin.*
Ocymum cereale. *Tabern. hist.* 276.
Habitat in Asia. ☉
- Convolvulus.** 25. **POLYGONUM** foliis cordatis , caule volubili floribus planiusculis.
Helxine caule volubili. *Fl. lapp.* 154. *Fl. svec.* 344. *Hort. cliff.* 150. *Gron. virg.* 157. *Roy. h.* 217.
Convolvulus minor . semine triangulo. *Bauh. pin.*
Convolvulum nigrum . *Dod. pempt.* 396.
Habitat in Europæ agris. ☉
Caules striati. Racemi ex alis. Flores etiam ad pedunculi communis. Semina calyce triquetrotel
- dumetorum.** 26. **POLYGONUM** foliis cordatis , caule volubili , floribus carinato - alatis.
Fagopyrum prælongum dumetorum , feminibus duplici more dispositis. *Dill. app.* 60.
Fagopyrum scandens altissimum dumetorum , sebus tribus alis pellucidis. *Rupp. jen.* 99. *Hall.* 173.
Fagopyrum sylvaticum scandens , flore foliaceo. *anth.* 265.
Fagopyrum majus scandens. *Vaill. paris.* 52.
Habitat in Europæ australioris sylvis umbrosis. ☉
Folia cordata lobis baseos rotundatis. Caulis noster. Panicula e racemo composito , alternatim bi
- scandens.** 27. **POLYGONUM** foliis cordatis , caule erecto dente , petiolis basi subtus poro pertusis.
Polygonum foliis cordatis , caule volubili , floribus carinatis. *Syst. nat.* 1. p. 364.

Egopyrum scandens americanum maximum. *Tournef. inst.* 511.

Egopyrum scandens, caule rubente, semine nigro. *Gron. virg.* 44. *Cold. nov. b.* 93.

Egotriticum volubile majus virginianum. *Pluk. alm.* 143. t. 177. f. 7.

Egopyrum scandens f. Volubilis nigra major, flore & fructu membranaceis compressis *Sloan. jam.* 46. *hist.* 1. p. 138. t. 90. f. 1.

Habitat in America. ☉

COCOLOBA,

COCOLOBA foliis cordato-subrotundis nitidis. *Uvifera.*

Coccoloba foliis subrotundis integris nitidis planis, racemis fructuum cernuis. *Jacq. amer.* 19. *hist.* t. 73.

Coccolobis foliis crassis orbiculatis sinu aperto. *Brown. jam.* 208.

Polygonum foliis subrotundis, caule arboreo, fructibus baccatis. *Sp. pl.* 1. p. 365.

Uvifera foliis subrotundis amplissimis. *Hort. cliff.* 487.

Uvifera litorea, foliis amplioribus fere orbiculatis crassis, americana. *Pluk. alm.* 394. t. 236. f. 7.

Guajabara racemosa, foliis coriaceis subrotundis. *Plum. ic.* t. 445.

Populus americana rotundifolia. *Bauh. pin.* 430.

Prunus maritima racemosa, folio subrotundo glabro, fructu minore purpureo. *Sloan. jam.* 183. *hist.* 2. p. 129. t. 220. f. 3. *Raj. dendr.* 40. *Catesb. car.* 2. p. 96. t. 96.

Habitat in America. ☿

COCOLOBA foliis orbiculatis pubescentibus. *rubescens.*

Coccoloba grandifolia foliis subrotundis integris hirsutis rugosis. *Jac. amer.* 19.

Coccolobis arborea, foliis orbiculatis. *Brown. jam.* 210.

Scortea arbor americana, amplissimis foliis averfa parte nervis extantibus. *Pluk. phyt.* 222. f. 8.

Habitat in America. ☿

COCOLOBA foliis lanceolato-ovatis. *punctata.*

Coccoloba foliis ovali-oblongis acuminatis planis. *Jacq. amer.* 19.

Coccolobis foliis oblongo-ovatis venosis, uvis minoribus punctatis. *Brown. jam.* 240.

Uvi-

Uvifera arbor americana, fructu aromatico puſſo
Pluk. alm. 394. t. 237. f. 4.
Habitat in America. †

- excoriata. 4. COCCOLOBA foliis ovatis, ramis quaſi ex cortice
 Coccoloba foliis ovato-oblongis acuminatis ru
Jacq. amer. 19.
 Coccolobis montana major arborea, foliis subre
 dis, cortice lævi. *Brown. jam. 210.*
 Guajabara alia racemosa, foliis oblongis. *Plu*
146. f. 1?
 Arborindica, glycyrrhizæ foliis subrotundis, florib
 prælongam ſpicam adactis. *Pluk. amalth. 22. t. 363.*
Habitat in America. †

- tenuifolia. 5. COCCOLOBA foliis ovatis membranaceis-
*acad. 5. p. 397. **
 Coccolobis frutescens, foliis subrotundis, fructu
 nore trigono. *Brown. jam. 210. t. 14. f. 3.*
Habitat in Jamaica. †

PAULLINIA.

- asiatica. 1. PAULLINIA foliis ternatis, caule aculeato, c
 nullis. *Fl. zeyl. 143. **
 Chamælæa trifolia aculeata. *Burm. zeyl. 58. t. 2.*
 Frutex baccifer indicus spinosus trifolius, floribu
 catis. *Pluk. alm. 202. t. 95. f. 5.*
 Kaka-toddali. *Rheed. mal. 5. p. 81. t. 41.*
Habitat in India. †

- Seriana. 2. PAULLINIA foliis ternatis, petiolis teretiuf
 foliolis ovato-oblongis.
 Paullinia foliis ternatis, foliolis crenatis, pedu
 cirrhiferis. *Hort. cliff. 152.*
 Seriana scandens triphylla & racemosa. *Plum. ge*
ic. 113. f. 2.
Habitat in America calidiore. †

- Cururu. 3. PAULLINIA foliis ternatis, petiolis marginat
 liolis cuneiformibus obtusis subdentatis.
 Paullinia foliis ternatis, foliolis obtusis vix de
 latis glabris deſinentibus in petiolum pro
*Hort. cliff. 151. **
 Cururu scandens triphylla. *Plum. gen. 34. ic. 111.*
Habitat in America calidiore. †

PAULLINIA foliis biternatis, petiolis marginatis, fo- mexicana.
liolis ovatis integris.

Paullinia foliis ternato-decompositis, caule aculeato.
Hort. cliff. 152.

Meriana scandens enneaphylla & racemosa. *Plum. gen.*
34. ic. 113. f. 1.

Quauhmeati. *Hern. mex.* 289.

Habitat in America calidiore. †

PAULLINIA foliis biternatis, foliolis ovatis sub- curassavica.
nuatis.

Paullinia foliis decompositis ternatis, caule inermi.
Hort. cliff. 152. *

Cururu scandens enneaphylla, fructu racemoso rubro.
Plum. gen. 34. ic. 111. f. 1.

Ordis indi folio & facie frutescens curassavica latifolia.
Pluk. alm. 120. t. 168. f. 6.

Habitat in Curassao. †

PAULLINIA foliis triternatis.

Paullinia foliis supradecompositis. *Hort. cliff.* 152. * polyphylla.

Meriana frutescens polyphylla & racemosa. *Plum. gen.*
34. ic. 112.

Ordis indi folio & facie frutescens portoricentis.
Pluk. alm. 120. t. 168. f. 5.

Habitat in America calidiore. †

Trichus axillaris; Flores paniculati.

PAULLINIA foliis pinnatis: foliolis incisis, petiolis pinnata.
marginatis. *Hort. cliff.* 52. * *Roy. lugdb.* 464.

Cururu scandens pentaphylla. *Plum. gen.* 34.

Rematis pentaphylla, pediculis alatis, fructu racemoso
tricoloro & coccineo. *Plum. amer.* 76. t. 91.

Hum cordatum non vesicarium. *Sloan. jam.* 111.

Cururu - ape. *Marcgr. bras.* 22. *Pij. bras.* 114. *Raj.*
hist. 1347.

Habitat in Brasilia, Jamaica, Domingo. †

Liola oblongo-ovata, profunde & remote serrata.

GARDIOSPERMUM.

GARDIOSPERMUM foliis lævibus. *Hort. cliff.* 150. *Halicaca-*
Hort. ups. 97. *Fl. zeyl.* 142. *Roy lugdb.* 464. *bun.*

Hum vesicarium, fructu nigro: alba macula notato.

Sauh. pin. 743.

Hali-

- Halicacabum*. *Rumph. amb. 6. p. 60. t. 24. f. 2.*
Halicacabus peregrinus. *Dod. pempt. 455.*
 β. *Corindum* ampliore folio, fructu maximo. *To inst. 431.*
 γ. *Corindum* fructu & folio minori. *Tournef. inf. Habitat in Indiis. ☉*
 Corindum. 2. **CARDIOSPERMUM** foliis subtus tomentosis
Cardiospermum villosum, foliis incisus obtusis
 tiolis brevibus. *Mill. dict. Habitat in Brasilia.*
Similis C. Halicacabo, sed Capsulae & Folia submentosa. Pedunculi inter cirrhos 10 s. 11 sic a caju fructificationum persistentes, rigidi: & arctiores.

SAPINDUS.

- Saponaria. 1. **SAPINDUS** foliis impari-pinnatis, caule inen
Sapindus. *Hort. clij. 152. Mat. med. 532. Roy 464.*
Sapindus foliis oblongis vix petiolatis per cost
 ple alatum. *Brown. jam. 206.*
 Saponaria. *Rumph. amb. 2. p. 134*
Prunitera racemosa, folio al. to costa media m
 nulius utrinque exstantibus donata. *Sloan. jar
 hist. 2. p. 131.*
Nux americana, foliis alatis bifidis. *Comm. hor
 183. t. 54.*
Nuciprunifera arbor americana, fructu saponari
 culato monococco nigro. *Pluk. alm. 255. t. 21*
Habitat in Indiis. †
 trifoliata. 2. **SAPINDUS** foliis ternatis.
Poerinsii s. Vercœpœlongi. Rheed. mal. 4. p. 4
Habitat in Malabaria. †
 spinosus. 3. **SAPINDUS** foliis abrupte pinnatis, caule
 fissimo.
Sapindus fruticosus, caudice & ramis spinosissim
 liis ovatis pinnatis. *Brown. jam. 207. t. 20. f.*
Habitat in Jamaica. †

TETRAGYNIA.

P A R I S

RIS.

quadrifolia.

s foliis quaternis. *Fl. lapp.* 155. *Fl. svec.* 325; 346.
ort. cliff. 153. *Roy. lugdb.* 461. *Hall. helv.* 412.
 num quadrifolium bacciferum. *Bauh. pin.* 167.
 nitum salutiferum. *Tabern. hist.* 720.
tat in Europæ nemoribus. 24

ADOXA.

OXA. *Hort. cliff.* 152. *Fl. svec.* 326, 347. * *Mofchatel-*
ly. lugdb. 252. *lina.*
 chatella. *Cord. hist.* 172.
 inculus nemorosus *Mofchatellina* dictus. *Bauh.*
t. 178.
 aria bulbosa f. tuberosa minima. *Tabern. ic.* 39.
tat in Europæ nemoribus. 24
relata secundum florem terminalem ex principiis
id. bot. 178.

ELATINE.

ATINE foliis oppositis. *Fl. lapp.* 156. *Fl. svec.* *Hydropiper*
 7; 348. *Gron. virg.* 158 *Roy. lugdb.* 452.
ropiper. Buxb. cent. 3. p. 35. t. 37. f. 3.
 astrum serpillifolium, flore albo tetrapetalo.
Vaill. paris. 5. t. 2. f. 2.
 astrum serpillifolium, flore roseo tripetalo. *Vaill.*
if. 5 t. 2. f. 1.
tat in Europæ inundatis. ☉
 ATINE foliis verticillatis. *Fl. svec.* 2. n. 349. *Alfinastrum.*
y. lugdb. 452. *Sauv. monsp.* 164. *Boem. lips.* 127.
 ne foliis emerfis linaribus, immerfis capillaceis.
rv. act. monsp. 1743 p. 50.
 ides facie pinastellæ. *Kupp. gen.* 90. *
 etum palustre, linariæ scopariæ folio. *Bauh.*
. 15.
 astrum galii folio. *Vaill. paris.* 6. t. 1. f. 8.
 astrum gratiolæ folio. *Tournef. inst.* 244. *Raj.*
pl. 502.
tat Aboæ, Lipsiæ, Parisiis, Monspeliis, in fossis.

Clas-

Classis IX.

ENNEANDRI
MONOGYNIA.

LAURUS.

- Cinnamomum. 1. LAURUS foliis trinerviis ovato-oblongis nervus apicem evanescentibus. *Fl. zeyl.* 145. *med.* 190.
Laurus foliis oblongo-ovatis nitidis planis. *Hort.* 154.
Cinnamomum, foliis latis ovatis, frugiferum. *zeyl.* 62. t. 27.
Cinnamomum f. Canella zeylanica. *Bauh. pin.*
Cassia cinnamomea. *Herm. lugdb.* 129. t. 655.
Habitat in Zeylona; in Martinia. Jacquin. †
- Cassia. 2. LAURUS foliis triplinerviis lanceolatis. *F.* 146. *Nat. med.* 191.
Cinnamomum perpetuo florens, folio tenuiore *Burm zeyl.* 63. t. 28.
Cinnamomum f. Canella malabarica f. javanensis *pin.* 409.
Carna. *Kheed. mal.* 1. p. 107. t. 59.
Habitat in Malabaria, Sumatra, Java. †
- Camphora. 3. LAURUS foliis triplinerviis lanceolato-ovatis *med.* 192.
Laurus foliis ovatis utrinque acuminatis trinerviis, petiolis laxis. *Hort. cliff.* 154.
Laurus Camphorifera. *Kempf. jap.*
Camphora officinarum. *Bauh. pin.* 500.
Arbor camphorifera japonica. *Breyn. prodr.* 2. ic. 16. t. 2.
Habitat in Japonia. †
- Chloroxyylon. 4. LAURUS foliis trinerviis ovatis coriaceis: apicem attingentibus.
Chloroxyylon foliis ovatis glabris rigidis trinerviis, floribus singularibus. *Brown. jam.* 187. t. 7.
Habitat in Jamaica. †

LAURUS foliis venosis lanceolatis perennantibus, floribus quadrifidis dioicis. *Hort. cliff.* 155. *Hort. upf.* 98. *Mat. med.* 194. *Roy. lugdb.* 98.

Laurus vulgaris. *Bauh. pin.* 460.

Laurus. *Cam. epit.* 60.

Habitat in Italia, Græcia. †

LAURUS foliis venosis lanceolatis perennantibus planis, ramulis tuberculatis cicatricibus, floribus racemosis. *Hort. cliff.* 154. *Gron. virg.* 159.

Laurus indica. *Pluk. alm.* 210. t. 301. f. 1.

Laurus latifolia indica. *Barr. rar.* 123. t. 877.

Cinnamomum sylvestre americanum. *Seb. thes.* 2. p. 90. t. 84. f. 6.

Habitat in Virginia. †

LAURUS foliis venosis ovatis coriaceis perennantibus, floribus corymbosis. *Persea.*

Persea. *Clus. hist.* 1. p. 2.

Persea americana. *Bauh. pin.* 441.

Pyriformis fructus in nova hispania, nucleo magno. *Bauh. pin.* 439.

Frutifera arbor fructu maximo pyriformi viridi, pericarpio esculento butyraceo nucleum unicum maximum nullo ossiculo tectum cingente. *Sloan jam.* 132. *hist.* 2. p. 132. t. 222. f. 2. *Raj. dendr.* 48.

Arbor americana, amplissimis pergamenis foliis superficie nitidissima, fructu pyriformi crustaceo cortice coriato. *Pluk. alm.* 39. t. 267. f. 1.

Habitat in America calida. †

LAURUS foliis venosis lanceolatis, calycibus fructus baccatis. *Hort. cliff.* 154. *Gron. virg.* 46. *Roy. lugdb.* 226.

Laurus carolinensis, foliis acuminatis, baccis cæruleis, pedicellis longis rubris insidentibus. *Catesb. car.* 1. p. 63. t. 63.

Borbonia fructu oblongo nigro, calyce coccineo. *Plum. gen.* 4. ic. 60.

Habitat in Carolina, Virginia. †

LAURUS foliis venosis oblongis acuminatis annuis, ramis supra axillaribus. *estivalis.*

Laurus foliis lanceolatis enervibus annuis. *Gron. virg.*

Laurus foliis enerviis ovatis utrinque acutis.
virg. 46.

Cornus foliis falcis laureæ acuminatis, floribus
fructu saffras. *Catesb. car.* 2. p. 28. t. 28?

Habitat in Virginia ad ripas rivulorum. †

Pedunculi hujus fructiferi colorati sunt.

Benzoin.

10. LAURUS foliis enerviis ovatis utrinque acutis
tegris annuis. *Hort. cliff.* 154. *Mat. med.* 195.
virg. 46. *Roy. lugdb.* 226.

Arbor virginiana, citreæ vel limonii folio, Benzoin
fundens. *Comm. hort.* 1. p. 189. t. 97.

Arbor virginiana, pisaminis folio, baccata Benzoin
redolens. *Pluk. alm.* 42. t. 139. f. 3, 4

Habitat in Virginia. †

Saffras.

11. LAURUS foliis integris trilobisque. *Hort.*
154. *Mat. med.* 193. *Gron. virg.* 46. *Roy. lugdb.*

Cold. noveb. 94. *Kalm. it.* 2. p. 270, 434.

Cornus mas odorata, folio trifido: margine pl.
Saffras dicta. *Pluk. alm.* 120. t. 222. f. 6. C

car. 1. p. 55. t. 55.

Saffras arbor, ex florida, ficulneo folio. *Bauh.*
431.

β. Cornus mas f. Saffras laurinis foliis indivisis.
amalth. 66.

Habitat in Virginia, Carolina, Florida. †

TINUS.

occidentalis.
Ms.

1. TINUS,

Volkameria arborea, foliis oblongo-ovatis alternis
perne glabris, subtus subvillosis & nervosis, l.
ramosis & terminalibus. *Brown. jam.* 214. t. 21.

Baccifera arbor calyculata, foliis laurinis, fructu
mose esculento subrotundo monopireno palli-
teo. *Sloan. jam.* 165. *hist.* 2. p. 86. t. 198. f. 2
dend. 49.

Habitat in Jamaica. †

CASSYTHA.

filiformis.

1. CASSYTHA. *Osbeck. ir.* 243. * *Jacq. amer.* 20. l.
79. *Sp. pl.* 1. p. 35.

Cuscuta altera f. major. *Camell. lux.* 1. n. 1. *Pet.*
77. t. 49. f. 12.

ita baccifera barbadensium. *Pluk. alm.* 126. t. 2. f. 2.

ita. *Rumph. amb.* 5. p. 491. t. 184. f. 4.
fia-valli. *Rheed. mal.* 7. p. 83. t. 44. *Raj. suppl.*

at in India.

ima *Cuscutæ*; relata ad *Triandriam* ab *Osbeckio*,
Enneandriam a *Jacquino*; mihi non floruit.

TRIGYNIA.

RHEUM.

UM foliis glabris, petiolis subfulcatis. Rhaponticum.

m foliis glabris. *Hort. upf.* 98. *Mat. med.* 198. cum.

m. *Hort. cliff.* 155.

onticum. *Alp. rhapont.* 1. t. 1.

onticum folio lapathi majoris glabro. *Bauh. pin.*

at in Thracia, Scythia, Monte Aureo. 2.

i subtus sulcati, quod non in sequenti specie.

UM foliis subvillosis undulatis petiolis æquali- undulatum.

. *Amxn. acad.* 3. p. 212. t. 4. *

m foliis subvillosis. *Hort. upf.* 98. *Mat. med.* 197.

arbarum folio oblongo crispo undulato, flabellis

sis. *Geoffr. mat.* 2. p. 125.

arbarum sinense, folio crispo, flagellis rarioribus

minoribus. *Amm. herb.* 206.

arbarum folio longiori hirsuto crispo, florum thyr-

ongiori & tenuiori. *Amm. ruth.* 9.

sa montana, folio cubitali oblongiore crispo,

ibus in subviridi luteolis. *Messerschmidii. Amm.*

. 226.

at in China, Sibiria. 2.

UM foliis palmatis acuminatis. palmatum.

at in China ad murum, a. *Dav. Gortero.* 2.

t vernans non rubescens, sed flavescens. *Folia*

riuscula. Foliorum lacinie oblonge acutiuscula.

UM foliis sublobatis obtusissimis glaberrimis ar- compactar-

denticulatis glabris.

i foliis cordatis glabris marginibus sinuatis, spi- yl-

divisis nutantibus. *Mill. dict.* t. 218

Habitat in Tataria, China. 24

Folia, magis quam reliqua, coriacea s. compa-
bis rotundatis, obsoletioribus, crenatis margine
tilagino acutis denticulis, utrinque glaberrimis,
nis robustioribus. Paniculae rami nutantes.

ibes.

5. RHEUM foliis granulatis, petiolis æqualibus. 6
orient. 130.

Lapathum orientale, asperum & verrucosum folio, R
arabibus dictum. *Dill. elth.* 191. t. 158. f. 192

Lapathum orientale tomentosum rotundifolium, R
arabibus dictum. *Breyn. E. N. C. cent.* 7. p. 7.

Lapathum orientale asperum, folio subrotundo, fit
magno purpureo. *Poock. orient.* 189. t. 84

Ribes arabum. *Rauw. it.* 266. 282.

Ribes arabum, foliis petasitidis. *Bauh. pin.* 455

Habitat in Persia, Libano, Carmelo. 24

Flores hujus speciei non vidi. Facies juadet hujus
neris esse.

HEXAGYNIA.

BUTOMUS.

mbellatus. 1. BUTOMUS. *Fl. lapp.* 159. *Fl. svec.* 328, 350. 1
lugdb. 45. *Hall. helv.* 298.

Juncus floribus major. *Bauh. pin.* 112.

Sedo affinis Juncoides umbellata palustris. *Morif.*

• 3. p. 468. f. 12. t. 5. f. 1.

Gladiolus aquatilis. *Dod. pempt.* 600.

Habitat in Europæ aquosif. 24



Classis X.

DECANDRIA

MONOGYNIA.

SOPHORA.

ORA foliis pinnatis: foliolis numerosis oblongo-alopecuroi-
villosis, caule herbaceo. des.

ra. *Hort. cliff.* 156.

orientale alopecuroides perenne, fructu lon-
no. *Tournef. cor.* 27. *Dill. elth.* 136.

rhiza siliquis nodosis quasi articulatis. *Burb.*

3. p. 25. t. 46.

in Oriente. 24.

ORA foliis pinnatis: foliolis numerosis subro- tomentosa.
lis tomentosis.

ra tomentosa, foliolis subrotundis. *Fl. zeyl.*

phora foliis tomentosis. *Hort. cliff.* 487.

ra zeylanica argentea tota. *Herm. lugdb.* 169. t.

Raj. hist. 1720.

in Zeylona. 6

ORA foliis pinnatis: foliolis numerosis sub- occidentalis
latis.

fruticosa, foliis subrotundis pinnatis, spicis sim-
bus terminalibus *Brown. jam.* 289. t. 31. f. 1.

odendron foliis pseudo-acatiæ subtus tomento-
flore luteo. *Plum. spec.* 21. ic. 101.

coral affinis non spinosa, fraxini folio rotun-
de, foliis & ramulis pubescentibus. *Sloan. jam.* 144.

2. p. 40. t. 107. f. 3.

in America.

a *Soph. tomentosa* parum admodum. *Folia*
s tomentosa, & fere subtus tantum subto-
osa.

ORA foliis pinnatis: foliolis septenis glabris. heptaphyl-
ra glabra, foliolis septenis. *Fl. zeyl.* 164. la.

ulus sinensis, fennæ sylvestris folio angustiore,

- nodosa siliqua rostro longiore donata. *Pluk. amb.*
18 t. 451 f. 10 ?
Anticholerica. *Rumph. amb.* 4. p. 60. t. 22.
Habitat in India. †
- Genistoides. 5. SOPHORA foliis ternatis sessilibus: foliolis linearibus.
Genistra africana, foliis galii. *Old. afr.* 31
Habitat ad Cap. b. Spei.
- tinctoria. 6. SOPHORA foliis ternatis subsessilibus: foliolis obovatis glabris.
Cytisus foliis tere sessilibus, calycibus bractea triplicata auctis. *Gron. virg.* 82.
Cytisus procumbens americanus, flore luteo, ramis fissimus, qui Anil suppeditat. *Pluk. alm.* 129. t. 1. f. 2. *Ehret. t.* 1. f. 3.
Habitat in Barbados, Virginia.
- lupinoides. 7. SOPHORA foliis ternatis petiolatis: foliolis ovatis pilosis.
Sophora foliis ternatis, spica verticillata. *Aman. afr.* 2. p. 350. *
Habitat in Camtschatca. G. Demidoff.
- biflora. 8. SOPHORA foliis simplicibus obovatis subtomentosis pedunculis bifloris.
Crotalaria foliis simplicibus ovatis villosis, petiolo simplicissimis, ramis teretibus. *Hort. cliff.* 357. * *Roy. lugdb.* 374.
Crotalaria arbor africana, styracis folio molli incana. *Pluk. alm.* 122. t. 185. f. 2.
Genista arborescens africana, styracis folio. *Hort. lugdb.* 270. t. 271. *Seb. mus.* 2. t. 99. f. 3.
Myrto-Genista capitis b. spei. *Breyer. cent.* t. 29.
Habitat in Æthiopia. †

ANAGYRIS.

- foetida. 1. ANAGYRIS *Clus. list.* 1. p. 93.
Anagyris floribus lateralibus. *Roy. lugdb.* 371.
Anagyris foetida. *Bauh. pin.* 391.
Habitat in Italiæ, Siciliæ, Hispaniæ montibus. †

CERCIS

- Siliqua-
strum. 1. CERCIS foliis cordato-orbiculatis glabris. *Hert. c.*
156

56. *Hort. upf.* 99. *Roy. lugdb.* 463. *Gron. orient.*
31.

lua sylvestris rotundifolia. Bauh. pin. 402.

or judæ. Dod. pempt. 786.

itat in Italia, Hispania, Narbona, Oriente. †

RCIS foliis cordatis pubescentibus. *Hort. cliff. canadensis.*

56. *Hort. upf.* 99. *Roy. lugdb.* 463. *Gron. virg.*

itia agrestis virginiana, folio rotundo minori. Raj.
indr. 100.

itat in Virginia. †

B A U H I N I A.

UHINIA caule cirrhifero. *Læst. it.* 218. *scandens.*

natis indica, folio bifido, flore fructuque carens,

bores transcendens. Raj. suppl. 328.

um linguæ. Rumph. amb. 5. p. 1. t. 1.

a-mu-valli. Rheed. mal. 8. p. 57. t. 29.

itat in Malabaria, Amboina, Cumana. †

UHINIA caule aculeato. *Hort. cliff.* 156. t. 14. *aculeata.*

oy. lugdb. 463. *Læst. it.* 219.

inia aculeata, folio rotundo & emarginato. Plum.

n. 23. *ic.* 44. *f.* 1.

itat in America calidiore. †

UHINIA foliis ovatis: lobis divaricatis. *divaricata.*

inia foliis quinquenerviis: laciniis acuminatis re-

otissimis. Hort. cliff. 156. t. 15. *Roy. lugdb.* 464.

inia non aculeata, folio ampliori & bicorni.

um. gen. 23. *ic.* 44. *f.* 2.

hinia foliis ovato-cordatis lobis longissimis paral-

lis. Mill. dict. t. 61.

itat in America. †

UHINIA foliis ovatis: lobis parallelis. *ungulata.*

inia foliis ovatis oblongis recta linea bifidis. Hort.

ff. 157.

itat in America. †

UHINIA foliis cordatis: lobis coadunatis obtusis. *variegata.*

or f. Thomæ f. Assitra. Zanon. hist. 26. t. 15.

vanna-mandaru. Rheed. mal. 1. p. 57. t. 32. *Raj.*

ff. 1751.

Habitat in Malabariæ, Maderæ arenosis. †
Corollæ patentis: Petalis ovatis, acutis, roseis, l
purpureoque variegatis.

purpurea. 6. BAUHINIA foliis subcordatis bipartitis rotundis
 subtus tomentosis.

Chovanna-mandaru. *Rheed. mal. 1. p. 59. t. 33*

Habitat in Indiæ arenosis. †

Flores patentis, purpurascens: Petalis lanceolatis distantibus.

tomentosa. 7. BAUHINIA foliis cordatis: lobis semiorbiculatis
 mentosis.

Bauhinia foliis cordato-subrotundis: laciniis rotundis

Hort. cliff. 157. Hort. ups. 99. Fl. zeyl. 147. lugdb. 464.

Bauhinia foliis subrotundis, flore flavescens sub

Burm. zeyl. 44. t. 18.

Mandaru maderaspatense, foliis firmioribus bifidis
 britie splendentibus. *Pluk. alm. 240. t. 44. f.*

Chanschena-pou. *Rheed. mal. 1. p. 63. t. 35.*

Habitat in India. †

Corollæ campanulatae, albo-flavescens: Petalis ovatis.

acuminata. 8. BAUHINIA foliis ovatis: lobis acuminatis
 ovatis.

Bauhinia inermis, foliis cordatis semibifidis: laciniis
 cuminato-ovatis erectis dehiscentibus. *Hort. cliff.*

*Fl. zeyl. 148. **

Bauhinia foliis bilobis, spicis laxis terminalibus. *B. jam. 286.*

Sennæ spuria aut Asphaltis affinis arbor filiquosa
 liis bifidis. *Sloan. jam. 150. hist. 1. p. 51.*

Velutta-mandaru. *Rheed. mal. 1. p. 61. t. 34. hist. 1751.*

Habitat in Indiis. †

Corollæ campanulatae, albæ: Petalis obtusis. St. diadelphæ in B. hac & B. divaricata, cont. ac in Papilionaceis modo.

PARKINSONIA.

aculeata. 1. PARKINSONIA. *Hort. cliff. 157. t. 13. Hort. 99. Roy. lugdb. 465. Brown. jam. 222. Jacq. t. 80.*

isonia aculeata, foliis minutis uni costæ adnexis.

m. gen. 25.

isonia aculeata, foliis mimosæ uni costæ affixis.

lth. hort. 6. t. 13.

at in America calidiorè. †

HYMENÆA.

YMENÆA. *Hort. cliff.* 484. *Hort. upf.* 305. *Mat.* Courbarif.

l. 515. *Brown. jam.* 221.

paril bifolia, fructu pyramidato. *Plum. gen.* 49.

a diphyllis anteguana, ricini majoris fructu ni-

, siliqua grandi incluso. *Pluk. alm.* 96. t. 82. f. 2.

r siliquosa ex qua Gummi Elemi. *Bauh. pin.* 404.

Pif. bras. 123.

at in America meridionali. †

CASSIA.

* *Sennæ.*

SIA foliis conjugis, stipulis cordato-lanceolatis. diphylla.

at in India. ☉

r Caule tereti. Folia conjugata s. duo in petio-

brevi, semiorbiculata, obtusa, striata. Stipulæ

dato-lanceolæ, totos ramos obtegentes.

SIA foliis bijugis subovatis, glandulis duabus *Abfus.*

ulatis inter infima. *Fl. zeyl.* 153. *

i quadrifolia, siliqua plana hirsuta, flore aureo

gvineo. *Burm. zeyl.* 212. t. 97.

i exigua maderaspatana tetraphylla siliquifera gla-

, florum pediculis ad exortum foliorum propen-

ditibus. *Pluk. alm.* 341. t. 60. f. 1.

affinis ægyptiaca. *Bauh. pin.* 332.

l. *Alp. ægypt.* 97.

at in India, Ægypto. ☉

SIA foliis bijugis ovato-oblongis acuminatis, *viminea.*

ndula oblonga inter infima, spinis subpetiolaribus

oletis tridentatis. *Amæn. acad.* 5. p. 397. * *Læfl.*

232.

viminea, foliis ovatis acuminatis bijugatis, ra-

is laxis alaribus, siliquis brevioribus compressis.

mn. jam. 223.

at in Jamaica. †

- Tagera.** 4. **CASSIA** foliis trijugis, glandula petiolari, 1 ciliatis cordatis acuminatis.
Cassia 6, *Senna spuria tetraphylla arborescens* quibus tenuibus longissimis pendulis. *Ann. bot. n. 33?*
Tagera. *Rheed. mal. 2. p. 103. t. 52.?* *Raj. hist. Habitat in India.*
Fruticulus procumbens: Ramis filiformibus brevissimis; Foliola quatuor, semiorbiculata, quorum duo exteriora majora. Stipulae cordato-lanceolatae, margine pilosae.
- Tora.** 5. **CASSIA** foliis trijugis obovatis: exterioribus; glandula subulata inter inferiora q
Roy. lugdb. 468. Fl. zeyl. 152. Hort. upf. 100 dist. t. 82.
Cassia filiqua quadrangulari. *Dill. elth. 72. t. 6;*
 β. *Cassia* humilis, filiquis foeni graeci. *Plum. spec 76. f. 2.*
Senna orientalis hexaphylla, Tala zeylonensium lugdb. 557. Raj. hist. 1743.
Senna orientalis hexaphylla, filiquis longis in Pluk. a.m. 342.
Galega indica minor hexaphyllos amanni. K 911.
Habitat in India. ☉
Caules & Petioli scabri. Stipulae lineares, aetate, pilosae. Glandulae acuminatae, apice super singula paria 2 inferiora, non vero internum par sitae.
Varietas β differt filiqua recurva. An species di-
- bicapsularis. 6. **CASSIA** foliis trijugis obovatis glabris: in bus rotundioribus minoribus: glandula interjuncta. *Hort. cliff. 159. Hort. upf. 100. Roy. lugdb.*
Cassia hexaphylla, filiqua bicapsulari. Plum. s. t. 76. f. 1.
Habitat in India. ☿
Arborescens est, & glaberrima. Foliola interiora viora. Sliqua teretiusscula, coriacea, loculo tereti.
- emarginata. 7. **CASSIA** foliis trijugis ovatis rotundatis emarginatis aequalibus. *Hort. cliff. 159 Roy. lugdb. 467.*
Cassia minor hexaphylla fruticosa, sennae foliis.

1. 146. *hist.* 2. p. 44. t. 180. f. 1. 2. 3. 4. *Raj.*
idr. 110.

itat in Caribæis. †

SIA foliis trijugis ovatis obtusiusculis.

obtusifolia.

1. *foetida*, foliis sennæ italicæ. *Dill. elth.* 71. t. 62.
72.

2. *minor herbacea* plerumque hexaphylla, folio
tuso. *Stban. jam.* 148. *hist.* 2. p. 47. t. 180. f. 5?

3. *paria rotundifolia.* *Rumph. amb.* 5. p. 283. t. 97.
2.

itat in Cuba. ☉

SIA foliis trijugis quadrijugisve sexjugis subovatis.

Senna.

ort. cliff. 159. *Mat. med.* 200. *Roy. lugdb.* 468.

1. *Alexandrina* s. foliis acutis. *Bauh. pin.* 397.

orif. hist. 2. p. 201. f. 2. t. 24. f. 1.

2. *italica* s. foliis obtusis. *Bauh. pin.* 397. *Morif.*

l. 2. p. 200. f. 2. t. 24. f. 2.

3. *Dod. pempt.* 361.

itat in Aegypto. ☉

ASSIA foliis quadrijugis ovato-lanceolatis re-
falcatas: glandula baseos petiolorum. *Hort. cliff.*

falcata.

9. *

itat in America. ☉

ASSIA foliis quinquejugis ovatis - lanceolatis
argenteo scabris: exterioribus majoribus; glandula
baseos petiolorum

occidentalis.

1. *foliolis quatuor parium ovato-lanceolatis, glandula*
baseos petiolorum. *Hort. cliff.* 159. *Roy. lugdb.*

57.

2. *na occidentalis*, odore opii viroso, orobi panno-
lici foliis mucronatis, glabra. *Comm. hort.* 1. p. 51.

26.

itat in Jamaica.

3. *foliis sesquipedalis, punctis vagis scaber, exaratus*
versum a singulo petiolo sulcis duobus. Folia su-
periora foliolis quinque parium, ovato-lanceolatis,
marginibus scabris, acuminatis, exterioribus sen-
tem majoribus, fetidis. Racemus terminalis. Flo-
res lutei absque macula. Folia impuberis plantæ
quinquejuga; adultæ tantum trijuga.

pilos.

12. CASSIA foliis quinquejugis eglandulatis, stri-
micordatis acuminatis, caule stricto piloso.
Cassia suffruticosa erecta hirsuta, floribus sing
ad alas. *Brown. jam.* 224.

Habitat in Jamaica.

Caulis erectiusculus, fruticulosus. Ramis erec-
dique valde pilosis. Folia glabra. Stipulae
datae, acuminatae, ciliatae. Folia levia. Pe-
erecti, gemini, uniflori, leves. Siliquae
compressae. Flores circiter pentandri.

planifiliqua.

13. CASSIA foliis quinquejugis ovato-lanceola-
bris, glandula baseos petiolorum. *Roy. lugd*
Cassia filiquis planis. *Plum. spec.* 18. t. 77.
Habitat in America calidior.

fistula.

14. CASSIA foliis quinquejugis ovatis acumin-
bris, petiolis eglandulatis. *Fl. zeyl.* 149. * *A*
199. *Hasslq. in.* 468.

Cassia foliolis quinque parium lanceolatis: ex-
noribus. *Hort. cliff.* 158.

Cassia fistula alexandrina. *Bauh. pin.* 405. *Co*
1. p. 215. t. 110. *Rumph. amb.* 2. p. 83. t.
Conna. Kheed. mal. 1. p. 37. t. 21.

Habitat in India, Aegypto. 5

biflora.

15. CASSIA foliis sejugis oblongiusculis glabri-
rioribus minoribus, glandula subulata inter
pedicellis subbifloris. *Hort. cliff.* 159. *

Cassia biflora. *Amæn. acad.* 5. p. 397. *

Cassia fruticosa, foliis minoribus obovatis sex
floribus geminis. s. bigeminatis, racemis
Brown. jam. 223.

- Cassia minor arboreascens, filiquis planis art
Plum. spec. 18. ic. 78. f. 1.

Habitat in America. 5

hirsuta.

16. CASSIA foliis sejugis ovatis acuminatis
Hort. cliff. 159. *Roy. lugdb.* 467.

Cassia americana foetida, foliis amplioribus
Tournef. inst. 619.

Senna occidentalis, odore opii viroso, foliis or-
nonici mucronatis hirsutis. *Herm. lugdb.* 55

Habitat in America.

SIA foliis septemjugis, floribus pentandris, cau- ferpena.
s filiformibus prostratis herbaceis.

herbacea tenuissima procumbens, floribus singu-
ous ad alas. *Brown. jam. 225.*

ut in Jamaica. ☉

*s filiformes, herbacei prostrati, rarius ad basin
psi, glabri. Foliola oblonga, striata, angustata.
culæ subulatæ. Pedunculi axillares, solitarii, lon-
tine foliorum, nudi, horizontales. Siliquæ ere-
rhombæ - oblongæ; ad angulum rectum cum pe-
ulo posita.*

SIA foliis septemjugis lanceolatis: extimis ligustrina.

oribus, glandula baseos petiolorum. *Hort. cliff.*

. Hort. upf. 100. Gron. virg. 47. Roy. lugdb.

ligustri folio. *Plum. spec. 10. Dill. elth. 350. t.
. f. 338.*

bahamensis, pinnis foliorum mucronatis angu-
calyce floris non reflexo. *Mart. cent. 21. t. 21.*

ut in Virginia, Bahama. †

glabra, subtus obsolete pubescentia.

SIA foliis octojugis ovali oblongis: interiori-
minoribus, petiolis eglandulosis, stipulis patulis.

t. cliff. 158. Hort. upf. 100. Roy. lugdb. 467.

sylvestris foetida, siliquis alatis. *Plum. spec. 18.*

dulcis *Mer. surin. 58. t. 58.*

tica. *Rumph. amb. 7. p. 35. t. 18.*

t in America calidiore. †

SIA foliis octojugis ovato-oblongis æquali- marilandica.

glandula baseos petiolorum. *Hort. cliff. 159.*

. upf. 100. Roy. lugdb. 467.

nimosæ foliis, siliqua hirsuta. *Dill. elth. 351. t.*

f. 339.

marilandica, pinnis foliorum oblongis, calyce

reflexo. *Mart. cent. 23. t. 23.*

in Virginia, Marilandia. †

3 folia adspersa pilis raris.

SIA foliis novemjugis oblongis, glandula tenuissima.

lata inter infima. *Roy. lugdb. 478.*

spuria frutescens, siliquis tenuissimis. *Houft. mff.*

t in Havana. †

- Sophora. 22. CASSIA foliis decemjugis lanceolatis, baseos oblonga. *Fl. zeyl.* 150. *
 Senna vigintifolia filiquis teretibus. *Burm.* 70 t. 98.
 Galegæ affinis. *Bauh. pin.* 352.
 Gallinaria acutifolia. *Kumph. amb.* 5. p. 283. t. 1.
 Ponnam-Tongera. *Rheed. mal.* 2. p. 101. t. 50.
Habitat in Ipdixæ umbrosis.
- auriculata. 23. CASSIA foliis duodecim-jugis obtusis muc glandulis subulatis pluribus, stipulis renibus barbatis. *Fl. zeyl.* 151. *
 Senna spuria maderafpatana, caule ad foliorum geminatis subrotundis appendiculis auriculatis. *alm.* 341. t. 314. f. 4. *Raj. dendr.* 110.
Habitat in India.
- Javanica. 24. CASSIA foliis duodecim-jugis oblongis glabris, glandula nulla.
 Cassia fistula javanica, flore carneo. *Comm. hort.* 217 t. III.
 Cassia foliis plurimis oblongis, flore rubello, maximis crassioribus trinerviis. *Brown. jam.*
 Cassia fistula brasiliensis. *Bauh. pin.* 403.
 Cassia nigra f. fistulosa secunda. *Sloan. jam.* 142. p. 44.
Habitat in Indiis.
Flores mihi non protulit.
- * * Chamæcristæ foliolis numerosis.
- Chamæcrista. 25. CASSIA foliis multijugis, glandula petioli cellata, stipulis ensiformibus. *Hort. upf.* 4.
 Cassia foliolis plurium parium linearibus, stipulis subulatis. *Hort. cliff.* 158. *Gron. virg.* 47.
 Cassia suffruticosa erecta, foliolis linearibus bipinnatis, floribus singularibus vel geminis. *Brown. jam.* 225.
 Chamæcrista pavonis major. *Comm. hort.* 1. p. 1.
Habitat in Jamaica, Barbados, Virginia. ☉
 Foliola 20. Pedicellus spatioso supra petiolum ens. Petala duo superiora macula purpurea theræ rubræ
- glandulosa. 26. CASSIA foliis multijugis multiglandulatis, subulatis.

scripta pavonis americana, filiqua multiplici.
m. cent. 64. t. 24.

t in Jamaica.

*suffruticosi; ramis nudiusculis. Foliola lan-
ta petiolo, inter singula paria, glandula pedi-
ta notato. Stipulæ subulatæ. Pedunculi axil-
liorum, gemini, uniflori, folio breviores. Si-
æ orobi. Flores circiter hexandri antheris dua-
longissimis.*

SIA foliis multijugis linearibus: glandulâ ba- mimofol-
petiolorum obioleta, stipulis setaceis. Fl. zeyl. des.

t in Zeylona.

i absque glandula. Caulis non flexuosus. Stipu-
anceolata, seta terminata.

SIA foliis multijugis, stipulis dimidiato-cor- flexuosa.
s.

spuria occidentalis, filiqua singulari, foliis her-
mimosæ. *Herm. lugdb. 558. Sloan. jam. 150. Raj.
l. 18.*

scripta pavonis brasiliiana, filiqua singulari. *Breyn.
. 65. t. 23.*

ut in Brasilia. ☉

SIA foliis multijugis, floribus pentandris, nictitans.
e erecto.

calycibus acutis, floribus pentandris. *Hort. cliff.
. t. 36. Hort. upf. 101.*

spuria virginiana, mimosæ foliis, floribus par-
nictitantibus. *Pluk. alm. 341. t. 314. f. 3.*

na mœsta. *Rumph. amb. 6. p. 147. t. 61. f. 1.*

ut in Virginia. ☉

da. petiolorum pedicellata ♂ fusca. Pedunculi
ius tripartiti ♂ triflori, spatio supra alas enati.

SIA foliis multijugis, caule procumbente. procum-
americana procumbens herbacea, mimosæ foliis, bens.

ibus parvis filiquis angustis planis. *Comm. pe-
2. t. 11.*

æcrista mariana, flore minore. *Pet. succ. 243.*

to.

ut in Indiis, Virginia, ricis siccis. ☉

POINCIANA.

elata. 1. POINCIANA caule inermi. *Amaz. acal.*
313 *

Poinciana foliis bipinnatis: foliolis ovato-oblongis
caule inermi. *Hort. cliff.* 158. *Fl. zeyl.* 159
Habitat in Indiis. †

Foliola integerrima, minuta. Calyces coriacei
laminati atropurpurea, longissima, basi villosa.

bijuga. 2. POINCIANA aculeis solitariis, foliolis emarginatis
Jacq. amer. 20.

Frutex pavonis, Crista pavonis. *Breyn. cent. 61.*
Raj. hist. 981.

Acacia gloriosa jamaicensis, foliis minoribus
tundis, spinis ad genicula simplicibus, floribus
virescentibus. *Pluk. alm.* 5.

Crista pavonis. *Rumph. amb.* 4. p. 53. t. 20.
Habitat in Indiis. †

pulcherrima. POINCIANA aculeis geminis. *Hort. upf.* 101

Acacia orientalis gloriosa, coluteæ foliis, ad genicula
spinis gemellis aculeata. *Pluk. alm.* 5.

Flos pavonis. *Mer. sur.* 45. t. 45 ?

Tsietti mandatu. *Rheed. mal.* 6. p. 1. t. 1.
Habitat in Indiis. †

CÆSALPINIA.

brasiliensis. 1. CÆSALPINIA caule foliisque inermibus.

Cæsalpinia foliolis obovatis integerrimis. *Mat. m.*

Cæsalpinia arborea inermis, foliis minoribus: bipinnatis, ligno kermesino: Brafiletto. *Brown*
227.

Cæsalpinia foliolis duplicato-pinnatis, foliolis emarginatis, floribus decandris. *Mill. dict.*

Pseudo-Santalum croceum. *Sloan. jam.* 213. h.
184. *Catesb. car.* 2. p. 51. t. 51.

Habitat in Carolina, jamaica, Brasilia. †
Brafiletto officinis dicta.

crifata. 2. CÆSALPINIA caule aculeato, foliolis ovatis pentandris.

Cæsalpinia foliis duplicato-pinnatis, foliolis ovatis integerrimis, floribus pentandris. *Mill. dict.*

esalpinia polyphylla aculeis horrida. Plum. gen. 26. t. 68.

abitat in Jamaica. †

ÆSALPINIA caule aculeato, foliolis obcordatis *vesicaria.*
subrotundis.

esalpinia spinosa, foliis minoribus obcordatis bipinnatis. Brown. jam. 227.

inna spuria arborea spinosa, foliis alatis ramosis f. decompositis flore luteo, siliquis brevibus sulcatis nigris, sabinæ odore. Sloan. jam. 149. hist. 2. p. 50. t. 181. f. 2, 3. bona. Raj. dendr. 11.

abitat in Jamaica. †

ÆSALPINIA caule aculeato, foliolis oblongis in- *Sappan.*
æquilateribus emarginatis. *Fl. zeyl. 158. * Mat. med.*

203
igno brasiliano simile. Baub. pin. 393.

ignum Sappan. Rumph. amb. 4. p. 56. t. 21. Meist. It. 90.

siam pangam. Rheed. mal. 6. p. 3. t. 2.

abitat in Indiis. †

GUILANDINA.

GUILANDINA aculeata, pinnis ovatis, foliolis a- *Bonduc.*
culeis solitariis.

uilandina caule fructuque aculeatis. Hort. cliff. 158.

onduc vulgare majus polyphyllum. Plum. gen. 25.

racia gloriosa, lentisci folio. spinosa, flore spicato

luteo, siliqua magna muricata. Pluk. alm. 4. t. 2. f. 2.

abus echinatus, fructu flavo, foliis rotundioribus.

Sloan. jam. 144. hist. 2. p. 40.

utex globulorum. Rumph. amb. 5. p. 89. t. 48.

abitat in Indiis. †

GUILANDINA aculeata, pinnis oblongo-ovatis, *Bontücosti.*
foliolis aculeis geminis.

uilandina aculeata, foliolis ovalibus acuminatis. F.

*zeyl. 156. * Hort. upf. 101.*

onduc vulgare minus polyphyllum. Plum. gen. 25.

nista Pavonis, glycyrrhizæ folio, minor repens spi-

nosissima, flore luteo spicato minimo, siliqua latif-

issima echinata, femine rotundo cinereo. Breyn. prod.

3. app. 33. t. 28.

Globuli majores. *Rumph. amb. 5. p. 92. f. 49. f. 1*
 Lobus echinatus fructu cæfio, foliis longioribus.
jam. 144. hift. 2. p. 41.

Habitat in Indiis. h

- Nugæ. 3. **GUILANDINA** caule inermi, foliis petiolo
 rio fubtus aculeis geminis. †

Nugæ filvarum. *Rumph. amb. 5. p. 94. t. 50.*

Habitat in Amboina. h

Legumina levia funt.

- Moringa. 4. **GUILANDINA** inermis, foliis subbipinnatis:
 lis inferioribus ternatis. *Fl. zeyl. 155. * Mat.*
 202.

Lignum peregrinum aquam cæruleam reddens.
pin. 416.

Moringha zeylanica, foliorum pinnis pinnatis.
 majore, fructu anguloso. *Burm. zeyl 162. t. 1.*

Morungu. *Rheed. mal. 6. p. 19. t. - Rumph. amb.*
 184. t. 74, 75.

Habitat in Zeylona, America, Ægypto. h

Semina ex Asia tribus membranis longitudinaliter

ta fuere, ex Africa vero membranis his ca

Hæc dioica secundum Rumphium; an etiam f

dentis?

- dioica. 5. **GUILANDINA** inermis, foliis bipinnatis: bip
 ceque simpliciter pinnatis. *Gen. plant. 2. 512.*

Bonduc canadense polyphyllum non spinosum,
 & femina. *Duham. arb. 1. p. 108. t. 42.*

Habitat in Canada. h

GUAJACUM.

- officinale. 1. **GUAJACUM** foliolis bijugis obtusis.

Guajacum foliis pinnatis: foliolis quaternis ob
Hort. cliff. 187. Mat. med. 207.

Guajacum foliis fere impetiolatis bijugis obov
 leniter radiatis, pinnis & ramulis dichotomis.
jam. 225.

Guajacum flore cæruleo, fructu subrotundo.
gen. 39

Guajacum jamaicense, foliis velut muria condit
 sus virentibus, flore subcæruleo. *Pluk. alm. 11*
 35. f. 4.

Guajacum magna matrice. *Bauh. pin. 448.*

Pruno vel **Evonymo** affinis arbor, folio alato buxæo subrotundo. *Sloan. jam. 186. hist. 2. p. 133. t. 222. f. 3. 4. 5. 6.*

Arbor ligni Sancti vel **Guajacum**. *Seb. thes. 1. p. 86. t. 53. f. 2.*

Guajacum jamaicense, lentisci subrotundis foliis læte virentibus, flore albo. *Pluk. alm. 180. t. 35. f. 3.*

Habitat in Hispaniola, Jamaica. h

GUAJACUM foliolis multijugis obtusis.

Sanctum:

Guajacum foliis pinnatis, foliolis obverse ovatis integerrimis. *Roy. lugdb. 208.*

Guajacum flore cæruleo fimbriato, fructu tetragono. *Plum. gen. 39.*

Guajacum americanum, lentisci folio. *Comm. hort. 1. p. 171. t. 88.*

Guajacum propemodum sine matrice. *Bauh. pin. 448.*

Jasminum vulgo americanum s. **Euonymo** affinis occidentalis, alatis rusci foliis, nucifera, cortice adgenicula fungoso. *Pluk. alm. 139. t. 94. f. 4.*

Habitat in Americis insula s. Johannis de Porto Rico. h

GUAJACUM foliolis multijugis acutis.

afrum:

Guilandinoides. *Hort. cliff. 439.*

Acacia africana, quæ **Acaciæ** similis, foliis myrti parvis aculeatis pinnatis, flore coccineo tetrapetaloides. *Walsh. hort. 2. t. 2.*

Afra arbor acaciæ similis, foliis myrti aculeatis splendidibus. *Boerh. lugdb. 2. p. 57.*

Habitat in Æthiopia, China. h

Flores & fructus non vidi, hinc de genere dubius.

CYNOMETRA.

CYNOMETRA trunco florifero. *Act. upf. 1741. p. cauliflora. 79. Fl. zeyl. 166.*

Cynomorium. *Rumph. amb. 1. p. 163. t. 62.*

Habitat in India. h

CYNOMETRA ramis floriferis. *Act. upf. 1741. p. ramiflora. 79. Fl. zeyl. 167.*

Cynomorium sylvestre. *Rumph. amb. 1. p. 164. t. 63.*

Iripa. *Rheed. mal. 4. p. 65. t. 31.*

Habitat in India. h

ANACARDIUM.

- occidentale. **I. ANACARDIUM.** *Hort. cliff.* 161. *Fl. zeyl.* 1
Mat. med. 206. *Hort. upf.* 102. *Roy. lugdb.* 1
Brown. jam. 227.
 Anacardii alia species. *Bauh. pin.* 512.
 Pomifera s. potius Prunifera indica, nuce renifo
Catesb. car. 3. p. 9. t. 9.
 Acaiou. *Pij. bras.* 58. *mant.* 193.
 Calluvium. *Rumph. amb.* 1. p. 177. t. 69.
 Caichou. *Mer. surin.* 16. t. 16.
 Kapa-maya. *Rheed. mal.* 3. p. 65. t. 54.
Habitat in Indiis. ‡

SWIETENIA.

- ahagoni. **I. SWIETENIA.** *Jacqu. amer.* 20. †
 Cedrela foliis pinnatis, floribus sparsis, ligno odorato. *Brown. jam.* 158.
 Arbor foliis pinnatis nullo impari: nervo ad latera
Catesb. car. 2. p. 81. t. 81.
Habitat in America meridionali. ‡
Affinitate proxima jungitur Cedrelæ.

DICTAMNUS.

- albus. **I. DICTAMNUS.** *Hort. cliff.* 161. *Hort. upf.* 1
Mat. med. 208. *Roy. lugdb.* 463. *Sauv. monsp.* 23
 Dictamnus albus vulgo Fraxinella. *Bauh. pin.* 222
 Fraxinella. *Reueal. spec.* 122. t. 121.
Habitat in Germania, Gallia, Italia. ‡
Ordo naturalis Rutæ communis.

RUTA.

- aveolens. **I. RUTA** foliis decompositis, petalis laceris, floribus lateralibus quadrifidis. *Hort. cliff.* 145. *Hort.* 1
 102. *Mat. med.* 209. *Roy. lugdb.* 461.
 Ruta sylvestris major. *Bauh. pin.* 336. *Morif. hist.*
 p. 507. f. 5. t. 14. f. 3.
 β. Ruta chalepensis tenuifolia, florum petalis villis sitentibus. *Morif. hist.* 2. p. 509.
 Ruta hortensis altera. *Bauh. pin.* 336. *Raj. hist.* 81
 γ. Ruta hortensis latifolia. *Bauh. pin.* 336.
 Ruta graveolens hortensis. *Dod. pempt.* 119.
 δ. Ruta hortensis latifolia arbusculæ similis. *Boerh. lugdb.*
 1. p. 260. Ru-

DECANDRIA MONOGYNIA. F. 549

1 africana maxima. *Schwer. hort.* 24.
 2 vitat in Europæ australis, Alexandriæ, Maurita-
 3 æ sterilibus. †
 4 primarius quinquefidus, reliqui quadrifidi. *Phil.*
 5 n. 178. *Paucule rami primi bipartiti; reliqui*
 6 *res alterni.*
 7 r: RUTA sylvestris minor. *Bauh. pin.* 336.
 8 m. *epit.* 495. *Ruta montana legitima. Clus. hist.* 2.
 9 136. *app. alt. fig. structura eadem, facie distincta,*
 10 *cripta Læfl. it.* 140.

TA foliis terminatis sessilibus. patavina.
 do- *Ruta patavina trifolia, floribus luteis, umbel-*
 is. *Mich. gen.* 22. t. 19.
 ut prope Patavium.

TA foliis simplicibus indivisis. linifolia.
 foliis simplicibus solitariis. *Hort. cliff.* 146.
 sylvestris linifolia hispanica. *Bocc. mus.* 2. p. 82.
 13. *Barr. ic.* 1186.
 1 montana, foliis integris subrotundis. *Buxb.*
 t. 2. p. 30. t. 28. f. 2.
 2 orientalis, linariæ folio, flore parvo. *Tournef.*
 . 19. *Buxb. cent.* 2. p. 30. t. 28. f. 1.
 3 at in Hispania; β. in Rodastro; γ. in Media. 24
 4 de rami laterales bifidi, triflori, flore interme-
 5 sessili. Petala 5, sessilia, integra, ovata. Fila-
 6 ta basi pilosa arcta includunt receptaculum poris
 7 liferis pertusum. *Pericarpia punctis elevatis.*

TOLUIFERA.

.UIFERA. *Mat. med.* 201. Balsamum
 num Tolutanum, foliis ceratiæ similibus. *Bauh.*
 401.
 ut in America prope Carthagenam. †

HÆMATOXYLUM.

IATOXYLUM. *Hort. cliff.* 160. *Roy. lugdb.* 465. Campechia-
 m campechianum, species quædam. *Sloan. jam.*
 . *hist.* 2. p. 183. t. 10. f. 1. 2. 3. 4. *Catesb. car.* 3.
 6. t. 66. num.
 ut in Campeche Americæ. †

ADENANTHERA.

- pavonina. 1. ADENANTHERA foliis decompositis utrinque
 bris. *Koy. lugdb.* 462. *Vir. cliff.* 36. *Fl. zeyl.* 160.
 Poinciana foliis duplicato-pinnatis: foliolis alterni
Hort. cliff. 158
 Corallaria parvifolia. *Rumph. amb.* 3. p. 173. t. 19
 Mandiadi. *Rheed. mal.* 6. p. 25. t. 14. *Raj. hist.* 175
Habitat in India. †
- Falcataria. 2. ADENANTHERA foliis decompositis subtus
 mentosis.
 Clypearia alba. *Rumph. amb.* 3. p. 176. t. 111.
Habitat in India. †

MELIA.

- Azedarach. 1. MELIA foliis bipinnatis. *Fl. zeyl.* 162. * *Gron. ori*
 133.
 Melia foliis decompositis. *Hort. cliff.* 161. *Roy. lugdb.* †
 Azedarach. *Dod. pempt.* 848.
 Arbor fraxini folio, flore cæruleo. *Bauh. pin.* 415
 Pseudo Sycomorus. *Cam. epit.* 181.
- sempervirens β. Azedarach sempervirens & florens. *Tournef. infl.* †
 Azadirachta indica, foliis ramosis minoribus, flore
 bo subcæruleo purpurascente majore. *Comm. h*
 1. p. 147. t. 76.
Habitat in Syria, β. in Zeylona. †
- Azadirachta 2. MELIA foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 161. *Fl. zeyl.*
 * *Roy. lugdb.* 462.
 Olea malabarica, fraxini folio. *Pluk. alm.* 269. t. 247.
 Azedarach foliis falcato-ferratis. *Burm. zeyl.* 40. t.
 Azadirachta indica, folio fraxini. *Breyn. ic.* 21 t.
 Arbor indica, fraxino similis, oleæ fructu. *Bauh. pin.*
 Aria Bepou. *Rheed. mal.* 4. p. 107. t. 52.
Habitat in India. †

TRICHILIA.

- hista. 1. TRICHILIA foliis pinnatis subhirsutis, foliolis obor
 Trichilia subhirsuta, foliis pinnatis ovatis, rad
 alaribus. *Boccon. jam.* 278.
 Evonymus caudice non ramoso, folio alato, fi
 rotundo tripyreno. *Sloan. jam.* 171. *hist.* 2. p. 1
 210. f. 2, 3. *Raj. dendr.* 70.
Habitat in Jamaica. †

[CHILIA] foliis ternatis. *Jacq. hist. t. 82.* trifoliata.

hilia Halefia. *Læff. it. 188.* *

tat in America meridionali. †

CHILIA foliis pinnatis glabris, floribus octandris. *Guara.*

ilia foliis oblongo-ovatis pinnatis nitidis, racemis
cis. *Brown. iam. 279.*

a guara floribus octandris. *Jacq. amer. 20.*

onia, nucis juglandis foliis, major. *Plum. gen.*
ic. 147. f. 2.

at in Brasilia aliisque indiae occidentalis. †

x planifolius. Petala 4, linearia. Nectarium lon-
gitudine corollae; intra cujus os Filamenta cum anthe-
brevissimis. Receptaculum subcylindricum, coro-
um margine glanduloso. Stigma orbiculatum. Fru-
s ignotus. Flores octandri.

ZYGOPHYLLUM.

ZYGOPHYLLUM foliis petiolatis: foliolis obova- *Fabago.*
caule herbaceo.

phyllum capsulis prismatico pentaëdriis. *Hort.*

103. *Sp. pl. 1. p. 385. Gron. orient. 132.*

phyllum foliis petiolatis. *Hort. cliff. 160. Roy.*
ib. 460.

aris portulacæ folio. *Bauh. pin. 480.*

aris Fabago. *Dod. pempt. 741.*

at in Syria, Mauritania. †

ovata, petiolata. Petala obtusa.

ZYGOPHYLLUM foliis petiolatis: foliolis linea- *coccineum.*
is carnosis.

phyllum capsulis cylindricis. *Sp. pl. 1. p. 386.*

go arabica teretifolia, flore coccineo. *Shaw. afr.*

f 231.

at in Africa.

Et a Z. albo floribus rubris, Capsulis oblongis.

ZYGOPHYLLUM foliis petiolatis: foliolis clava- *album.*
carnosis. *Linn. dec. 1. t. 8.* *

at in Aegypto. *Roque.* †

ZYGOPHYLLUM foliis subpetiolatis: foliolis ob- *Morgsana.*
atis, caule fruticoso.

phyllum capsularum angulis compresso - mem-
naceis. *Sp. pl. 1. p. 385.*

Fabagó triphylla & tetraphylla, flore tetrapetalo,
 étu membranaceo quadrangulari. *Burm. afr.* 7.

f. 2.

Fabago capensis frutescens major. *Dill. elth.* 116. f. 141.

Planta africana frutescens, portulacæ foliis, Mor
 fyrorum, ex brevi pediculo binis. *Pluk. amalik*
 t. 429 f. 4.

Habitat in Æthiopia. †

Folia *obverse ovata, subpetiolata; nec perfecte* |
 Petala *acuta.*

sessilifolium. 5. **ZYGOPHYLLUM** foliis sessilibus: foliolis la
 lato-ovalibus margine scabris, caule fruticoso
 Zygophyllum capsulis globofo-depressis. *Sp.*
 p. 385.

Zygophyllum foliis sessilibus. *Hort. cliff.* 160.
lugab. 460.

Fabago capensis frutescens minor. *Dill. elth.* 116. f. 142.

Fabago humilis quadrifolia glabra, flore albide
 étu rotundo. *Burm. afr.* 4. t. 2. f. 1.

Fabago africana arborescens, flore sulphureo,
 rotundo. *Comm. rar.* 10. t. 10.

β. Zygophyllum fulvum capsulis ovatis acutis.
 1. p. 386.

Fabago flore luteo, petalorum unguibus rubris
 étu sulcato acuto oblongo. *Burm. afr.* 6. t.

Habitat in Æthiopia. †

Folia *sessilia: Foliola ovali-lanceolata margine*
gineo crenata s. scabra. Caulis angulatus. Pe
jolitarii, foliis longiores. Petala crenata.

spinosum. 6. **ZYGOPHYLLUM** foliis sessilibus: foliolis |
 bus, caule suffruticoso.

Zygophyllum caule aculeato. *Sp. pl.* 1. p. 386

Fabago tenuifolia spinosa, fructu rotundo. *Bu*
 5. t. 5.

Habitat in Æthiopia. †

Folia *linearia, acuta.*

212222. 7. **ZYGOPHYLLUM** foliis sessilibus: foliolis |
 tis retusis.

Habitat in Surinamo. Rolander; sed impubes pe
 Caules *herbæci, pedales, læves, diffusi, tereti*

latere superiore plani. Folia opposita, conjugata, sessilia: Foliola obovata, avenia, retusa. Stipulae quinæ, reflexæ; duabus inter folia a latere superiore; una inter folia a latere inferiore; unica inter foliorum utrumque par.

Q VASSIA.

Q VASSIA.

amara.

abitat in Surinamo C. Dahlberg. †

FAGONIA.

FAGONIA spinosa, foliolis lanceolatis planis læceticis. Hort. upf. 103.

agonia spinosa. Hort. cliff. 160.

trifolium spinosum creticum. Bauh. pin. 330. prodr. 142. Clus. hist. 2. p. 212.

abitat in Creta. ☉

FAGONIA inermis.

hispanica.

agonia hispanica non spinosa. Tournef. inst. 265.

abitat in Hispania. ♂

FAGONIA spinosa, foliolis linearibus convexis. arabica. Shaw. afr. 229.

agonia arabica, longissimis aculeis armata. Shaw. afr. 229.

abitat in Arabia.

TRIBULUS.

TRIBULUS foliolis subquadrijugis: exterioribus maximis majoribus. Læst. it. 208.

ribulus foliolis trium parium pinnatis. Hort. cliff. 160.

ribulus foliis fenis pinnatis: extremis majoribus, floribus singularibus. Brown. jam. 220. t. 132. f. 3.

ribulus terrestris major, flore maximo odorato. Sloan. jam. 90. hist. 1. p. 209. t. 132. f. 1. Raf. suppl. 650.

ribulus terrestris fructu turbinato, foliis lanuginosis. Plum. spec. 7. ic. 254. f. 1.

abitat in Jamaicæ aridis. ☉

fructus decaspermus, lævis f. muticus.

TRIBULUS foliolis quinquejugatis subæqualibus, lanuginosis seminibus bicornibus.

Tribulus foliolis quinque parium. Fl. zeyl. 169.

*Tribulus terrestris zeylanicus, cauliculis villi
fructu acuminato. Burm. zeyl. 226. t. 106. f. 1.
Habitat in Zeylona.*

- terrestris. 3. **TRIBULUS** foliolis sexjugatis subæqualibus,
nibusquadricornibus *Hort. cliff. 160. Hort. upl.
Roy. lugdb. 460. Sauv. monsp. 227. Brown. jam.
Tribulus terrestris, ciceris folio, fructu acu-
/Bauh. pin. 250.
Tribulus terrestris. Lob. ic. 2. p. 84.
Tribulus terrestris minor incanus hispanicus. Bar-
54. t. 558.
Habitat in Europa australi ad semitas. ☉*

- Cistoides. 4. **TRIBULUS** foliolis octojugatis subæqualibus.
Tribulus foliis octo parium pinnatis. *Roy. lugdb.
Tribulus terrestris major curassavicus. Herm. par-
t. 236.
Tribulus terrestris americanus, argemones flor-
vo. Pluk. alm. 374. t. 64. Raj. suppl. 649.
Habitat in America calidiore.*

THRYALLIS.

- brasiliensis. 1. **THRYALLIS.**
Fruticescens herba pisonis. *Marcgr. bras. 79. f. 2.
Habitat in Brasilia. h̄
Fruticulus ramis teretibus, articulatis. Folia opp-
petiolata, ovata, integerrima. Stipulæ set-
Racemus terminalis, e dichotomia ramorum,
plex, pedalis: Bracteis setaceis, brevissimis; l-
cellis filiformibus, flore longioribus. Flores l-
lutei. Fructus tricocci.*

LIMONIA.

- acidissimum 2. 1. **LIMONIA.**
*Limonia malus sylvestris zeylanica, fructu pu-
Burm. zeyl. 143.
Schinus foliis pinnatis: petiolo marginato articu-
latis spinis axillaribus solitariis. Fl. zeyl. 175. *
Anisifolium. Rumph. amb. 2. t. 43.
Catu Tseru Naregam. Rheed. mal. 4. p. t. 14
Habitat in India. h̄*

MONOTROPA.

OTROPA floribus lateralibus octandris; ter. Hypopithys
 ali decandro. *Fl. Svec. 329; 351. Phil. bot. §.*

nche quæ Hypopithys dici potest. *Bauh. pin.
 prodr. 31*

nche Hypopithys lutea. *Mentz. pug. 3. f. 5.*
 nche flore brevior duplici, verbasculi odore.
ris hist. 3. p. 504. f. 12. t. 15. f. 20.

nche verbasculi odore. *Plot. oxf. 146. t. 9. f. 6.*
t. alm. 273. t. 209. f. 5.

ut in Sveciæ, Germaniæ, Angliæ, Canadæ syl-
Parasitica radicum.

OTROPA caule unifloro decandro. *uniflora.*
 tropa flore nutante. *Gron. virg. 41.*

nche monanthos virginiana, flore majore penta-
 alo. *Morif. hist. 3. p. 502. f. 12. t. 15. f. 5. mal.*

nche virginiana flore pentapetalo cernuo. *Pluk.
 273. t. 209. f. 2. Catesb. car. 1. p. 36. t. 36. bon.
 ut in Marilandia, Virginia, Canada.*

JUSSIÆA.

JÆA repens, floribus pentapetalis decandris, repens.
 junctulis folio longioribus. *Fl. Zeyl. 169.*

Carambu. *Rheed. mal. 2. p. 99. t. 51. Raj. hist.
 10.*

at in India.

JÆA erecta, floribus pentapetalis, pedunculis peruviana.
 iosis.

ra laurifolia, flore amplo pentapetalo. *Few. peruv.
 5. t. 11.*

tat in Lima.

JÆA erecta villosa, floribus pentapetalis decan- pubescens.
 is sessilibus. *Mill. dict. Læfl. it. 282. n. 201.*

machia lutea erecta non papposa major, foliis hir-
 is, fructu caryophylloide. *Sloan. jam. 85.*

tat in America.

JÆA erecta villosa, floribus tetrapetalis octan- suffruticosa.
 is pedunculatis.

wigia capsulis oblongis uncialibus. *Roy. lugdb.
 2.*

Lyfimachia indica non papposa, flore luteo in
siliquis caryophyllum aromaticum æmula
H. r. m. lugdb. 396.

Carambu. *Rheed. mal. 2. p. 55. t. 49. Raj. hist.*
Habitat in India.

erecta. 5. *JUSSIEA* erecta glabra floribus tetrapetalis
driis sessilibus. *Fl. zeyl. 170. Hort. upf. 103*

Ludwigia capsulis oblongis. Hort. cliff. 491.

Onagra persicæ foliis amplioribus, parvo flore
Plum. spec. 7. t. 175. f. 2.

Lyfimachia lutea non papposa erecta, foliis glabris
caryophylloide. *Sloan. jam. 85. hist. 1. p. 37. t. 1*

Jasminum catalanicum, flore luteo. *Seb. thes. 1*
t. 24. f. 3.

Herba vitiliginum. *Rumph. amb. 6. p. 49. t. 21. f.*
Habitat in America & forte in Virginia. ☉

QUISQUALIS.

indica. 1. *QVISQUALIS.*

Qvis qualis. Rumph. amb. 5. p. 71. t. 38.

Habitat in India. ☿

Rami teretes, pubescentes. Folia opposita, pe-
cordata s. ovata, integerrima. Stipulæ nullæ
ca terminalis & axillares pedunculatæ Bractæ
to-oblongis, oppositis, Floribusque oppositis
Daphnes, calyce filiformi extas pubescente.

DAIS.

ocotifolia. 1. *DAIS. D. v. Royen.*

Habitat ad Cap. b. Spei. ☿

Folia opposita, obovata, integerrima, glabra,
ta. Flores fasciculo aggregati, terminales,
tes: Involucro gemmaceo, quadrivalvi. *Ab*
serinis.

BUCIDA.

Buceras. 1. *BUCIDA. Amæn. acad. 5. p. 397. **

Buceras ramulis flexuosis tenuioribus, foliis
confertis, spicis plurimis terminalibus. *Br*
221. t. 23. f. 1.

Mangle julifera, foliis subrotundis versus sum-
latissimis confertim nascentibus, cortice

sanda utili. *Sloan. jam. 156. hist. 2. p. 67. t. 189.*
Raj. dendr. 116.
 ut in Jamaica. †
Rhizophora.

COPAIFERA.

COPAIFERA.

officinalis.

1. *Ma. med. 513. Jacq. amer. 21. hist. t. 86.*
 2. *iba. Marcgr. bras. 131. Pif. bras. 118. Raj. hist.*
 3. *in Brasilia, Antillis. †*

SAMYDA.

1. *DA floribus decandris, foliis ovato-oblongis parvisora.*
que glabris.

2. *a parvisora. Læfl. it. 260.*

3. *a foliis ovatis cum acumine, fructibus plurimis*
ribus confertis. Brown. jam. 217.

4. *ia floribus decandris. Jacq. amer. 21. hist. t. 85.*

5. *baccifera foliis oblongis acuminatis, floribus*
ertim ex alis foliorum erumpentibus, fructu
no croceo. Sloan. jam. 137. hist. 2. p. 108. t.
f. 2. Raj. dendr. 108.

6. *in America. †*

7. *DA floribus octandris, foliis cordatis glabris: nitida.*

8. *foliis nitidis cordatis lævissime crenatis rudi-*
s mollibus rubentibus, racemis tenuioribus
us. Brown. jam. 217. t. 23. f. 3. Guilandina.

9. *in America. †*

10. *DA floribus octandris, ramis spinosis.*

spinosa.

11. *a aculeata, floribus octandris. Jacq. amer. 21.*

12. *a, aurantii foliis, aculeata. Plum. gen. 4. ic.*

13. *f. 1.*

14. *in America.*

15. *DA floribus dodecandris, foliis obovatis sub-*
mentosis. pubescens.

16. *foliis ovatis villosis, floribus confertis, fasci-*
parsis. Brown. jam. 218?

17. *baccifer folio oblongo integro, flore penta-*

18. *pallide luteo odoratissimo. Sloan. jam. 173.*

19. *p. 109? Raj. dendr. 75?*

20. *in America.*

- ferrulata. 5. **SAMYDA** floribus dodecandris, foliis ovatis ferrulatis.
Samyda floribus dodecandris. *Jacq. amer.* 21.
Guidonia ulmi folio, flore roseo niveo. *Plum.*
ic. 146. f. 2.
Habitat in America. †

MELASTOMA:

- Acinodendron. 1. **MELASTOMA** foliis denticulatis subtrinertis acutis.
Melastoma foliis ovato-lanceolatis crenatis neque longitudinalibus: extimis obsoletioribus *cliff.* 162.
Acinodendrum americanum pentaneuron: foliis hirsutis ad ambitum rarioribus ferris. *Pl.* 4. t. 159. f. 1.
Grossularia alia, plantaginis folio, fructu rarilaceo. *Plum. ic.* 142. f. 2.
Grossulariæ fructu arbor maxima non spinol bathri folio maximo inodoro, flore raceo. *Sloan. jam.* 164. *hist.* 2. p. 84. t. 196. f. *dendr.* 26.
Habitat in America calidiore. †
- Grossularioides. 2. **MELASTOMA** foliis denticulatis triplinertis acuminatis.
Arbor americana, latiore & acuminato folio utrinque glabro & margine leviter crenato. *alm.* 40. t. 249. f. 1.
Habitat in Surinamo D. Bartsch.
- scabrofa. 3. **MELASTOMA** foliis denticulatis quincordatis scabris subtus tomentosis, ramis fo villosis.
Melastoma subhirsuta, foliis cordatis scabris sine denticulatis reticulatis, racemis minoribus. *Brown. jam.* 219. t. 24. f. 3.
Habitat in Jamaica. †
- sessilifolia. 4. **MELASTOMA** foliis integerrimis trinertis sessilibus subtus subtomento: s.
Melastoma foliis amplioribus per petiolum tibus & contractis, fasciculis florum sparsis. *jam* 219. t. 24. f. 1, 2.

americana, foliis a concursu nervorum im-
 rte longius productis, subtus lanugine candican-
 tomentosis. *Pluk. phyt.* 249. f. 2.
lat in Jamaica. †

LASTOMA foliis denticulatis quinquenerviis *hirta*,
 ovato-lanceolatis, caule hispido.
ularia plantaginis folio angustiore hirsuto. Plum.
c. 18. *ic.* 141.

*ulariæ fructu non spinosa, malabathri foliis longa
 rufa lanugine hirsutis, fructu majore cæruleo.*
zn. jam. 165. *hist.* 2. p. 85. t. 197. f. 2. *Raj.*
iv. 74.

*cula jamaicensis quinquenervis, minutissime
 tatis foliis & caule pubescentibus. Pluk. alm.* 40.
 54. f. 1. *vel potius.* 265. f. 1.
ut in America meridionali †

in foliorum alis breviter pedunculati.

ASTOMA foliis integerrimis trinerviis oblon- *holosericea.*
 ovatis subtus tomentosis, racemis brachiatis,
 is bipartitis.

*toma foliis integerrimis ovato lanceolatis sub-
 sericeis: nervis ante basin coadunatis. Hort.*
 162.

*lendum americanum, ampliore folio trinervi,
 ius alba lanugine incano maximo utrinque gla-
 Pluk. mant.* 4. t. 250. f. 2.

racemosa brasiliiana, folio malabathri. Breyer.
 3. t. 2. 4.

Marcgr. bras. 117.

in Brasilia, Jamaica, Surinamo. †

*Ramis tomentosis. Folia petiolata, trinervia
 to marginali nervo, reticulata, subtus tomen-
 uti petioli. Racemi terminales e dichotomia
 iati: spicis lateralibus conjugatis secundis,*

ASTOMA foliis integerrimis quinquenerviis *malabathri-*
 olato-ovatis scabris. *Fl. zeyl.* 171. *ca.*

*oma quinquenervia hirta major, capitulis seri-
 villosis. Burm. zeyl.* 155. t. 73.

Rheed. mal. 4. p. 87. 42.

in India. †

ASTOMA foliis integerrimis quinquenerviis *levigata.*
 ova-

ovato-oblongis læviusculis acuminatis: margi-
vibus.

Melastoma fruticosa minor, foliis tenuibus
racemis terminalibus. *Brown. jam. 219.*

Grossulariæ fructu arbor non spinosa, malabathri
maximo glabro & splendente. *Sloan. jam. 197.*
2. p. 85. t. 197. f. 1. *Raj. dendr. 26.*

Grossularia plantaginis folio lato, fructu mini-
ruleo. *Plum. spec. 18. t. 140. †*

Habitat in America. †

Folia tenuiora & minus consistentia. Racemi
compositi Floribus minutis.

discolor. 9. MELASTOMA foliis integerrimis quinque
oblongo-ovatis glabris margine lævibus. *Jam.*
t. 84.

Grossularia plantaginis folio apicibus candidis
tis. *Plum. ic. t. 42. f. 1.*

Grossularia fructu non spinosa, malabathri
tus niveis, fructu racemoso umbellæ modo
to. *Sloan. jam. 165. hist. 2. p. 86. t. 198. f.*

Arbor americana quinquenervia, comantibus
foliis amplissimis glabris prona parte albâ
Pluk. alm. 40. t. 264. f. 4.

Habitat in America. †

aspera. 10. MELASTOMA foliis integerrimis trinervi-
ceolatis scabris. *Fl. zeyl. 172.*

Fragarius ruber. *Rumph. amb. 4. p. 135. t. 71.*

Katou-Kadali. *Rheed. mal. 4. p. 91. t. 43.*
1493.

Habitat in India. †

octandra. 11. MELASTOMA foliis integerrimis trinervi-
glabris margine hispida. *Fl. zeyl. 173. * O*

Habitat in India. †

crispata. 12. MELASTOMA foliis integerrimis quinque
quaternis, ramis crispatis. †

Funis murænarum. *Rumph. amb. 5. p. 66. t. 1*

Habitat in Amboina. †

KALMIA.

latifolia. 1. KALMIA foliis ovatis, corymbis ten-

DECANDRIA MONOGYNIA.

561

n. acad. 3. p. 13. * *Kalm. it.* 2. p. 43. $\text{\textcircled{E}}$ 3.
148.

roneda foliis ovatis obtusis, corollis corymbosis
fundibuliformibus, genitalibus declinatis. *Gron.*
g. 160.

næ *Daphne* foliis tini, floribus bullatis. *Catesb. car.*
p. 98. t. 98.

um floribus bullatis confertis in summis caulibus.
Trew. ehret. t. 38. f. 1.

is *Chamæ Rhododendros mariana laurifolia*, flori-
is expansis summo ramulo in umbellam plurimis.
luk. alm. 49. t. 379. f. 6.

itat in *Marilandia, Virginia, Pensylvania.* $\text{\textcircled{h}}$

LMIA foliis lanceolatis, corymbis lateralibus. *angustifolia.*
mæn. acad. 3. p. 14. *Kalm. it.* 3. p. 147.

læa foliis lanceolatis integerrimis non nervosis gla-
ris, corymbis terminalibus. *Gron. virg.* 21.

mæ *Daphne sempervirens*, foliis oblongis angustis.
liorum fasciculis oppositis. *Catesb. car.* 3. p. 17. t.
7. f. 1.

um floribus bullatis fasciculatis ex alis oppositis
oliorum. *Trew. ehret. t.* 38. f. 2.

us sempervirens *laurifolia*, floribus eleganter bul-
latis. *Pluk. alm.* 106 t. 161. f. 3.

nyma. *Cold. noveb.* 100.

itat in *Pensylvania, Nova Cæsarea, Noveborac-*
o. $\text{\textcircled{h}}$

L E D U M.

DUM. *Fl. lapp.* 160. *Fl. svec.* 2. n. 352. *

palustre.

lum foliis linearibus subtus hirsutis, floribus co-
ymbosis. *Fl. svec.* 1. n. 341; 352. *Mat. med.* 210.
us *Ledon* foliis rosmarini ferrugineis. *Bauh. pin.*
67.

marinum sylvestre. *Cam. epit.* 546.

itat in *Europæ septentrionalis; paludibus uligino-*
s. $\text{\textcircled{h}}$

R H O D O R A.

IODORA. †

canadensis.

imærhododendros. *Duham. sem. app.* 10. t. 27. f. 2.
itat in *Canada.* $\text{\textcircled{h}}$

uam non vidi; *sile Cl. Duhamelii assumfi.*

N R

RHO-

RHODODENDRON.

- ferrugine-
um. 1. RHODODENDRON foliis glabris subtus le-
corollis infundibuliformibus.
Azalæa maculis ferrugineis subtus adspersa, flo-
decandris. *Lemonier, Sauv. monsp.* 57.
Ledum foliis glabris, flore tubuloso. *Hall. helv.*
Ledum alpinum, foliis ferrea rubigine nigranti
Bauh. pin. 468. *Raj. hist.* 1005.
Evonymus theophrasti. *Dalech. hist.* 27.
Montana allobrogum lentiscifolia. *Lob. ic.* 366.
Habitat in Alpibus Helveticis, Allobrogicis, I-
næis. †
- dauricum. 2. RHODODENDRON foliis glabris utrinque
corollis rotatis.
Chamærhododendros folio glabro majusculo, a
flore roseo. *Amm. ruth.* 181. t. 21.
Habitat in Dauria. †
- hirsutum. 3. RHODODENDRON foliis ciliatis nudis, co-
infundibuliformibus.
Ledum foliis glabris ciliatis ovatis, flore tub-
Hall. helv. 418.
Ledum alpinum hirsutum. *Bauh. pin.* 468. *Raj. hist.*
Ledum alpinum. *Clus. hist.* 1. p. 82.
Balsamum alpinum. *Lob. ic.* 468.
Habitat in Alpibus Helveticis, Austriacis, Stiriaci
- Chamæci-
stus. 4. RHODODENDRON foliis ciliatis, corollis rot-
Ledum foliis serpylli ad margines cilii instar pilosi
re purpureo. *Mich. gen.* 225. t. 106.
Chamæ Cistus hirsuta. *Bauh. pin.* 466.
Chamæ Cistus VIII. *Clus. hist.* 1. p. 76.
Cistus pumilus montis baldi. *Bauh. hist.* 2. p. 19.
hist. 1005.
Cistus Chamærhododendros foliis confertis fern-
bigine nitentibus margine pilosis. *Pluk. alm.* 1
23. f. 4.
Habitat in Baldo & prope Salisburgum. †
- ponticum. 5. RHODODENDRON foliis nitidis lanceolatis
que glabris, racemis terminalibus.
Chamærhododendros pontica maxima, folio lau-
rafi. *Tournef. cor.* 42-it. 2. p. 99.

itat in Oriente, Gibraltariæ subhumidis umbrosis.
Isræmer. †

a Pruni *Laurocerasi*, perennia, acuta: Petiolis bre-
 vibus, glabris. Racemus terminalis, longitudine
 dicellorum s. foliorum: Pedicellis alternis, nudis.
 Alyx minutissimus. Corolla campanulata, magni-
 tudine Nerii, purpurea. Stamina declinata, longi-
 tudine corollæ.

DODENDRON foliis nitidis ovalibus obtusis maximum,
 cymosis margine acuto reflexo, pedunculis unifloris.
 in *Laurocerasi* folio. *Amæn. acad.* 2. p. 200.

nia foliis lanceolato-ovatis nitidis subtus ferrugi-
 nis, corymbis terminalibus. *Mill. dict.* t. 229.
 nærhododendros, lauri folio, sempervirens, flo-
 rous bullatis corymbosis. *Catesb. car.* 3. p. 17. t. 17.
 2.

itat in Virginia. *Collinson.* †

i & Folia magnitudine & consistentia Padi *Lauro-
 cerasi* dicti, venis reticulatis inscripta, margine
 flexa.

A N D R O M E D A.

DROMEDA pedunculis solitariis lateralibus, co- tetragona.
 corollis campanulatis, foliis oppositis imbricatis obtusis
 volutis.

romeda foliis quadrifariam imbricatis obtusis. *Fl.*
c. 338; 356.

romeda, foliis quadrifariam imbricatis obtusis, ex
 s florens. *Fl. lapp.* 166. t. 1. f. 4. *Hort. cliff.* 163.

itat in Alpibus Lapponicis. 2

DROMEDA pedunculis solitariis terminalibus, hypnoides,
 corollis campanulatis, foliis confertis subulatis. *Oed.*
 2. t. 10.

romeda foliis aciformibus confertis. *Fl. lapp.* 165.
 t. f. 3. *Fl. svec.* 337; 355.

itat in Alpibus Lapponicis. 2

DROMEDA pedunculis aggregatis, corollis ova- cærulea.
 corollis, foliis sparsis linearibus obtusis planis.

romeda foliis linearibus obtusis sparsis. *Fl. lapp.*
 15. t. 1. f. 5. *Fl. svec.* 336, 354. *Hort. cliff.* 163.

romeda rarior norvegica. *Burser. Amoen. acad.* 1.
 332. *Oed. dan.* t. 57.

Erica folio abietis, flore arbuti. *Buxb. cent. 4 p. t. 53.*

Habitat in Lapponiæ Alpibus. †

mariana.

4. **ANDROMEDA** pedunculis aggregatis, corollis lindricis, foliis alternis ovatis integerrimis. *Andromeda* foliis ovatis, pedunculis fasciculatis pfulis pentagonis apice dehiscens. *Gron. viri Arbutula mariana*, brevioribus synonymi foliis de virentibus, floribus arbuteis ex eodem nodo rimis, spicatum uno versu erumpentibus. *Pluk. 25. t. 448.*

Habitat in Virginia. †

Polifolia.

5. **ANDROMEDA** pedunculis aggregatis, corollis tis, foliis alternis lanceolatis revolutis. *Andromeda* foliis alternis lanceolatis margine reflexo. *Fl. lapp. 163. t. 1. f. 3. Fl. svec. 335; 353. Hort. 163. Roy. lugilb. 440. Hall. helv. 416. opusc. 140. Polifolia. Buxb. act. 2. p. 345. cent. 5. p. 28. t. 49. Vitis idææ affinis polifolia montana. Oed. dan. Erica humilis, rosmarini foliis, unedonis flore, cila cistoide. *Pluk. alm. 136. t. 175. f. 3.*
*Habitat in Europæ frigidioris paludibus turfosis.**

paniculata.

6. **ANDROMEDA** racemis secundis nudis panic corollis subcylindricis, foliis alternis oblongis catis. *Andromeda* foliis ovatis acutis crenulatis planis, floribus racemosis. *Hort. cliff. 162. Gron. viri Frutex* foliis serratis, floribus longioribus spicatis viridibus, spica pentagona. *Catesb. car. 2. t. 43.*
Vitis idæa americana, longiori mucronato & crenulato folio, floribus urceolatis racemosis. *Pluk. alm. Habitat in Virginia.*

racemosa.

7. **ANDROMEDA** racemis secundis bracteatis, corollis gibbo-cylindricis, foliis alternis oblongis serratis. *Habitat in Pensylvania. Kalm.*
Hæc differt a priori: 1. Racemis minus paniculata. Bractea sub singulo flore lineari lanceolata, & flore longiore, viridi, dicitur; in præcedenti bractea. 3. Capsulis retinentibus stylum, quem cædens dimittit. 4. foliis magis serratis.

DROMEDA racemis secundis nudis, corollis arborea. tundo-ovatis.

Dromeda arborea, foliis oblongo-ovatis integerrimis, floribus paniculatis nutantibus, racemis simplicissimis. *Gron. virg.* 48.

ex foliis oblongis acuminatis, floribus spicatis ut versu dispositis. *Catesb. carol.* p. 71. t. 71.

at in Virginia, Carolina. †

DROMEDA racemis secundis foliaceis, corollis calyculata. subcylindricis, foliis alternis lanceolatis obtusis nectatis. *Fl. suec.* 2. n. 357. *Gort. ingr.* 64.

Ledon s. **Andromeda**, floribus monopetalis parvis albis tubulosis spicatum in summis ramulis dispositis, foliis & facie vitis idææ, capsula minima ca quinquepartita. *Gron. virg.* 21?

at in Virginia, Canada, Sibiria, Ingria. †

Daphne. *Buxb. act.* 1. p. 241. t. 8. f. 1. at in Virginia, Canada, Sibiria, Ingria. †
 x foliis ovali-lanceolatis, coriaceis, myricæ confertia, obtusis, margine recurvis, adspersis punctis conspicuis, callosis, ab utraque parte. Racemi ramis propriis, foliolis ovalibus alternis, in quocumque axilla flos solitarius, pedicellatus. Calyx a basi tur duobus foliolis ovatis. Flores ad unum latus int. Stamina 10, antheris oblongis.

E P I G Æ A.

ÆA. *Amæn. acad.* 3. p. 17. *

repens.

cylum. *Mich. gen.* 13.

us foliis ovatis integris, petiolis laxis longitudine eorum. *Gron. virg.* 49.

e affinis repens fruticosa, foliis rigidis scabritie operatis, flore pentapetaloido fistuloso. *Pluk. alm.* t. 107. f. 1. *Raj. suppl.* 596.

at in Virginia, Canadae pinetis. †

G A U L T H E R I A.

LATHERIA. *Kalm. Amæn. acad.* 3. p. 14. * procumbens. *am arb.* 1. p. 286. t. 113.

dæa canadensis, pyrolæ folio. *Tournef. inst.*

ma pedunculis arcuatis. *Cold. noveb.* 98.

in Canadae sterilibus arenosis. †

A R B U T U S.

- Unedo. 1. ARBUTUS caule arboreo, foliis glabris ferratis, cibus polyspermis. *Hort. cliff.* 163. *Roy. lugdb.* *Sauv. monsp.* 59. *Gron. orient.* 137.
Arbutus folio ferrato. *Bauh. pin.* 460. *Mill* 48. f. 1, 2.
Arbutus. *Cam. epit.* 168.
Habitat in Europæ australis, Hiberniæ occidentalis, sylvis. †
Baccæ polyspermæ, tuberculis seminum exasperatæ.
- Andrachne. 2. ARBUTUS caule arboreo, foliis glabris integris, baccis polyspermis.
Arbutus folio non ferrato. *Bauh. pin.* 460.
Andrachne theophrasti. *Clus. hist.* 1. p. 48.
Habitat in Oriente. †
Cortice non scabro. & Foliis integerrimis ab Adine differt.
- acadiensis. 3. ARBUTUS caulibus procumbentibus, foliis c subferratis, floribus sparsis, baccis polyspermis.
Vitis idæa acadiensis, foliis alaterni. *Tournef. inf.*
Habitat in Acadia. †
- alpina. 4. ARBUTUS caulibus procumbentibus, foliis n ferratis. *Fl. lapp.* 161. *Fl. svec.* 340; 359. *Hort* 163. *Roy. lugdb.* 440. *Hall. helv.* 415.
Vitis idæa foliis oblongis albicantibus. *Bauh. pin*
Vitis idæa. *Clus. hist.* 1. p. 61.
Habitat in Alpibus Laponiæ, Helvetiæ, Sibiria glia. †
- Uva ursi. 5. ARBUTUS caulibus procumbentibus, foliis rimis. *Fl. lapp.* 162. t. 6. f. 3. *Fl. svec.* 335
Mat. med. 211. *Hort. cliff.* 163. *Roy. lugd*
Hall. helv. 415.
Uva ursi. *Clus. hist.* 1. p. 63. *Oed. dan.* t. 33.
Radix idæa putata & Uva ursi. *Bauh. hist.* 1.
Arbutus noveboracensis Bearberry. *Cold. ne*
Habitat in Europa frigida, Canada. †

C L E T H R A .

- alnifolia. 1. CLETHRA. *Gron. virg.* 47. *Duham. arb.* 1. t. 71.
Alnifolia americana ferrata, floribus pentapet

in spicam dispositis, *Pluk. alm.* 18. t. 115. f. 1. *Catesb. car.* 1. p. 66. t. 66.

habitat in Carolina, Virginia, Pennsylvania. †

P Y R O L A.

YROLA staminibus adscendentibus, pistillo declinato. *Fl. suec.* 330; 360. *Mat. med.* 212. *Amæn. acad.* 1. p. 156. rotundifolia.

YROLA staminibus & pistillis declinatis. *Fl. lapp.* 169. YROLA foliis integerrimis. *Vir. cliff.* 37. *Roy. lugdb.* 440.

YROLA foliis subrotundis, scapo racemoso. *Hort. cliff.* 162.

YROLA rotundifolia major. *Bauh. pin.* 191.

YROLA noveboracensis. *Cold. noveb.* 99.

habitat in Europa septentrionaliore, Virginia, Brasilia. 2

YROLA floribus racemosis dispersis, staminibus pistillisque rectis. *It. gotl.* 206. *Fl. suec.* 331; 361. minor.

YROLA foliis subrotundis, scapo undique racemoso, genitalibus rectis. *Aët. stockh.* 1741. p. 192.

YROLA foliis obiter ferratis subrotundis racemosis, floribus tuba erecta. *Hall. helv.* 420. *opusc.* 82.

YROLA minor. *Riv. pent.* 149. *Raj. angl.* 3. p. 363.

habitat in Europæ frigidiore. 2

YROLA racemo unilaterali. *Fl. suec.* 332; 362. secunda.

YROLA floribus uno versu sparsis. *Fl. lapp.* 168.

YROLA folio mucronato serrato. *Bauh. pin.* 181.

YROLA 2 tenerior. *Clus. pan.* 506.

habitat in Europæ borealis sylvis. †

YROLA pedunculis subumbellatis. *Fl. suec.* 333; 363. umbellata.

YROLA frutescens, arbuti flore. *Bauh. pin.* 191.

YROLA 3. fruticans. *Clus. pan.* 507.

habitat in Europæ, Asiæ & Americæ septentrionalis sylvis. †

YROLA pedunculis bifloris. maculata,

YROLA petiolis apice bifloris vel trifloris. *Gron. virg.* 48.

YROLA marilandica minor, folio mucronato arbuti. *Pet. mus.* 675.

Pyrola mariana, arbuti foliis angustioribus, trifol
ad medium nervium linea alba utrinque per lon
gitudinem discurrente. *Pluk. mant.* 157. t. 349. f. 1
Habitat in Americæ septentrionalis sylvis. h

niflora. 6. *PYROLA* scapo unifloro. *Fl. lapp.* 167. *Fl. suec.*
364. *Hall. helv.* 420.

Pyrola rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 191.
Singulari flore ampliore. *Morsj. hist.* 3. p. 505. f. 1
10. f. 2.

Pyrola IV. *Oed. dan.* t. 8.
Habitat in Europæ borealis sylvis. 24

DIGYNIA.

ROYENA.

lucida. 1. *ROYENA* foliis ovatis scabriusculis. *Hort. cliff*
Roy. lugdb. 411.

Staphylodendron africanum sempervirens, foliis
dentibus. *Comm. hort.* 1. p. 187. t. 96.

Staphylodendrum africanum, folio singulari
Herm. parad. 232. t. 232.

Pistacia africana. *Pluk. alm.* 298. t. 63. f. 4. t. 317
Habitat ad Cap. b. Spei. h

glabra. 2. *ROYENA* foliis lanceolatis glabris. *Roy. prod*
Royena foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 149.

Vitis idæa æthiopica, buxi minoris folio, floribus
Comm. hort. 1. p. 125. t. 65.

Vitis idæa æthiopica, myrti foliis, flosculis depe
bus. *Pluk. alm.* 391. t. 321. f. 4.

Habitat ad Cap. b. Spei. h

hirsuta. 3. *ROYENA* foliis lanceolatis hirsutis. *Roy. luga*
Arbutus foliis lanceolatis integerrimis hirsutis
cliff. 163.

Staphylodendrum africanum, folio lanuginoso
rima latiore. *Boerh. lugdb.* 2. p. 235.

Habitat ad Cap. b. Spei. h

HYDRANGEA.

arborescens. 1. *HYDRANGEA.* *Gron. virg.* 50. *Duham. ar*
298. t. 118.

at in Virginia. †

ex ordine *Arbustivarum XIX*, foliis oppositis,
ribus in cymam digestis.

C U N O N I A.

IONIA.

rdykia floribus spicatis pentapetalis, foliis oblon-
subincanis ferratis. *Burm. afr.* 259. t. 96.

scula, arbuti alatis foliis, africana. *Pluk. alm.* 45.
191. f. 4.

at ad Cap. b. Spel. †

opposita, pinnata cum impari sessili, nec longio-
Foliola sæpe septem, lanceolata, glabra, serrata.
andula maxima, spatula forma, ovata, integerrima,
compressa, foliacea, petiolo ancipiti, tum e sin-
la foliorum ala, tum major inter pedunculos. Ra-
mi terminales, bini, simplices: pedicelli ex singu-
punctis sparsis plures, uniflori.

capensis.

C H R Y S O S P L E N I U M.

RYOSPLENIUM foliis alternis. *Fl. suec.* 317; alternifoli-
um.

5. *It. scan.* 16.

ryosplenium. *Hort. cliff.* 149. *Roy. lugdb.* 209.

ryosplenium foliis amplioribus auriculatis. *Rudb.*
p. 97. *Fl. lapp.* 151.

ryosplenium foliis pediculis oblongis insidentibus.
Burm. f. hist. 146.

fraga aurea, foliis pediculis oblongis insidentibus.
W. hist. 206.

in palustre luteum majus, foliis pediculis longis
insidentibus. *Morif. hist.* 3. p. 477. f. 12. t. 8. f. 8.
tat in Sveciæ, Germaniæ, Angliæ opacis humen-
us. 24

primarius Decandrus, reliqui Octandri. *Phil. Bot.*
8.

RYOSPLENIUM foliis oppositis. *Sauv. monsp.* oppositifoli-
um.

ryosplenium foliis amplioribus auriculatis. *Tournef.*
ff. 146.

ryosplenium l. Saxifraga aurea. *Tabern. hist.* 1224.

fraga aurea. *Dod. pempt.* 316. *Lob. hist.* 336. ic.
12.

fraga rotundifolia aurea. *Bauh. pin.* 309.

Saxifraga romanorum. Dalech. hist. 1114
Sedum palustre luteum, foliis subrotundis fel
Morif. hist. 3. p. 477. f. 12. t. 8. f. 7.
Alchimilla rotundifolia aurea hirsuta. Herm. lug
Habitat in Belgio, Anglia, Canada, locis umbra
mentibus.
Affinis nimium præcedenti.

SAXIFRAGA.

* *Foliis indivisis, Caule subnudo.*

- Cotyledon. 1. **SAXIFRAGA** foliis radicatis aggregatis lin
 cartilagineo-ferratis, caule paniculato.
Saxifraga foliis ligulatis radicalibus margine cartil
acuta ferratis, floribus paniculatis. Fl. svec. 33
Saxifraga foliorum marginibus cartilagineis
Hort. cliff. 168. Roy. lugdb. 453.
Saxifraga foliis radicalibus in orbem positis: se
cartilagineis. Fl. lapp. 177. t. 2. f. 2.
Sanicula montana crenata, folio longiore, p
foliofo. Pluk. alm. 331. t. 222. f. 1.
Sedum ferratum album bicorne, marginibus an
Morif. hist. 3. p. 478. f. 12. t. 9. f. 19. 20.
 Cotyledon media, foliis oblongis ferratis. *Bo*
 285.
 β. Cotyledon minor, foliis subrotundis ferratis
pin. 285. prodr. 133.
 γ. *Saxifraga*, sedi folio, flore albo, multiflora. *J*
inst. 252.
Sedum ferratum, flore albo, multiflorum. Dod
 113.
 δ. *Saxifraga*, sedi folio, pyrenaica ferrata. *Tour*
 252.
 ε. Cotyledon pyramidale, lato crenato & retuso
 polyanthos. *Bocc. mus. 2. p. 109. t. 86.*
Saxifraga sedi folio angustiore ferrato. Segu. ve
t. 9. f. 1
Habitat in Alpibus Europæ. 24
 mutata. 2. **SAXIFRAGA** foliis radicalibus aggregatis l
 tis cartilagineo-ferratis, caule racemoso.
Saxifraga foliorum limbo cartilagineo integro
longa, floribus purpureo-croceis. Hall. herb.
9. t. 9. Seguier. ver. 3. p. 199. Burf. XVI.

at in *Alpibus Helvetiæ, Italiæ.*

ida quasi apparet hæc planta *S. Cotyledoni affinis, distincta. Folia Radicalia aggregata, lingulata, tilagine serrata, versus basin ciliato-villo-*
*Caulis firmior, simplex foliis copiosioribus, ma-
 viicidus. Racemi alterni, breves. Flores qua-
 plo majores: Petalis lanceolatis, longis, diversiffi-
 , croceis nec albis.*

IFRAGA foliis lanceolatis denticulatis, caule *penfylvani-
 ca.*
 do paniculato, floribus subcapitatis.

raga foliis radicalibus lanceolatis denticulatis, cau-
 lubnudo piloso ramoso, floribus confertis capita-
Gron. virg. 49.

raga noveboracensis. *Cold. noveb. 105.*

raga penfylvanica, floribus muscosis recemosis.
ll. eth. 337. t. 253. f. 328.

ula virginiana alba, folio oblongo mucronato.

k. alm. 331. t. 59. f. 1. ☉ t. 222. f. 3.

at in Virginia, Penfylvania, Canada.

IFRAGA foliis lanceolatis obtusis pilosis, caule *androsacea,
 ca.*
 do bifloro.

raga caule paucifloro, foliis subhirsutis lingulatis
 tridentatis. *Hall. helv. 405.*

m alpinum tertium. *Col. ecphr. 2. p. 66. t. 67.
 ultim.*

raga alpina, habitu androsaces, villosa, *Hall. norib.
 36. t. 1. f. 3.*

at in Sibiria, Helvetia.

IFRAGA foliis linearibus subtus punctatis ag- *caesia.*
 egatis recurvatis, caule nudo, multifloro.

raga rosulis densissimis, foliis crassis glaucis re-
 ndis subtus fulcatis. *Hall. helv. 402.*

raga alpina minima, foliis cæsiis deorsum incur-
 s. *Tournef. inst. 253. Segu. veron. 449. t. 9. f. 2.*

m alpinum album, foliis compactis. *Bauh. pin.
 4. Moris. hist. 3. f. 12. t. 7. f. 32.*

m alpinum minimum, foliis cinereis, flore can-
 lo. *Scheuch. alp. 341; 141. t. 21. f. 1.*

at in *Alpibus Helveticis, Austriacis, Pyrenaicis,
 ldo.*

pagina superioris duplici ordine punctorum per-
 atorum evadunt albida.

- burseriana.* 6. **SAXIFRAGA** foliis aggregatis imbricatis lævibus, caule subnudo unifloro.
Saxifraga alpina, foliis glaucis acutis, mono caule folioso. *Segu. ver. 3. p. 201. t. 5. f. 2.*
Sedum alpinum, saxifragæ albæ flore. *Bauh. pin. Burf. XVI; 6.*
Habitat in Taurero Rastadiensi, montibus Leibus. 24
Facies Sedi minoris. Folia juniperina, dense imbricata, acuta, carinata, glabra. Caulis vix demum rufescente hispidus s. glutinosus, foliolis 3-f. ternis, linearibus. Flos magnitudine Saxifragæ nulatæ: venis incarnatis.
- sedoides.* 7. **SAXIFRAGA** foliis caulinis aggregatis alternis positisque sublanceolatis, flore pedunculato.
Saxifraga alpina minima, foliis ligulatis in obtusis, flore ochroleuco. *Segu. veron. 450. t. 9.*
Habitat in Alpibus Tridentinis, Sibiricis. 24
- bryoides.* 8. **SAXIFRAGA** foliis ciliatis inflexis imbricatis, nudiusculo unifloro.
Saxifraga rosulis densissimis, foliolis ciliatis, eximifloro. Hall. helv. 403.
Saxifraga pyrenaica minima lutea muscicola. Tournesf. inst. 253.
Sedum muscolum. Bauh. hist. 3. p. 695. Scheuchz. 142. t. 21. f. 2.
Sedum ejusdem alpinum quartum. Col. ecphr. 2. t. 67. f. 1, 2.
Habitat in Alpibus Helveticis, pyrenaicis.
Folia spinoso-ciliata, licet cilia sæpius obtegantur imbricatis.
- bronchialis.* 9. **SAXIFRAGA** foliis imbricatis subulatis ciliatis, caule subnudo multifloro.
Habitat in Sibiria.
Stolones oblongi confertim imbricati: Foliis subulatis, mucronato-spinosis, spinoso-ciliatis. altus, nudiusculus: foliis aliquot minimis mucronatis margine lævibus. Panicula parva.
- stellaris.* 10. **SAXIFRAGA** foliis ferratis, caule nudo multifloro, petalis acuminatis.

strifraga foliis lanceolatis dentato-ferratis, caule nudo
implici. *Fl. svec.* 335; 367.

strifraga caule nudo simplici, foliis lanceolatis denta-
tis, petalis acutis. *Fl. Lapp.* 175.

strifraga myofotis, floribus albicantibus fere umbella-
s. *Pluk. alm.* 331. t. 58. f. 2. *Æ* t. 222. f. 4.

strifraga montanum hirsutum, mucronato & dentato
obliquo, flore albo guttato. *Morif. hist.* 3. p. 478. f. 12.

9. f. 13.

strifraga alpinum IV. *Oed. dan.* t. 23.

strifraga in Alpibus Spitsbergenibus, Lapponicis, Hel-
eticis, Styriacis, Westmorlandicis.

strifraga inferi.

AXIFRAGA foliis ovalibus retusis obsolete fer- *crassifolia.*
tatis petiolatis, caule nudo, panicula conglomerata.

axifraga foliis ovalibus crenulatis, caulibus nudis.
axifraga mel.

axifraga in Alpibus Sibiricæ. 24

axifraga crassitie fere digiti. Folia bina, palmaria,

oriacea, ovalia, retusa, repando-crenata, glabra,
obliatione involuta. Gemmæ maximæ foliolis 2 f.

3, ovatis, concavis, quorum unum scapo adherens
extollitur. Scapus nudus, pedalis, crassitie digiti,

paniculatus ramis pedatis. Flores superi, subnu-
mbrati, campanulati: petala obovata, rubro-pur-
purea.

AXIFRAGA foliis obovatis crenatis subfessilibus, *nivalis.*
caule nudo, floribus congestis.

axifraga foliis subovatis crenatis, caule nudo, flori-
bus capitatis. *Fl. svec.* 354; 368.

axifraga caule nudo simplici, foliis elliptico-subro-
undis crenatis, floribus capitatis. *Fl. Lapp.* 176. t. 2.

5. 6.

axifraga foliis cordato-ovalibus crenatis, corolla alba,
caule hirsuto aphylo. *Grav. virg.* 160.

axifraga foliis oblongo-rotundis dentatis, floribus
compactis. *Raj. angl.* 3. p. 354. t. 16. f. 1.

axifraga pervivum minus dentatum. *Mart. Spitzb.* 43. t. F.
A. Pluk. phyt. 222. f. 2.

axifraga III. *Oed. dan.* t. 28.

axifraga in summis Alpibus Spitzbergenibus, Lappo-
nicis, Arvenicis, Virginia, Canada. 24

- punctata. 13. **SAXIFRAGA** foliis subrotundis dentatis longipetiolatis, caule nudo.
Sedum bicorne ferratum, pallidiore folio rotundifloribus punctatis. *Morif. hist. 3. p. 478. f. 12. f. 17.*
Habitat in Sibiria. 24
Folia subrotunda, dentibus incisa, ut fere lobata que ora cartilaginea, minime retusa, dentibus tuis; Petioli læves foliis triplo longiores, sensim dilatati in folium. Flores minores quam S. Geo, fere inferi.
- umbrosa. 14. **SAXIFRAGA** foliis obovatis subretusis carneo-crenatis, caule nudo paniculato.
Saxifraga foliis cuneiformibus retusis radicalibus futo-ferratis margine acutis, caule, paniculato. *upf. 108.*
Geum folio subrotundo minori, pistillo floris *Magn. hort. 88. t. 8. Mill. ic. 141. f. 2.*
Habitat in Montibus apud Cantabros. 24
Affinis nimium S. Geo; Folia basi minime cordatis angulatis; petiolis ciliato-villosis. Flores
- cuneifolia. 15. **SAXIFRAGA** foliis cuneiformibus obtusissimipandis, caule nudo paniculato.
Cotyledon altera olim matthioli. *Bauh. hist. 3. p. 6*
Cotyledon aut Sedi species quædam. *Gesn. fasc. 12. f. 37. bene.*
Habitat in Alpibus Stiriz, Gotthardo. Gerard.
Simillima præcedenti, sed Foliorum margo non tus, at obtusissime repandus, ut E folia longiora. Flores inferi.
- hirsuta. 16. **SAXIFRAGA** foliis cordato-ovalibus retusis cingineo-crenatis, caule nudo paniculato.
Geum folio circinato acute crenato, pistillo floribro. *Magn. hort. 87. t. 87.*
Habitat in Pyrenæis. 24
Affinis nimium sequenti, sed folia ovalia, nec vicia. Flores inferi.
- Geum. 17. **SAXIFRAGA** foliis reniformibus dentatis, nudo paniculato.
Sanicula montana rotundifolia minor. *Bauh. pin*

m montanum rotundifolium minus album non
 tatum. *Morif. hist. 3. p. 478. f. 12. t. 9 f. 12.*
at in Alpibus Europæ. 2
es inferi.

* * Foliis indivisis, Caule folioso.

XIFRAGA foliis caulinis ovatis oppositis im-
 catis: summis ciliatis. *Fl. suec. 359; 369.* oppositifolia.

raga, foliis ovatis quadrangulo imbricatis, ramis
 procumbentibus. *Fl. lapp. 179. t. 2. f. 1. Hall. helv.*

3.

m alpinum ericoides purpurascens. *Bauh. pin. 284.*

edr. 132. Morif. hist. 3. p. 480. f. 12. t. 10. f. 36.

at in rupibus Alpium Spitzbergenium, Lappo-

zarum, Pyrenaicarum, Helveticarum. 2

es filiformes, dependentes, repentes. Folia ovata,

adrisariam imbricata opposita, sessilia, ciliata.

os terminalis, solitarius, sessilis.

XIFRAGA foliis caulinis lanceolatis alternis aspera-

noso-ciliatis, caule inferne procumbente.

raga foliis simplicibus ciliatis, caule folioso ramo-

Hall. helv. 403.

raga sedi foliis crenatis asperis. *T. Scheuch. it. 2.*

140. t. 20. f. 3.

m alpinum, foliis crenatis asperis. *Bauh. pin. 284.*

edr. 132. Gesn. fasc. 22. t. 6. f. 27.

m alpinum hispidum fere spinosum, flore pallido.

uh. hist. 3. p. 695. Morif. hist. 3. p. 479. f. 12. t.

f. 25.

m minimum alpinum villosum alterum. *Park.*

atr. 738.

at in Alpibus Helveticis.

XIFRAGA foliis caulinis linearibus alternis ci- autumnalis,

tis: radicalibus aggregatis.

raga foliorum margine ciliari, floribus luteis ma-

lulis. *Hall. helv. 399.*

raga angustifolia autumnalis, flore luteo guttato,

his floribus magis acuminatis. *Breyn. cent. 106.*

48.

m alpinum, floribus luteis maculosis. *Bauh. pin.*

4.

m angustifolium autumnale, flore luteo guttato.

orif. hist. 3. p. 477. f. 12. t. 8. f. 6.

Habitat in humentibus Boruffiæ, Angliæ, Helvetiæ.
Calyx corolla longe brevior & viridis est. Flores inferi.

- Hirculus.** 21. **SAXIFRAGA** foliis caulinis lanceolatis alternis inermibus, caule erecto. *Fl. Svec. 2. 1. 371.*
Saxifraga petalis latissimis luteis lineatis. Hort. 399. t. 8.
Geum palustre luteum bicorne, nardi celticæ. Morif. hist. 3. p. 477.
Chamæ Cistus fruticis, foliis nardi celticæ. Bauh. 466.
Hirculus qui Chamæ Cisti genus. Clus. cur. 5.
Habitat in Svecia, Helvetia, Lapponia, Siberia.
Petala ad basin Lacuna nectarifera ex rimis apicibus acutis instructa. Flores inferi.
- rotundifolia.** 22. **SAXIFRAGA** foliis caulinis lineari-subulatis nudis inermibus, caulibus decumbentibus.
Saxifraga foliis linearibus sparsis glabris. Fl. Svec. 371.
Saxifraga foliis subulatis sparsis. Fl. lapp. 178.
Sedum alpinum, flore pallido. Bauh. pin. 284. hist. 3. p. 477. f. 12. t. 6. f. 3.
Sedum minus VI. Clus. hist. 2. p. 60.
Habitat in Alpibus Lapponicis, Styriacis, Wandalicis, Baldo.
- rotundifolia.** 23. **SAXIFRAGA** foliis caulinis reniformibus distichis petiolatis, caule paniculato.
Saxifraga foliis reniformibus acute crenatis, composito folioso. Hort. cliff. 167. Roy. lugdb. 45. helv. 400.
Sanicula montana rotundifolia major. Bauh. pin. 284. f. 25.
Sanicula alpina. Cam. epit. 764. Gesn. fasc. 19. f. 25.
Habitat in Alpibus Helveticis, Austriacis. 2.
Flores inferi.
- * * * Foliis lobatis, Caule erecto.
- granulata.** 24. **SAXIFRAGA** foliis caulinis reniformibus distichis caule ramoso, radice granulata. *Hort. cliff. 167. Svec. 350; 372. Mat. med. 215. Roy. lugdb. 45. helv. 401.*

axifraga rotundifolia alba. *Bauh. pin.* 309.

axifraga alba. *Dod. pempt.* 316.

axifraga IV. *Cam. epit.* 719.

Habitat in Europæ apricis. 24

SAXIFRAGA foliis caulinis palmato-lobatis: cau- bulbifera.
linis sessilibus, caule ramoso bulbifero.

axifraga bulbosa altera bulbifera montana. *Col. ecphr.*

1. p. 318. t. 317.

axifraga ad folia bulbos gerens. *Bauh. pin.* 309.

Sedum bicorne rotundifolium erectum, radice granu-
lata, & ad caulem tubercula proferens. *Morif. hist.*

3. p. 474. f. 12. t. 9. f. 24.

Habitat in Italiæ pratis saxosis umbrosis. 24

Varietas potius præcedentis, quam species. Segu. ver.

3. p. 207.

SAXIFRAGA foliis caulinis palmatis petiolatis, cernui.
caule simplicissimo unifloro bulbifero. *Oed. dan. t.*
22.

axifraga foliis palmatis, caule simplici unifloro. *Fl.*

Lapp. 172. t. 2. f. 4. Hort. cliff. 167. Fl. suec. 351, 373.

Habitat in Alpibus Lapponicis frequens. 24

Flos parum nutat. Folia caulina glabra, magis pal-
mata & germen supra receptaculum, magis quam in
antecedente, ut distinctissima a priore planta. Vi-
detur tamen affinis sequenti, licet & ab hac di-
stineta.

SAXIFRAGA foliis reniformibus palmatis pilosis, sibirica.
caule pedunculisque filiformibus.

Habitat in Sibiria.

radiculæ capillares. Folia radicalia petiolata, reni-
formia, septemloba s. palmata: lobis ovatis, pilis ra-
ris adpersa, petioliis hirsutis. Caulis filiformis, ad-
scendens, sempipedalis, debilis, Foliis 2. s. 3. sessilibus,
palmatis. Pedunculi terminales & laterales longis-
simi, filiformes, bifidi, nudi. Flos majusculus, al-
bus, inferus.

SAXIFRAGA foliis caulinis palmatis: summo flo- rivulatis.
rali ovato, caule simplici subbifloro.

axifraga foliis radicalibus quinquelobis, florali ovato.

Fl. lapp. 174. t. 2. f. 7. Fl. suec. 352, 374.

Habitat ad Alpium Lapponicarum latera & rivulos.

Linnei Spec. plant p. 115 l.

OO

29. SA-

- grœnlandi-
ca. 29. SAXIFRAGA foliis caulinis palmato-multifidis
fis: laciniis acutis, caule erecto.
Saxifraga tridactylites grœnlandica, caulibus vald
liosis. *Dill. elth.* 337. t. 353. f. 329.
1 *Habitat in Grœnlandia, forte etiam in Pyrenœi*
Helveticis Alpibus.
- geranioides. 30. SAXIFRAGA foliis radicalibus reniformibus &
quelobis multifidis, caulinis linearibus, caule
nudo ramoso. *Amœn. acad.* 4. p. 271. *
Habitat in Pyrenœis. Eurf. XVI. 86.
- ajugifolia. 31. SAXIFRAGA foliis radicalibus palmato-quin
partitis, caulinis linearibus indivisis, caulibus
scendentibus multiloris. *Amœn. acad.* 4. p. 271.
Habitat in Galloprovinciæ montibus.
- tridactylites 32. SAXIFRAGA foliis caulinis cuneiformibus tri
alternis, caule erecto ramoso *Fl. svœc.* 353; 3
Saxifraga foliis trifidis basi angustis, caule erecto. *l*
lugdb. 457. *Sauv. monsp.* 208.
Saxifraga foliis omnibus trilobis basi angustis, c
erecto. *Fl. lapp.* 173. *Hort. cliff.* 168.
Sedum tridactylites tectorum. *Bauh. pin.* 285.
Paronychia altera. *Dcd. p.mpt.* 113.
Habitat in Europæ arenosis, & Alpibus. ☉
- petræa. 33. SAXIFRAGA foliis caulinis palmato-tripartitis:
ciniis subtrifidis, caule ramosissimo laxo.
Saxifraga alba petræa. *Pon. bald* 339. f. 337. *
Saxifraga aizoides alpina, trifido folio, major. *l*
Pluk. alm. 331. t. 222. f. 3.
Sedum tridactylites alpinum majus album. *Bauh. p*
284. Morif. hist. 3. p. 479. f. 12. t. 9. f. 28.
Habitat in Alpibus Norvegicis, Pyrenœis, Baldi.
Affinis nimium S. tridactyliti, etiam viscida, sed C
ramosissimus. Folia lata, palmata, tripartita,
sa. Corollæ quadruplo majores.
- caespitosa. 34. SAXIFRAGA foliis radicalibus aggregatis linear
integris, trifidisque, caule erecto subnudo subtri
ro *Fl. svœc.* 2. n. 376. *
Saxifraga foliis simplicibus & trifidis, caule pa
aphyllo paucifloro. *Hall. helv.* 405. *opuz.* 291. *l*
f. 1.

aga foliis partim integris partim trifidis. *Segu.*

451. t. 9. f. 4.

1 tridactylites alpinum minus. *Bauh. pin.* 284.

r. 131.

1 Moschatella alpina lutea. *Gesn. fasc.* 25. t. 6.

r.

ut in *Alpibus* Lapponicis, Helveticis, Tridenti-
, Montpelii. 2.

* Foliis lobatis; Caulibus procumbentibus.

FRAGA foliis caulinis cordatis trilobis inte- cymbalaria.
que, caulibus procumbentibus.

aga exigua, foliis cymbalariae. *Buxb. cent.* 2. p.

t. 45. f. 2.

ut in Oriente.

XIFRAGA foliis caulinis ovatis lobatis, caule hederacea.
formi flaccido.

aga cretica annua minima, hederaceo folio.

urnes. cor. 18.

at in Creta.

XIFRAGA foliis caulinis linearibus integris tri- hypnoides.
sve, stolonibus procumbentibus, caule erecto
liusculo.

aga procumbens, foliis linearibus integris trifidis-

1. *Hort. cliff.* 168. *Roy. lugdb.* 453. *Sauv. monsp.*

3. *Gort. gelr.* 248.

aga foliis omnibus angustis petiolatis apice triden-
s, caule folioso ramoso viscido. *Hall. helv.* 404.

n alpinum, trifido folio. *Bauh. pin.* 284. *Moriz.*

3. p. 479. f. 12. t. 9. f. 26.

aga procumbens, foliis linearibus integris trifidis

quinquefidis. *Roy. lugdb.* 454. *Sauv. monsp.* 208.

at in *Alpibus* Helveticis, Austriacis, Pyrenaicis,
estmorlandicis. 2.

XIFRAGA foliis caulinis cuneiformibus apice ascendens.
natis, caule adscendente subviloso.

m tridactylites alpinum, caule folioso. *Bauh. pin.*

4.

m tridactylites alpinum majus. 3. *Bauh. prodr.*

r. *Burf. XVI.* 89.

at in *Pyrenæis*, Baldo, Taurero Rastadiensi. 2.

TIARELLA.

- cordifolia. 1. **TIARELLA** foliis cordatis. *Amæn. acad.* 3. p. 1
Mitella scapo nudo. Hort. cliff. 167. * *Roy. l.*
 459. *Gron. virg.* 160.
Cortusa americana, flore spicato, petalis integris. h
par. 129. t. 129.
Habitat in America ☉ *Asia septentrionali.* 2
- trifoliata. 2. **TIARELLA** foliis ternatis. *Amæn. acad.* 3. p.
Mitella foliis ternatis. Amæn. acad. 2. p. 351.
Habitat in Asia boreali. *G. Demidoff.* 2

MITELLA.

- diphylla. 1. **MITELLA** scapo diphylo. *Hort. cliff.* 167. *
lugdb. 459. *Cold. noveb.* 96.
Cortusa americana altera, floribus minutim fimbri
Mentz. pug. t. 10.
Cortusa americana, spicato flore, petalis fimbri
Herm. par. 130.
Sanicula f. Cortusa indica, flore spicato fimbri
Dodart. mem. 209.
Habitat in America septentrionali.
- nuda. 2. **MITELLA** scapo nudo. *Amæn. acad.* 2. p. 351.
Habitat in Asia boreali. 2

SCLERANTHUS.

- annuus. 1. **SCLERANTHUS** calycibus fructus patulis
fec. 348; 377.
Scleranthus. Hort. cliff. 166. *Roy. lugdb.* 215.
Polygonum, gramineo folio, majus erectum. l
p. n. 281.
Polygonum, angustissimo & gramineo folio, n
repens. Bauh. pin. 281. (*sed mixtum*)
Polygonum minus alterum. Tabern. hist. 1217.
Habitat in Europæ arvis arenosis. ☉
- perennis. 2. **SCLERANTHUS** calycibus fructus clausis. *Fl.*
 349; 378.
Knavel incanum, flore majore, perenne. Raj. a
p. 160. t. 5. f. 1.
Polygonum minus polycarpon. Tabern. hist. 121

Alchimilla gramineo folio, majori flore. *Vaill. parif.*

4. t. 1. f. 5.

habitat in Europæ campis apricis arenosis. 24

SCLERANTHUS calycibus fructus patentissimis polycarpus spinosis, caule subvillosa. *Amæn. acad.* 4. p. 313.*

Polycarpus. *Dalech. hist.* 444.

Olygonum montanum. *vermiculatae* foliis. *Bauh. pin.* 281.

vermiculata nova planta. *Col. ecphr.* 1. p. 295. t. 294.

habitat *Monspeli* ♂ in Italia. ○

GYP SOPHILA.

GYP SOPHILA foliis mucronatis recurvatis, floribus aggregatis. *Amæn. acad.* 3. p. 23.

aponaria calycibus pentaphyllis, floribus aggregatis, foliis mucronatis canaliculatis recurvis. *Hort. upf.* 107.

aryophyllus saxatilis, *ericæ* foliis, umbellatis corymbis. *Bauh. pin.* 211. *prodr.* 105. *Raj. hist.* 1033.

Magn. monsp. 53. t. 5.

habitat in monte Lupi Galliæ, *Monspeli*, *Pyrenæis.* 24

GYP SOPHILA foliis lanceolatis, petalis emarginatis, staminibus pistillo brevioribus. *Amæn. acad.* 3. p. 23.

aponaria caule simplici, foliis subulatis planis, ex alis ramulosa. *Hort. cliff.* 166.

aponaria foliis glaucis pulposis angustis heteromallis. *Hall. helv.* 380. n. 6. *Kupp. j. n.* 117.

line orientalis altissima, gramineo folio, flore albo. *Buxb. cent.* 3. p. 32. t. 60.

line angustifolia caryophylloides multiflora glabra purpurascens, radice astragaliti. *Pluk. alm.* 22. t. 75. f. 2.

aryophyllus saxatilis, foliis graminis, minor. *Bauh. pin.* 211. *Burf. XI.* 126.

habitat in Sibiria, *Austria*, *Helvetia*, *Pyrenæorum montibus.* 24

rollæ albæ, extus incarnatæ, emarginatæ; antheræ rufescentes polline violaceo.

GYP SOPHILA foliis lanceolatis lævibus, caulibus prostrata diffusis, pistillis corolla campanulata longioribus.

Habitat in Alpibus Europæis? 2

Caulis plures, diffusi, læves, teretes, subpedalis
 genicula rufescentes. Folia lanceolata, glabra,
 genicula brachiata, trichotoma: pedunculo immo
 simpliciore ad triangulum recto. Corolla alba:
 talis obtusis, patentibus, apice canaliculatis.
 minima corolla dimidio breviora. Antheræ flave.
 li corolla paullo longiores. Simillima *G. repens*
 sed differt Radice vix repente; Caulis
 minus purpurascens. Calycis foliolis non carinis
 Corollis minoribus albis, nec subrubentibus. Antheris
 flavis. Stylis divergentibus, petalo longioribus.
 liis minus carnosus.

astigiata 4. **GYPSOPHILA** foliis lanceolato-linearibus obtusis
 triquetris lævibus obtusis secundis. *Aman. 3. p. 23.*

Saponaria calycibus pentaphyllis, corymbis fastigiatis,
 foliis linearibus, caule ascendente. *L. 282. Fl. suec. 346. ; 379. Sauv. monsp. 145.*

Saponaria petalis ovatis, foliis glaucis pulposioribus.
Hall. jen. 117. t. 2. f. 1.

Caryophyllus saxatilis, floribus gramineis, umbellatis
 corymbis. *Bauh. pin. 211.*

Polygonum majus erectum angustifolium, floribus
 candidis. *Mentz. pug. t. 2. f. 2.*

Habitat in Gotlandiæ, Borussia, Helvetiæ rupibus.
 Caulis in hac, non in antecedente, ante florescens
 procumbit, hinc folia secunda.

altissima, 3. **GYPSOPHILA** foliis lanceolatis subtrinerviis
 etis.

Saponaria calycibus pentaphyllis, corymbis fastigiatis,
 foliis lanceolatis, caule ascendente. *Hort. up. 179.*

Habitat in Sibiria. 2

*Differt a sequente magnitudine dupla vel quadrupla
 partium; Structura eadem, tamen diversa flosculi.
 Caulis erectus, sesquipedalis. Folia longitudine
 latitudine digiti.*

urbium. 6. **GYPSOPHILA** foliis linearibus; axillaribus compositis
 teretibus. *J. fl. it. 73.*

Saponaria caule simplici, foliis linearibus ex aliorum
 confertis teretibus. *Hort. cliff. 166. Lugdb. 444.*

ponaria lychnidis folio, flosculis albis. *Bauh. pin.* 206.

ali vermiculatum, albo globofo flore. *Barr. rar.* 64. t. 119. *Bocc. mus.* 2. p. - t. 122.

abitat in Hispania. 2.

YPSOPHILA foliis lanceolatis subtrinerviis tomentosis, caule pubescente. *Amæn. acad.* 4. p. 271. * *tomentosa.*
num sylvestre latifolium, flore albicante. *Barr. rar.* 670. t. 1002.

abitat in Hispania. 2.

YPSOPHILA foliis lanceolatis scabris, floribus dioicis, corollis revolutis. *Amæn. acad.* 3. p. 23. *paniculata.*

sine frutescens, caryophylli folio, flore parvo albo. *Gerb. tanaïf.* 15.

abitat in Sibiria, Tataria desertis sabulosis, Tawrow, Bielogrod 2.

alia margine scabra, acuta. Stamina in fundo floris sterilia latent. Petala revoluta, minora quam in congeneribus. Styli longiores corolla, incurvi. Mas mihi non visus.

YPSOPHILA foliis ovato-lanceolatis semiamplexicaulibus. *perfoliata.*

ponaria foliis lanceolatis, calycibus campanulatis angulatis. *Hort. cliff.* 165.

ergula multiflora, foliis inferioribus saponariae, superioribus behen similibus. *Dill. elth.* 368. t. 276.

357.

abitat in Hispania & Oriente.

YPSOPHILA foliis lineari-lanceolatis planis, caule dichotomo, pedunculis bifloris, petalis emarginatis. *Amæn. acad.* 3. p. 24. *rigida.*

ponaria caule dichotomo, foliis subulatis planis. *Hort. cliff.* 445. *Roy. lugdb.* 445.

ponaria caule brachiato, capillaceo folio, calyce campanulato, floribus sparsis. *Sauv. monsp.* 145.

nica minima. *Dalech. hist.* 1191.

abitat Monspelii & forte in Belgio. 2.

YPSOPHILA foliis linearibus planis, calycibus muralis
phyllis, caule dichotomo, petalis crenatis. *Amæn.*

cad. 3. p. 23.

Saponaria calycibus pentaphyllis. corollis emarginatis, foliis subulatis planis. Fl. juer. 345.

Saponaria foliis linearibus. Fl. lapp. 171.

Caryophyllus minimus muralis. Bauh. pin. 211.

Lychuis parva palustris, foliis acutis lanceolatis, sculis purpureis. Menz. pug. t. 7. f. 4.

Habitat in Svecia, Germania, Helvetia ad vias.

Similis G. saxifragæ. at caret squamis calycinis.

*saxifraga. 12. GYPSOPHILA foliis linearibus, calycibus at-
tis: squamis duabus, corollis crenatis.*

Dianthus saxifragus. Sp. pl. 1. p. 413.

Dianthus radice repente, ramis decumbentibus, subulatis. Roy. lugdb. 444.

Dianthus calyce lato & brevissimo. Hall. herb. 7.

Caryophyllus saxifragus strigosior f. Caryophyllus vestris, flore minimo. Bauh. pin. 211.

Lychuis pumila caryophyllata, flore rubello, hæmorrhoidalis aldrovando. Barr. rar. 64. t. 1.

Habitat in Austria, Helvetia, Gallia. 24

SAPONARIA.

*officinalis. 1. SAPONARIA calycibus cylindricis, foliis ovato
ceolatis. Hort. cliff. 165. Hort. upf. 106. Ma.
214. Roy. lugdb. 414. Gron. virg. 160. Gort. gen.*

Saponaria major lævis. Bauh. pin. 206.

Saponaria vulgaris. Cam. epit. 152.

*hybrida. 3. Saponaria concava anglica. Bauh. pin. 206. l
hist 2. p. 548. f. 5. t. 22. f. 52.*

Gentiana folio convoluto. Bauh. hist. 3. p. 531.

Habitat in Europa media. 24

*Hybrida varietas singularis, instar alterius P
Antirrhini, qua ex Saponaria transit in mon
lam Gentianam, reperta in Spineis, Lichba
Northamptonshire Angliæ, a Gerardo, ampli
non occurrit teste Mortono, forte etiamnum ab
Hortis Curiosorum asservata, quæ semine non
pagatur,*

*aretica 2. SAPONARIA calycibus striatis quinquangulis
caule erecto subdichotomo, foliis subulatis.*

Saxifraga altera. Alp. exot. 292. t. 291.

Habitat in Cretæ aridis.

Caulis brachiatus f. dichotomus, teres, villosus vif

angustis, pedalis. Folia lineari-subulata, levia. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, striati. Flores triflori. Calyx quinquangularis angulis striis tribus, monophyllus, oblongus, acutus, inter dentes membranaceus. Petala parva, integra.

APONARIA calycibus pyramidatis quinquangularibus, foliis ovatis acuminatis sessilibus. *Hort. cliff. 166. Hort. upf. 107. Roy. lugdb. 443. Guett. stamp. 287. Sauv. monsp. 153.* **Vaccaria.**
var. chnis segetum rubra, foliis perfoliatis. Bauh. pin. 204. Vaccaria Dod. pempt 104.
abitat inter segetes Galliae, Germaniae, Helvetiae, Orientis. ☉

APONARIA calycibus cylindricis villosis, caulis dichotomis procumbentibus. **Ocymoides.**
aponaria minor quibusdam. Bauh. hist. 3. p. 344.
var. chnis vel Ocymoides repens montanum. Bauh. pin. 206.
abitat in Helvetiae, Italiae, Monspelii petrosis, umbrosis. 2.

APONARIA calycibus cylindricis villosis, caule dichotomo erecto patulo. **orientalis.**
Hort. upf. 106. n. 2.
aponaria caule dichotomo, foliis lanceolatis petiolatis. floribus solitariis pedunculatis. Roy. lugdb. 445.
var. chnis orientalis annua supina, antirrhini folio, flore minimo purpurascens. Tournef. cor. 25. Dill. elth. 205. t. 167. f. 204.
abitat in Oriente. ☉
milis praecedenti; huic Folia lineari-lanceolata, illi lanceolato ovata. Calyces fructus ovati, adpersi punctis elevatis piliferis. Petala acute emarginata absque coronula.

APONARIA calycibus teretibus, corollis coronatis, floribus subumbellatis, foliis sublinearibus canaliculatis. **lutea.**
var. chnis floribus umbellatis ochroleucis, petalis ovatis, filamentis nigris. All. pedem. 29. t. 5. f. 2.
Globularia lutea montana. Col. ecphr. 1. p. 152. t. 153.
bellis montana, globoso luteo flore. Bauh. pin. 262.
var. chnis lutea montana, globulariae capite & facie. Barr. ic. 498.

Lychnis rubra, globulariæ capitulo. *Bocc. mus.* 1
75. t. 62. f. 1.

Habitat in Alpibus Exilliarum, Renestrellarum,
nifio. 24

DIANTHUS.

* *Flores aggregati.*

barbatus. 1. **DIANTHUS** floribus aggregatis fasciculatis: semis calycinis ovato-subulatis tubum æquantibus
liis lanceolatis. *Hort. cliff.* 155. *Hort. upf.* 165. *lugdb.* 444. *Sauv. monsp.* 144.

Caryophyllus hortensis barbatus latifolius. *Bauh.*
208.

Thyrsis. *Renal. spec.* 47.

β. *Caryophyllus barbatus hortensis angustifolius.* *B.*
pin. 209.

Armerius flos alter. *Dod. pempt.* 176. •

Habitat in - - - - 24

carthusiano- 2. **DIANTHUS** floribus subaggregatis: squamis c
rum. cinis ovatis aristatis tubum subæquantibus, foli
nearibus trinerviis. *Hort. upf.* 105.

Dianthus floribus aggregatis, squamis calycinis
ceolatis, corollis crenatis. *Guett. stamp.* 284.

Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius. *Bauh.*
209.

Caryophyllus arvensis, calyculo florum numer
Læf. pruss. 37. f. 7.

β. *Caryophyllus sylvestris*, flore rubro plurimo del
mo caule prodeunte. *Segu. ver.* 434. t. 8. f. 2.

Habitat in Germaniæ, Italiæ, Scitiæ sterilibus a
cis. 24

Differt a D. barbato Foliis dimidio angustioribus,
gidioribus, trinerviis nec uninerviis. Caule pa
scabro, nec levissimo. Petalis distantibus, si
villosis, nec glabris. Pistillis tubo longioribus.

Armeria. 3. **DIANTHUS** floribus aggregatis fasciculatis: se
mis calycinis lanceolatis villosis tubum æquant
Hort. cliff. 165. *Fl. spec.* 345. 381. *It. gotl.* 301. *lugdb.* 443. *Sauv. monsp.* 144.

Caryophyllus barbatus sylvestris. *Bauh. pin.* 208.

Armeria sylvestris altera. *Lob. ic.* 448.

itat in sterilibus Gotlandiæ, Germaniæ, Galliæ, aliæ. ☉

la acuminata, uno alterove dente notata.

ANTHUS floribus aggregatis capitatis: squamis prolifer.

calycinis ovatis obtusis muticis tubum superantibus.

anthus floribus aggregatis, capitulo magno, squamis

calycinis ovatis obtusis magnis. *Hort. upf.* 106. *Sauv.*

monsp. 144.

trichophyllus sylvestris prolifer. *Bauh. pin.* 209. *Segu.*

ron. 26. t. 7. f. 1.

trichophyllus sylvestris annuus, multis capsulis simul

natis donatus. *Moris. hist.* 2. p. 563.

itat in Germaniæ & australioris Europæ pascuis

sterilibus. ☉

ANTHUS floribus solitariis, squamis calycinis diminutus.

calycinis florem superantibus.

trichophyllo prolifero affinis, unico ex quolibet ca-

pitulo flore. *Bauh. pin.* 219.

trichophyllus sylvestris minimus. *Tabern. hist.* 290.

itat in Germania. ☉

a D. proliferi, eique nimis affinis, an pro Specie

agnoscenda? Folia angustiora. Caulis ramosus. Flo-

res terminales simplices, nec aggregati. Calyx pari-

tes 4 squamarum, quarum interiores per gradus

majores obtusiores. Corolla brevissima, vix extra

calycem prominens; adeoque fructificatio D. proliferi,

ad non aggregata, verum simplex.

* * Flores solitarii.

ANTHUS floribus solitariis: squamis calycinis Caryophyl-

loides brevissimis, corollis crenatis. *Hort. cliff.*

54. *Hort. upf.* 104. *Mat. med.* 213. *Roy. lugdb.* 443.

Sauv. monsp. 143.

trichophyllus hortensis simplex, flore majore. *Bauh. coronarius.*

pin. 208.

trichophyllus altilis major. *Bauh. pin.* 207.

trichophyllus maximus ruber & variegatus. *Bauh. pin.*

209.

trichophyllus - - -, flore pleno ex squamis calycinis imbricatus.

longissime imbricatis. *Hort. cliff.* l. c.

trichophyllus spicam frumenti referens. *E. N. C. cent.*

1. p. 368. t. 9. *Hort. cliff.* 164. *Phil. bot.* 8.

- inodorus.* 8. *Tunica angustifolia procumbens, petalis ferratis.* *helv.* 382.
Caryophyllus sylvestris biflorus. *Bauh. pin.* 209. 104.
Caryophyllus sylvestris, flore rubro inodoro, oblongo cum brevibus unguibus. *Segu. var.* 7. f. 3.
Habitat in Italia, Rajus; in Alpibus Helveticis, f. gustior. 2.
Coronarius a. cum reliquis γ. β. δ. forte ex dorro prognatus est.
Varietas δ. maxime singularis est.
- beltoides.* 7. **DIANTHUS** floribus solitariis: squamis cal lanceolatis binis, corollis crenatis. *Hort. cliff. Fl. svec.* 342; 382. *Sauv. monsp.* 143.
Caryophyllus minor repens nostras. *Raj. hist.* 981. *elth.* 402.
Caryophyllus simplex supinus latifolius. *Bauh.* 209.
Betonica coronaria f. Caryophyllus minor, folio nigricante, repens. *Bauh. hist.* 3. p. 329.
Habitat in Europæ pratis. 2.
- glaucus.* 8. **DIANTHUS** floribus subfolitariis squamis (nis lanceolatis quaternis brevibus, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164. *Hort. upf.* 104.
Tunica ramosior, flore candido cum corolla pura. *Dill. elth.* 400. t. 298. f. 348.
Habitat in Anglia. 2.
- chinensis.* 9. **DIANTHUS** floribus solitariis: squamis cal subulatis patulis tubum æquantibus, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164. *Hort. upf.* 104. * *Roy.* 443.
Caryophyllus finensis supinus, leucoji folio, unico. *Toarnes. act.* 1705. p. 348. f. 5. *Mill.* f. 2.
Habitat in China. ☉
- monspeliatus.* 10. **DIANTHUS** floribus solitariis: squamis cal subulatis tubum æquantibus, petalis multifidis. *acad.* 4. p. 313. *
Habitat Monspeli, Veronæ. 2.

IANTHUS floribus paniculatis : squamis calycinis brevibus acuminatis, corollis multifido-capillibus, caule erecto. *Amxn. acad.* 4. p. 272. * *Fl. rec.* 2. p. 383. superbus.

yophyllus simplex alter, flore laciniato odoratissimo. *Bauh. pin.* 210.

yophyllus sylvestris VI. *Clus. hist.* 1. p. 284.

vitat in Gallia, Germania, Dania, Kemi. ♂

IANTHUS floribus solitariis : squamis calycinis ovatis brevissimis, corollis multifidis fauce pubescentibus. plumarius.

anthus floribus solitariis, petalis multifidis basi caliculatis. *Hort. upf.* 105. * *Sauv. monsp.* 143.

anthus floribus solitariis, corollis lacero-partitis, squamis calycinis ovatis acutis. *Fl. svec.* 344.

anthus petalis multifidis. *Fl. lapp.* 170, *Hort. cliff.* 74. *Roy. lugdb.* 443.

yophyllus sylvestris, floribus lanuginosis hirsutis. *Bauh. pin.* 210.

yophyllus sylvestris V. species alia. *Clus. hist.* 1. 284

vitat in Europæ & Canadæ pascuis nemorosis.

ca. vore cæfio glauca.

* * * *Caule unifloro herbaceo.*

IANTHUS caulibus subunifloris : squamis calycinis ovatis obtusis, corollis multifidis, foliis lineibus. *It. gotl.* 318. *Fl. svec.* 343; 384. * arenarius.

anthus caule simplici unifloro. *Monnier. obs.* 152.

anthus foliis brevibus, squamis muticis, caule unifloro. *Sauv. meth.* 143.

yophyllus sylvestris humilis, flore unico. *Bauh. n.* 209.

yophyllus sylvestris I. *Clus. hist.* 1. p. 282. *Dill. th.* 402.

erius flos tertius. *Dod. pempt.* 176.

vitat in Europæ frigidioris arena mobili. 24

vitatem hujus summam cum præcedente docet Petarum faux ; Petala magis oblonga, divisa & lacera tra medium disci (illi vero tantum multifida) basi acula livida acuta, pilis purpurascensibus adpersa.

- alpinus. 14. **DIANTHUS** caule unifloro, corollis crenatis
 mis calycinis exterioribus tubum æquantibus
 linearibus obtusis.
 Caryophyllus pumilus latifolius. *Bauh. pin.* 209
 104. *Burf. XI.* 95.
 Caryophyllus sylvestris, flore magno inodoro
Bauh. pin. 209.
 Caryophyllus sylvestris 2. *Clus. hist.* 1. p. 28
 bon.
Habitat in Stiria, Austria. 24
 Radix lignosa, exserens caules plures. Caulis
 dine digiti, articulis tribus constans. Folia c
 nearia, obtusiuscula, plana, obtusa, vel ver
 ram, ubi cespites constituunt, lanceolato-linear
 lycis squamæ exteriores longitudine tubi calycis:
 res dimidio breviores. Corolla magna. Petal
 longitudine, rotundata, dentibus brevissimis
 crenata, fauce parum villosa.
- virginicus. 15. **DIANTHUS** caule subunifloro, corollis c
 squamis calycinis brevissimis, foliis subulat
 Caryophyllus sylvestris repens multiflorus. *B*
 209; *Burf. XI.* 99.
 β. 1 unica rupestris, folio cæpio molli, flore cart
 eth. 401. t. 298. f. 385.
Habitat Monspelii. 24
 Radix perennis. Folia radicalia, copiosa, erecti
 spitem imbricata, acuminata, facie Statice
 Caules aliquot, spithamæi, 4 articulis sum
 corstantes, foliis minoribus & summis minim
 gina perfoliata ortis. Calycis squamæ lati
 tæ, acutæ, brevissimæ: paribus remotis.
 limbus dimidio brevior tubo calycis, rotundat
 natus. Flos unicus in caule, interdum &
 ala folii supremi.
- * * * * Frutescentes.
- arboreus. 16. **DIANTHUS** caule fruticoso, foliis subulat
 Caryophyllus creticus arboreus, juniperi foli
 nef. cor. 23.
 Caryophyllus arborefcens creticus. *Bauh.*
 prodr. 104.
 Betonica coronaria arborea cretica. *Bauh. hist.*
Habitat in Creta. 5

IANTHUS caule fruticoso, foliis lanceolatis. fruticosus.
 yophyllus græcus arboreus, leucoji folio perama-
 2. *Tournef. cor. 23. itin. 1. p. 183. t. 9.*
itat in Græcia. 5

TRIGYNIA.

CUCUBALUS.

CUCUBALUS calycibus campanulatis, petalis di- bacciferus.
 antibus, pericarpis coloratis, ramis divaricatis.
 cubalus caule ramoso, floribus trigynis, fructu co-
 orato globofo. *Hort. cliff. 170. Hort. upf. 109. Roy.*
ugdb. 448. Sauv. monsp. 152.

ine scandens baccifera. *Bauh. pin. 250.*

ine repens. *Dod. pempt. 403.*

itat in Tataria, Germaniæ, Galliæ, Italiæ nemo-
ibus, sepibus. 24

CUCUBALUS calycibus subglobosis glabris reticu- Behen.
 to-venosis, capsulis trilocularibus, corollis subnu-
 is. *Fl. Jvec. 360, 385.*

cubalus floribus trigynis, calycibus glabris, ca-
 psulis trilocularibus. *Hort. cliff. 176. Roy. lugdb.*
48.

cubalus calycibus ovatis hermaphroditis. *Fl. lapp.*
80.

chnis sylvestris, quæ Behen album vulgo. *Bauh.*
in. 205.

aver spumeum. *Lob. ic. 340.*

chnis maritima repens. *It. gotl. 197.*

itat in Europæ septentrionalis pratis ficcis. 24

rietas Feminea in Horto upsaliensi frequens. *Hæc*
Hermaphrodito minor. Calyces exacte ovati, magis
bscure, nec oblongo-ovati. Corolla minor. Stami-
ta corolla dimidio breviora terminata tuberculo absque
antheris. Styli 3. s. 5. corolla longiores, declinati.
**lanta utraque fertilis.*

CUCUBALUS foliis obovatis carnosiss. *Roy. lugdb. Fabarius.*
48.

chnis maritima saxatilis, folio anacamperotis.
Tournef. cor. 24. Boerl. lugdb. 1. p. 214.

Behen album f. Polemonium saxatile, fabaræ
ficulum. *Bocc. mus.* 133. t. 92.
Habitat in Sicilia.

viscosus. 4. CUCUBALUS floribus lateralibus undique
decumbentibus, caule indiviso, foliis basi reflexis. *L.*
2. n. 386. *

Cucubalus foliis amplexicaulibus, floribus
latis, pedunculis erectis. *Roy. lugdb.* 448?

Lychnis montana viscosa noctiflora hirsuta latifolia,
floribus absque appendicibus. *Till. pis.*

Lychnis orientalis maxima, buglossi folio unguiculata.
Tournef. cor. 24. *itin.* 2. p. 361. t. 361.

Lychnis major noctiflora drubensis. *Raj. hist.*
Habitat in Svecia, Italia, Anglia, Ararat. †

stellatus. 5. CUCUBALUS foliis quaternis. *Hort. upf.* 111.
Drypis foliis quaternis. *Cold. noveb.* 106.

Silene foliis quaternis. *Gren. virg.* 50.

Lychnis caryophyllæus virginianus, gentianæ
glabris quatuor ex singulis geniculis caulem amplexantibus,
flore amplo fimbriato. *Raj. hist.* 1895.

Habitat in Virginia, Canada.

Petala, absque corona, quadrifida, lobis bipartitis.

egyptiacus. 6. CUCUBALUS floribus erectis, petalis emarginatis
retroflexis: utrinque denticulo notatis. *Hall.*
Habitat in Ægypto.

sibiricus. 7. CUCUBALUS petalis emarginatis, floribus
tuberculatis: verticillis umbellatis aphyllis.

Viscago foliis imis petiolatis ovatis, floribus
latis, petalis emarginatis. *Hall. gætt.* 1. p. 1
bona.

*Habitat in desertis Tacorow; inter Woronin
Bielgrad.*

Stamina flore longiora.

tataricus. 8. CUCUBALUS petalis bipartitis, floribus
decumbentibus, pedunculis oppositis solitariis
erectis, caule simplicissimo. *Hort. upf.* 111. †
ingr. 68.

ychnis septentrionalium, foliis hyssopi, floribus uno
versu positis albis. *Hall. gart.* 33. *
abitat in Tartaria, Russia. 24

UCUBALUS calycibus clavatis, petalis semibi- *italicus.*
fidis, panicula dichotoma erecta, genitalibus decli-
natis, caule incano.

abitat in Italia. ♂

folia lanceolata, obtusifuscula, subnuda. Caulis, præ-
sertim inferne, tomento vix conspicuo incanus. Pa-
nicula dichotoma, floribus pedunculatis, erectis. Ca-
lyces erecti, clavati, exarati sulcis decem. Petala
semibifida, latiuscula, alba, subtus plumbea. Sta-
nina alba.

UCUBALUS petalis bipartitis, floribus panicula- *catholicus.*
is, staminibus longis, foliis lanceolato-ovatis. *Hort.*
pf. III. *

caule foliis ovatis utrinque acutis, caule paniculato,
floribus nutantibus tenuissimis. Roy. lugdb. 447.

ychnis viscosa altissima, flore muscoso, ocymastri-
acie. Cupan. cath. 110.

ychnis nocturna non viscosa, herbaceo flore. Dill.
lh. 425. t. 316. f. 408.

abitat in Italia, Sicilia. 24

calyces fusci, nitidi.

UCUBALUS petalis semibifidis, panicula brachia- *mollissimus.*
ta dichotoma, caule foliisque holosericeis: radicali-
bus spatulatis.

ychnis maritima pulverulenta, folio carnosio. Tournef.
fl. 338.

abitat in Italiæ maritimis. 24. ♀

caules plures, rigiduli, erecti, pedales, subtomentosi,
mollissimi: Ramis inferne alternis, brevioribus.

caules his immixti steriles dimidio breviores, erecti,
vix confertim foliosi. Folia inferiora spatulata,

aliaque lanceolata; omnia subcarnosa, mollissima, to-
mentosa, obtusifuscula, apice subreflexa, patentia.

panicula brachiata: ramis dichotomis. Calyces ob-
se dentati, clavati, erecti, mollissimi. Flores al-

bi: Laminis calyce brevioribus, semibifidis. Stami-
nibus a longitudine calycis. Styli corolla longiores.

- Odites.** 12. **CUCUBALUS** floribus dioicis; petalis lineæ indivisis. *Hort. cliff.* 272. *Roy. lugdb.* 445.
Lychnis viscosa, flore muscoso. *Bauh. pin.* 206.
Lychnis sylvestris sesamoides minor, flore musc.
Mentz. pug. t. 3. f. 2.
Sesamoides magnum salmanticum. *Clus. hist.* 295.
Habitat in Silesia, Austria, Vallesia, Anglia, G. Sibiria. 24
- reflexus.** 13. **CUCUBALUS** floribus spicatis alternis set subsessilibus, corollis obsoletis nudis. *Hort.* 112. *
Lychnis sylvestris alba, spica reflexa. *Mag. monsp.* t. 170. *Raj. hist.* 996. n. 12.
Habitat Monspeli. 24
Confer. Silene mutabilis, cujus an sola varietas?

S I L E N E,

* *Floribus lateralibus solitariis.*

- anglica.** 1. **SILENE** hirsuta, petalis integerrimis, floribus fructibus reflexis pedunculatis alternis. *Hort.* 113.
Viscago cerastii foliis, vasculis pendulis anglica. *clth.* 417. t. 309. f. 398.
Lychnis sylvestris hirsuta annua, flore minore
Vaill. parif. 121. t. 16. f. 12.
Habitat in Anglia, Gallia. ☉
Petala in hac non crenata, in sequente ☉ emu ☉ crenata. Folia inferiora obovato-lanceolata basin ciliata. Calyces non pilosi, sed muricatis: aculeis reflexis vix conspicuis.
- lusitanica.** 2. **SILENE** hirsuta, petalis dentatis, floribus fructibus divaricato-reflexis alternis. *Hort.* 113.
Hort. cliff. 172.
Silene floribus alternis, petalorum limbis integerrimis. *Hort. cliff.* 172.
Viscago hirsuta lusitanica, stellato flore. *D.* 420. t. 311. f. 401.
Habitat in Lusitania. ☉
Calyces fructus horizontaliter reflexi, valde
Corolla indivisa, crenata, incarnata.

ENE petalis integerrimis subrotundis, fructibus quinqueval-
ctis alternis. *Hort. cliff.* 171. *Hort. upf.* 113. *Roy.* nera.
ib. 446.

spica incurva uno versu florida, foliis imis spa-
latis. *Sauv. monsp.* 46.

nis sylvestris lanuginosa minor. *Bauh. pin.*

nis hirsuta, flore eleganter variegato. *Raj. hist.*

nis hirsuta minor, flore variegato. *Dod. mem.* 4.
91.

ut in Hispania, Lusatia, Italia, Gallia. ☉

es fructus erecti, pilosi, visceridi. Petala obtusa,
emarginata, integerrima, purpurea margine
ido.

NE floribus spicatis alternis secundis sessilibus, nocturna.
alis bifidis.

foliis lanceolatis, caule ramoso & floribus
indis erectis, calycibus hirsutis. *Roy. lugdb.*

o hirta noctiflora, floribus obsoletis spicatis.

elth. 420. t. 310. f. 406.

nis sylvestris hirsuta elatior spicata, lini colore.

ic. 10. t. 27. f. 1.

nis sylvestris nocturna pilosa, floribus unius or-
s dilute purpureis. *Cup. cath.* 119. *Raj. suppl.*

is segetum meridionalium annua hirta, floribus
s uno versu dispositis. *Morif. hist.* 2. p. 346. f.

36. f. 7.

in Hispania, Monspeli, Pennsylvania. ☉

inferiora obovata, concava, rigida. Flores ses-
ex bracteis oppositis alterni, alternatim floran-
Petala alba, bifida, majuscula, subtus virescen-
nec post anthesin rubra. Similis Cucubalo re-
sed Cuius ramosiore altiore, Petalis extra
em patentibus.

NE floribus subspicatis alternis secundis, petala gallica.
ndivisis, fructibus erectis

hirsuta, foliis sessilibus oblongo-cuneiformibus
fis, calycibus striatis, fructibus erectis alternis.

l. paris. 127.

Lychnis sylvestris hirsuta annua, flore minore can
Vaill. parif. 121. t. 16. f. 12.

Viscago hirta gallica, flore parvo carneo, petalis
gris. Dill. elth. 419. t. 310. f. 399.

Habitat in Gallia. ☉

- cerastoides. 6. **SILENE** petalis bipartitis, fructificationibus et
subsessilibus, calycibus subpilosis subsessilibus.
Silene hirsuta, petalis emarginatis, fructibus erectis
ternis hirsutis sessilibus. Sp. pl. 1. p. 417.
*Silene rigidula. Amæn. acad. 4. p. 313.**
Viscago cerastii foliis, vasculis erectis sessilibus.
elth. 416. t. 309. f. 307.
Habitat in Europa australi. ☉

* * *Floribus lateralibus confertis.*

- mutabilis. 7. **SILENE** petalis bifidis, calycibus angulatis peculatis, foliis lanceolato-linearibus. *Amæn. acad. p. 314.**
Lychnis flore albo minimo. Raj. hist. 905.
Lychnis arvensis minor anglica. Raj. hist. 1004.
Habitat in Europa australi. ☉
Affinis Cucubalo reflexo, cum qua conjungit Raj. 664, sed sata utraque diversam sese mihi debat.

- nutans. 8. **SILENE** petalis bifidis, floribus lateralibus secernuis, panicula nutante.
*Silene foliis lanceolatis, caule paniculato, floribus tantibus, calyce striato, corolla involuta. Hort. 171. Fl. svec. 366; 588.**
Lychnis montana viscosa alba latifolia. Bauh. pin. Habitat in Europæ borealis pratis aridis. 24

- amœna. 9. **SILENE** petalis bifidis: coronula subcoadunata ribus secundis, pedunculis oppositis trifloris, alternis.
Silene petalis bifidis coronatis: corolla coadunata lycibus erectis raris pilosis Hort. upf. 114.
Lychnis maritima repens. Bauh. pin. 205.
Lychnis maritima anglicana. Bauh. hist. 3. p. 357.
Lychnis perennis angustifolia marina anglica probens. Moris. hist. 2. p. 535. f. 5. t. 20. f. 2.

ut in Tataria; in Angliæ meridionalis litori-

2
s diffusi, leviusculi, adscendentes. Rami alter-
divaricati, breviores. Folia supra glabra. Ra-
mus secundus: pedunculis oppositis, trifloris. Ca-
ves angulis 10 purpurascens villosis. Petala
1, semibifida: Nectarium lamellis bifidis, patulis,
1 alba.

.ENE petalis bifidis, caule fruticoso, foliis lato- fruticosi:
ceolatis, panicula trichotoma.

caule folioso fruticoso, foliis lineari-lanceolatis
atis glabris, capsulis ovatis *Vir. cliff.* 38. *Hort.*
F. 171. n. 4. *Hort. ups.* 111. n. 2. *Roy. lugdb.*
5.

inis myrtifolia behen albo similis. *Bauh. pin.* 205.

oides fruticosum. *Cam. hort.* 109. t. 33.

naria frutescens, acutis foliis, ex sicilia. *Booc. sic.*

t. 30.

at in Sicilia, Germania. ♂

.ENE foliis suborbiculatis carnosis hirsutis, ra- crassifolia:
no secundo.

at ad Cap. b. Spei.

is bipedalis, firmus, hirsutus: Ramis alternis.

lia orbiculata s. obovata, obtusissima, *Portulaca,*

ssa, carnosu, utrinque pileosa: vix extimi pollicis

3nitudine. Racemus terminalis, secundus, *Flo-*

8 s. 12, tristi colore; calycibus hirsutis; bracteis

utis. Petala emarginata, rito coronata. *Pistilla*

1.

.ENE petalis semibifidis, foliis ovatis scabriuscu- viridiflora:
acutis, panicula elongata subaphylla.

e foliis lanceolatis, caule paniculato nudo, flori-

s erectis. *Hort. cliff.* 171. *Roy. lugdb.* 446.

inis ocymastri facie, flore viridi. *Herm. parad.*

7. t. 199.

at in Lusitania. ♂

a pedalis ♂ ultra. Caules erecti, teretes, pube-

utes, geniculis incrassatis. Folia lanceolato-ova-

pubescentia, viridia, acuta. Rami alterni. Pa-

nula brachiata pedunculis dichotomis, paucifloris.

lyces nutantes, cylindrici, angulis decem viscosis,

pedunculi. Flores albido-virescentes: petalis

semi-

femibifidis: lobis recurvatis, linearibus. 8 longitudine tubi; Pistilla longitudine petalorum

gigantea.

13. **SILENE** foliis radicalibus cochleariformibus
 ussimis, caule subverticillato.

Silene foliis obverse ovatis crassis, limbis coro-
 fidis a sole revolutis. *Wach. utr. 391.*

Lychnis græca, sedi arbor-scentis folio & facie
 albo. *T. Walth. hort. 32. t. 11.*

Habitat in Africa. ♂, ♀.

Folia prioris anni, maxima. Caulis posterioris
 bipedalis, simpl. x: articulis inferioribus bre-
 villosis; superioribus longissimis, nudis, viscoso-
 nos. Folia inferiora obovata, carnosa, fra-
 concava, pubescentia, sessilia. Pedunculi con-
 oppositi, horizontaliter patentes, brevissimi, 6
 mi. Calyces pubescentes Corollæ virides &
 obsoleta, ut fere nulla quasi Cucubali generis
 tamen alicquali. Flores noctu tantum explicati.

bupleuroi-
des.

14. **SILENE** petalis bifidis, floribus pedunculatis
 sitis bractea brevioribus, foliis lanceolatis
 glabris.

Silene caule folioso herbaceo, foliis lanceolatis
 glabris, calycibus erectis. *Hort. cliff. 171.*
lugdb. 446.

Lychnis orientalis, bupleuri folio. *Tournef. cor.*
2. p. 139. t. 154.

Habitat in Persia

* * * *Floribus ex dichotomia caulis.*

Cenoldea.

15. **SILENE** calycibus fructus globosis acuminatis
 triginta, foliis glabris, petalis integris. *Hort. upf.*
Savv. monsp. 146.

Cucubalus calycibus conicis striatis. *Hort. cliff.*
Roy. lugdb. 448.

Lychnis sylvestris latifolia, calycibus turgidis
Baub. pin. 205.

Lychnis sylvestris. 2. *Cus. hist. 1. p. 288.*

Habitat inter segetes Hispaniæ. ☉

conica.

16. **SILENE** calycibus fructus conicis striis trig-
 foliis mollibus, petalis bifidis. *Hort. upf. 110.*

Lychnis sylvestris angustifolia, calycibus turgidis
 atis. *Bauh. pin. 205.*

Ly

lychnis glabra annua, foliis oblongis mucronatis, flore amplo rubello, capsula oblonga pyramidali. *Morrif. hist. 2. p. 542. f. 5. t. 36. f. 6.*

Habitat in Hispania, Galloprovincia, Oriente. ☉

SILENE calycibus glabris ovatis venoso-reticulatis, Behen. capsulis trilocularibus.

lychnis vesicaria cretica, parvo flore purpurascente.

Dill. elth. 427. t. 317. f. 409.

lychnis cretica, parvo flore, calyce striato purpurascente. *Tournef. cor. 24.*

Habitat in Creta. ☉

Differt a Cucubalo Behen corona corollæ, petalorum laminis vix $\frac{1}{2}$ longitudine calycis, radice annua, corollis purpurascens, antheris albis. Calyx obtusus. Flores nutantes, pedunculo e dichotomia, flore ipso brevior.

SILENE petalis emarginatis, calycibus glabris reticulato-venosis acuminatis pedunculo longioribus, caule dichotomo stricto. *Amæn. acad. 4. p. 314. **

Silene caule subdichotomo, floribus erectis subsessilibus, foliis lanceolatis piloso-viscidis. *Amæn. acad. 1. p. 158.*

Habitat in Hispania ☉ Tolosæ. ☉

SILENE calycibus fructiferis pendulis inflatis: angulis decem scabris. *Hort. ups. 109. **

Cucubalus floribus trigynis erectis, fructibus pendulis, calycibus striis decem crispis. *Hort. cliff. 170.*

Cucubalus floribus trigynis erectis, calycibus fructus pendulis angulosis. *Hort. cliff. 171.*

Scirpus hirsuta sicula, lychnidis aquaticæ facie, supina. *Dill. elth. 421. t. 312. f. 404.*

Habitat in Creta ☉ Sicilia. ☉

SILENE calycibus decemangularibus: dentibus tubum æquantibus, caule dichotomo. noctiflora.

Cucubalus calycibus fructus ovatis erectis: angulis decem: alternis venosis. *Hort. ups. 109. * Fl. svec. 2. n. 389. Sauv. monsp. 146.*

lychnis noctiflora. *Bauh. pin. 205. Raj. hist. 994.*

Cymoides noctiflorum. *Cam. hort. 109. t. 34.*

Habitat in Suecia, Germania. ☉

Calyces admodum viscerati dentibus longioribus, reliquis.

virginica.

21. **SILENE** calycibus floris cylindricis villosis, pediculis dichotoma.

Lychnis flore simplici specioso coccineo, foliis dichotomis acuminatis aduersis, caule viscoso. Gron. 161.

Habitat in Virginia. 24

Planta polymorpha. Flores facie Lychnis dissimulatae, at saturate rubri; Calyces angustiores quam congeneribus, hirsuti. Stamina cum stylis extra corollam prominente. Caulis nunc simplex digiti longitudine terminatus floribus in fasciculum collectis, nunc dichotomis apice trichotomis, pedunculo intermedio unifloro. Folia oblonga s. lato-lanceolata, ut Gomphrena globoza.

antirrhina.

22. **SILENE**, foliis lanceolatis subciliatis, pediculis trifidis, petalis emarginatis, calycibus ovatis. *lugdb. 447.*

Silene petalis bilobis coronatis, floribus erectis, subciliatis. Hort. ups. 114.

Silene corymbo dichotomo, floribus pedunculatis ramis alternis erectis, foliis lanceolatis integerrimis. Gron. virg. 50.

Viscago americana noctiflora, antirrhini folio. Benth. elth. 442. t. 313. f. 403.

Habitat in Virginia, Carolina. ☉

rubella.

23. **SILENE** erecta laevis, calycibus subglobosis, bris venosis, corollis inapertis. *Hort. ups. 114.*

Viscago lusitanica, flore rubello vix conspicua. Benth. elth. 324. t. 314. f. 406.

Habitat in Lusitania, Oriente. ☉

inaperta.

24. **SILENE** caule dichotomo paniculato, calycibus globosis, petalis brevissimis emarginatis, foliis glabris lanceolatis.

Viscago laevis, inaperto flore. Dill. elth. 424. t. 314. f. 407.

Habitat in Europa australi. ☉

Stamina saepe 5. ☉ corolla absque limbo.

hortensis.

25. **SILENE** caule dichotomo paniculato, calycibus

striatis, petalis bifidis, foliis linearibus.

habitat in Lusitania. *Læfl.* ☉

habitus *S. inapertæ*, at *Folia angustiora* ☉ *Calyces longitudinally striati*. *Planta spithamea, brachiata, dichotoma. Folia linearia, acuta, glabra. Pedunculi filiformes, angustissimi, longi, erecti, e dichotomia caulis uniflori. Calyces clavati, longi, purpurascens, striis alternis albis. Stamina longitudine fere corollæ. An Silenes inapertæ sola varietas? Amœn. acad. 3. p. 409.*

SILENE erecta lævis, calycibus erectis decangulis *cretica.*

fulcatis, petalis bifidis. *Hort. ups. 112. f.*

ifc: go foliis inferioribus bellidis, superioribus tunicæ, calyce strictiore & turgidior. *Dill. eth. 422. t.*

314. f. 404, 405.

ychnis viscosa, foliis inferioribus bellidi similibus, flore minimo carneo s. rubro. *Magn. hort. 126.*

abitat in Creta. ☉

aulis dichotomo-paniculatus, patens, filiformis: articulis viscidis. Calyces glabri. Flores amœne purpurei petalis semibifidis, erecto-patulis.

SILENE petalis bifidis, caule dichotomo, floribus *Muscipula.*

axillaribus sessilibus, foliis glabris.

lene floribus tristyliis, foliis lanceolatis sessilibus, capsulis trilocularibus, floribus ternis. *Sauv. monsp. 145.*

ychnis sylvestris viscosa rubra alterna. *Bauh. pin. 205.*

ychnis sylvestris. 3. *Clus. hist. 1. p. 289.*

abitat in Hispania, G. Narbonensi.

SILENE foliis fasciculatis setaceis: ramorum flo- *polyphylla,*

rentium oppositis. *Roy. lugdb. 447.*

ychnis sylvestris, plurimis foliolis simul junctis. *Bauh. pin. 205.*

ychnis sylvestris VIII. *Clus. hist. 1. p. 290.*

abitat in Pannonia, Austria, Bohemia. 24

SILENE floribus fasciculatis fastigiatis, foliis supe- *Armeria.*

rioribus cordatis glabris. *Hort. ups. 110.*

ene foliis lanceolato-ovatis glabris, floribus terminalibus fasciculatis fastigiatis. *Hort. cliff. 172. Roy.*

lugdb. 446. Sauv. monsp. 153.

Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis. Bauh. Pin. 205.

Armerius flos quartus. Dod. pempt. 176.

Habitat in Anglia, Gallia. ☉

Quadrifida. 30. **SILENE** petalis quadrilobis, caule dichotomibus pedunculatis, foliis glabris recurvis. *Le. 383.*

Cucubalus quadrifidus. Sp. pl. 1. p. 415.

Lychnis alpina, foliis angustis reflexis, petalis 4 partitis. Segu. veron. 3. p. 186. t. 5. f. 1.

Lychnis saxatilis, linariæ folio, glabra, flore petalis tricuspидatis, femine limbo fimbriato. Pis. 106.

Lychnis viscosa angustifolia major. Bauh. pin. 1.

Lychnis sylvestris X. Clus. hist. 1. p. 291.

Caryophyllus minimus humilis alter exoticus. Lobb. Habitat in Italia, Austriae montibus. ☉

rupesfris. 31. **SILENE** floribus erectis, petalis emarginatis, cibus teretibus, foliis lanceolatis. *Fl. svec. 367 It. W: goth. 144. **

Silene floribus erectis laxe distantibus, caule dimo. Fl. lapp. 183.

Alfina alpina glabra. Bauh. pin. 251. prodr. 118 dan. t. 4. Raj. hist. 1003, 1031.

Auricula muris alpina glabra. Bauh. hist. 3. p. 36

β. *Caryophyllus holosteus alpinus gramineus. Bauh. 210. prodr. 104. Burf. XI. 117.*

Habitat in montibus aridis Sveciæ, Helvetiæ. ♂

Varietas β. foliis linearibus in umbra nata.

Saxifraga. 32. **SILENE** caulibus unifloris, pedunculis longi caulis, foliis glabris, floribus hermaphroditis neisque.

Caryophyllus saxifragus. Bauh. pin. 211.

Saxifraga antiquorum quibusdam. Bauh. hist. 3. p. 1

Lychnis minor saxifraga. Segu. ver. 431. t. 6. f. 1

Habitat in montibus cretaceis Galliæ, Italiæ. ♀

Radix lignosa, ramosa. *Caules plures, digitales bri. Folia opposita, linearia, acuta, glabra, per 6 oppositiones. Pedunculus terminalis, sibi*

longitudine caulis; raro pedunculus alter

Flos unicus. *Calyx clavatus, glaber, Petala limbo calyce brevioribus, subtus rubro.*

LENE caulibus subunifloris decumbentibus, foliis lanceolatis tomentosis longitudine calycis, axillis pumila saxatilis alpina, flore carneo, folio molli tomentoso. *Amæn. acad.* 1. p. 158.
 var. *maritima* pinguis e corsica. *Bocc. mus.* 1. 34?
folia latiora breviora.
nat in Alpibus Vallefiacis, Valdensibus. Allioni.

LENE acaulis. *Fl. lapp.* 184. *Fl. svec.* 368; 387. *acaulis.*
ill. helv. 375.

var. *alpina* pumila, folio gramineo. *Bauh. pin.* 5. *Dill. elth.* 206. t. 167. f. 206. *Oed. dan.* t. 21.
 var. *alpinus*, lychnidis flore. *Bauh. hist.* 3. p. 767.
nat in Alpibus Lapponicis, Austriacis, Helveticis, renæis. 24

var. *Bryo similis. Petala emarginata.*

STELLARIA.

STELLARIA foliis cordatis petiolatis, panicula pedunculata ramosis. *Fl. svec.* 2. n. 391. *nemorum.*

var. *altissima* nemorum. *Bauh. pin.* 250.

var. *montana* hederacea maxima. *Col. ecphr.* 1. p. 290.

var. *montana* latifolia, flore laciniato. *Bauh. pin.* *Rupp. gen.* 109.

nat in Europæ nemoribus.

STELLARIA foliis ovatis sessilibus, caule dichotomo, floribus solitariis, pedunculis fructiferis reflexis. *dichotoma.*
nat in Alpibus Helveticis, Sibiricis. ☉
divaricati, dichotomi. Pedunculi fructiferi reflexi.

STELLARIA foliis lanceolatis ferrulatis, petalis quinquepartitis. *radians.*

var. *saxatilis*, angusto & oblongo falcis folio, flore tenuissime laciniato. *Amm. ruth.* 83. t. 10.
nat in Sibiria.

STELLARIA foliis lanceolatis ferrulatis, petalis bispinatis. *Holosteæ.*

var. *foliis lanceolatis. Hort. cliff.* 172. *Fl. svec.* 371;

var. *phyllus holosteus arvensis*, flore majore. *Bauh.* 210.

Gramen. *Fuchf. hist.* 136.

Habitat in Europæ nemoribus.

graminea.

5. **STELLARIA** foliis linearibus integerrimis, bus paniculatis.

Alfinae foliis linearibus. *Fl. lapp.* 189; 393. *Fl.* 372. *Hort. cliff.* 172. *Roy. lugdb.* 449.

Caryophyllus arvensis glaber, flore minore. *Bank* 210.

Gramen floridum minus. *Tabern. ic.* 232.

- β. Alfinae, folio gramineo angustiore, palustris. *Dill.* 69.

- γ. Caryophyllus holosteus alpinus angustifolius. *Bank* 210. *prodr.* 104. n. 6. *Burf.* XI. 2.

Habitat in siccis juniperetis sepibus rectis Europa

Cerastoides.

6. **STELLARIA** foliis oblongis, pedunculis subbil

Fl. svec. 2. n. 394 *

Habitat in Alpibus Lapponicis.

biflora.

7. **STELLARIA** foliis subulatis, scapis subbifloris talis emarginatis, germinibus oblongis, calyc striatis. *Fl. svec.* 2. n. 395. *

Sagina ramis erectis bifloris. *Fl. lapp.* 158. *Ord.* t. 12.

Mœhringia scapis bifloris. *Fl. svec.* 1. n. 316. *Acad.* 2 p. 264.

Alfinae polygonoides, foliis brevibus, flore albo. *ver.* 3. p. 177. t. 4. f. 1.

Arenaria foliis subulatis, calycibus striatis, germinibus oblongis, floribus corymbosis. *Amæn. acad.* 158. *

Habitat in Alpibus Lapponicis. 24

Planta parva, facie Saginae. Folia radicalia sub in acervum congesta. Caules digitales, filifera maxima parte nudi; superne bifidi in 2. pedunculo pariter foliorum: altero pedunculo, in 2 foliolis duobus.

Arenaria.

8. **STELLARIA** caule erecto bifido, ramis alternis petalis emarginatis. *Sl. pl.* 1. p. 11. 26.

Habitat in Hispania. ☉

Radix fibrosa. Caulis erectus, teres, spithameus, patulis pubescens & subglutinosus. Rami oblongitudine fere caulis. Folia sessilia, spatulata

picæ ovato, basin versus linearia angustiora, subtus
 ☉ *marginè pilosa, supra vero vix manifeste. Pri-*
mus flos e dichotomia caulis: reliqui ex alis ramorum
alterni. Omnes majusculi. Pedunculi recti, foliis
longiores. Calyx viscosus uti tota planta, apicibus
purpurascens, uti etiam Folia floralia. Corolla cam-
panulata, calyce longior, alba, obtusissima petalis
vix manifeste emarginatis. Stamina alba, longitu-
dine calycis. Antheræ cærulescentes. Germen glo-
bosum. Styli tres, longitudine staminum.

A R E N A R I A.

ARENARIA foliis ovatis acutis carnofis. *Fl. svec.* peploides.
 375; 396. *Fl. lapp.* 149. *It. æl.* 151.

line litoralis, foliis portulacæ. Bauh. pin. 251. *Læs.*
pruss. 12. t. 2.

elephium maritimum, portulacæ folio. Buxb. act. 3.
 p. 271.

abitat ad litora maris Europæi borealia. 2

ARENARIA foliis ovatis carinatis recurvis quadri- tetraquetra.
 fariam imbricatis. *Bauh. pin.* 211. *prodr.* 125. *Burf.*
XI. 135.

abitat in Pyrenæis. 2

erba omnino Gypsophile aggregatæ, sed Pedunculus
unisflorus, terminalis.

ARENARIA foliis ovatis obtusis, pedunculo laterali lateriflora.
 bifloro.

abitat in Sibiria.

ulis digitalis, filiformis, simplicissimus. Folia ovata,
obtusæ, subpetiolata, glabra. Pedunculus axillaris u-
nicus, longus, bifidus. Corolla calyce longior.

ARENARIA foliis ovatis acutis petiolatis nervosis. trinervia.

Hort. cliff. 173. *Fl. svec.* 374; 397.* *Roy. lugdb.* 471.

line plantaginis folio. Bauh. hist. 3. p. 364.

abitat in Europæ sylvis. ☉

ARENARIA foliis ovatis nervosis sessilibus acutis, multisaulis,

corollis calyce majoribus. Amæn. acad. 1. p. 162. n.

55.

line foliis lanceolatis, petalis integris calyce majo-
ribus. Hall. helv. 390. t. 6. f. 3.

abitat in Alpibus Helvetiæ, Pyrenæis.

- terpyllifolia* 6. **ARENARIA** foliis subovatis acutis sessilibus
lis calyce brevioribus. *Fl. suec.* 373; 398. *L.*
173. *Roy. lugdb.* 451.
Alfina minor multicaulis. Bauh. pin. 251.
Alfina minor. Fuchf. hist. 23.
Habitat in Europæ sylvis glareosis. ☉
- montana.* 7. **ARENARIA** foliis lanceolato-linearibus scab-
libus sterilibus longissimis procumbentibus.
acad. 4. p. 272. *
Alfina foliis linearibus acuminatis, petalis flor-
gris calyce duplo longioribus. Monn. opf. 1
Habitat in Galliæ australis montibus.
- tubra.* 8. **ARENARIA** foliis filiformibus, stipulis me-
ceis vaginantibus. *Fl. suec.* 376; 399.
- campestris.* α. *Alfina*, spergulæ facie, minor f. *Spargula mini-*
cæruleo flore. Bauh. pin. 251. *prodr.* 119.
Polygonum foliis gramineis, spergulæ capituli
pruss. 203. t. 63.
- marina.* β. *Arenaria foliis linearibus longitudine internodi-*
Hort. cliff. 173. *Gron. virg.* 161. *Roy. lugdb.*
Spargula marina nostras. Raj. hist. 1034.
Alfina spergulæ facie media. Bauh. pin. 251.
Habitat α in Europæ arenosis collibus; β. in h-
marinis. ☉
Stamina in campestri certe 10. sunt: in maritim-
pe Aboam stamina tantum 5 observavit D. Kab
- medit.* 9. **ARENARIA** foliis linearibus carnosis, stipulis
branaceis.
Arenaria teretifolia verna, flore albo, semine
foliaceo cincto. Rupp. jen. 2 p. 113.
Spargula annua, semine foliaceo nigro circulo
branaceo albo cincto. Dill. giff. 46. *E. N. C.*
5. f. 6. p. 275. t. 4. Morif. blasf. 228.
Alfina Spergulæ facie minima, femuribus margi-
T. Vaill. paris. 8.
Habitat in Germania, Gallia. *
Simillima A. rubræ maritimæ; sed minus rō
caulibus magis ascendentibus, tota pubescenti-
Folia carnosæ, linearia, acutiuscula, supra dep-
scula, subtus convexa. Flores albi, petalis α
vix majoribus. Semina margine membranaceo α
Planta vernalis β filia spuria A. rubræ, α,

varietas, quod imprimis ex stipulis scariofo-membranaceis constat.

ARENARIA foliis femicylindricis carnosis obtusis, petalis lanceolatis, pedunculis terminalibus subnatis. *Amæn. acad.* 4. p. 315. *

line alpina, foliis teretibus obtusis, flore albo. *Segu. veron.* 1. p. 429.

Xifraga bavarica. Raj. hist. 1033.

abitat in Bavaria, Baldo. 2.

ARENARIA foliis subulatis, caulibus paniculatis, calycum foliolis ovatis, saxatilis.

ARENARIA foliis subulatis, calycinis laciniis membranae ipsius latiore auctis obtusis. *Guett. stamp.* 2. p. 281.

regula foliis aciformibus densis, ramis ramosis subnudis. *Sauv. monsp.* 45.

line glabra, tenuissimis foliis, floribus albis. *Herm. par.* 12. t. 12.

line saxatilis & multiflora, capillaceo folio. *Vaill. paris.* 7. t. 2. f. 3. *Hall. opusc.* 113.

line saxatilis, laricis folio, minor & minori flore. *T. Magn. monsp.* 11. t. 11.

line caryophylloide tenuifolia, flore albo punctato. *Pluk. alm.* 22. t. 7. f. 3.

anthyllis lychnitis annua. *Barr. ic.* 580.

abitat in Germania, Helvetia, Gallia, Sibiria. 2.

ARENARIA foliis subulatis, caule paniculato, pedunculis simplicibus, capsulis erectis, petalis calyce brevioribus. tenuifolia.

ARENARIA foliis subulatis, calycinis laciniis membranae ipsius angustiore auctis acutissimis. *Guett. stamp.* 2. p. 282.

line tenuifolia. *Bauh. pin.* 3. p. 364. *Vaill. paris.* 7. t. 3. f. 1. *Segu. ver.* 418. t. 6. f. 2.

abitat in Helvetia, Gallia, Anglia, Italia. 2.

habet in flore stamina decem.

ARENARIA foliis setaceis, caule superne nudiusculo, calycibus subhirsutis. laricifolia.

line foliis fasciculatis, petiolis simplicibus, calyce hirsuto. *Hall. helv.* 388.

line alpina, junceo folio. *Bauh. pin.* 251. prodr. 118.

Lychnoides, juniperi folio, perennis. *Vaill. parisi.*
Habitat in montosis Helvetiæ, Geneva, Parision
Monspeli. 2.

- striata.* 14. *ARENARIA* foliis linearibus erectis, oppressis,
 lycibus oblongis striatis. *Amæn. acad. 4. p. 315.*
Auricula muris pulchro flore, folio tenuissimo. B
pin. 3. p. 361.
Caryophyllus saxatilis, polygoni minoris folio & fi
Burf. XI. 129.
Habitat in Alpibus Austriæ & Vallis augustæ. 2.
- ciliata.* 15. *ARENARIA* foliis ovatis ciliatis acutis.
Alfine, serpylli folio, multicaulis & multiflora. S
ver. 1. p. 421. t. 5. f. 2.
Habitat in Alpibus Ræticiis, monte Abrahami.
- hispida.* 16. *ARENARIA* foliis subulatis subtus hispidis.
Habitat Monspeli in monte calcaris.
Habitus Spergulæ. Caules simplices, pilis raris adf
si. Folia opposita, subulata, plana, subtus pilis
ris hispida. Panicula primum dichotoma, max
ternis pedunculis ramosa.
- grandiflora.* 17. *ARENARIA* foliis subulatis strictis: radicali
 confertis, caulibus unifloris.
Alfine uniflora & grandiflora, foliis acuminatis, p
lis integris. Allion. pedem. 49. t. 10. f. 1.
Habitat in Alpibus Valdensium, Cenisii. 2.

CHERLERIA.

- Sedoïdes.* 1. *CHERLERIA.* *Hall. helv. 391. t. 6. opusc. 300. t.*
f. 3. Segu. ver. 3. p. 180. t. 4. f. 3.
Lychnis alpina, muscosis foliis densius stipatis, fl
bus parvis, calyce duriore. Pluk. alm. 233. t.
f. 8.
Sedum montanum perpusillum luteum. Moris. hist.
p. 471. f. 12. t. 6. f. 14.
Sedum montanum perpusillum, luteolis floribus. B
theatr. 738.
Habitat in Alpibus Helvetiæ, Valesiæ, Gotthardo.

GARIDELLA.

- Nigella-*
strum. 1. *GARIDELLA.* *Hort. cliff. 170. Hort. ups. 108. B*
lugdb. 481.

aridella foliis tenuissime divisis. *Garid. prov.* 203.
t. 39.

igellastrum raris & fœniculaceis foliis. *Magn. hort.*
143: t. 143.

igella cretica. folio fœniculi. C. B. *Morif. hist.* 3.
p. 516. f. 12 t. 18 f. 6.

abitat in Galloprovincia. ☉

MALPIGHIA.

MALPIGHIA foliis ovatis integerrimis glabris, pe- glabra.
dunculis umbellatis. *Hort. clij.* 159. *Hort. upf.* 108.

Roy. lugub. 49. *Mill. dict.* t. 181. f. 2.

Malpighia ruticola erecta, foliis nitidis ovatis acumi-
natis, floribus umbellatis, ramulis gracilibus. *Brown.*
jam. 230.

eratus jamaicensis, fructu tetrapyreno. *Comm. hort.*
1. p. 145. t. 75.

erbor baccifera, folio subrotundo, fructu cerasino
sulcato rubro polypyreno: officulis canalicularis.

Stoan. jam. 172 *hist.* 2. p. 106. t. 207. f. 2. *Raj.*
den. v. 74.

abitat in Jamaica, Brasilia, Surinamo, Curassao. ☿

MALPIGHIA foliis ovatis integerrimis glabris, pe- puniceifolia
dunculis unifloris.

malpighia foliis ovatis integerrimis glabris. *Hort. upf.*
108:

malpighia fruticoso erecta, ramulis gracilibus paten-
tibus, floribus solitariis. *Brown. jam.* 230.

malpighia mali parvi folio. *Pluk. g n.* 46 t. 166. f. 2.

eratus americana, myri conjugatis foliis, fructu a-
cerbo tetrapyreno. *Puk. abn.* 94 t. 157. f. 7.

abitat in America meridionali. ☿

MALPIGHIA foliis lanceolatis integerrimis glabris, nitida.
spicis lateralibus.

malpighia foliis oblongo-ovatis utrinque nitidis, ra-
cemis axillaribus. *Jacq. am. r.* 21.

abitat in America. ☿

MALPIGHIA foliis oblongo-ovatis: setis decum- urens:
bentibus. rigidis, pedunculis unifloris aggregatis. *Mill.*
dict. t. 181. f. 1.

malpighia latifolia, folio subtus spinoso. *Plum. gener.*
46. t. 167. f. 1.

vi *Spec. plant. pars I.*

Qq

Ma-

Mespilus americana, folio lato subtus spinoso, rutro. *Tournef. inst.* 642.

Arbor baccifera, folio oblongo subtilissimis spinis obdito, fructu ceratino sulcato polypyrenis ficulis canaliculatis. *Sloan. jam.* 172. *hist.* 2. t. 207 f. 3. *Raj. dendr.* 74.

Habitat in America calidiore. ♀

Folia ovato-oblonga, integerrima, subpetiolata, sa, inprintis subtus, setis rigidis adpressis pungentibus: altera anteriore. Stipulae utrinque 2, res axillares utrinque 4, pedunculis unifloris, culo instructis.

angustifolia. 5. **MALPIGHIA** foliis lineari-lanceolatis: setisque decumbentibus rigidis, pedunculis umbellatis. *Mill. dict. Jacq. amer.* 21.

Malpighia angustifolia, folio subtus spinoso. *gen.* 46.

Habitat in America meridionali. ♀

crassifolia. 6. **MALPIGHIA** foliis ovatis integerrimis submentosis, racemis terminalibus.

Malpighia arborea, floribus spicatis, foliis ovatis cuminatis. *Brown. jam.* 230.

Malpighia arborea, foliis subrotundis alternis sublanuginosis, spicis crassis compositis terminalibus. *Brown. jam.* 231.

Malpighia latifolia, cortice sanguineo. *Barr.* 72.

Tiliae affinis *laurifolia*, arbuti floribus et his odoratis, fructu pentagono. *Sloan. jam.* 136. p. 20. t. 163. f. 1.

Habitat in America calidiore. ♀

Arbor. Foliis ovatis palmaribus crassis subpetiolatis integerrimis, supra pubescentibus, subtus tomentosis alternis. Racemi terminales longi tomentosi.

verbascofolia. 7. **MALPIGHIA** foliis lanceolato-ovatis tomentosis integerrimis, racemis terminalibus.

Malpighia humilis, verbasco folio & facie, caulis fissimo. *Larr. equin.* 71.

Baccifera arbor calyculata, foliis laurinis, fructu composito esculento subrotundo monoppyrenis luteo. *Sloan. hist.* 2. t. 158. f. 2.

Habitat in America calidiore. ♀

Folia lanceolato-ovata, in petiolos desinentia, pedalia, villosa, subtus densissimo tomento vestita. Racemi terminales, longi, villosi.

MALPIGHIA foliis lanceolatis dentato spinosis sub-aquifolia,
tus hispida.

Malpighia angustis & acuminatis aquifolii foliis. *Plum.*
gen. 46. ic. 168. f. 1.

Habitat in America calidior. †

MALPIGHIA foliis subovatis dentato-spinosis. coccigera

Malpighia humilis, ilicis cocciglandiferæ foliis. *Plum.*
gen. 46. ic. 168. f. 2.

Habitat in America calidior. †

B A N I S T E R I A.

BANISTERIA foliis sinuato-angulosis. angulosa

Acer scandens, folio anguloso. *Plum. spec. 18.*

Clematis anguloso folio, aceris fructu. *Plum. amer.*
77. t. 92. Raj. suppl. 328.

Habitat in America calidior. †

BANISTERIA foliis ovatis, spicis lateralibus, semi-purpurea.
nibus erectis.

Banisteria foliis pinnatis: foliolis ovatis, spicis lateralibus, seminibus erectis. *Mill. dict.*

Acer scandens, pseudocacix folio, flore purpurascente. *Plum. spec. 18. ic. 15.*

Habitat in America meridionali. †

BANISTERIA foliis ovato-oblongis rigidis, racemis terminalibus. *Mill. dict.* laurifolia

Acer scandens, foliis laurinis. *Sloan. jam. 137. hist. 2.*

p. 26. Raj. dendr. 94.

Habitat in Jamaica. †

BANISTERIA foliis ovato-oblongis acuminatis, racemis lateralibus, seminibus patentibus. *L. zeyl.* benghalensis.

176. *

Acer scandens, foliis citri, flore cæruleo spicato. *Plum.*
spec. 18. ic. 14.

Acer benghalensis, laurinis foliis, fructu tergemino.

Pluk. alm. 7. t. 3. f. 1.

Habitat in Indiis. †

- dichotoma. 5. BANISTERIA foliis ovatis, racemis dichotomis.
Banisteria foliis ovatis, ramis dichotomis, semi-
extrorsum tenuioribus, introrsum lacinulam
emittibus. *Hort. cliff.* 169. *
Acer scandens, convolvuli folio, flore ex am-
nereo. *Plum. spec.* 18 ic. 13.
Habitat in America calidiore. †
- fulgens. 6. BANISTERIA foliis subovatis subtus tomentosis
racemis brachiatis, pedunculis umbellatis.
Banisteria foliis ovatis, ramis ramosis, seminibus
introrsum tenuioribus, introrsum lacinulam emittibus. *Hort. cliff.* 169. *
Banisteria foliis orbiculatis, petiolis biglandulosis
minibus unilatis rugosis, racemis subumbellatis.
Brown. jam. 231.
Acer scandens minus, apocyni facie, folio sub-
obovato. *Sloan. jam.* 138. *hist.* 2. p. 27. t. 162. f. 2.
dendr. 94.
Triopteris americana scandens, fructu fulgente
aureo. *Pluk. mant.* 185.
Habitat in America. †
- brachiata. 7. BANISTERIA foliis subovatis, ramis brachiatis
seminibus introrsum angustioribus.
Banisteria foliis subovatis, ramis ramosis, semi-
introrsum tenuioribus nullam lacinulam emittibus. *Hort. cliff.* 169. *
Banisteria foliis ovatis acuminatis, floribus latiusculis,
ramis diffusis scandentibus. *Mill. dict.*
Habitat in America. †

TRIOPTERIS.

- jamaicensis. 1. TRIOPTERIS. *Hort. cliff.* 169. *
Acer scandens tricoccus, foliis citri, flore luteo.
Plum. c. 9. t. 16?
Hiræa reclinata. *Jacq. amer.* 21?
Habitat in America calidiore. †

ERYTHROXYLON.

- areolatum. 1. ERYTHROXYLON. *Simon. acad.* 5. p. 307. *
Erythroxyton tonis ellipticis lineis luteis longis

libus subtus notatis. fasciculis florum sparsis *Brown. jam. 278. t. 38. f. 2.*
habitat in Jamaica. h

PENTAGYNIA.

AVERRHOA.

AVERRHOA caudice nudo fructificante, pomis ob- *Bilimbi.*
 longis obtusangulis. *Fl. zeyl. 177. **
 Blinbingum teres. *Rumph. amb. 1. p. 118. t. 36.*
 Bilimbi. *Rheed. mal. 3. p. 55. t. 45. 46.*
habitat in India. h

AVERRHOA axillis foliorum fructificantibus, po- *Carambola.*
 mis oblongis acutangulis. *Fl. zeyl. 178. **
 Mala goënsia, fructu octangulâri pomi vulgari magni-
 tudine. *Baub. pin. 433.*
 runum stellatum. *Rumph. amb. 1. p. 115. t. 35.*
 amara Tonga s. Carambolas. *Rheed. mal. 3. p. 51.*
t. 43. 44.
habitat in India. h

AVERRHOA ramis nudis fructificantibus, pomis *acida.*
 subrotundis. *Fl. zeyl. 179.*
 eli-poli. *Rheed. mal. 3. p. 57. t. 47. 48. Raj. hist.*
1450.
 heramela. *Rumph. amb. 7. p. 34. t. 33. f. 2.*
habitat in India. h

S P O N D I A S.

PONDIAS petiolis communibus compressis. *Læf. it. 209.* *purpurea.*
 Pondias diffusa, foliis plurimis minoribus pinnatis,
 penna compressa sulcata, floribus præcocibus. *Brown. jam. 228.*
 Tyrobalanus minor, folio fraxini alato, fructu pur-
 pureo officulo magno fibroso. *Sloan. jam. 182. hist.*
2. p. 126. t. 219. f. 3, 4, 5. Raj. dendr. 43.
habitat in India occidentali. h

PONDIAS foliolis nitidis. *lutea.*
 Pondias. *Hort. cliff. 484. Hobo. Læf. it. 209. **
 Pondias foliolis plurimis pinnatis ovatis, racemister-
 minalibus, cortice interno rubente. *Brown. jam. 229.*

Merbin arbor, folio fraxini, flore luteo racem
Flum gen. 44.

Myrobalanus folio fraxini alato, fructu luteo, d
 lo magno fibroso *Noan. jam.* 181. *ist.* 2. p. 12
 219. f. 1. 2 *Raj. d. ndr.* 43.

Prunus americana. *Mer. surin.* 13. t. 13. bona.

Prunus brasiliensis, fructu racemoso ligno intus
 officulo. *Raj. hist.* 1154.

Acaja & Ibametara. *Marcgr. bras.* 129.

3. Spondias foliis paucioribus pinnatis ovatis
Brown. jam. 229.

Habitat in America meridionali. †

C O T Y L E D O N.

orbiculata. 1. COTYLEDON foliis subrotundis planis integ
 mis. *Hort. cliff.* 276. *Roy. lugdb.* 454.

Cotyledon africanum frutescens incanum, orbicul
 foliis. *Herm. lugdb.* 349. t. 551. *Mori. hist.* 3. p.
 f. 12. t. 7. f. 39.

Habitat ad Cap. b. Spei. †

spuria. 2. COTYLEDON foliis alternis spatulatis carnos
 tegerrimis.

Cotyledon africana frutescens, folio longo & ang
 flore flavescente. *Comm. rar.* 23. t. 23. *Burm.* 4
 18. 19. f. 1. † t. 22. f. 1.

Cotyledon africana, foliis depressis cruciatis. *H
 hort.* 16.

Habitat ad Cap. b. Spei. †

Simillima C. orbiculatae; differt saltem foliis orb
 † digito similibus, sed, quod praecipuum, ab
 Frustrificatio adeo C. orbiculatae, ut de matre ad
 esse nequeat.

na misphæri- 3. COTYLEDON foliis semiglobosis. *Hort. cliff.*
 ca. *Roy. lugdb.* 454.

Cotyledon capensis, folio semiglobato. *Dill. herb.*
 t. 95. f. 111.

Habitat in Aethiopia. †

ferrata. 4. COTYLEDON foliis ovalibus crenatis, caule
 cato.

Cotyledon foliis radicalibus lanceolatis crenatis:
 linis subulatis. *Hort. cliff.* 457. *Roy. lugdb.* 454
 C

Cotyledon cretica, folio oblongo fimbriato. *Dill. elh.*

113. t. 95. f. 112.

Habitat in Creta, Sibiria.

COTYLEDON foliis oblongis spinoso-mucronatis, spinosa. caule spicato.

Habitat in Sibiria. D. Gmelin.

Habitus speciei 3. *Folia integra spina setacea terminata.*

Flores quinquepartiti.

COTYLEDON foliis cucullato-peltatis serrato dentatis alternis, caule ramoso, floribus erectis. *Gron. orient. 141.*

Cotyledon foliis peltatis. *Vir. cliff. 39. Roy. lugdb.*

454.

Cotyledon flore luteo, radice repente. *Dod. mem. 265. repens.*

t. 73.

Cotyledon radice tuberosa longa repente. *Morif. præl.*

257. Raj. hist. 1878.

Cotyledon luteum umbilicatum spicatum, radice repente majus. *Morif. hist. 3. p. 471.*

Umbilicus repens. *Cam. epit. 858.*

Cotyledon vera, radice tuberosa. *Bauh. hist. 5. p. 683. tuberosa.*

Cotyledon major. *Bauh. pin. 285. Raj. hist. 1878.*

Cotyledon umbilicus veris. *Clus. hist. 2. p. 63.*

Sedum luteum murale spicatum, folio umbilicato rotundo. *Morif. hist. 3. p. 470. f. 12. t. 10. f. 4.*

Habitat in Lusitania, Hispania, Anglia, Judæa. 24

COTYLEDON foliis trifidis, floribus quadrifidis. *laciniata.*

Hort. cliff. 175. Roy. lugdb. 454.

Cotyledon afra, folio crasso lato laciniato, flosculo aureo. *Boerh. lugdb. 1. p. 288. t. 288.*

Telephium africanum, angustiori folio, flore aurantiaco. *Pluk. alm. 362. t. 228. f. 3.*

Telephium indicum. *Bout. jav. 132.*

Planta anatis. *Rumph. amb. 5. p. 275. t. 95.*

Habitat in Ægypto, India. 6

COTYLEDON foliis oblongis subteretibus, floribus fasciculatis. *hispanica.*

Læst. it. t. 1.

Cotyledon maritima, sedi folio, flore carneo, fibrosa radice. *Tournef. inst. 90.*

Cotyledon hispanica, sedi teretifolii folio, flore umbellato rubro, fibrosa radice. *Minuart. sched. 3.*

Cotyledon palustris. sedi folio, floribus rubris luteis. *Shaw. afr. 177.*

β. Cotyledon palustris, sedi folio, floribus luteis violis. *Shaw. afr. 178. f. 178.*

Habitat in Africa, Oriente, Hispania. ♂

Radix fibrosa. Caulis simplex, teres, erectiusculus, gitalis. Folia oblonga, teretiuscula, obtusiuscula, sitia, subpilosa, supra planiuscula rufopunctata. Flores fasciculati corymbo terminali. Corollæ indistinctiformes: extus rufescentes, subpilosæ. Lacinie quinquepartito, plano, acuto, supra incarnato tribus purpurascensibus & apice purpureo. Filamenta crassiuscula, prominula. Antheræ minime. Stylus brevis. Facies herbæ est Sedi albi.

S E D U M.

* *Planifolia.*

- verticillatum. 1. SEDUM foliis quaternis. *Amæn. acad. 2. p. 231. 4. f. 14.**
Sedum, aparinis facie. tauromenitanum. Raj. extr. 1. Morif. hist. 3. p. 473.
Habitat in Europa maxime australi, & Sibiria. ♀
- Telephium. 2. SEDUM foliis planiusculis terratis, corymbosis, caule erecto.
Sedum foliis planiusculis patentibus ferratis, corymbo terminali. Hort. cliff. 176. Fl. svec. 386; 400. med. 217. Roy. lugdb. 456.
Telephium vulgare. Bauh. pin. 287.
Telephium album. Luchf. hist. 800.
- album. 3. Telephium purpureum majus. *Bauh. pin. 287.*
 purpureum. γ. Telephium purpureum minus. *Bauh. pin. 287. 133.*
- maximum. δ. Telephium latifolium peregrinum. *Bauh. pin. 287.*
 ε. Sedum foliis ovalibus terratis, umbellis in alis.
rum. Hall. helv. 35.
Telephium hispanicum 1. Clus. hist. 2. p. 66.
Anacampteros maxima. Bauh. hist. 3. p. 682.
Habitat in Europæ fecissimis. ♀
- Anacampteros. 3. SEDUM foliis cubiformibus integerrimis, caudicibus, floribus corymbosis.
Sedum foliis spatulatis indivisis, umbella terminali. Saw. monsp. 77.

aphium repens, folio deciduo. *Bauh. pin.* 287.
 aphium VI. Cephæa plancii. *Clus. hist.* 2. p. 67.
 camperos minor, rotundiore folio, sempervirens.
ruth. hist. 3. p. 682.
stat in - - - - 24
in hyeme decidua.

DUM foliis lanceolatis ferratis planis, caule ere- Aizoon.
 o, cyma sessili terminali.
 im foliis planis ferratis, corymbo folioso. *Hort.*
f. 116. *
 camperos flore flavo. *Amm. ruth.* 96. t. 11.
stat in Sibiria. †

DUM foliis cuneiformibus concavis subdentatis hybridum.
 gregatis, ramis repentibus, cyma terminali. *Hort.*
f. 116.
 camperos minor repens, flore purpureo. *Buxb.*
ut. 1. p. 33. t. 61. f. 2.
 im minus repens, chamædryos foliis, e singulis
 liorum alis radices agens. *Amm. ruth.* 93.
stat in Tataria ad radices montium uralensium, Tra-
 zunt. †

DUM foliis radicalibus fasciculatis spatulato- lan- libanoti-
 olatis, caule subnudo simplicissimo. cum.
stat in Palæstina. *Hasselquist.* 24
 es sempervivi montani. Folia Radicalia fascicula-
 ta, spatulato-lanceolata, acuta, glabra, integerrima.
 caulibus ad latus radice, adscendens, semipedalis,
 simplicissimus, inferne adpersus foliis linearibus, a-
 cutis. Racemus terminalis, longitudine caulis: Pe-
 tellis sparsis, sæpius bifloris. Capsulæ non diver-
 dentes, calyce cinctæ.

DUM foliis planiusculis angulatis, floribus late- stellatum.
 dibus sessilibus solitariis. *Hort. cliff.* 176. *Roy. lugdb.*
 56.
 im echinatum vel stellatum, flore albo. *Bauh. hist.*
 p. 680.
 pervivum tertium. *Col. phytob.* 32. t. 11.
 yledon stellata. *Bauh. pin.* 295.
stat in Italia, Gallia, Helvetia.

DUM foliis planis, caule ramofo, floribus pani. Cephæa.
 Qq 5. cu-

culatis. *Hort. cliff.* 176. * *Roy. lugdb.* 456, *monsp.* 76.

Sedum annuum album, oblongo portulacæ folio. Morif. hist. 3. p. 473. f. 12. t. 7. f. 31
Cepæa. *Bauh. pin.* 288. *Clus. hist.* 2. p. 68.

Habitat Monspelii, Genevæ, Halæ ad lacum.
sum. ☉

* * *Teretifolia.*

dasyphyllum. 9. **SEDUM** foliis oppositis ovatis obtusis carnosule infirmo, floribus sparsis.

Sedum foliis cordato-ovatis compressis sæpius sitis, floribus sparsis. Sauv. monsp. 8.

Sedum foliis semiglobosis subovatis sessilibus quæ fariam imbricatis. Wachend. ultr. 391.

Sedum parvum, folio circinato, flore albo. Bauh. 3. p. 691.

Sedum minus, folio circinato. Bauh. pin. 283. *hist.* 3. p. 473. f. 12. t. 7. f. 35.

Aizoon dasyphyllum. Dalech. hist. 1133.

Habitat in Helvetia, Lusitania, Hispania, Italia.

reflexum. 10. **SEDUM** foliis subulatis sparsis basi solutis: lobis recurvatis. *Fl. svec.* 2. p. 1296.

Sedum minus luteum, folio acuto. Bauh. pin. 1

β. *Sedum minus luteum ramulis reflexis. Bauh. pin.* 1

Habitat in Europa ad radices montium. 2.

Folia viridia, tenuius subulata, inferiora recurvata.

rupestre. 11. **SEDUM** foliis subulatis quinquefariam basi solutis, floribus cymosis. *Hort. cliff.* 178. *Fl. svec.* 388. *Roy. lugdb.* 466. *Gort.* 268.

Sedum rupestre repens, foliis compressis. Dalech. hist. 343. t. 256. f. 333.

Habitat ad radices montium Europæ. 2.

Folia glauca, crassius subulata, quinquefariam imbricata.

hispanicum. 12. **SEDUM** foliis teretibus acutis: radicalibus lobatis, cyma pubescente. *Amoen. acad.* 4. p. 1

Sedum hispanicum, folio glauco acuto, flore albo.

Dill. elth. 342. t. 256. f. 332.

Habitat in Hispania. 2.

EDUM foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus **albura.**
 us patentibus, cyma ramosa. *Hort. cliff.* 177. *Fl.*
ec. 387; 402. *Roy. lugdb.* 457. *Hall. helv.* 398.
 um minus teretifolium album. *Bauh. pin.* 283.
 micularis s. Illecebra major. *Lob. hist.* 205.
itat in Europæ petris.

EDUM foliis fusiformibus subdepressis: infimis **rubens.**
 uaternis, cyma subquadrifida, floribus pentandris,
 aminibus reflexis.

um foliis oblonge ovatis, floribus in summum cau-
 am congestis, calyce rubente. *Hall. helv.* 396.

um minimum montanum non acre, flore purpura-
 zente parvo, semine stellato. *Raj, hist.* 692.

um saxatile, atrorubentibus floribus. *Bauh. pin.* 283.
prodr. 132. *Scheuch. it.* 1. p. 48. t. 6. f. 3, 4. *Segu.*
et. 3. p. 207.

lea erecta, floribus lateralibus, foliis obtusis. *Sp.*
L. 1. p. 129.

lea erecta. *Hort. ups.* 24. *Sauv. monsp.* 129.
 um annum minimum stellatum rubrum. *Magn.*
monsp. 233. t. 237.

um arvense, flore rubente. *Bauh. pin.* 283. *prodr.*
 32. *Segu. ver.* 1. p. 461.

um minus teretifolium alterum. *Bauh. pin.* 283.

um minus teretifolium luteum. *Bauh. pin.* 283.

bitat in Europa australi. ☉

ita (an unica a — s ?) mea. Caulis digitalis,
 implex pilis raris viscosis. Folia sparsa, patentia,
 blonga, obtusa, carnoosa: inferiora quaterna. Cyma
 tri - s. quadrifida ramis recurvis. Flores sessiles.
 corolla alba, valde mucronata carina villosa pur-
 purascente. Stamina 5, mox recurvata. Germina
 pilosa, Fructus purpurascens. *Crasulam dice-*
em ob stamina; sed Petala 5 omnino Sedi ☉ ha-
itus.

EDUM foliis subovatis adnato sessilibus gibbis ere- **acre.**
 tiusculis alternis, cyma trifida. *Hort. cliff.* 177. *Fl.*
ec. 389; 403. *Mat. med.* 218. *Roy. lugdb.* 456.
 spervivum minus vermiculatum acre. *Bauh. pin.*
 83.

cebra s. Sempervivum tertium. *Dod. pempt.* 129.
bitat in Europæ campis siccissimis sterilissimis. ☉

- sexangulare. 16. **SEDUM** foliis subovatis adnato-fessilibus gibb. rectiusculis sexfariam imbricatis. *Fl. svec.* 390; Sempervivum minus vermiculatum infipidum. *Lin. pin.* 284 ?
Sempervivum minimum. *Cam. epit.* 856.
Habitat in Europæ borealis campis apricis siccis. Differt a præcedenti, cui simillimum, Foliis sexf. oblique imbricatis; Ramis nunquam copiosis, ut et tem constituent; Floribus in singulo ramo cymæ ultra tres.
- annuum. 17. **SEDUM** caule erecto solitario annuo, foliis ov. fessilibus gibbis alternis, cyma recurva. *Fl. svec.* 405. *
Sedum minimum non acre, flore albo. *Raj. anst.* p. 270. t. 12. f. 2. figura tenuis.
Habitat in Europa boreali. ☉
- villosum. 18. **SEDUM** caule erecto, foliis planiusculis, pediculisque sup. pilosis.
Sedum palustre subhirsutum purpureum. *Bauh. pin.*
Sedum minus 111. s. palustre. *Clus. hist.* 2. p. 59.
Sedum palustre 111. *Oed. d.n. t.* 24.
Habitat in pratis paludosis Germaniæ, Angliæ, liæ, Pyrenæis.

PENTHORUM.

- sedoides. 1. **PENTHORUM.** *Gren. virg.* 51. * *Aët. upf.* 1 p. 12. t. 2.
Habitat in Virginia. 24. ☉

OXALIS.

* *Scapo radicali.*

- Acetofella. 1. **OXALIS** scapo unifloro, foliis ternatis, radice moso-articulata. *Hort. cliff.* 175. *Fl. svec.* 385; *Roy. lugdb.* 458. *Mat. med.* 216.
Oxalis foliis ternatis: scapo unifloro. *Fl. lapp.* 19
Trifolium acetosum vulgare *Bauh. pin.* 330.
Trifolium acetosum. *Dod. pempt.* 578.
3. **Oxys** flore subcæruleo. *Tournef. inst.* 88.
4. **Oxys** flore purpurascente. *Tournef. inst.* 88.
Habitat in Europæ borealis sylvis. 24

ALIS scapo unifloro, foliis ternatis indivisis ciliatis. *purpurea.*

alis scapo unifloro, foliis ternatis, radice bulbosa.

fort. clus. 175. Roy. lugdb. 458. Sp. pl. 1. p. 433.

hort. pict. t. 10. f. 2.

lidi affinis planta bulbosa africana, flore purpureo

agno Breyn. cent. 102. t. 46.

bulbosa africana rotundi folia, caulibus & flori-

is purpureis amplis. *Comm. hort. 1. p. 41. t. 21.*

s bulbosa trifolia hirsuta, flore albo. *Burm. afr.*

t. 27. f. 3.

s africana bulbosa trifolia, flore luteo magno.

b. mus. 1. p. 37. t. 22. f. 10.

itat in Æthiopia. 2

ALIS scapo unifloro, foliis ternatis semibifidis: longiflora.

foliis lanceolatis.

itat in Virginia.

alis nudus, simplex, squamis aliquot adpersus, e ra-

dice per terram exit terminatus Umbella ex foliis no-

num 3 flore unico. Folia petiolata, ternata: folio-

sis sessilibus, plus quam semibifidis: lobis lanceolatis.

edunculus uniflorus, in medio stipularum pari nota-

is. Flos unicus, longus.

ALIS scapo unifloro foliis ternatis bipartitis. *flava.*

alis bulbosa, angustis digitatis foliis, flore solitario

teo. *Burm. afr. 68. t. 27. f. 4.*

s africana bulbosa, floribus amplis luteis, foliis

inimis hirsutis. *Raj. suppl. 549.*

alis africana bulbosa, foliis simpliciter decaphyl-

lis, flore flavo. *Burm. afr. 69. t. 27. f. 5.*

alis bulbosa, simplici caule ad summum folioso,

flore luteo. *Burm. afr. 81. t. 30. f. 1.*

itat in Æthiopia. 2

ALIS scapo umbellifero, foliis ternatis obcordatis *violacea*

caulibus apice callosis.

alis caule aphylo, flore purpureo, radice tuberosa

tunda. *Gron. virg. 161.*

s purpurea virginiana, radice lili more nucleata.

uk. alm. 274. t. 102. f. 4.

itat in Virginia Canada. 2

is sequenti, sed hinc foliola parum biloba, illi se-

missida, huic calycis foliola ovata, illi lanceolata,

trique apice callosa.

Pes capræ. 6. **OXALIS** scapo umbellifero, foliis ternatis
titis apice subtus callosis. *Mill. ic.* 195. J
Oxalis bulbosa pentaphylla & hexaphylla
magnis luteis & copiosis. *Burm. afr.* 80.
t. 28. f. 3.

Habitat in Æthiopia. 24

*Foliola obcordata, biloba f. semibifida, obtusa
tenera. Flos flavissimus. Radix granulata.*

sensitiva. 7. **OXALIS** scapo umbellifero, foliis pinnatis
180. *

Oxyoides malabarica sensitiva, caule viridi
flore luteo majore. *Garc. act. angl.* 1730. f.

Herba Mimosa malabariensium. *Zan. hist.* 19

Herba sentiens. *Rumph. amb.* 5. p. 301. t. 104

Herba viva. *Clus. exot.* 290.

Herba viva foliis polypodii. *Bauh. pin.* 259.

Todda vaddi. *Rheed. mal.* 9. p. 33. t. 19.

Habitat in India.

* * *Foliis caulinis alternis.*

vericolor. 8. **OXALIS** caule ramoso, pedunculis uniflor
passim verticillatis linearibus emarginatis
tus callosis.

Oxalis caule simplici, pedunculo unifloro at
foliis filiformibus subramosis. *Sp. pl.* 434.

Oxalis bulbosa trifolia, foliis linearibus obtu
externe rubro, intus albo. *Burm. afr.* 65.

Oxys africana, foliis tenuissimis in summit
Raj. suppl. 598.

β. Oxys bulbosa africana angustifolia, flore r
leto amplo. *Raj. supp.* 548.

Oxys africana, foliis tenuissimis, flore am
lore. *Fluk. amalth.* 169. t. 434. f. 5.

Oxalis bulbosa angustifolia, caule folioso,
Burm. afr. 66. t. 27. f. 2.

Habitat in Æthiopia. 24

incarnata. 9. **OXALIS** caule subramoso bulbifero, ped
floris, foliis passim verticillatis foliolis
Oxalis pedunculis unifloris, caule dichoto
433.

Oxalis caule bulbifero. *Hort. cliff.* 175.
458.

xys bulbosa æthiopica minor, folio cordato, flore ex albido purpurascente. Comm. hort. 1. p. 43. t. 22. habitat in Æthiopia. 24

alia respective ad lucem subtus incarnata. Bulbi ex alis post florescentiam nascuntur.

OXALIS caule ramoso, pedunculis unifloris, foliis hirta. sessilibus: foliolis lanceolatis.

alis caule ramoso, foliis lineari-lanceolatis sessilibus, floribus lateralibus solitariis. Roy. lugdb. 532.

alis radice longa fibrosa, caulibus ramosis, foliis ternis angustis, florum petiolis longissimis. Burm. afr. 71 t. 28. f. 2.

ys bulbosa africana, flore purpureo, foliis pilosis, pedunculis privis. Seb. mus. 1. p. 33. t. 22. f. 11.

ys africana, hirsuta latioribus foliis, flore magno purpureo. Pluk. amalth. 164.

alis bulbosa, foliis angustis ternis hirtis, flore purpureo. Burm. afr. 70. t. 28. f. 1.

ys africana bulbosa, flore purpureo, caule folioso. Raj. suppl. 599.

ys africana bulbosa, dorychnii monspeliensium parvis foliis, floribus purpureis amplis. Pluk. amalth. 164. t. 434. f. 7.

abitat in Æthiopia.

alis solidior. Folia alterna, sessilia, obtusiuscula, subtus hirta. Pedunculi uniflori, hirti, axillares, longi uti Calyces. Radix bulbosa.

OXALIS caule ramoso diffuso, pedunculis umbelliferis. Hort. cliff. 175. Hort. upj. 116. Roy. lugdb. 158. Sauv. monsp. 173. Gort. gelr. 91. corniculat.

ys flavo flore. Clus. hist. 2. p. 249.

trifolium acetosum corniculatum. Bauh. pin. 330.

luteum minus repens, etiam procumbens. Moris. hist. 2. p. 183. f. 2. t. 17. f. 2.

abitat in Italia, Sicilia. O

nsfer. a. Oxalis lutea annua, floribus dentatis. Few. per. 3. p. 49. t. 24.

ys lutea americana humilior annua. Dill. elth. 299. t. 221. f. 288.

ys zeylanica. Burm. zeyl. 179. differt tantum caule repente & quod minor.

- striata. 12. OXALIS caule ramoso erecto, pedunculis
litteris. *Gron. virg.* 161. *Brown. jam.* 231.
Oxys americana erectior. *Tournef. inst.* 80.
Trifolium acetosum corniculatum luteum maj
etum indicum s. virgineum. *Morif. hist.* 2 p. 1
2. t. 17. f. 3.
Habitat in Virginia.
Affinis nimium præcedenti, ut fere varietas.
- frutescens. 13. OXALIS caule fruticoso erecto pedunculis
belliferis, foliis ternatis ovatis: intermedio petio
Oxalis caule erecto fruticoso, foliis ternatis in
maximo. *Mill. dict.* 7.
Oxys lutea frutescens, trifolii bituminosi facie.
Spec. 2. ic. 213. f. 1.
Habitat in America meridionali. †
- Barrelieri. 14. OXALIS caule ramoso erecto, pedunculis
racemiferis. †
Trifolium acetosum americanum, rubro flore.
Var. 64. t. 1139. *Bocc. mus.* 2. p. 63. t. 51.
Habitat in America.

S U R I A N A.

- maritima. 1. SURIANA. *Hort. cliff.* 492.
Suriana foliis portulacæ angustis. *Plum. gen.* 2
249. f. 1.
Suriana maritima, foliis lanceolatis, floribus sin
bus. *Brown. jam.* 190.
Arbor americana, falicis folio, frondosa berm
lis. *Fluk. alm.* 44. t. 241. f. 5.
Habitat in Americæ calidioris maritimis. †
Stamina huic 10 adscripsit. D. Jacquin.

A G R O S T E M M A.

- Cichlago. 1. AGROSTEMMA hirsuta, calycibus coroll
quantibus petalis integris nudis.
Agrostemma. *Hort. cliff.* 175. *Fl. fvec.* 383.; 4
lugd. 449.
Lychnis tetegum major. *Bauh. pin.* 204.
Lolium. *Luchf. hist.* 127.
Habitat inter Europæ segetes. ☉
- Caltha. 2. AGROSTEMMA glabra, foliis lineari-lance
petalis emarginatis coronatis. *Hort. ug.* 115

chnis segetum, Nigellastrum minus glabrum dicta,
ore elegante rubello. *Morif. hist. 2. p. 543 f. 5.*
2. f. 32.

chnis foliis glabris, calyce duriore. *Bocc. sic. 27.*
ido Melanthium glabrum ficulum. *Raj. hist. 999.*
itat in Sicilia, Oriente. ☉

ROSTEMMA tomentosa, foliis ovato-lanceola- Coronaria-
s, petalis integris coronatis. *Hort. upf. 115.*

onaria. *Hort. cliff. 174. Roy lugdb. 449.*

chnis coronaria dioscoridis sativa. *Bauh. pin. 203.*

chnis. *Cam. epit. 569.*

itat in Italia. ♂

varialis planta corolla alba medio rubra est.

ROSTEMMA tomentosa, petalis emarginatis. Flos Jovis.

chnis coronaria sylvestris. *Bauh. pin. 204. Morif.*
ist. 2. p. 540. f. 5. t. 36. f. 2.

chnis umbellifera montana helvetica. *Zan. hist. 128.*

51. *Raj. hist. 993.*

itat in Helvetia.

L Y C H N I S.

CHNIS floribus fasciculatis fastigiatis. *Hort. cliff. chalcidoni-*
74. *Hort. upf. 115. Roy. lugdb. 449.* ca.

chnis hirsuta, flore coccineo, major. *Bauh. pin. 203.*

is constantinopolitanus. *Dod. pempt. 178.*

bitat in Tataria. ♀

CHNIS petalis quadrifidis, fructu subrotundo. Flos cuculi.

Hort. cliff. 174. Fl. svec. 384; 408. Roy. lugdb. 139.

ryophyllus pratensis, flore laciniato simplici s. Flos
cuculi. *Bauh. pin. 210.*

ryophyllus pratensis, flore pleno. *Bauh. pin. 210.*

Mill. ic. 169. f. 2.

ontites pinii. *Clus. hist. 1. p. 292; 293.*

bitat in pratis Europæ humilissculis. ♀

CHNIS petalis integris.

Viscaria:

ne floribus pentagynis, capsulis quinquelocularibus.

Hort. cliff. 172. Fl. svec. 364; 409. Roy. lugdb. 445.

chnis sylvestris viscosa rubra angustifolia. *Bauh.*

in. 205.

chnis sylvestris IV. *Clus. hist. 1. p. 289.*

bitat in Europæ septentrionalis pratis siccis. ♀

Spec. plant. pars. 1.

R r

4. LYCH-

alpina.

4. **LYCHNIS** petalis bifidis, floribus corymbosis.
*svéc. a. n. 410. **
 Silene floribus corymbosis, caule erecto, foliis
 ceolato-linearibus. *Roy. lugdb. 447.*
 Silene lapponica alpina, facie viscariæ. *Fl.*
*185. **
 Silene floribus in capitulum congestis. *Hall. helv.*
t. 7.
Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Sibirii
Pyrenæicis. 2. ♂

sibirica.

5. **LYCHNIS** petalis bifidis, caule dichotomo, &
 subhirtis.
Habitat in Sibiria. Gmelin. 24
Statura Silenes rupestris, sed Radix perennis, &
minus glabra, & Styli 5 distinguunt plantam.

dioica.

6. **LYCHNIS** floribus dioicis. *Hort. cliff. 171. Fl.*
361; 411. Roy. lugdb. 448.
 Cucubalus caule composito, calycibus oblongo
Fl. lapp. 182.
 Lychnis sylvestris f. aquatica purpurea simplex. *L.*
p n. 204.
 Lychnis sylvestris noctiflora alba simplex, calyce
 plissimo. *Till. pis. 105. t. 41. f. 1.*
 Melandrium plinii genuinum. *Clus. hist. 1. p.*
mas.

β. Cucubalus floribus hermaphroditis pentagynis, &
 lis unilocularibus. *Hort. cliff. 170.*

Lychnis sylvestris alba simplex *Bauh. pin. 204*

γ. Lychnis alba multiplex. *Bauh. pin. 204.*

Habitat in Europa frigide pratis succulentis. 2

Variat floribus hermaphroditis, licet varius.

apetala.

7. **LYCHNIS** calyce inflato, corolla calyce brev
 caule subunifloro, flore hermaphrodito.
 Cucubalus caule simplicissimo unifloro, petalis &
 brevioribus. *Fl svéc. 363; 412.*
 Cucubalus caule simplicissimo unifloro, corolla
 sa. *Fl. lapp. 181. t. 12. f. 1.*
Habitat in Alpibus Lapponicis, Sibiricis. 2
In Sibiria planta caule multifloro lecta est. He
maphrodita.

CERASTIUM.

* *Capsulis oblongis.*

ASTIUM foliis connatis. *Hort. cliff.* 173. *Hort.* perfoliatum.
 115. *Roy. lugdb.* 450.
 otis orientalis perfoliata, lychnidis folio. *Tournef.*
 r. 18. *Dill. elth.* 295. t. 217. f. 284.
 at in Græcia. ☉

ASTIUM foliis ovatis, petalis calyci æquali- vulgatum.
 s, caulibus diffusis. *Fl. svec.* 2. 415.
 stium floribus decandris, petalis subtridentatis ca-
 ce majoribus. *Læfl. it.* 143. *
 otis arvensis hirsuta, parvo flore albo. T. *Vaill.*
 if. 142. t. 30. f. 1.
 e hirsuta, magno flore. *Bauh. pin.* 251.
 cula muris quorundam, flore parvo, vasculo te-
 i longo. *Bauh. hist.* 3. p. 359.
 at in Scaniae & Europæ australioris pratis, a-
 s.
 : C. viscoso, sed denso cæspite crescens.

ASTIUM erectum villoso-viscosum. *Hort. cliff.* viscosum.
 4. *Fl. svec.* 379; 414. *Roy. lugdb.* 450.
 tium corolla calyci æquali. *Fl. lapp.* 193.
 otis hirsuta altera viscosa. *Vaill. paris.* 142. t. 130.
 t. 3.
 e hirsuta altera viscosa. *Bauh. pin.* 251.
 at in Europæ pratis macilentis. ☉

ASTIUM floribus pentandris, petalis emargi- semidecan-
 is. *Hort. cliff.* 173. *Fl. svec.* 382; 416. * *It. æl.* 17. drum.
 y. *lugdb.* 450. *Gron. virg.* 51. *Gort. gelr.* 90.
 tium corolla calyce brevior. *Fl. lapp.* 193.
 tium hirsutum minus, parvo flore. *Raj. angl.* 3.
 348. t. 15. f. 1.
 otis arvensis hirsuta minor. *Vaill. paris.* 142. t.
 f. 2.
 at in campis apricis sterilissimis Europæ borea-
 ☉
 ienta huic 5 sterilia, 5 antherifera.

ASTIUM floribus pentandris, petalis integris. pentan-
 fl. it. 142. * drum.
 at in Hispania.

Planta minima, similis *C. semidecandro*, a quo colore viridi nec incano. Staminibus 5 fertur nec 5 aliis anthera destitutis. Petalis calyce brevioribus lanceolatis acutis; nec acute emarginatis.

arvense.

6. **CERASTIUM** foliis linearilanceolatis obtusis, corollis calyce majoribus. *Fl. suec.* 381; *Cerastium* foliis calycibusque hirsutis. *Hort. cliff. Roy. lugdb.* 450.
Myosotis arvensis hirsuta, flore majore. *Vaill.* 141. t. 30. f. 4.
Caryophyllus arvensis hirsutus, flore majore. *pin.* 210.
Habitat in Scania ☉ *australiori Europa.* 24

dichotomum.

7. **CERASTIUM** foliis lanceolatis; caule dichotomissimo, capsulis erectis. *Roy. lugdb.* 450
Lychnis segetum minor. *Bauh. pin.* 204.
Alfina corniculata. *Clus. hist.* 2. p. 184.
Habitat inter segetes Hispaniæ. ☉

alpinum.

8. **CERASTIUM** foliis ovato-lanceolatis, caule fo, capsulis oblongis.
Cerastium foliis ovato lanceolatis, corollis calycibus. *Fl. suec.* 380; 418.
Cerastium foliis lanceolato-ovatis, caule subuni *Roy. lugdb.* 451.
Cerastium corolla calyce majore. *Fl. lapp.* 198.
Caryophyllus holosteus alpinus latifolius. *Oed. da*
Alfina myosotis facie lychnis alpina, flore ampveo, repens. *Raj. angl.* 3. p. 349. t. 15. f. 2.
Habitat in Alpibus Europæ.

* * Capsulis subrotundis.

repens.

9. **CERASTIUM** foliis lanceolatis, pedunculis 1 fis, capsulis subrotundis.
Cerastium caule perenni procumbente, foliis latis tomentosis. *Roy. lugdb.* 450.
Cerastium perenne procumbens. *Hort. cliff.* 174
Myosotis arvensis, polygoni folio. *Vaill. partij.* 30. f. 5.
Ocymoides lychnitis reptans radice. *Col. physol.* t. 31.
Lychnis incana repens. *Bauh. pin.* 206.
Habitat in Gallia, Italia. 24

CERASTIUM foliis linearibus acuminatis glabris, strictum.
pedunculis unifloris subtomentosis, capsulis glo-
bosis.

Alpine alpina subhirsuta, linearis folio. *Scheuch. alp. 2.*
p. 130.

aryophyllus holosteus alpinus, foliis strictissimis gla-
bris acutis, flore magno. *Burf. XI. 119.*

abitat in Alpibus Austriacis.

varietas Auriculæ muris pulchro flore, folio tenuissimo *1.*
B. 3. p. 360, sed Flos Arenariæ montanæ. Folia li-
nearia, acuminatissima, stricta, glabra. Caules gla-
bri, procumbentes. Pedunculus uniflorus s. biflorus,
in medio Bracteis duabus, brevibus, lanceolatis, la-
tioribus; subtomentosus uti Calyx.

CERASTIUM caule perenni procumbente, foliis suffrutice-
lineari-lanceolatis subhirsutis. sum.

lyototis tenuissimo folio rigido. *Tournef. inst. 205.*
abitat in Europa australi. *§*

CERASTIUM foliis lanceolatis scabris, petalis cre- maximum.
natis, capsulis globosis.

abitat in Sibiria. *D. Gmelin.*

CERASTIUM foliis cordatis sessilibus, floribus so- aquaticum.
litariis, fructibus pendulis. *Fl. svec. 2. n. 413. **

varietas major. *Bauh. pin. 250.*

varietas maxima folanifolia. *Mentz. pug. 2. t. 1. f. 3.*

abitat ad littora lacuum Europæ. *¶*

CERASTIUM glabrum, caule stricto, foliis lan- manticum.
ceolatis, pedunculis longissimis, capsulis globosis.

*Amæn. acad. 4 p. 315. **

varietas caryophylloides glabra, florum pediculis lon-
gissimis. *Segu. veron. 3. p. 178. t. 4. f. 2.*

abitat Veronæ. *○*

CERASTIUM foliis ovatis subtomentosis, ramis latifolium.
subunifloris, capsulis globosis.

aryophyllus holosteus alpinus latifolius. *Bauh. pin.*

210. prodr. 104.

abitat in Alpibus Helvetiæ. *¶*

CERASTIUM foliis oblongis tomentosissimis, pedun- tomento-
culis ramosis, capsulis globosis. sum.

Ceraftium foliis lanceolato-linearibus subhirsutis
rolla calycem superante *Sauv. monsp.* 143.

Caryophyllus holosteus tomentosus latifolius.
pin. 210. *prodr.* 104.

β. *Caryophyllus* holosteus tomentosus angustifolius.
pin. 210. *prodr.* 104.

Habitat in Granada, 24

S P E R G U L A.

irvensis.

1. SPERGULA foliis verticillatis, floribus decem

Hort. cliff. 173. *Fl. svec.* 377. 419. *Koy. lugd.*

Spergula fructu pendulo. *Fl. lapp.* 190.

Spergula. *Dod. pempt.* 527.

Alfina *Spergula* dicta major. *Bauh. pin.* 251.

Habitat in Europæ agris. ☉

pentandra.

2. SPERGULA foliis verticillatis, floribus pentam

Lafl. it. 143.

Spergula foliis filiformibus verticillatis raris, semine
nigris. *Sauv. monsp.* 167.

Alfina *spergulae* facie minima, seminibus emarginatis
Tournef. inst. 244. *Vaill. parif.* 8.

Alfina *spergulae* facie minima. *Magn. monsp.* 14.

Arenaria teretifolia verna, flore albo, semine
foliaceo cincto. *Rupp. jen.* 101.

Spergula annua, semine foliaceo nigro circulo
branceo albo cincto - *Morif. hist.* 2. p. 551

28. *Dill. giff.* 46. *E. N. C. cent.* 5. p. 275. t. 4
angl. 3. p. 351.

Habitat in Germania, Gallia, Anglia, Hispania

nodosa.

3. SPERGULA foliis oppositis subulatis lævibus
libus simplicibus.

Spergula foliis oppositis, pedunculis simplicibus
cliff. 173. *Fl. svec.* 378; 420. *Roy. lugd.* 41

Arenaria *Bauh. hist.* 3. p. 720. *Raj. hist.* 1033.

Alfina nodosa germanica. *Bauh. pin.* 251.

Alfina palustris, ericæ folio, polygonoides, seminibus
crebrioribus, flore albo pulchello. *Pluk.* ab

7. f. 4.

Polygonum, foliis gramineis, alterum. *Lafl.*

204. t. 64.

Habitat in Europæ frigidioris campis sublacu

SPERGULA foliis oppositis subulatis ciliatis fasci- laricina.
culatis.

Habitat in Sibiria. D. Gmelin.

SPERGULA foliis oppositis linearibus lævibus, pe- faginoides.
dunculis solitariis longissimis, caule repente.

Alfina tenuifolia, pedunculis florum longissimis. *Vaill.*

parif. 8. Sauv. monsp. 142.

Habitat in Gallia, Sibiria ex D. Gmelin.

DECAGYNIA.

NEURADA.

NEURADA. *Hort. upf. 117.*

Chamædrifolia tomentosa mascariensis. *Pluk. alm. 97.*

t. 275 f. 6. Shaw. afr. 133.

Habitat in Aegypto, Arabia, Numidia. ☉

procum-
bens.

PHYTOLACCA.

PHYTOLACCA floribus octandris octagynis.

octandra.

Phytolacca mexicana, baccis sessilibus. *Dill. elth. 218.*

t. 239. 308.

Jamma gobo. *Kæmph. amæn. 828. t. 829.*

Habitat in Mexico. 2

Statura Ph. decandrae. Folia albidiora. Pedunculus
communis brevissimus. Pedicelli breves, ut fere
nulli. Calyx f. Corolla alba, omnino plana, nec con-
cava. Stamina ♂ Styli octo.

PHYTOLACCA floribus decandris decagynis. *Hort.* decandra.

cliff. 177. Hort. upf. 117. Gron. vtrg. 161. Roy.

lugdb. 222.

Phytolacca vulgaris. *Dill. elth. 318. t. 239. f. 309.*

Solanum racemosum americanum. *Pluk. alm. 353. t.*

225. f. 3.

Habitat in Virginia. 2

PHYTOLACCA floribus icofandris decagynis.

icofandra.

Phytolacca spicis florum longissimis, radice annua.

Mill. dict. t. 207.

Habitat in Malabar. ☉. †

Cauli tripedalis, herbaceus sed perennans, paucis ra-
mis subdivisus. Folia strictiora, acutiora. Pedun-
cu-

culus inferne triqueter, at intra racemum m
gularis, sed in hac scaber. Pedicelli inferiores
pe triflori. Flores albi. Stamina, certe in u
oribus floribus, viginti. Bacca saturate purp

dolca.

4. PHYTOLACCA floribus dioicis.

Habitat in - - - - Alstræmer ex horto M
tensi. h

Caulis perfecte fruticosus. Folia exacte ovata, gl
magnitudine Populi nigrae, longius petiolata. l
tes ut in reliquis, sed dioici.



Classis XI

DODECANDRIA

Stamina inter XI & XIX inclusive.

MONOGYNIA

A S A R U M.

SARUM foliis reniformibus obtusis binis. europæum.
 rum foliis subcordatis petiolatis. *Hort. cliff.* 178.
L. suæc. 392; 421. *Mat. med.* 219. *Guett. stamp.* 198.
Zoy. lugdb. 207.
 rum. *Bauh. pin.* 197. *Cam. epit.* 19.
 bitat in Europæ nemoribus. 2

SARUM foliis reniformibus mucronatis. canadense.
 rum foliis subcordatis petiolatis. *Gron. virg.* 52.
 rum canadense, mucronato folio. *Morif. hist.* 3. p.
 II. f. 13. t. 7. f. 4.
 rum canadense. *Corn. canad.* 24. t. 25.
 bitat in Canada. 2

varietas præcedentis? sic suadent Folia bina; dif-
 cadent alia.

SARUM foliis cordatis obtusis glabris petiolatis. virginicum.
Gron. virg. 162.

rum virginianum, pistolochiæ foliis subrotundis,
 cyclaminis more maculatis. *Pluk. alm.* 53. t. 78. f. 2.

Morif. hist. 3. p. 511. f. 17. t. 7. f. 3.

bitat in Virginia, terra Mariana, Carolina. 2

SARUM foliis sessilibus imbricatis, floribus quadri- Hypocistis.
 idis. *Mat. med.* 220.

rum aphyllum squamosum. *Sauv. monsp.* 4.

hypocistis. *Bauh. pin.* 465. *Cam. epit.* 96, 97. *Clus.*

hist. 1. p. 68, 79. *Duham. arb.* 1. p. 170. t. 68.

bitat in Hispania, Lusitania parasitica cisti.

G E T H Y L L I S.

ETHYLLIS. *Hort. cliff.* 493. *

afra.

bitat in Africa.

cura Croci.

BOCCONIA.

- mutescens. 1. BOCCONIA. *Hort. cliff.* 202. *Jacq. amer.* 22.
 Bocconia ramosa, sphondylii folio tomentoso, *gen.* 55. *Trew. chr.* t. 4.
 Bocconia ramosa, foliis majoribus sinuatis, racem
 minalibus. *Brown. jam.* 244.
 Chelidonium majus arboreum, foliis quercinis
jam. 82. *hist.* 1. p. 195. t. 125.
 Cocoxihvitl. *Hern. mex.* 158.
Habitat in Mexico, Jamaica. †

RHIZOPHORA.

- conjugata. 1. RHIZOPHORA foliis ovato-oblongis obtusis
 integerrimis, calycibus sessilibus, fructibus
 draceo subulatis. *Fl. zeyl.* 181. *
Habitat in India. †
- gymnorhiza. 2. RHIZOPHORA foliis ovato-lanceolatis integerrimis
 radice terræ superimposita.
 Rhizophora calycum laciniis persistentibus patulis
 versus fructum incurvatis. *Wachend. ult.* 89.
 Mangium celsum. *Rumph. amb.* 3. p. 102. t. 68.
 Candel. *Rheed. mal.* 6. p. 57. t. 31. 32. *Raj.*
 1769.
Habitat in Indiæ ripis salis. †
- Candel. 3. RHIZOPHORA foliis obtusis, pedunculis biglandulosis
 folio longioribus, fructibus subulatis.
 Tierou-Kandel. *Rheed. mal.* 6. p. 63. t. 35. *Raj. hist.* 17
Habitat in Indiæ salis. †
- Mangle. 4. RHIZOPHORA foliis acutis, fructibus subulatis
 vatis. *Jacq. hist.* t. 89.
 Rhizophora segmentis calycum persistentibus
 fructu acuminato. *Wach. ultr.* 90.
 Magles aquatica, foliis subrotundis & punctatis
gen. 13.
 Mangle pyri foliis, cum siliquis longis, ficui
 affinis. *Bauh. hist.* 1. p. 415. *Sloan. jam.* 155.
 2. p. 63.
 Mangium candelarium. *Rumph. amb.* 3. p. 101
 71; 72.
 Peekandel. *Rheed. mal.* 6. p. 91. t. 34. *Raj. hist.* 17
Habitat in paludibus Caribæarum, Malabaræ. †

HIZOPHORA fructibus cylindricis obtusis. *cylindrica.*
 ri-Kandel. *Rheed. mal. 6. p. 59. t. 33. Raj. hist. 1770.*
 ungium minus. *Rumph. amb. 3 p. 106. t. 69.*
bitat in uliginosis Malabarizæ. †

HIZOPHORA foliis ovatis, floribus confertis, fru- *corniculata.*
 ctibus arcuatis mucronatis.
 ungium fruticosum corniculatum. *Rumph. amb. 3. p.*
17. t. 77.
bitat in Moluccis. †

HIZOPHORA foliis ovatis obtusis, floribus foli- *cafeolaris.*
 ariis, fructibus orbiculatis depressis mucronatis.
 ungium cafeolare. *Rumph. amb. 3. p. 111. t. 73; 74.*
bitat in Moluccis. †

B L A K E A.

BLAKEA. *trinervia.*
 kea foliis ellipticis trinerviis, nitidis, floribus la-
 teralibus. *Brown. jam. 323. t. 35.*
bitat in Jamaica. †
 lia oblongo-ovata, petiolata, integerrima, coriacea,
 opposita, trinervia: nervis subtus protuberantibus ni-
 tricantibus. Flores oppositi, pedunculati, solitarii.

G A R C I N I A.

GARCINIA foliis ovatis, pedunculis unifloris. *Hort. Mangostana.*
cliff. 182.
 ngostans. *Garc. act. angl. 431. t. 1. Bont. jam. 115.*
 ngostana. *Rumph. amb. 1. p. 132. t. 43. 1*
 urifolia javanensis. *Bauh. pin. 461. Raj. hist. 1662.*
bitat in Java. †

GARCINIA foliis lanceolatis, pedunculis trifloris. *celebica.*
 ngostana celebica. *Rumph. amb. 1. p. 134. t. 44.*
bitat in India. †

S T Y R A X.

STYRAX. *Hort. cliff. 187. Hort. upf. 192. Mat. officinale.*
med. 227. Roy. lugdb. 265. Sauv. monsp. 306. Gron.
orient. 149.
 yrax folio mali cotonei. *Bauh. pin. 452.*
 yrax. *Cam. epit. 38.*
bitat in Syria, Judæa, Italia. †

W I N T E R A N I A.

Canella.

1. WINTERANIA. *Hort. cliff.* 488.
 Winteranus cortex. *Cus. exot.* 75.
 Laurus foliis enerviis obovatis obtusis. *Mat. m.*
Sp. pl. 1. p. 371.
 Canella foliis oblongis obtusis nitidis, racemulibus. *Brown. jam.* 215. t. 27. f. 3.
 Cassia lignea jamaicensis, laureolæ foliis subcorticice piperis modo acri. *Pluk. alm.* 89. t. 8.
 Cassia cinnamomea f. Cinnamomum sylvestre densum. *Pluk. alm.* 89. t. 161. f. 7.
 Arbor baccifera laurifolia aromatica, fructu villiculato racemoso. *Sloan. jam.* 165. *hist.* 2. p. 191. f. 2. *Catesb. carol.* 2. p. 50. t. 50.
Habitat in America, †

H A L E S I A.

tetraptera.

1. HALEZIA foliis lanceolato-ovatis: petioliis lobis.
 Halezia fructibus membranaceo-quadrangulatis *act. angl.* v. 51. p. 931. t. 22. f. A.
 Frutex padi foliis serratis, floribus monopetalis campaniformibus, fructu crasso tetragono. *car.* 1. p. 64. t. 64.
Habitat in Carolina. †

diptera.

2. HALEZIA foliis ovatis: petioliis lævibus.
 Halezia fructibus alatis. *Ellis. act. angl.* v. 51. f. B.
Habitat in Carolina. D. Garden. †
 Folia hujus sextuplo majora præcedentis, nec subtomentosa. Fructus mucronatus alis duabus postis magnis; duabus minutis. *Ordine proxima Styraci.*

C R A T E V A.

gynandra.

1. CRATEVA inermis, foliis integerrimis, floribus nandris.
 Crateva arborea triphylla, foliis ovatis glabris terminalibus. *Brown. jam.* 246.
 Arbor americana triphylla, numerosis staminibus pureis apicibus præditis, floris umbilicum occubus. *Pluk. phyt.* 147. f. 6.

bitat in Jamaica. †

Fert a C. *Tupia* foliis tenuibus nec crassis. Petalis
anceolatis nec ovatis; imprimis vero quod columna
longitudine calycis attollat stamina, ut in *Cleome*
ynandra. Pistillum in meis non aderat.

ATEVA inermis, foliis integerrimis: foliolis la- Tupia.
teralibus basi antica brevioribus.

teva inermis. *Fl. zeyl.* 211. *Sp. pl.* 1. p. 444. *Hort.*
cliff. 484.

oscorodon f. Arbor americana triphyllos, allii odore,
poma ferens. *Pluk. alm.* 34. t. 137. f. 7.

lus americana trifolia, fructu pomi aurantii instar
colorato. *Comm. hort.* 1. p. 129. t. 67.

ona trifolia, flore stamineo, fructu sphaerico fer-
ragineo scabro minore, allii odore. *Sloan. jam.* 208.
cliff. 2. p. 169. *Raj. dendr.* 79.

ervala. *Rheed. mal.* 3. p. 49. t. 22.

bitat in Indiis. †

ATEVA spinosa, foliis ferratis. *Fl. zeyl.* 212. Marmelos.

turbitifera trifolia spinosa medica, fructu pulpa cy-
donii æmula. *Pluk. alm.* 125. t. 170. f. 5.

lonia exotica: *Bauh. pin.* 435.

inus. *Rumph. amb.* 1. p. 197. t. 81.

alam. *Rheed. mal.* 3. p. 37. t. 37.

bitat in India. †

TRIUMFETTA.

TRIUMFETTA foliis basi emarginatis. *Hort. cliff.* Lappula.

no. * *Hort. upf.* 148. *Roy. lugdb.* 476.

umfetta floribus calyculatis, foliis semitrilobis.
zcg. amer. 22.

umfetta fructu echinato racemoso. *Plum. gen.* 40.
255.

umfetta villosa, foliis inferioribus angulato-ovatis
errato dentatis, floribus ternatis: fasciculis gemina-
s. *Brown. jam.* 233.

pula bermudensis althæoides spicata, fructu orbi-
ulari majorè. *Pluk. alm.* 206. t. 245. f. 7.

imonia lappacea inodora, folio subrotundo denta-
o. *Sloan. jam.* 92. *hist.* 1. p. 211. *Raj. suppl.* 247.

bitat in Jamaica, Brasilia, Bermudis. †

- Bartramia. 2. TRIUMFETTA foliis basi integris.
 Triumphetta floribus calyculatis, foliis rhombatis. *Jacq. amer. 22. hist. t. 90.*
 Bartramia. *Fl. zeyl. 174. Sp. pl. 1. p. 389.*
 Lappula benghalensis tetralpermos, ribesii foliis orbiculatis ad foliorum ortum plurimis & *Pluk. alm. 206. t. 41. f. 5.*
 Agrimonia maderaspatana, folio rotundo singulis incano. *Pet. gaz. 31. t. 42. f. 10.*
 Lappago amboinica. *Rumph. amb. 6. p. 59. t. 1.*
Habitat in India. ☉

P E G A N U M.

- Harmala. 1. PEGANUM foliis multifidis. *Hort. upf. 144 orient. 165.*
 Peganum. *Hort. cliff. 206. Hort. upf. 144. Roy 461.*
 Ruta sylvestris, flore magno albo. *Bauh. pin. 1*
 Harmala. *Dod. pempt. 121.*
Habitat in arena Madriti, Alexandriae, Cappae Galatiae. 2
- daurica. 2. PEGANUM foliis indivisis.
 Harmala montana daurica perennis multicaulis galæ folio, flore albo. *Amm. ruth. 91.*
 β. Harmala montana, polygalæ foliis, floribus *Amm. ruth. 92.*
Habitat in Sibiria. 2

N I T R A R I A.

- Schöberl. 1. NITRARIA.
 Oxyris foliis obtusis. *Hort. upf. 295. Gmel. sibi 237. t. 98.*
 Cassia fructu nigro. *Amm. ruth. 256.*
Habitat ad Salsas aquas Vrunscinensis Lacus, chauenensis, Volgæ finitimis. 5

P O R T U L A C A.

- oleracea. 1. PORTULACA foliis cuneiformibus, floribus. *Roy. lugdb. 473. Gron. virg. 59. H 146. Mat. med. 260. Dalib. parif. 158 H 392. Sauv. monsp. 168. Brown. jam. 233.*
 Portulaca foliis cuneiformibus verticillatis & floribus sessilibus. *Hort. cliff. 207.*

ulaca angustifolia sylvestris. *Bauh. pin.* 288.
 ulaca latifolia sativa. *Bauh. pin.* 288
 ulaca domestica. *Lob. ic.* 388.
 etat in Europa, India, Ins. Ascensionis, Ameri-

logii floræ vigiliis 11—12 habet.

RTULACA foliis subulatis alternis: axillis pilosis, pilosa.
 ribus sessilibus terminalibus.

ulaca foliis linearibus acutis, caule procumbente
 loto. *Roy. lugdb.* 473.

ulaca curassavica, angusto longo lucidoque folio,
 ocumbens. *Comm. hort.* 1. p. 9. t. 5.

ulaca corassavica lanuginosa procumbens. *Herm.*
 2. 215. t. 215.

ulaca lanuginosa procumbens, vermiculatæ foliis,
 americana. *Pluk. alm.* 304. t. 247. f. 7. *Volk norib.*
 11. t. 341.

campferos supina minor, foliis linearibus turgidis,
 ribus summis ramulis confertis. *Brown. jam.* 234.

ulaca corassavica lanuginosa, psyllii folio, erectior
 elatior, flore dilutius rubente. *Herm. par.* 214.
 214.

ulaca curassavica lanuginosa, kali folio, erectior
 elatior. *Pluk. alm.* 303. t. 105. f. 4.

etat in America meridionali. ☉

a alterna, sed terminalia s. floralia octo in orbem
 gesta. Flores sessiles, terminales, calyce bifido,
 amibus quindecim, stylo quinquesido, Capsula
 circumscissa.

RTULACA foliis oblongis carnosis, caule co- Halimoides.
 rmboso, floribus sessilibus.

ulaca erecta, sedi minoris facie, capitulo tomen-
 to. *Sloan. jam.* 88. *hist.* 1. p. 205. t. 129. f. 3.

mus minimus, foliis oblongis succulentis tumen-
 bus, summis ramulis densissime fitis. *Brown. jam.*
 26.

etat in Jamaica. ☉

ex diphylas, Capsula circumscissa.

RTULACA foliis ovatis gibbis, pedunculo mul- *Anticampfe*
 floro, caule fruticoso. *ros.*

campferos foliis ovatis convexis acutiusculis. *Hort.*

Jf 146.

Anacampseros foliis acuminatis. *Hort. c.*
lugdb. 412.

Telephiastrum folio globofo. *Dill. elth*
f. 363.

Portulaca africana sempervirens, flore rubicundo
hort. 2. p. 177. t. 89. *Raj. suppl.* 507.

Oxalis affinis planta aphylla mammillaris. *Burm*
76. t. 30. f. 2. vitata.

Habitat ad Cap. b. Spei. §

*Axillæ foliorum pilosæ sunt, & Folia succulenta
jungunt hanc cum Portulacis, quamvis flamma
rima & Capsula trivalvis. Calyx diphyllus est.*

racemosa. 5. PORTULACA foliis obovatis planiusculis,
nō simplici triquetro.

Portulaca pedunculis multifloris triangularibus
amer. 22.

Helianthemum frutescens, portulacæ folio
7. t. 150. f. 2.

Habitat in America ad maris littora. §
Calyx diphyllus. Capsula trilocularis.

paniculata. 6. PORTULACA foliis ovatis planis
mosa.

Portulaca floribus paniculatis. *Jacq.*

Portulaca americana latifolia *ere*

Comm. hort. 1. p. 7. t. 4.

Portulacæ facie maritima frutescens

Sloan. jam. 87. *hist.* 1. p. 205.

Anacampseros foliis radicalibus

scapo allurgenti paniculata

Habitat in Americæ maritimæ.

Calyx pentaphyllus. Capsula

LYTHRUM

Salicaria. 1. LYTHRUM foliis oppo-
sitibus spicatis dodeca-

Lythrum foliis opposi-
393; 422 Roy. l.

Lythrum floribus ve-

Lythymachia spicata

Lythymachia purpur-

p. 51.

Attaria rubra spicata major, folio subrotundo. *Mo. f. filij. 2. p. 490. f. 5. t. 10. f. 11.*

Yimachia trifolia spicata purpurea. *Bocc. mus. 167.*

Yimachia quadrifolia purpurea, mollioribus & longioribus foliis. *Bocc. mus. 167.*

abitat in Europa, ad ripas aquarum. 2.

YTHRUM foliis oppositis subtus tomentosis, floribus decandris, corollis calyce calyceque genitalibus brevioribus. *fruticosum.*

abitat in China. 3.

Text cortice lacero. Folia opposita, sessilia, lanceolata, integerrima, subtus subtomentosa.

YTHRUM foliis oppositis ovalibus, floribus sessilibus alternis hexandris, caule diffuso. *Parsonia.*

Parsonia herbacea, foliis ovatis oppositis, floribus singularibus foliis ad alterum latus interpositis. Bro. v. Fam. 199. t. 21. f. 2.

abitat in Jamaica. 2.

Stiles pro ... Folia subsessilia, nuda, integerrima.

centil ... flores solitarii, alterni, sessiles.

YTHRUM foliis oppositis subtus tomentosis subverticillatis, floribus verticillatis. *Grön.*

... foliis, floribus verticillatis. Grön.

... olitis ... petiolatis, floribus petiolatis.

... Grön.

... tis ... oribus obliquis.

... oribus solitariis.

... tis linearibus, remotis.

... Grön.

*Melanium herbaceum reclinatum, foliis ovatis
 sitis, floribus singularibus ad alas alternas*
jam. 215.

Habitat in Jamaica. 24

Hyssopifolia 8. **LYTHRUM** foliis alternis linearibus, floribus
 dris. *Hort. upf. 118,*

Lythrum foliis alternis. Hort. cliff. 178. Sarr. 53. Roy. lugdb. 458. Gort. gelr. 271.

Salicaria hyssopi folio latiore. Hall. jen. 147. 16

Hyssopifolia. Bauh. pin. 218.

β. *Lyfimachia rubra non filiquosa. Bauh. pin. 246.*

γ. *Lyfimachia linifolia purpureo-cærulea. Bauh. pin.*

*Habitat in Germaniæ, Helvetiæ, Angliæ, Gallie
 undatis. ☉*

Thymifolia. 9. **LYTHRUM** foliis alternis linearibus, floribus
 petalis.

Lythrum foliis linearibus. Sauv. monsp. 49.

Salicaria minima tenuifolia. Tournef. inst. 254.

Salicaria hyssopi folio angustiore. Buxb. hal. 297.

*Hyssopifolia minor s. potius thymifolia maritima.
 hist. 3. p. 792.*

Polygonum aquaticum minus. Barr. ic. 773. f. 2.

Habitat in Italiæ & G. Narbonensis uliginosis. 6

Petala 4, stamina 2, calyx 4dentatus. Folia in

lanceolata, alterna, ima opposita. Flores in

axillares. Calyx stipulis 2 lateralibus fulcitur.

Sauvages.

virgatum. 10. **LYTHRUM** foliis oppositis lanceolatis, paniculatis,
 gata, floribus dodecandris.

Salicaria orientalis, foliis acutissimo & g

Tournef. cor. 18.

Salicaria glabra ramosissima, longissimis & ang

mis foliis. Amm. ruth. 89.

Salicaria glabra, longioribus & angustioribus.

Amm. ruth. 88.

Habitat in Sibiria, Tataria.

Caulis paniculatus, ramis alternis longis. Flores in

pedicellati, ex singula ala alterna racemi.

GINORA.

americana. 1. **GINORA.** Jacq. amer. 22.

Habitat in America. ♂
Frutex pulcher halitū Myrti.

DIGYNIA.

HELIOCARPUS.

HELIOCARPUS. *Hort. cliff. 211. t. 16. * Trew. americana.*
chret. t. 45.

Habitat in Vera Cruce. ♂

AGRIMONIA.

AGRIMONIA foliis caulinis pinnatis: impari petio- *Eupatoria.*
 lato, fructibus hispida. *Hort. cliff 179. Fl. svec. 394;*
423. Hort. upf. 118. Mat. med. 221. Gron. virg. 53.
Roy. lugdb. 240. Hall. helv. 407. Guett. stamp. 1. p.
293. Dalib. paris. 139.

Eupatorium veterum f. Agrimonia. Bauh. pin. 321.

Eupatorium. Fuchf. hist. 244. Cam. epit. 756. Mill. ic. 15.

Habitat in Europæ pratis apricis argillaceis. 2

AGRIMONIA foliis caulinis pinnatis: impari sessili, *repens.*
 fructibus hispida.

Agrimonia orientalis humilis, radice crassissima repen-
te, fructu in spicam brevem & densam congesto.
Tournef. cor. 21.

Habitat in Oriente.

Affinis nimium A. Eupatoriæ, sed Caules breviores,
crassiores, hirsuti. Stipulæ longitudine interstitio-
rum, reflexæ, fere totum obumbrant caulem. Fo-
liorum impar non pedicellatum. Spica brevis, den-
sa, sessilis, Bracteis longitudine florum.

AGRIMONIA foliis caulinis ternatis, fructibus gla- *Agrimoni-*
 bris. *Hort. cliff. 179. Roy. lugdb. 241.* *des.*

Agrimariæ similis. Bauh. pin. 321.

Agrimonoides. Col. ecphr. 1. p. 145. t. 144. Boerh.
lugdb. 1. p. 179.

Habitat in Italiæ nemoribus umbrosis humentibus. 2

Stamina sæpe vix ultra 8.

TRIGYNIA.

RESEDA.

RESEDA foliis lanceolatis integris, calycibus quadri- *Luteola.*
 fidis.

Reseda foliis simplicibus lanceolatis integris. *Hort. d.*
212. *Vir. cliff.* 49. *Fl. svec.* 439; 424. *Roy. bot.*
483. *Dalib. paris.* 160.

Luteola herba salicis folio. *Bauh. pin.* 100.

Lutum herba. *Dod. pempt.* 80.

Habitat in Europa ad vias ☉ *pagos.* ☉

Folia ad basin utrinque denticulum habent callosum.

caesescens.

2. RESEDA foliis subulatis sparsis. *Saur. monsp.* 48.
Reseda foliis simplicibus oblongis integris. *Guett. fl.*
1. p. 225.

Reseda alba minor. *Bauh. pin.* 100.

Sesamoides salmanticum parvum. 2. *Clus. hist.* 1.
296. t. 295.

Habitat in Salmantica.

glauca.

3. RESEDA foliis linearibus basi dentatis, floribus
trigynis.

Reseda linariæ foliis. *Bauh. pin.* 100. *prodr.* 41. *Bur.*
IV. 88.

Reseda, linariæ folio, glaucum pyrenaicum, flori
stamineo. *Morif. hist.* 3. p. 601. f. 15. t. 1. f. 4.

Reseda, linariæ folio, pyrenaica, glauco folio. *Fl.*
alm. 317. t. 107. f. 2. *Raj. suppl.* 511.

Luteola pumila pyrenaica, linariæ folio. *Tournef.* 4.
424.

Habitat in Pyrenæis.

purpura-
icens.

4. RESEDA foliis linearibus obtusis, floribus pentagynis

Reseda alba minor. 1. *Bauh. pin.* 100. *Raj. hist.* 1034

Sesamoides salmanticum parvum. 1. *Clus. hist.* 1. p. 295

Sesamoides foliis crassis, floribus ex herbaceo purp
rascentibus. *Tournef. inst.* 424.

Habitat in collibus Salmanticis, Monspelii.

Sesamoides.

5. RESEDA foliis lanceolatis integris, fructibus stellatis

Sesamoides fructu stellato. *Tournef. inst.* 424.

Habitat Monspelii in Horto Dei.

undata.

6. RESEDA floribus trigynis tetragynisque, calycibus
quinquepartitis, foliis pinnatis undulatis.

Reseda minor, foliis incis. *Barr. rar.* 78. t. 588.

Habitat in Hispania. 2

Caulis pedalis, striato-angulatus, striatus. Folia rari
calia ☉ caulina pinnata: foliolis lanceolatis,

currentibus, acutis, undatis: alternis minoribus, erectioribus. Superiora folia excludunt foliola alterna minora. Racemi terminales. Calyx 5partitus. Petala 5, trifida, alba. Antheræ luteæ, 10. Pistilla in aliis flosculis 3, in aliis 5. Capsulæ hujus generis maximæ.

ESEDA foliis pinnatis apice recurvis, floribus tetragynis, calycibus quinquepartitis patentibus, caule basi suffruticoso. suffruticu-
losa.

abit in Hispania. 2.

dix s. caulis supra terram perennans, crassitie sæpe dupla pollicis, brevissimus, e cuius apice Caules plures, adscendentes, læves striis elevatis. Folia pinnata: pinnis 5 s. 7, lanceolatis, decurrentibus, fere undatis, levibus, apice recurvis. Spiæ plures, alternæ, versus caulis apicem primores. Petala 6 s. 5, alba, trifida, calyce majora. Stamina 11, quasi melia inter R. undatam & albam.

ESEDA foliis pinnatis, floribus tetragynis, calycibus sexpartitis. alba.

Hort. upf. 149.

seda foliis pinnatis integerrimis. Hort. cliff. 212.

seda maxima. Bauh. pin. 100. Lob. hist. 110.

abit Monspeli, in Hispania. ☉

ESEDA foliis omnibus trifidis: inferioribus pinnatis. lutea.

Hort. cliff. 212. Hort. upf. 149. Roy. lugdb. 483.

Hall. helv. 315. Dalib. parif. 159. Gort. gelr. 310.

seda vulgaris. Bauh. pin. 100. Raj. hist. 1053.

seda lutea. Bauh. hist. 3. p. 467.

seda gallica crispa. Bocc. sic. 77. t. 41. f. 3.

seda massiliensis, foliis latioribus crispis. Pluk. alm.

317. t. 55. f. 4.

abit in Europæ australioris montibus cretaceis. ☉

ESEDA foliis integris trilobisque, calycibus sexpartitis maximis. Phyteuma.

Hort. cliff. 412. Dalib. parif. 159.

seda floribus trigynis, calycibus maximis hexaphyllis. Hort. upf. 150.

seda minor vulgaris. Tournef. inst. 423.

seda affinis Phyteuma. Bauh. pin. 100. prodr. 42.

. 42.

Erucago apula trifida quinquefolia. Col. ephr. t. 269.

β. *Reseda minor vulgaris, folio minus inciso. T. inf. 423.*

γ. *Reseda minor vulgaris, foliis integris. Tournef. 423.*

Phyteuma. Bauh. pin. 3. p. 386. fig.

Habitat in Gallia, Italia, Oriente. ☉

odorata.

II. **RESEDA** foliis integris trilobisque, calycibus rem æquantibus.

Reseda foliis integris trilobisque, floribus tetrag. Mill. dict. t. 217.

Reseda foliis integris, floribus odoratis. Hall. 195. Zinn. zett. 123.

Habitat in Ægypto. ♂

Simillima R. Phyteumæ, sed Folia magis undatis Calyces corolla non longiores. Rami declinatis vagis adpersi. Flores tristes ambrosiaci, sed tetragyni. Petalorum lacinie laterales in hac, termedia vero in præcedenti, breviores.

EUPHORBIA.

* *Fruticosa aculeata.*

antiquorum. I. **EUPHORBIA** aculeata subnuda triangularis arborata: ramis patentibus. *Hort. cliff. 196. * Hort. 138. Fl. zeyl. 199. Mat. med. 154. Roy. lugdb. 1 Amæn. acad. 3. p. 106. **

Euphorbium antiquorum verum. Comm. hort. 1. p. t. 12.

Schadidacalli. Rheed. mal. 2. p. 81. t. 42.

β. *Euphorbia aculeata nuda triangularis articulata, erectis. Mill. dict.*

Euphorbium trigonum & tetragonum spinosum, compressis. Isn. act. 1720.

Tithymalus aizoides triangularis & quadrangularis, culosus & spinosus, ramis compressis. Comm. 1 55. t. 5.

Habitat in India. ♀

canariensis. 2. **EUPHORBIA** aculeata nuda subquadrangularis, levis geminatis. *Hort. cliff. 196. * Hort. usq. 1 Roy. lugdb. 194. Amæn. acad. 3. p. 107. **

Tithymalus aizoides fruticosus canariensis aphy.

quadrangularis & quinquangularis, spinis geminis aduncis atronitentibus armatus. *Comm. hort.* 2. p. 207. t. 104.

Eithymalus aizoides lactifluus f *Euphorbia canariensis* quadrilatera & quinquelatera, cerei effigie. *Pluk. alm.* 370. t. 320. f. 2.

Habitat in Canariis. †

EUPHORBIA aculeata nuda septemangularis: spinis heptagona. solitariis subulatis floriferis. *Hort. cliff.* 196. * *Roy. lugdb.* 194. *Amæn. acad.* 3. p. 109. *

Euphorbium heptagonum, spinis longissimis in apice frugiferis. *Bærh. lugdb.* 1. p. 258. t. 258.

Euphorbium capense, spinis longis simplicibus. *Bradl. fvec.* 2. p. 4. t. 13.

Habitat in Æthiopia. †

EUPHORBIA aculeata nuda: angulis tuberosis spinis interstinctis. *Amæn. acad.* 3. p. 108. mammillaris.

Euphorbium polygonum, aculeis longioribus ex tuberculorum internodiis prodeuntibus. *Isn. act.* 1720. p. 386.

Eithymalus aizoides africanus, validissimis spinis ex tuberculorum internodiis provenientiibus. *Comm. præl.* 59. t. 9.

Habitat in Æthiopia. †

Differt ab Heptagona angulis duplicatis torulosis; spinæ solitariæ inter singula tubercula longitudinaliter digesta. Flores non vidi; an ex spinarum apice, ut heptagonæ?

EUPHORBIA aculeata nuda multangularis, spinis cereiformis. solitariis subulatis. *Roy. lugdb.* 195. *Amæn. acad.* 3. p. 108.

Euphorbium cerei effigie, caulibus gracilioribus. *Boerk. lugdb.* 1. p. 258.

Euphorbium aphyllum angulosum, florum coma densissima. *Burm. afr.* 19. t. 9. f. 3.

Eithymalus africanus spinosus, cerei effigie. *Moris. hist.* 3. p. 245. *Pluk. alm.* 370. t. 231. f. 1.

Habitat in Æthiopia. †

EUPHORBIA aculeata nuda multangularis: aculeis officinarum. geminatis. *Hort. cliff.* 196. * *Hort. upf.* 138. *Roy. lugdb.* 195. *Amæn. acad.* 3. p. 107. *

Euphorbium polygonum spinosum, cerei effigie. *Ju*
act. 1720. p. 500. t. 10

Euphorbium cerei effigie, caulibus crassioribus
validioribus armatum. *Comm. hort.* 1. p. 21. t. 11.
thes. 1. p. 29. t. 19. f. 2.

Euphorbium. *Bauh. pin.* 387.

Habitat in Æthiopia & Africa calidior. †

neriifolia.

7. EUPHORBIA aculeata seminuda: angulis obli-
tuberculatis. *Hort. cliff.* 196. * *Hort. upf.* 139.

zeyl. 200. *Roy. lugdb.* 194. *Amæn. acad.* 3. p. 101
Euphorbium atrum spinosum, foliis latioribus non
nosis. *Seb. thes.* 1. p. 18. t. 9. f. 1.

Tithymalus aizoides arborefcens spinosus, caudice
gulari, nerii folio. *Comm. præl.* 22. 56. t. 6. *Br*
succ. 3. p. 10. t. 28.

Tithymalus indicus spinosus, nerii folio. *Comm.* 1
1. p. 25. t. 13.

Ligularia. *Rumph. amb.* 4. p. 88. t. 40.

Ela Calli. *Rheid. mal.* 2. p. 83. t. 43.

Habitat in India. †

* * *Fruticose inermes.*

(*Caulis nec dichotomus, nec umbelliferus.*)

Caput me-
dusæ.

8. EUPHORBIA inermis imbricata tuberculis foli-
lineari instructis. *Hort. cliff.* 197. *Hort. upf.* 1
Roy. lugdb. 195. *Amæn. acad.* 3. p. 110.

Planta lactaria atricana. *Comm. hort.* 1. p. 33. t. 11

Tithymalus aizoides africanus, simplici squamato
le, chamænerii folio. *Comm. præl.* 58. t. 8. *E*
23. 57. t. 7.

β. Euphorbium anacantum squamosum, lobis florum
dentatis. *Isnard. act.* 1720. p. 502. t. 11. *Breyer. p*
3. p. 29. t. 19.

γ. Euphorbium erectum aphyllum, ramis rotundis, ti-
culis tetragonis. *Burm. afr.* 16. t. 7. f. 2.

δ. Euphorbium humile procumbens, ramis simplicibu
piosis, caule crassissimo tuberoso. *Burm. afr.* 8
10. f. 1.

ε. Euphorbium procumbens, ramis plurimis simplic
squamosis, foliis deciduis. *Burm. afr.* 17. t. 8.

ζ. Euphorbium procumbens, ramis geminatis, caule
bro oblongo cinereo. *Burm. afr.* 18. t. 9. f. 1.

H.

abit in Æthiopia. †
 sanctissima planta petalis palmatis.

UPHORBIA inermis nuda fruticosa filiformis viminalis, viminalis, ubilis: cicatricibus oppositis. Hort. cliff. 197. * Hort. upf. 140. Amæn. acad. 3. p. 110. *

Isel Tavil. Alp. ægypt. 190. t. 190. Dill. elth. 368.
 bitat in Africæ maritimis. †

UPHORBIA inermis seminuda fruticosa filiformis mauritania, mauritania, flaccida, foliis alternis. Hort. cliff. 197. Hort. upf. 140. Roy. lugdb. 195. Amæn. acad. 3. p. 111. * Gron. orient. 160.

hymalus aphyllus mauritaniæ. Dill. elth. 384. t. 289.
 373.

bitat in Africæ maritimis. †

UPHORBIA inermis seminuda fruticosa filiformis Tirucalli, Tirucalli, erecta, ramis patulis determinate confertis. Hort. cliff. 197. Hort. upf. 139. Fl. zeyl. 197. Roy. lugdb. 195. Amæn. acad. 3. p. 111. *

hymalus indicus frutescens. Comm. hort. 1. p. 27.
 14.

hymalus arborefcens, caule aphylo. Pluk. phyt. 319. f. 9.

ifraga lactea. Rumph. amb. 7. p. 62. t. 29.

u Calli. Rheed. mal. 8. p. --- t. 44.

bitat in India. †

UPHORBIA inermis fruticosa, foliis distiche al-Tithymaloi- Tithymaloides, Tithymaloides, ternis ovatis. Hort. cliff. 198. * Roy. lugdb. 195. Amæn. acad. 3. p. 111. *

hymalus curassavicus myrtifolius, flore coccineo myrtifolia, myrtifolia, mellifluo. Herm. par. 234. t. 234.

hymalus curassavicus myrtifolius, flore papilionaceo coccineo parvo. Comm. hort. 1. p. 31. t. 16.

Pluk. alm. 369. t. 230. f. 2.

hymaloides laurocerasi folio non ferrato. Dill. elth. padifolia, padifolia, 383. t. 288 f. 372.

bitat in Curassao, at β. forte in India. †

EUPHORBIA inermis, foliis ferratis petiolatis heterophylla, heterophylla, filiformibus ovatis lanceolatis panduriformibus. Amæn. acad. 3. p. 112.

hymalus heterophyllus. Plum. ic. 250. t. 251. f. 3.

Tithymalus curassavicus, salicis & atriplicis foliis, caulibus viridantibus. *Pluk. alm.* 369. t. 11
Tithymalus curassavicus, salicis & atriplicis foliis, caulibus subrubentibus. *Morif. hist.* 3. p.
Habitat in America calidiore.

cotiniifolia. 14. *EUPHORBIA* foliis oppositis subcordatis petiolo emarginatis integerrimis, caule fruticoso. *Amæn. acad.* 3. p. 112.

Euphorbia inermis, caule fruticoso, foliis oppositis subcordatis emarginatis, petiolo folio longioribus. *Hort. cliff.* 198. *Roy. lugdb.* 196.

Tithymalus curassavicus, folio cotini triphyllis, foliis florum ferratis. *Pluk. alm.* 369. t. 230. f. 3.

Tithymalus arboreus curassavicus, cotini folio. *Amæn. acad.* 1. p. 75. t. 46. f. 4.

Tithymalus arboreus americanus, cotini folio. *Hort. I.* p. 29. t. 15.

Habitat in Curassao. §

ecymoides. 15. *EUPHORBIA* inermis herbacea ramosa, foliis cordatis integerrimis petiolo brevioribus, floribus litariis. *Amæn. acad.* 3. p. 112.

Euphorbia inermis, foliis subcordatis obtusis integerrimis petiolatis, caule ramoso erecto. *Roy. lugdb.*
Habitat in Campechia. *Houft.*

* * * *Dichotomæ (umbellæ bifidæ aut nullæ)*

origanoides. 16. *EUPHORBIA* dichotoma, foliis serrulatis cordatis obtusis trinerviis, panicula terminali, caulibus atriplicibus. *Amæn. acad.* 2. p. 114. *

Habitat in Insula Ascensionis. 24

Planta refert ita Origanum, ut primo intuitu non agnosci.

hypericifolia. 17. *EUPHORBIA* dichotoma, foliis serratis ovalibus longis glabris, corymbis terminalibus, ramis divaricatis. *Amæn. acad.* 3. p. 113. *

Euphorbia inermis, foliis ovalibus oppositis hinc inde uniformibus, ramis alternis, caule erecto. *Hort. cliff.* 198. *Hort. upf.* 143. * *Roy. lugdb.* 196.

Euphorbia minima reclinata, foliolis ovatis dentatis, floribus subumbellatis terminalibus lateralibus. *Brown. jam.* 235.

Symalium americanum, flosculis albis. *Comm. prat.*
D. t. 60.

Symalium erectum acris; parietariæ foliis glabris, florum ad caulium nodos conglomeratis. *Sloan. jam.*
2. *hist.* 1. p. 197. t. 126.
stat in India. ☉

EPHORBIA dichotoma, foliis ferrulatis ovatis
terminatis, pedunculis capitatis axillaribus, caulibus
latis. *Amæn. acad.* 3. p. 114. *

hirta.

Ephorbia inermis, foliis oppositis ovalibus ferratis u-
formibus, pedunculis capitatis axillaribus. *Fl. zeyl.*
7. *

Ephorbia reclinata minor subhirsuta, foliis ferratis.
Brown. jam. 234.

Symalium botryoides zeylanicum, cauliculis villosis.
Burm. zeyl. 223. t. 104.

La esculenta. *Rumph. amb.* 6. p. 54. t. 23. f. 2.
stat in India. ☉

EPHORBIA dichotoma, foliis ferratis ovali-ob- capitulifera.
longis, pedunculis bicapitatis axillaribus, caule ere-
cto. *Amæn. acad.* 3. p. 115.

Symalium botryoides erectum, florum capitulis con-
gestis & longiori pediculo insidentibus. *Burm. zeyl.*
24. t. 105. f. 1. *Pet. gal.* t. 80. f. 14.
stat in India. ☉

EPHORBIA dichotoma, foliis subcrenatis linea- hypophylla.
ribus, floribus fasciculatis terminalibus, caule erecto.

Ephorbia dichotoma erecta tenuis, foliis linearibus,
orbibus quasi umbellatis terminalibus. *Brown. jam.*
35.

stat in America.

EPHORBIA dichotoma, foliis ferratis ovali-ob- thymifolia.
longis, capitulis axillaribus glomeratis subsessilibus,
caulibus procumbentibus. *Amæn. acad.* 3. p. 115.

Symalium foliis oppositis oblique cordatis obtusis fer-
ratis, pedunculis multifloris. *Fl. zeyl.* 198.

Symalium indicum annuum dulcis, floribus albis, cau-
libus viridantibus & rubentibus. *Pluk. alm.* 372. t.
13. f. 2.

Symalium humile ramosissimum hirsutum, foliis thymi-
feris. *Burm. zeyl.* 225. t. 105. f. 3.

stat in India. ☉

22. EU-

- maculata; 22. EUPHORBIA dichotoma, foliis ferratis ob pilosis, floribus axillaribus solitariis, ramis; Euphorbia minima supina rufescens. *Brown. jam* Tithymalus f. Chamæfyce altera virginiana, foliatis & macula fusca eleganter notatis. *Fla* 372. t. 65. f. 8.
Chamæfyce. *Sloan. jam. 83. hist. 1. p. 198.*
Habitat in America septentrionali. ☉
Caulis dichotomi: Ramis alternis, patèntibus, purpurascèntibus. Folia ovali - oblonga, tri subpilosa, ferrata, altero latere maxima parte gerrima, tenera adhuc planta notata macula Flores axillares, solitarii, parvi, calyce rufo. Fructus lævis.
- parviflora. 23. EUPHORBIA subdichotoma, foliis ferratis glabris, floribus solitariis, caule erectius terne ramoso.
Tithymalus erectus, floribus rarioribus, foliis glabris integris. *Burm. zeyl. 224. t. 105.*
Habitat in India. ☉
- canescent. 24. EUPHORBIA dichotoma foliis integris suldis pilosis, floribus solitariis axillaribus, caulibus cumbentibus.
Tithymalus exiguus villosus nummulariz *Tournef. inst. 87.*
Habitat in Hispania. ☉
Affinis nimis E. Chamæfyces, sed tota undique villosa. Folia obsolete emarginata, obsolete et
- Chamæfyce. 25. EUPHORBIA dichotoma, foliis crenulatis tundis glabris, floribus solitariis axillaribus, cumbentibus. *Amæn. acad. 3. p. 115. **
Euphorbia inermis, foliis oblique cordatis serratis, ramis alternis, floribus solitariis. *cliff. 198. * Roy. lugdb. 196. Gmel. fib. 2. 1 Gron. orient. 160.*
Chamæfyce. *Bauh. pin. 293. Clus. hist. 2. p. 187*
Habitat in Europæ australis, Sibiriz, Mesopotamiz aridis. ☉
Fructus subhirsutus.
- repulis. 26. EUPHORBIA dichotoma, foliis integerrimis cordatis, floribus solitariis axillaribus, caulibus

mbentibus. *Amæn. acad.* 3. p. 115. *Gron. orient.*

3.
 corbia foliis subrotundis obtusis, floribus solitariis
 foliorum alis. *Guett. stamp.* 2. p. 420.

is maritima, folio obtuso. *Bauh. pin.* 293.

is. *Clus. hist.* 2. p. 187. *Cam. epit.* 970.

ion. *Dalech. hist.* 970.

rat in Narbonæ, Hispaniæ maritimis. ☉

PHORBIA foliis oppositis integerrimis lanceo- polygonifo-
 is obtusis, floribus solitariis axillaribus, caulibus lia.
 procumbentibus. *Amæn. acad.* 3. p. 116. *

corbia procumbens, ramulis alternis, foliis lanceo-
 o-linearibus, floribus solitariis. *Gron. virg.* 58.

corbia minima ramosissima angustifolia. *Raj. suppl.*

1.

rat in Canada, Virginia. ☉

PHORBIA dichotoma, foliis integerrimis lan- Ipecacuan-
 olatis, pedunculis axillaribus unifloris folia æquan- hæ.
 us, caule erecto. *Amæn. acad.* 3. p. 117. *

ymalus, flore exiguo viridi apicibus flavis, ante-
 am folia emittit florens. *Gron. virg.* 58.

rat in Virginia, Canada. 24

PHORBIA dichotoma, foliis integerrimis ova- portulacoli-
 us retusis, pedunculis axillaribus unifloris folia des.
 quantibus, caule erecto. *Amæn. acad.* 3. p. 117. *

ymalus perennis, portulacæ folio. *Few. peruv.* 707.

2?

rat in Philadelphia. *Kalm.* 24

PHORBIA dichotoma, foliis integerrimis sub- myrtifolia,
 tundis emarginatis subtus incanis, floribus solita-
 s, caule erecto.

corbia erecta, foliolis ovatis oppositis, ramulis te-
 ribus alaribus. *Brown. jam.* 235.

rat in Jamaica. ☉

* * * * *Umbella trifida.*

PHORBIA umbella trifida: dichotoma, invo- Peplus.
 cellis ovatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis.
Amæn. acad. 3. p. 117. *

corbia foliis obverse ovatis integerrimis, umbella
 diversali trifida triphylla, partialibus dichotomis di-
 phyl-

phyllis. *Hort. cliff.* 199. *Fl. svec.* 437; 481
lugdb. 197. *Dalib. paris.* 156.

Peplus s. Esula rotunda. *Bauh. pin.* 292.

Peplus. *Fuchj. hist.* 603. *Dod. pempt.* 375.

Habitat in Europæ cultis oleraceis. ☉

falcata. 32. EUPHORBIA umbella trifida: dichotom
 lucellis cordato-subfalcatis acutis, foliis la
 obtusiusculis. *Amen. acad.* 3. p. 118. *
Habitat in Europa australi.

terraccina. 33. EUPHORBIA umbella quadrifida dichot
 liis alternis lanceolatis retusis mucronatis.
 Tithymalus marinus, folio retuso, terraccino
ic. 833.

Habitat in Hispania. Alstræmer. ☉

Caulis herbaceus, ultra semipedalis, teres. I
 terna, lanceolata, lævia, obliqua, margine
 scula, apice retusa & quasi truncata muc
 flexo. Involucrum subquadriphyllum: foliis
 ovatis, obtusis, folio latioribus, vix serratis.
 lucella ovata, basi truncata. Petala flavescen
 s. tridentata. Fructus glabri. Ex inferior
 foliorum ramuli steriles. Figura Foliorum a
 exiguam retusam prope accedit, sed in illa
 lata, huic digiti magnitudine.

exigua. 34. EUPHORBIA umbella trifida: dichotoma
 lucellis lanceolatis, foliis linearibus. *Amen.*
 p. 118. *

acuta. α. Euphorbia inermis, foliis alternis linearibus acut
 bella universaliter trifida, partialibus dichotomis
 lis. *Hort. cliff.* 199. *Hort. ups.* 143 * *Roy.*
 197. *Dalib. paris.* 157. *Gort. gelr.* 304
 Tithymalus s. Esula exigua. *Bauh. pin.* 291.
 Esula minima tragi. *Dalch. hist.* 1656.

retusa. β. Tithymalus s. Esula exigua, foliis obtusis. *Ba*
 291. *prodr.* 132.

γ. Tithymalus exiguus saxatilis. *Bauh. pin.* 291.
 132. *Magn. monsp.* 259. t. 258. *Burf. XVI.*
Habitat in Lusatia, Gallia, Helvetia, Hispania
segetes; β. Monspeli in saxosis. γ. Padus &
filix: at Acuta in collibus, Retusa in pratis.

tuberosa. 35. EUPHORBIA umbella trifida, involucreo tet

caule nudo, foliis oblongis emarginatis. *Amen. acad. 3. p. 117.*

phorbia inermis, foliis oblongis obtusis emarginatis. *Roy. lugdb. 199.*

ymalus humilis, folio lapathi. *Buxb. cent. 2. p. 7. t. 23.*

ymalus tuberosus acaulos, foliis oblongis cucullatis & planis. *Burm. afr. 9. t. 4.*

ymalus africanus humilis, foliis latioribus oblongis tuberosa radice. *Raj. suppl. 933.*

bitat in Ægypto & Æthiopia. ♀

* * * * * *Umbella quadrifida.*

UPHORBIA umbella quadrifida: dichotoma, foliis oppositis integerrimis. *Amen. acad. 3. p. 119.* * Lathyrus.

phorbia inermis, foliis oppositis lanceolatis integerrimis, umbella universali quadrifida tetraphylla, ulterioribus dichotomis. *Hort. ups. 140. Mat. med. 256.*

phorbia inermis, foliis oppositis lanceolatis, umbella universali trifida polyphylla, partialibus triphyllis, aliquis diphyllis. *Hort. cliff. 198. Roy. lugdb. 196.*

Salib. paris. 155.

hyris major. *Bauh. pin. 293.*

hyris. *Cam. epit. 968. Fuchf. hist. 454.*

bitat in Gallia, Italia ad agrorum margines. ♂

* * * * * *Umbella quinquefida.*

UPHORBIA umbella subquinquefida simplici, involucrellis ovatis: primariis triphyllis, foliis oblongis integerrimis, caule fruticoso. *Amen. acad. 3. p. 120.* * spinosa.

phorbia inermis fruticosa, foliis lanceolatis integerrimis, floribus solitariis terminalibus, involucris triphyllis. *Hort. cliff. 201. Roy. lugdb. 196.*

phorbia inermis fruticosa, ramis siccis pungens, foliis ad umbellas ternis sæpius ovatis, floribus solitariis. *Sauv. monsp. 51.*

ymalus ragulinus, flore luteo pentapetalo. *Herm. lugdb. 600. t. 601.*

ymalus maritimus spinosus. *Bauh. pin. 291.*

bitat in Cretæ & Galloprovinciæ montibus maritimis. ♀

rami senescentes sicci & aridi persistunt, unde quasi spinosa apparet.

- Apios.** 38. **EUPHORBIA umbella quinquefida**: bifida lucellis obcordatis. *Amæn. acad.* 3. p. 120.
Tithymalus tuberosa pyriformi radice. *Bauh.*
Tithymalus tuberosa radice. *Clus. hist.* 2. p.
Habitat in Creta.
- epithymio-**
des. 39. **EUPHORBIA umbella quinquefida**: bifida lucellis ovatis, foliis lanceolatis obtusis sulosis.
Tithymalus epithymi fructu. *Col. ecphr.* 1. p. 5.
Peplos altera species. *Bauh. pin.* 292
Habitat in Italia *D Jacquin.* 2.
Accedit ad E. dulcem, sed Folia magis margin
Et subtus villosa. Fructus hispidi, setis
purpurascensibus adpersi.
- dulcis.** 40. **EUPHORBIA umbella quinquefida**: bifida, lucellis subovatis, foliis lanceolatis obtusissimis. *Amæn. acad.* 3. p. 122.
Tithymalus montanus non acris. *Bauh. pin.* 292.
Pithyusa s. **Efula minor** altera, floribus rubris.
ic. 358.
Habitat in Galliæ, Italiæ, Germaniæ umbrosis.
Exsiccatione nigra evadit.
- Pithyusa.** 41. **EUPHORBIA umbella quinquefida**: bifida, lucellis ovatis mucronatis, foliis lanceolatis involutis retrorsum imbricatis. *Amæn. acad.* 3. p. 122.
Tithymalus foliis brevibus aculeatis. *Bauh. pin.* 292.
Pithyusa. *Dalech. hist.* 1652.
Tithymalus maritimus, juniperi folio. *Bocc. sc.* 9.
Morif. hist. 3. p. 337. f. 10 t. 1 f. 25.
Habitat in arenosis Belgii, Hispaniæ, Italiæ,
liæ. 2.
- portlandica.** 42. **EUPHORBIA umbella quinquefida**: dichotomis involucellis subcordatis concavis, foliis lanceolatis acutis glabris patentibus. *Hudf. angl.*
Tithymalus montanus, esulæ folio, minor in
Barr. ic. 822.
Tithymalus maritimus minor. *Raj. syn.* 3. p. 124. f. 6.
Habitat in Angliæ Devonshire. †
Caules *Fruticulosi, palmares, glabri, teretes, rubri.*
Folia *alterna, subsessilia, lineari-lanceolata,*

ata, glabra, patentia, basi subtus rubra. Ramuli
 terales : ex alis inferioribus steriles, demum ex-
 escentes & caulem inumbrantes. Umbellæ termi-
 nales, quinquefida, dichotomæ, patentes. Involucrum
 aliis simile. Involucella subcordata, concava, mucronata.
 Flores subsessiles, lutei : Primi & secundarii
 masculi : Petalis muticis, obtusissimis ; Reliqui
 hermaphroditi : Petalis bicornibus. Fructus glabri
 rugulis muricatis.

UPHORBIA umbella subquinquefida : bifida, in- Paralias,
 involucellis cordato-reniformibus, foliis sursum im-
 ricatis. *Amæn. acad.* 3. p. 129. *Huds. angl.* 183.

Uphorbia inermis, foliis setaceo-linearibus confertis,
 umbella universaliter multifida, partialibus ramose bi-
 fidis. *Hort. cliff.* 200. *Roy. lugdb.* 193. *Gort. gelr.*
 06. *Gron. orient.* 162.

Uphorbium mymalus maritimus. *Bauh. pin.* 291. *Dod. pempt.*
 70. f. 1. 2.

Uphorbium mymalus paralias. *Cam. epit.* 962.

Uphorbium inermis in Europæ arena maritima. 4

UPHORBIA umbella quinquefida : dichotoma, aleppica.
 involucellis ovato-lanceolatis mucronatis, foliis in-
 terioribus setaceis. *Amæn. acad.* 3. p. 122.

Uphorbium mymalus foliis inferioribus capillaceis : superioribus
 pyriformibus. *Morif. hist.* 3. p. 338.

Uphorbium mymalus cyparissius. *Alp. exot.* 65. t. 64.

Uphorbium inermis in Creta, Aleppo. 4

UPHORBIA umbella quinquefida : dichotoma, vegetalis.
 involucellis cordatis acutis, foliis lineari-lanceolatis,
 tenuibus floriferis. *Amæn. acad.* 3. p. 121. * *Huds.*
 37. 182.

Uphorbium inermis, foliis alternis linearibus acutis, par-
 tialibus umbellæ ovato-rhombeis, petalis bicornibus.
Hort. ups. 142. *

Uphorbium inermis, foliis linearibus acutis ad umbel-
 lam quinquefida isoscelibus, ad umbellulas ter dichotomas
 ovato-trigonis *Sauv. monsp.* 46.

Uphorbium mymalus annuus, lunato flore, linariæ folio lon-
 gioris. *Morif. hist.* 3. p. 339. f. 10. t. 2. f. 3.

Uphorbium mymalus maritimo affinis, linariæ folio. *Bauh. pin.*
 1?

Tithymalus segetum longifolius. Raj. angl. 3. p.
Habitat in Mauritania. ☉

helioscopia. 46. **EUPHORBIA** umbella quinquefida : trifida :
 toma , involucellis obovatis , foliis cuneiformib
 ratis. *Amæn. acad. 3. p. 124. **

Euphorbia foliis crenatis , umbella universali qu
fida pentaphylla , partialibus trifidis , propriis tr
lis. Hort. cliff. 198. Fl. svec. 436. 425. Roy.
197. Dalib. parif. 156

Euphorbia inermis , foliis subrotundis crenatis. Fl
220.

Tithymalus helioscopius. Bauh. pin. 291. Fuch
811.

Habitat in Europæ cultis. ☉

Umbellæ radii bis trifidi , dein dichotomi ☉ In
foliis similia.

ferrata.

47. **EUPHORBIA** umbella quinquefida : trifida : d
 toma , involucellis diphyllis reniformibus ,
 amplexicaulibus cordatis ferratis. *Amæn. acad.*
*125. **

Euphorbia inermis , foliis denticulatis caulipis la
latis , umbellarum cordatis. Hort. cliff. 200.
*upf. 141. * Roy. lugdb. 197.*

Tithymalus characias , folio ferrato. Bauh. pin. 290

Tithymalus myrtites valentinus. Clus. hist. 2. p. 189

Habitat in Narbona , Hispania , Italia , Orient

verrucosa.

48. **EUPHORBIA** umbella quinquefida : subtrifida
 fida , involucellis ovatis , foliis lanceolatis serr
 villosis , capsulis verrucosis. *Amæn. acad. 3. p. 124*
Huds. angl. 183.

Euphorbia inermis , foliis linearibus , umbella univ
trifida triphylla , partialibus trifidis , propriis di
tomis diphyllis , foliolis subrotundis. Guett. p.
269. Dalib. parif. 154.

Tithymalus myrsinites , fructu verrucæ simili. J
pin. 291.

Tithymalus foliis subhirsutis ad caulem ellipticis ,
*floribus binis subrotundis. Hall. hel. 191. **

Habitat in Gallia , Helvetia , Italia , Oriente. ♂

Fructus verrucosus simulque villosus.

corollata.

49. **EUPHORBIA** umbella quinquefida : trifida :
 di

rotoma, involucellis foliisque oblongis obtusis, pediculis membranaceis. *Amæn. acad. 3. p. 122.*

Urbia inermis, foliis lanceolatis obtusis alternis, ramis floriferis dichotomis, petalis maximis subrotundis. *Gron. Virg. 58.*

Urbia marianus, angustis rigidis foliis; summo ramulo ramosus, foliis atque ramulis ad divaricationes ternis. *Pluk. mant. 182. t. 446. f. 3.*

Urbia in Virginia, Canada.

UPHORBIA umbella quinquesida: trifida: dichotoma, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, capsulis natis. *Amæn. acad. 3. p. 123. **

Urbia inermis fruticosa, foliis lanceolatis, involucrio universali quinquesido; partialibus trifidis, reliquis bifidis. *Hort. upf. 142. * Roy. lugdb. 198.*

Urbia arborea, caule corallino, folio hyperici; Ericarpiio barbato. *Bærh. lugdb. 1. p. 256.*

Urbia in Sicilia, Mauritania, Oriente. 24

UPHORBIA umbella quinquesida: trifida: bifida, involucrio ovatis, petalis integris, foliis lanceolatis bipilosis apice serrulatis.

Urbia foliis alternis ex ovali-lanceolatis; umbellæ diphyllis subtrifloris, capsulis erectis muricatis, caule simplici. *Gmel. sib. 2. p. 226. t. 93.*

Urbia palustris villosus mollior erectus. *Barr. ur. 41. t. 885.*

Urbia incanus hirsutus. *Bauh. pin. 292. ? prodr. 35. ?*

Urbia Characias pratensis incanus. *Magn. monsp. 55.*

Urbia in Sibiria: 24

Urbia exacte *E. palustris*, ut facile pro eadem sumatur, eodemque tempore floret; paulo tamen major.

Urbia lato lanceolata, alterna; utrinque vix manifeste pilosa; apice ita tenuissime serrata; ut vix observetur serraturæ. Umbellæ cum umbellulis laterales ita coacervatæ; ut primariæ difficiliter eruatur;

et petalis & involucrio. Flores primariæ masculinæ pentapetalæ; reliqui hermaphroditi tetrapetalæ; petalis transverse ovalibus. Fructus verrucosi & pilosis albis subtilissimis adpersi.

Rami steriles ex aliorum inferiorum, ut ex summis alii pedunculati umbelliferi.

orientalis.

52. EUPHORBIA umbella quinquefida : quadrifida : chotoma, involuclis subrotundis acutis, foliis lanceolatis. *Amæn. acad. 3. p. 123.*

Euphorbia inermis, foliis lanceolatis, involucro universaliali quinquefido lanceolato, partiali tetrastylis subrotundo, propriis diphyllis. *Roy. lugdb. 198.*

Tithymalus orientalis, falcis folio, caule perfoliatis flore magno. *Tournef. cor. 2.*

Habitat in Oriente.

platyphylla.

53. EUPHORBIA umbella quinquefida : trifida : chotoma, involuclis carina pilosis, foliis serratis lanceolatis, capsulis verrucosis. *Syst. nat. 10. p. 42. 47.*

Euphorbia umbella quinquefida : subquadrifida : chotoma, involuclis primariis tetraphyllis, foliis serratis lanceolatis sessilibus. *Amæn. acad. 3. p. 124.*

Euphorbia inermis, foliis alternis lanceolatis serratis caulibus subserratis, umbella universaliali quinquefida pentaphylla, partialibus bifidis. *Hort. upf. 144.*

Euphorbia inermis, foliis lanceolatis, umbella universaliali partialiumque prima quinquefida : secundaria : reliquis bifidis. *Roy. lugdb. 198. Dalib. part. 1.*

Tithymalus arvensis latifolius germanicus. *Boiss. 291.*

Tithymalus platyphyllos. *Fuchf. hist. 813.*

Habitat in agris Galliæ, Angliæ, Germaniæ. ☉.

Caulis erectus, pedalis, glaber. Folia alterna, repandentia, lanceolata, glabra, serrulata, coriacea, nervis rarissimis : inferiora subpetiolata, versus latera deflexa; superiora basi emarginata & supra basi latera deflexa. Involucrum lanceolatum. Involucella partialia ovato-oblonga; reliqua ovato-oblonga, omnia serrulata. Petala suborbiculata, Germine obscure verrucosa. Ex alis foliorum bellula trifida. Planta superior viridi-flavescescens.

* * * * * Umbella multifida.

Efula.

54. EUPHORBIA umbella multifida : bifida : involuclis subcordatis, petalis subbicornibus, ramulibus foliis uniformibus. *Amæn. acad. 3. p. 127.*

Euphorbia inermis, foliis lanceolato-linearibus lucris universalis foliis quinque ovato-acutis, partialibus semiorbiculatis. *Hort. upf. 141. Sauv. monsp. 47.*

horbia inermis, foliis ligulatis patulis ad umbellam
 unius ovato-oblongis acutis, bracteis trigonis. *Sauv.*

monsp. 51?

var. *inermis* lithospermi majoris folio. *Magn. monsp.*

4?

var. *minor*. *Dalech. hist.* 1653. *Dod. pempt.* 374.

var. *inermis* in Germania, Belgio, Gallia. 24

var. *inermis* omnes fertiles: petala flavescencia, 4, obsolete

inermis? Fructus glaber. Umbellæ caulis laterales

abotomæ.

PHORBIA umbella multifida: dichotoma, in- Cyparissias.

volucellis subcordatis, ramis sterilibus foliis fetaceis,

foliis lanceolatis. *Amxn. acad.* 3. p. 127.

var. *inermis*, foliis confertis linearibus, umbella

inversa multifida, partialibus dichotomis: foliolis

profundis. *Hort. cliff.* 199. * *Hort. upf.* 142. *

var. *inermis* *ly. lugdb.* 197. *Dalib. paris.* 155. *Gort. gelr.* 105.

var. *inermis* *inermis* cyparissius. *Bauh. pin.* 291. *Dalech. hist.*

44.

var. *inermis* *inermis* cypressinus. *Tabern. hist.* 990.

var. *inermis* in Misinæ, Bohemiæ, Helvetiæ, G. Narbo-

nis collibus, viis, siccis.

PHORBIA umbella suboctifida: bifida, involu- Myrsinites.

cellis subovatis, foliis spatulatis patentibus carnosis

marginatis margine scabris. *Amxn. acad.* 3. p. 128. *

var. *inermis*, foliis superioribus reflexis latiori-

bus lanceolatis, umbella universali trifida, partiali-

bus bifidis. *Hort. cliff.* 199. *Hort. upf.* 141.

var. *inermis*, foliis ligulatis spinula terminatis, ad

umbellam duodenis, bracteis trigonis spinula termi-

nis. *Sauv. monsp.* 51.

var. *inermis* *inermis* myrsinites latifolius. *Bauh. pin.* 290.

var. *inermis* *inermis* myrsinites legitimus. *Clus. hist.* 2. p. 189.

var. *inermis* in Calabria, Montpelii. 24

var. *inermis* multi, pedales, deflexi, virides, inferne aca-

foliorum cicatrifati. Folia alterna, spatulata,

ovata, concava, glauco-viridia, patentia, mucro-

ta, margine subscabra, superiora reflexa. Umbel-

la 7 - 9 fida, ramiis semel bifidis. Involucrum u-

nersale foliolis 7 - 9, ovatis, tenuioribus, acutis;

involucella diphylla, subcordata, latiora, concava,

ovata, margine subscabra. Flores intra involucella

primaria & secundaria masculi, reliqui hermaphro-

*diti. Calyces ore serrati. Petala 4, flava, l
nia apicibus teretibus, nitentia. Capsulæ glabræ.*

palustris.

57. EUPHORBIA umbella multifida: subtrifida: bi
involucellis ovatis, foliis lanceolatis, ramis steri
*Amæn. acad. 3. p. 126. **

Euphorbia foliis lanceolatis, umbella universali
fida polyphylla: partialibus trifidis triphyllis: pri
dichotomis. *Hort. cliff. 200. Fl. suec. 438; 4
Mat. med. 255. Roy. lugdb. 198. Dalib. parif.
Gort. gelr. 307.*

Tithymalus palustris fruticosus. *Bauh. pin. 292.*

Efula major. *Dalech. hist. 1653.*

Habitat in Suecia australi, Germania, Belgio. ¶

hiberna.

58. EUPHORBIA umbella sexfida: dichotoma, i
lucellis ovalibus, foliis integerrimis, ramis an
capsulis verrucosis. *Amæn. acad. 3. p. 128. l
angl. 185.*

Tithymalus latifolius hispanicus. *Bauh. pin. 291. Td
hist. 987.*

Tithymalus hibernicus, vasculis muricatis erectis l
elth. 387. t. 290. f. 374.

Habitat in Hibernia, Sibiria, Austria, Pyrenæis. ¶

dendroides.

59. EUPHORBIA umbella multifida: dichotoma,
volucellis subcordatis: primariis triphyllis, caule
boreo. *Amæn. acad. 3. p. 128. **

Tithymalus myrtifolius arboreus. *Bauh. pin. 292.*

Tithymalus dendroides. *Cam. epit. 965.*

Habitat in Italia, Creta, Insulis Stœchadum. ¶

amygdaloi-
des.

60. EUPHORBIA umbella multifida: dichotoma,
volucellis perfoliatis orbiculatis, foliis obtusis. *l
acad. 3. p. 126.*

Tithymalus characias amygdaloides. *Bauh. pin. 292.*

Habitat in Gallia, Germania.

Characias.

61. EUPHORBIA umbella multifida: bifida, involu
lis perfoliatis emarginatis, foliis lanceolatis integ
mis, caule perenni. *Amæn. acad. 3. p. 126. **

Euphorbia inermis, foliis lanceolatis, umbella uni
fali multifida, partialibus dichotomis, involucris
bifidis perfoliatis. *Hort. cliff. 199. Hort. upf. 4
Roy. lugdb. 197.*

lymalus characias rubens peregrinus. Bauh. pin. 290.
lymalus characias 1. Clus. hist. 2. p. 188.
itat in Gallia, Hispania, Italia, Germania. b
les quadripedales, fruticosi, secundum annos ramo-
, crassitie digiti. Rami annotini superne crassiores,
villosi, infra folia adpersi cicatricibus transversis.
amus florifer primo vere ex apice ramorum ex-
escit, fruticat, perit, cum ad latera baseos novi
uni prodeunt. Folia lanceolata, coriacea, subto-
entosa, viridia, reflexa nervo utrinque elevato,
rus flores laticora obtusiora. Umbella parva, con-
rta, terminalis, sessilis: Radiis numerosis, semel bi-
tis. Involucrum universale polyphyllum, sublan-
olatum, parvum, reflexum; Involucella perfoliata,
nibida. Flores intra involucella primaria ma-
di, reliqui hermaphroditi; omnes Petalis 4, pur-
treis, humidis. Germina villosa.

OPHORBLIA umbella quinquefida: bifida, involu- sylvatica.
ellis perfoliatis subcordatis acutiusculis, foliis lan-
ceolatis integerrimis.

lymalus lunato flore. Col. ecpr. 2. p. 56. t. 57.
lymalus sylvaticus, lunato flore. Bauh. pin. 290.
loris. hist. 3. p. 335. f. 10. t. 1. f. 3.
itat in Europa australiore. b
is nimium E. Characia, unde etiam conjungitur
Hallero, Allionio; Involucelli foliola unita quidem
m, sed non emarginata.

PENTAGYNIA.

GLINUS.

GLINUS. Læfl. it. 145. * Gron. orient. 143. lotoides.
le lotoides sicula. Bocc. sic. 21. t. 11. Moris. hist.
p. 552.
le heliotropio cognata. Cup. cath.
ulaca bætica, luteo flore, spuria aquatica. Barr. rar.
8. t. 336.
itat ab Hispania in Asiam, ad fossas, locis inun-
tis. ©

OCTAGYNIA.

ILLICIUM.

anifatum.

1. ILLICIUM. †

Sedum vulgo Skimmi. *Kæmpf. amæn.* 880. t. 881.*Habitat in Japonia, China.* ‡*Planta a me non visa, fide Kæmpferi recepta, Anisum stellatum officinarum, quod adjectum traadenti ocellari ejus auget venenum.*

DODECAGYNIA.

SEMPERVIVUM.

arborescens.

1. SEMPERVIVUM caule arborescente læviter

Sempervivum caule inferne nudo lævi ramoso. *Hort. cliff.* 179. *Hort. ups.* 118. *Roy. lugdb.* 456.Sedum majus arborescens, flosculis candidis. *Pin.* 282. *Bradl. succ.* 4. p. 1. t. 31.Sedum majus legitimum. *Clus. hist.* 2. p. 58.*Habitat in Lusitania, Creta, Corcyra, Zacintho.*

canariense.

2. SEMPERVIVUM caule foliorum rudibus lævi
foliis retusis.Sempervivum caule infra folio lacero, foliis corymbiformibus; summis subrotundis. *Hort. cliff.* 179. *lugdb.* 457.Sedum canarium, foliis omnium maximis. *Comm.* 2. p. 189. t. 95.Sedum majus canarium acaulon, pilis ad oras firmis hispidis. *Pluk. alm.* 340. t. 314. f. 1. *Rajf.* 362.*Habitat in Canariis.* ‡

testaceum.

3. SEMPERVIVUM foliis ciliatis, propaginibus
tentibus.Sempervivum foliis radicalibus carnosissimis ciliatis, tenuibus inbricatis membranaceis, corymbo racemoso flexo. *Hort. cliff.* 179. *Fl. svec.* 395; 428. *Mull.* 222. *Roy. lugdb.* 457.Sempervivum majus alterum s. Barba jovis. *penpt.* 127.Sedum majus vulgare. *Bauh. pin.* 283.*Habitat in Europa testis & collibus.* 4

EMPERVIVUM foliis ciliatis, propaginibus glo- globiferum.
bosis.

empervivum foliis radicalibus in globum congestis
ciliatis, propaginibus globosis. *Hort. cliff.* 180. *Roy.*
lugdb. 457.

≡dum majus vulgari simile, globulis decidentibus.
Morif. hist. 3. p. 472. f. 12. t. 7. f. 18.

≡dum vulgari magno simile. *Bauh. hist.* 3. p. 588.

abitat in Rutheno. *D. Gmelin.* 24

ores flavi, nec rubri.

EMPERVIVUM foliis caule petalorumque apici- hirtum.
bus hirtis. *Amæn. acad.* 4. p. 273.*

≡dum majus montanum, foliis dentatis. *Bauh. pin.*
283. *Raj. hist.* 1. p. 588.

Styledon altera montana. *Clus. hist.* 2. p. 63.

abitat in Taurero raftadiensis: 24

ores albi sunt, ceterum nimis affinis *S. montano*
globifero.

EMPERVIVUM foliis ciliatis, propaginibus patulis, montanum.

≡dum rosulis liberis, foliis lævibus. *Hall. helv.* 393.

≡dum alpinum, rubro magno flore. *Bauh. pin.* 284.

≡dum majus montanum, foliis non dentatis, floribus
rubentibus. *Bauh. pin.* 283.

≡dum minus, flore rubente. *Best. eyf. vern.* 6. t. 8.

f. 2.

abitat in rupibus Helvetiæ. 24

EMPERVIVUM foliis pilis intertextis, propagini- arachnoide-
bus globosis. um.

empervivum foliis radicalibus in globum congestis:
villis reticulatim connexis. *Hort. cliff.* 180. * *Roy.*
lugdb. 457.

empervivum rubrum montanum gnaphaloides. *Col.*
cephr. 1. p. 292. t. 291.

≡dum montanum tomentosum. *Bauh. pin.* 284.

abitat in Alpibus Italiæ, Helvetiæ, Pyrenæis. 24

Classis XII.

ICOSANDRIA

MONOGYNIA.

CACTUS.

* Echino-Melocacti *subrotundi*.mammilla-
ris.

1. CACTUS subrotundus tectus tuberculis ovatis
batis. *Hort. cliff.* 181. *Hort. upf.* 119. *Roy. lugdb.*
EchinoMelocactus minor lactescens, tubercu-
mammillis majoribus. *Herm. par.* 136. t. 136.
Ficoides f. Melocactus mammillaris glabra
rens fructum suum undique fundens. *Pluk.*
148. t. 29. f. 1.

Ficoides f. Ficus americana sphaerica tuberculata
scens, flore albo. *Comm. hort.* 1. p. 105. t. 55.
succ. 3. p. 11. t. 19.

Habitat in Americae calidioris rupibus. †

Conf. Melocactus minimus lanuginosus & tub
Plum. spec. 19. ic. 201. f. 1.

Ficoides f. Melocactus minima lanuginosa, spi-
rioribus, fructu sparsim egrediente. *Pluk. alm.*
29. f. 2.

Melocactus.

2. CACTUS subrotundus quatuordecim-angularis
cliff. 181. *Hort. upf.* 119. *Roy. lugdb.* 279.
Cactus humilis subrotundus sulcatus & cora-
spinis confertis. *Brown. jam.* 238.
Melocactus indiae occidentalis. *Bauh. pin.* 384.
EchinoMelocactus. *Clus. exot.* 92. t. 92. *Brad.*
4. p. 9. t. 32.
Habitat in Jamaica, America calidiore. †

* * Cerei angulati erecti.

heptagonis.

3. CACTUS erectus oblongus septemangularis.
cliff. 181. * *Roy. lugdb.* 279.
Habitat in America. †
Historia Cactorum angulatorum 3 — 14, quoru
rimas species Plumier in iconibus sibi, e

obscura permansit, quam itaque attenti per Indias peregrinatores graphice describant.

ACTUS quadrangularis longus erectus : angulis tetragonus. compressis. *Hort. cliff.* 181. *Hort. upf.* 119. *Roy. lugdb.* 280.

ereus erectus minor, fructu spinoso, costarum numero varians. *Herm. par.* 117.

Habitat in Curassao, America calidiore. †

ACTUS erectus sexangularis longus. *Hort. cliff.* hexagonus 181. *Hort. upf.* 119. *Roy. lugdb.* 279.

ereus surinamensis. *Eph. N. C.* 3. p. 349. t. 7, 8.

ereus erectus altissimus surinamensis. *Herm. par.* 116. *Raj. dendr.* 23.

ereus erectus maximus americanus hexangularis, flore albo radiato. *Bradl. succ.* 1. p. 1. t. 1.

elocactus monoclonos, flore albo, fructu atropureo. *Plum. spec.* 19. ic. 191 ?

Habitat Surinami. †

ACTUS subquingularis erectus longus artic. pentagonus. latus. *Hort. cliff.* 182. * *Roy. lugdb.* 280.

Habitat in America.

ACTUS erectus longus octangularis : angulis compressis undatis ; spinis lana longioribus. *Hort. cliff.* 182. *Roy. lugdb.* 279. repandus.

actus erectus cylindraceus sulcatus tenuior summitate attenuatus, aculeis confertis. *Brown. jan.* 238.

ereus altissimus gracilior, fructu extus luteo, intus niveo seminibus nigris pleno. *Sloan. jam.* 197. *hist.* 2. p. 158. *Raj. dendr.* 22. *Trew. chret.* t. 14.

Habitat in America calidiore. †

ACTUS erectus longus subnovemangularis : angulis lanuginosus obsolete, spinis lana brevioribus. *Hort. cliff.* 182. *Roy. lugdb.* 279.

ereus curassavicus erectus maximus, fructu rubro non spinoso, lanugine flavescente. *Herm. par.* 115. t. 115.

Habitat in Curassao. †

ACTUS erectus longus suboctangularis : angulis peruvianus. obtusis. *Hort. cliff.* 181. *Hort. upf.* 120. *Roy. lugdb.* 279.

Cactus cylindraceus erectus sulcatus major somn obtusus, aculeis confertis. Brown. jam. 238.

Cereus erectus, fructu rubro non spinoso. Herm. 114.

Cereus peruvianus spinosus, fructu rubro nucis m tudine. Bauh. pin. 458.

Euphorbii arbor cerei effigie. Lob. ic. 2. p. 25.

Habitat in Jamaicae, Peru apricis aridis maritimis. †

Royenl.

10. **CACTUS** erectus articulatus subdecangularis: tuculis subovatis, spinis lanam æquantibus. *lugdb. 279.*

Habitat in America. †

* * * *Cerei repentes radiculis lateralibus.*

grandiflorus

11. **CACTUS** repens subquingularis.

*Cactus scandens, angulis quinque pluribusque obt Hort. cliff. 182. Hort. ups. 121. * Roy. lugdb.*

Cereus scandens minor polygonus articulatus. icon. t. 90.

Cereus gracilis scandens ramosus plerumque sexa laris, flore ingenti atque fragranti. Trew. chyt. t. 31

E. N. C. 1752. v. 9. app. 184. t. 11, 12, 13.

Cereus americanus major articulatus, flore max nocte se aperiente s. suavissimum odorem spiti

Volk. hejp. 1. p. 133. t. 134.

Habitat in Jamaica; Vera Cruce. †

flagellifor.
x. is.

12. **CACTUS** repens decemangularis.

Cactus scandens, angulis decem obsoletis. Hort. 121.

Cereus minor scandens polygonus spinosissimus, purpureo. Ehret. sel. 2. f. 2. Trew. ehret. t. 30.

Ficoides americanum s. Cereus minima serpens ricana. Pluk. alm. 148. t. 158. f. 6. Sloan. jam. hist. 2. p. 158.

Habitat in America calidiore. †

parasiticus.

13. **CACTUS** repens teres striatus muticus.

Cactus parasiticus inermis aphyllus ramosus pro dens, ramulis gracilibus teretibus striatis. B jam 238.

Opuntia minima flagelliformis. Plum. spec. 6. ic. f. 2.

Habitat in America.

CACTUS repens triangularis.

triangularis.

actus triangularis scandens articulatus. *Hort. cliff.* 182.

Hort. upf. 121. *Roy. lugdb.* 280.

actus debilis brachiatus æqualis triquetrus scandens f. repens, spinis brevissimis confertis. *Brown. jam.* 468.

cereus americanus triangularis radicosus. *Bradl. succ.*

1. p. 4. t. 3. E. N. C. 1752. *v. 9. app.* 199. *t. 10. f.*

14. E. N. C. 1754. *v. 9. app.* 349. *t. 3.*

coccoides americanum, f. **Cereus erectus cristatus**, foliis triangularibus profunde canaliculatis. *Pluk. alm.*

147. t. 29. f. 2.

abitat in Brasilia, Jamaica.

**** *Opuntia compressa articulata prolifera.*

CACTUS articulato-prolifer, articulis globosis spinosis glomeratis. *moniliformis.*

telocactus, ex plurimis globulis opuntia modo nascentibus, spinosissimus. *Plum. spec.* 20. *ic.* 198.

abitat in America calidiore. h

CACTUS articulato-prolifer laxus, articulis ovatis, spinis setaceis. *Opuntia.*

actus compressus articulatus ramosissimus, articulis ovatis: spinis setaceis. *Hort. cliff.* 183. *Hort. upf.* 120.

Gron. virg. 54. *Roy. lugdb.* 280.

Cuntia vulgo herbariorum. *Bauh. hist.* 1. *p.* 154. *Mill. ic.* 191.

cus indica, folio spinoso, fructu majore. *Bauh. pin.* 458.

abitat in America, Peru, Virginia, nunc in Hispania, Italia, Lusitania. h. 2

CACTUS articulato-prolifer, articulis ovato-oblongis spinis setaceis. *Ficus indica.*

actus compressus articulatus ramosus, articulis ovato-oblongis, spinis setaceis. *Hort. cliff.* 183. *Hort. upf.* 120. *Roy. lugdb.* 280.

abitat in America calidiore. h

CACTUS articulato-prolifer, articulis ovato-oblongis, spinis subulatis. *Tuna.*

actus compressus articulatus ramosus, articulis ovato-oblongis, spinis subulatis. *Hort. cliff.* 183. *Hort. upf.* 120. *Roy. lugdb.* 280.

Cactus brachiatus articulatus, articulis oblongis compressis, caudice tereti erecto ferocissimo, brachiorum brevibus confertis. *Brown. jam.* 177.

Tuna major, spinis validis flavicantibus, flore. *Dill. elth.* 396. t. 295. f. 238.

Opuntia major, folio oblongo rotundo: spinis & validissimis, flore luteo. *Sloan. jam.* 107. p. 149. t. 224. f. 1.

Habitat in Jamaica & America calidiore. †

cochinillifer 16. **CACTUS** articulato-prolifer, articulis oblongis subinermibus.

Cactus compressus articulatus ramosus, articulis to-oblongis subinermibus. *Hort. upf.* 121.

Tuna mitior, flore sanguineo, cochinillifera. *Dill.* 399. t. 297. f. 383.

Ficus indica major lævis f. spinosa vermiculata. *Pluk. alm.* 146. t. 281. f. 383.

Opuntia maxima, folio oblongo rotundo marginulis nonnullis & innocentibus obsito. *Sloan.* 194. *hist.* 2. p. 152. t. 8. f. 1. 2.

Habitat in Jamaica & America calidiore. †

curassavicus. 20. **CACTUS** articulato-prolifer, articulis cylindricis ventricolis compressis.

Cactus tereti-compressus articulatus ramosus. *cliff.* 182. *Hort. upf.* 120. *Roy. lugdb.* 280.

Opuntia minima americana spinosissima. *Bradl.* p. 5. t. 4.

Ficus indica f. *Opuntia curassavica minima.* *hort.* 1. p. 107. t. 56.

Ficus indica f. *Opuntia minor caulescens* art in modum, ramis cineritiis, spinosissima. *Pl.* 147. t. 281. f. 3.

Habitat in Curassao. †

Phyllanthus 21. **CACTUS** prolifer ensiformi-compressus serpens.

Cactus foliis ensiformibus obtuse serratis. *H.* 183. *Roy. lugdb.* 281.

Cactus mitis minor, sarmento flexili rotundo, bus longis compressis crenatis, ad crenas. *Brown. jam.* 237.

Cereus scolopendri folio brachiato. *Dill. elth.* 64. f. 74.

ntia non spinosa minima caulescens, foliis pilosis
ictissimis e crenis foliorum florem proferens. *Sloan.*
n. 216. hist. 2. p. 159.

llanthos americana, sinuosis foliis longis. *Pluk.*
n. 296. t. 247. f. 5.

s f. Opuntia non spinosa, scolopendriæ folio si-
lato. *Raj. dendr. 21.*

at in Brasilia, Surinamo, America meridionali. †

CTUS caule tereti arboreo: aculeis geminis re- Pereskia.
rvis, foliis lanceolato-ovatis. *Hort. upf. 122.*

us Lamentosus foliatus spinosus, spinis geminis
curvis, foliis mollibus ovatis. *Brown. jam. 237.*

skia. *Hort. cliff. 122. Roy. lugdb. 281.*

skia aculeata, flore albo, fructu flavescente. *Plum.*
1. 37. Dill. elth. 305. t. 227. f. 294.

us americana spinosa, portulacæ folio, fructu fo-
sso, semine reniformi splendente. *Comm. hort. 1.*
135. t. 70.

ulaca americana latifolia ad foliorum ortum lanu-
e obducta, longioribus aculeis horrida. *Pluk. alm-*
5. t. 215. f. 6.

ulariæ fructu majore arbor spinosa, fructu folio-
viridi-albicante. *Sloan. jam. 165. hist. 2. p. 86. Raj.*
utr. 27.

at in America calidiore, Jamaica, Margaretha. †

CTUS caule tereti arboreo spinoso, foliis cunei- portulacifolius.
mibus retusis.

tia arbor spinosissima, foliis portulacæ cordatis.
m. spec. 6. ic. 197. f. 1.

at in America calidiore. †

us hujus minime foliis adpersus, uti præcedentis.

PHILADELPHUS.

LADELPHUS foliis subdentatis.

coronarius.

delphus. *Hort. cliff. 188. Hort. upf. 122.*

ga alba f. Philadelphus athenæi. *Bauh. pin. 399.*

x coronarius. *Clus. hist. 1. p. 55.*

at Veronæ? †

primarius quinquefidus calyce, corolla, pistillo,
sula. *Phil. bot. 178. Petala æstivantia obvoluta*
sole. Gemmis caret.

- inodorus. 2. PHILADELPHUS foliis integerrimis. *Mill.*
 Philadelphus flore albo majore inodoro. *Catesb.*
 2. p. 84. t. 84.
Habitat in Carolina. †

PSIDIUM.

- pyriferum. 1. PSIDIUM foliis lineatis obtusiusculis, pedunculis
 nifloris.
 Psidium caule quadrangulo. *Hort. cliff.* 148. *Fl.*
 192.
 Guajava foliorum angulis quadrangulis, fructu ob
 go. *Trew. ehr.* t. 43.
 Guajava alba dulcis. *Comm. hort.* 1. p. 121. t. 63.
surin. 19. t. 19.
 Guajavos fructu pallido dulci. *Burm. zeyl.* 112.
 Cujavus domestica. *Rumph. amb.* 1. p. 140. t. 47.
 Pela. *Rheed. mal.* 3. p. 31. t. 34.
Habitat in Indiis. †

- pomiferum. 2. PSIDIUM foliis lineatis acuminatis, pedunculis
 floris.
 Guajava alba acida, fructu rotundiore. *Pluk. alm.*
 t. 193. f. 4.
 Guajabo pomifera indica : pomis rotundis. *Bauh.*
 437.
 Cujavus agrestis. *Rumph. amb.* 1. p. 149. t. 4.
surin. 57. t. 57.
 Malacca pela. *Rheed. mal.* 3. p. 33. t. 35.
Habitat in Indiis. †

EUGENIA.

- malaccensis. 1. EUGENIA foliis integerrimis, pedunculis
 lateralibus. *Fl. zeyl.* 187.
 Perfici officulo fructus malaccensis rubens. *Bauh.*
 441.
 Jambosa domestica. *Rumph. amb.* 1. p. 121. t. 37.
 Nati-schambu. *Rheed. mal.* 1. p. 29. t. 18. *Raf.*
 1748.
Habitat in India. †
- Jambos. 2. EUGENIA foliis integerrimis, pedunculis
 terminalibus. *Fl. zeyl.* 188.*
 Perfici officulo fructus malaccensis ex candido
 scens. *Bauh. pin.* 441.

ambosa sylvestris alba. *Rumph. amb. 1. p. 127. t. 39.*
 Malacca Ichambu. *Rheed. mal. 1. p. 27. t. 17. Raj. hist.*
 1478.

Habitat in India. †

EUGENIA foliis integerrimis, pedunculis unifloris uniflora.
 lateralibus. *Fl. zeyl. 189.*

eugenia. *Roy. lugdb. 265*

eugenia indica, myrti folio deciduo, flore albo, fru-
 ctu suave rubenti molli leviter sulcato & odoro.
Mich. gen. 226 t. 108.

Myrtus indica, foliis rigescentibus latis ac recurvis pa-
 rum odoratis. *Till. pisf. 117. t. 44.*

Habitat in India. †

EUGENIA foliis crenatis, pedunculis terminalibus, acutangula,
 pomis oblongis acutangulis. *Fl. zeyl. 190. **

tonica terrestris rubra. *Rumph. amb. 3. p. 181. t.*
 115.

Geria-samstravadi. *Rheed. mal. 4. p. 51. t. 7. Raj.*
hist. 1480.

Habitat in India. †

EUGENIA, foliis crenatis, racemis longissimis, po- racemosa.
 mis ovatis. *Fl. zeyl. 191. **

tonica sylvestris alba. *Rumph. amb. 3. p. 181. t. 116.*

stravadi s. Caibatsumbu. *Rheed. mal. 4. p. 11. t. 16.*

Raj. hist. 1479.

Habitat in India. †

M Y R T U S.

MYRTUS floribus solitariis: involucro diphylo. communis.

Hort. cliff. 42. Hort. upf. 123. Mat. med. 224. Roy.

lugdb. 269.

myrtus folus ovatis, pedunculis longioribus. *Mill. dict. romana.*

t. 184. f. 1.

myrtus latifolia romana. *Bauh. pin. 468.*

myrtus foliis ovatis, baccis rotundioribus. *Mill. tarentina.*
dict.

myrtus minor vulgaris. *Bauh. pin. 469.*

myrtus foliis ovato lanceolatis acutis, ramis rectio- italica.
 ribus. *Mill. dict.*

myrtus communis italica. *Bauh. pin. 468.*

myrtus foliis ovato-lanceolatis confertis, *Mill. dict. botica.*

mei Spec. plant. pars. I. U u

Myr-

- Myrtus latifolia boëtica 2. *Bauh. pin.* 469. *Clus. I. p.* 65.
- lusitanica.* 2. Myrtus foliis lanceolato ovatis acutis. *Mill. bot.* 57.
Myrtus sylvestris, foliis acutissimis. *Bauh. pin.*
Clus. hist. I. p. 66. f. 1.
- belgica.* 2. Myrtus foliis lanceolatis acuminatis. *Mill. bot.* 57.
Myrtus latifolia belgica. *Bauh. pin.* 469.
- mucronata.* 7. Myrtus foliis lineari lanceolatis acuminatis. *Mill. bot.* 57.
Myrtus foliis minimis & mucronatis. *Bauh. pin.*
Clus. hist. I. p. 67.
Habitat in Europa australi, Asia, Africa. †
- brasiliensis.* 2. MYRTUS floribus solitariis, pedunculis multitalis subciliatis.
Myrtus pomifera latissimis foliis. *Plum. spec.* 1. 207. f. 1. (*ob petala ciliata*).
Philadelphus arborescens, foliis myrtinis nitidissimis, ramulis gracilibus, pedunculis bipartitis. *Brown. jam.* 240.
Myrti folio arbor, cortice argenteo, foliis oblongis basi latioribus inodoris. *Sloan. jam.* 162. t. 78. t. 187. f. 3. *Raj. dendr.* 35.
Arbor brasiliensis, myrti laureæ foliis inodoris. *hort.* 1. p. 173. t. 89.
Habitat in Brasilia. D. *Wachend.* †
Folia ovata, obtusa, petiolata, glabra, opposita res solitarii, axillares, pedunculati, pedunculo. Corollæ petala 4. f. 5, lacero-ciliata se ovata, concava, reflexa. Stamina circiter
- biflora.* 3. MYRTUS pedunculis bifloris, foliis lanceolatis. *Amæn. acad.* 5. p. 398. *
Caryophyllus fruticosus, foliis lanceolatis et floribus geminatis alaribus. *Brown. jam.* 241. f. 3.
Habitat in Jamaica. †
- lucida.* 4. MYRTUS pedunculis subtrifloris, foliis sublanceolatis attenuatis.
Habitat Surinami. *Rolander.* †
Folia singulari structura, ex ovato admodum attenuata in apicem lanceolatum. Flores pentapetales
- tumini.* 5. MYRTUS pedunculis multifloris, foliis lanceolatis. *Fl. Zeyl.* 185. *

Jambosa ceramica. *Rumph. amb. i. p. 136. t. 41.*

Habitat in Zeylona. †

MYRTUS pedunculis trichotomo-paniculatis; foliis oblongis floribus dioicis.

Habitat in America. *Miller.* †

Folia opposita, lanceolato-ovata, crassa. Pedunculi axillares & terminales; brachiato-paniculati; longitudine foliorum. Petala paucā.

MYRTUS pedunculis dichotomis paniculatis tomentosi, foliis geminis subovatis terminalibus. *Chytraculia. Am. en. lia. acad. 5. p. 398. **

Chytraculia arborea, foliis ovatis glabris oppositis, racemis terminalibus. *Brown. jam. 239. t. 37. f. 2. Pluk. phyt. 274. f. 2.*

Habitat in Jamaica. †

MYRTUS pedunculis multifloris, foliis geminis subovatis terminalibus, ramis dichotomis. *Zuzygium. Am. en. acad. 5. p. 398. **

Zuzygium fruticosum, foliis ovatis nitidis & ramulis ubique jugatis. *Brown. jam. 240. t. 7. f. 2.*

Habitat in Jamaica. †

MYRTUS pedunculis multifloris, foliis ovatis subpetiolatis. *zeylanica.*

Myrtus foliis ovatis acuminatis obtusiusculis. *Fl. zeyl. 182. **

Myrtus zeylanica odoratissima, baccis niveis monococcis. *Herm. ugdb. 434. t. 435.*

Myrtoides foliis ovatis. *Hort. cliff. 489. Roy. lugdb. 535.*

Habitat in Zeylona. †

MYRTUS pedunculis trifido-multifloris, foliis subovalibus sessilibus. *androfemoides. Fl. zeyl. 184. **

Habitat in Zeylona. †

MYRTUS pedunculis trifido-multifloris, foliis obovatis. *caryophyllata. Fl. zeyl. 183. Mat. med. 225.*

Caryophyllus aromaticus ind. occid. foliis & fructu rotundis. *Pluk. alm. 188. t. 155. f. 2.*

Habitat in Zeylona. †

- Pimenta.** 12. **MYRTUS** foliis alternis. *Fl. zeyl.* 186. *Nat.* 225.
Myrtus calycibus absque appendiculis. Hort. cliff.
Myrtus foliis oblongo-ovatis glabris alternis, rac
terminalibus & lateralibus. Brown. jam. 247.
Myrtus arborea aromatica, foliis laurinis. Slo
161. hist. 2. p. 76 v. 191. f. 1.
Caryophyllus foliis oblongo-ovatis alternis, rac
terminalibus & lateralibus. Brown. jam. 247.
Caryophyllus aromaticus americanus, lauri acumin
foliis, fructu orbiculari. Pluk. atm. 88. t. 155.
Habitat in India. †
- Leucaden-** 13. **MYRTUS** baccis sessilibus urceolatis, foliis
dra. ceolatis. †
Arbor alba. Rumph. amb. 2. p. 72. t. 16, 17.
Habitat in Amboina. †

PUNICA.

- Granatum,** 1. **PUNICA** foliis lanceolatis, caule arboreo. *H*
cliff. 134. *Hort. ups.* 122. *Mat. med.* 223. *Roy. l.*
267. Gron. orient 144.
Malus punica sylvestris. Bauh. pin. 438.
Malus punica fativa. Bauh. pin. 438.
Malus punica. Cam. epit. 130, 131.
 β. *Balaustia flore pleno majore & minore. Bauh.*
 438.
Habitat in Hispania, Italia, Mauritania, solo cretacea.
- nana.** 2. **PUNICA** foliis linearibus, caule fruticoso. *H*
dict. †
Punica americana nana s. humillima. Tournef.
 636.
Habitat in Antiliis. †

AMYGDALUS.

- Perfica,** 1. **AMYGDALUS** foliorum ferraturis omnibus
 tis, floribus sessilibus solitariis. *Hort. cliff.* 189. *H*
ups. 123. *Mat. med.* 230. *Roy. lugdb.* 267.
Perfica molli carne & vulgaris. Bauh. pin. 440.
Perfica rubra. Cam. epit. 145.
 β. *Nuciperfica, quæ nucum juglandium faciem re*
sentat. Bauh. pin. 440. *Kaj. hist.* 1516.
Habitat - - - †

Flores sessiles, gemmales, solitarii. Folia e gemma terminali, nec infra flores.

AMYGDALUS foliis serraturis infimis glandulosis, communis. floribus sessilibus geminis. *Hort. cliff.* 186. *Hort. upf.* 123. *Mat. med.* 229. *Roy. lugdb.* 267. *Gron. orient.* 146.

Amygdalus sylvestris. *Bauh. pin.* 442.

Amygdalus fativa. *Bauh. pin.* 441.

Amygdalus. *Dod. pempt.* 798.

Amygdalus amara. *Journes. inst.* 627.

Habitat in Mauritanix sepibus. †

Flores gemmales, sessilis s. subsessiles, sæpius bini. Folia e gemmis infra & supra flores locatis.

AMYGDALUS foliis basi attenuatis. *Hort. cliff.* 186. *Hort. upf.* 124. *Roy. lugdb.* 267. nana.

Amygdalus indica nana. *Pluk. alm.* 28. t. 11. f. 3. *Mill. dict.* t. 28. f. 2.

Armeniaca persicæ foliis, fructu exsucco. *Amm. ruth.* 273. t. 30.

Habitat in Asia septentrionali.

P R U N U S.

PRUNUS floribus racemosis, foliis deciduis basi sub. *Padus* tus biglandulosis

Padus glandulis duabus basi foliorum subjectis. *Hort. cliff.* 185. *Fl. svec.* 396; 431. *Roy. lugdb.* 269. *Hall. helv.* 347.

Padus foliis annuis. *Fl. lapp.* 198.

Cerasus racemosa sylvestris, fructu non eduli. *Bauh. pin.* 451.

Habitat in Europa. †

Racemi foliacei infra folia. Petala serrata ut in sequenti, nec emarginata ut in Ceraso.

PRUNUS floribus racemosis, foliis deciduis basi antice glandulosis. *virginiana.*

Cerasus sylvestris, fructu nigricante in racemis longis pendulis phytolaccæ instar congestis. *Gron. virg.* 54. *Roy. lugdb.* 537.

Cerasus latiore folio, fructu racemoso purpureo majore. *Catesb. car.* 2. p. 94. t. 94.

Habitat in Virginia, Carolina. †

Padi progenies, sed verrucæ in ramis duplo maj.
 Petioli antice ad apicem binis paribus glandul.
 Folia minus subtus reticulata & fere glabra.
 tala orbiculata, nec obovata. Fructus quadrupl.
 jores rubri.

- canadensis. 3. PRUNUS floribus racemosis, foliis lato-lanceo-
 rugosis utrinque pubescentibus.
 Cerasus pumila canadensis, oblongo angusto f
 fructu parvo. *Duham. arb. 1. p. 149.*
 Cerasus racemosa, foliis amygdalinis, americana. *l*
alm. 97. t. 158. f. 4
Habitat in America septentrionali. ♀
 Rami leves. Folia lato-lanceolata absque gland
 venoso-rugosa, minusque rigida quam in reliq
 acute serrata, utrinque viridia, ad tactum
 fesse villosa, & basi in petiolum desinentia.
- lusitanica. 4. PRUNUS floribus racemosis, foliis sempervire
 bus eglandulosis. *Mill. ic. 131. t. 196. f. 1.*
 Padus folii glandula destitutis. *Vir. cliff. 42. H*
upf. 126. Roy. lugdb. 269.
 Padus foliis sempervirentibus ovatis. *Hort. cliff. 1*
 Lauro Cerasus lusitanica minor. *Dill. elth. 193. t. 1*
f. 193.
Habitat in Lusitania, Pennsylvania. ♀
- Lauro-Cera- 5. PRUNUS floribus racemosis, foliis sempervire
 sus. bus dorso biglandulosis.
 Padus glandulis duabus dorso foliorum innatis. *l*
cliff. 42. Hort. upf. 126. Roy. lugdb. 269.
 Padus foliis sempervirentibus lanceolato-ovatis *h*
cliff. 185.
 Cerasus folio laurino. *Bauh. pin. 450.*
 Laurocerasus. *Clus. hist. 1. p. 4. Cam. hort. t. 23*
Habitat in Trapezunte, unde in Europam venit. 157
- Mahaleb. 6. PRUNUS floribus corymbosis, foliis ovatis.
 Cerasus foliis ovatis. *Vir. cliff. 43. Hort. upf.*
Hall. herb. 360. Roy. lugdb. 268. crenatis. Hort.
487.
 Ceraso affinis. *Bauh. pin. 451.*
 Mahaleb. *Cam. epit. 91.*
Habitat in Helvetia. ♀

*conduplicata, ovata, obtusa, crenata. Stipulæ
 æ dentibus fulcis. Corymbus convexus. Bra-
 brevissimæ, obtusissimæ, serratæ.*

NUS floribus sessilibus, foliis subcordatis. *Armeniaca.*
 foliis ovato-cordatis. *Hort. cliff. 186. Hort.*
124. Roy. lugdb. 268.

Armeniaca majora. *Bauh. pin. 442.*

Armeniaca majora, nucleo dulci. *Bauh. pin.*

Armeniaca minor. *Bauh. pin. 442.*

errantia convoluta.

NUS floribus sessilibus, foliis ovato-oblongis. *Sibirica.*
 iaca betulæ folio & facie, fructu exsucco. *Amm.*
272. t. 29.

in Sibiria.

satia distincta a præcedenti ?

NUS umbellis subsessilibus, foliis ovato-lan- *Cerasus.*
 tis conduplicatis glabris.

s foliis ovato-lanceolatis. *Vir. cliff. 43. Hort.*

125. Mat. med. 233. Roy. lugdb. 267. Hall. helv.

s sativa rotunda rubra & acida. *Bauh. pin. capromiana.*

s hortensis, flore roseo. *Bauh. pin. 450.*

rosea.

s hortensis, flore pleno, *Bauh. pin. 450.*

plena.

alba dulcia. *Bauh. pin. 450.*

dulcis.

carne tenera & aquosa. *Bauh. pin. 450.*

juliana,

s acidissima sanguineo succo. *Bauh. pin. 450.*

austera.

s pumila. *Bauh. pin. 450.*

pumila,

s racemosa hortensis. *Bauh. pin. 450.*

avium.

sativa majora. *Bauh. pin. 450.*

Bigarella.

crassa carne dura. *Bauh. pin. 450.*

Duracina.

s hortensis, flore pleno. *Bauh. pin. 450. Mill.*

t. 89. f. 1.

in Europa. †

conduplicata. Stipulæ dentatæ. Bractææ trifidæ.

æ : intermedia foliacea. Gemmæ terminales

æ, laterales floriferæ.

- avium. 10. PRUNUS umbellis sessilibus, foliis ovato-lanceatis conduplicatis subtus pubescentibus. *Fl. jav.* p. 474. *Huds. angl.* 187.
Cerasus sylvestris, fructu nigro & rubro. *Bauh. hist.*
Cerasus major f. *sylvestris*, fructu subdulci nigro-lore inficiente. *Bauh. pin.* 1539.
Cerasus sylvestris septentrionalis anglica, fructu parvo serotino.
Habitat in Europa borealiore. †
Nostra fructu rubro, nec nigro; horæo nec oportuna magnitudine certat cum Quercu.
- domestica. 11. PRUNUS pedunculis subsolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis muticis.
Prunus inermis, foliis lanceolato-ovatis. *Hort. d.* 186. *Hort. ups.* 124. *Mat. med.* 232. *Roy. lugd.* 2
Prunus sylvestris fructu majore. *Vaill. parif.* 140.
Prunus. *Bauh. pin.* 443.
- Damascena. β. *Pruna* majora dulcia & parva atro-cærulea. *Bauh.* 443. n. 23.
- hungarica. γ. *Pruna* magna crassa subacida. *Bauh. pin.* 443.
juliana. δ. *Pruna* oblonga cærulea. *Bauh. pin.* 443.
pertigona. ε. *Pruna* nigra, carne dura. *Bauh. pin.* 443.
cerea. ζ. *Pruna* coloris ceræ ex candido in luteum pallescit. *Bauh. pin.* 443.
- acinaria. η. *Pruna* magna rubra rotunda. *Bauh. pin.* 443.
maiormis. θ. *Pruna* rotunda flavida dulcia mali amplitudine. *B. pin.* 443.
- angustana. ι. *Pruna* angusto-maturescentia minora & angustiora. *B. pin.* 443.
- præcox. κ. *Pruna* parva præcocia. *Bauh. pin.* 443.
cereola. λ. *Pruna* parva ex viridi flavescens. *Bauh. pin.* 443.
amygdalina. μ. *Pruna* amygdalina. *Bauh. pin.* 443.
galatensis. ν. *Pruneoli* albi oblongiusculi acidi. *Bauh. pin.* 443.
Bignola. ο. *Pruna* ex flavo rufescentia mixti saporis gratissima. *Bauh. pin.* 443.
- ryobalaz. ξ. *Prunus* fructu rotundo nigro-purpureo dulci. *B. pin.* 444.
Habitat in Europæ australioris l. cis elevatis. †
Folia vernantia convoluta.
- insititia. 12. PRUNUS pedunculis geminis, foliis ovatis villosis convolutis, ramis spiniscentibus. *Acad.* 4. p. 273. * *Huds. angl.* 186.

mus sylvestris major. *Raj. hist.* 1528.
ma sylvestria præcocia. *Bauh. pin.* 444.
bitat in Germania, Anglia. †

'RUNUS pedunculis solitariis, foliis lanceolatis spinosa.
flabris, ramis spinosis. *Hort. cliff.* 186. *Fl. svec.* 397;
132. *viat. med.* 231. *Roy. lugdb.* 268. *Häll. he. v.* 355.
mus sylvestris. *Bauh. pin.* 444. *Tabern. ic.* 992.
bitat in Europæ collibus apricis. †

CHRYSOBALANUS.

IRYSOBALANUS. *Jacq. amer.* 23. *hist. t.* 94. Icaso.
co fructu ex albo ruiescente. *Plum. gen.* 44. ic.
58.

ico fructu nigro. *Plum. gen.* 44.

co fructu purpureo. *Plum. gen.* 44.

yfobalanus fruticosus, foliis orbiculatis alternis, flo-
ribus laxè racemosis. *Brown. jam.* 250. t. 17. f. 5
bitat in America meridionali. †

ecies an una vel plures vix dixero, quum tantum
nica mihi visa δ , quæ caule scabro non est, sed
folia alterna, subrotunda, integerrima, subemargina-
ta. Flores paniculati: Pedunculis exterius rotun-
datis, interius planis.

DIGYNIA.

C R A T Æ G U S.

RATÆGUS foliis ovatis inæqualiter ferratis sub- Aria.
us tomentosus. *Hort. cliff.* 187. *Fl. svec.* 398; 433.
Vir. cliff. 43. *Mat. med.* 234. *Roy. lugdb.* 271. *Sauv.*
nonsp. 306.

ri effigie, lanato folio major. *Bauh. pin.* 452.

ia. *Dalch. hist.* 202.

rbus alpina. *Bauh. hist.* 1. p. 65.

atægus inermis, foliis ellipticis ferratis transversaliter *suecica.*

inuatis subtus villosis. *Fl. lapp.* 199.

rbus sylvestris anglica. *Raj. hist.* 1459.

bitat in Europæ, Helvetiæ frigidis; β . in Svecia,
Anglia. †

RATÆGUS foliis cordatis spetangulis: lobis infi- torminalis-
nis divaricatis.

Cratægus foliis cordatis acutis: lacinulis acutis

Hort. cliff. 187. Roy. lugdb. 271. Sam. mon.

Sorbus torminalis & Cratægus theophrasti.

i. p. 63.

Sorbus torminalis. Cam. epit. 162. Edw. an 17

Mespilus, apii folio, sylvestris non spinosa, seu

torminalis. Bauh. pin. 454

Habitat in Anglia, Germania, Helvetia, Burgundia

coccinea.

3. *CRATÆGUS foliis ovatis repando-angulatis*

tis glabris. Hort. cliff. 187. Hort. upl. 126.

virg. 54. Roy. lugdb. 272.

Mespilus foliis cordatis ovatis acuminatis, marginibus

acute ferratis, ramis spinosis. Mi l. dict. t. 177

Mespilus, apii folio, virginiana spinis horrida,

amplo coccineo. Pluk. alm. 249. t. 46. f. 4.

Mespilus virginiana, colore rutilo. Bauh. pin.

Mespilus spinosa f. Oxyacantha virginiana

Angl. hort. 49. t. 13. f. 1.

Oxyacantha spina sancta dicta. Raj. hist. 1799.

Habitat in Virginia, Canada

Variat cum validis spinis lateralibus & absque

Stipulæ lineares. Folia basi subcuneiformia:

mea obovata, uti stipulæ & petioli glanduloso-

Crus galli.

4. *CRATÆGUS foliis lanceolato-ovatis ferratis*

bris, ramis spinosis. Kalm. it. 1. p. 244.

Mespilus foliis lanceolatis ferratis, spinis robustis

floribus corymbosis. Mill. dict. t. 178. f. 2.

Mespilus aculeata pyrifolia denticulata splendens

et uti insigni rutilo, virginienensis. Pluk. alm. 249

f. 1.

Mespilus pruni foliis, spinis longissimis fortibus,

rubro magno. Clayt. virg. 55.

Habitat in Virginia.

tomentosa.

5. *CRATÆGUS foliis cuneiformi-ovatis ferratis*

angulatis subtus villosis, ramis spinosis.

Mespilus inermis, foliis ovato-oblongis ferratis

tomentosis. Gron. virg. 55.

Mespilus caroliniana, apii folio, vulgari similis:

fructu luteo. Trew. chret. t. 17.

Mespilus virginiana, grossulariæ foliis. Pluk.

100. f. 1.

Habitat in Virginia.

ATÆGUS foliis lanceolato-ovatis subtrilobis viridis.
 ratis glabris, caule inermi.
 pilus inermis foliis oblongis integris acuminatis
 ratis parvis utrinque viridibus, *Gron. virg.* 163.
at in Virginia. †
læ semicordatæ.

ATÆGUS foliis lanceolatis ferratis, caule iner- indica,
 corymbis squamosis.
at in India. †

*x ramis inermibus. Folia lato-lanceolata, obtu-
 ferrata, crassiuscula, petiolata. Corymbi termi-
 es, pedunculis squamosis, bracteis subulatis.*

ATÆGUS foliis obtusis subtrifidis ferratis. *Hort. Oxyacan-
 f.* 188. *Fl. svec.* 399; 434. *Roy. lugdb.* 272. *tha.*
 pilus, apii folio, sylvestris spinosa f. *Oxyacantha.*
Bauh. pin. 454.
acantha f. Spina acuta. Dod. pempt. 751.
at in Europæ pratis apricis duris. †

ATÆGUS foliis obtusis subtrifidis subdentatis. *Azarolug.*
 pilus apii folio laciniato. *Bauh. pin.* 453.
 pilus Aronia veterum. *Bauh. hist.* I p. 67.
 pilus orientalis, apii folio, subtus hirsuto. *Poch. Aronia.*
ent. 189. t. 85.

at Florentiæ, Monspelii. †
*rre videtur ab Oxyacantha sola magnitudine, ut
 rbus domestica a sylvestri; in hac quadruplo majoro-
 omnia; spinæ in culta pauciores & sæpe nullæ.*

TRIGYNIA.

SORBUS.

SORBUS foliis pinnatis utrinque glabris. *Hall. heb. aucuparia.*
 10.
 us foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 188. *Fl. svec.* 400;
 5. *Mat. med.* 235. *Roy. lugdb.* 274. *Gron. orient.*
 11.
 us sylvestris, foliis domesticæ similis. *Bauh. pin.*
 5.
 us sylvestris. *Cam. epit.* 161.
at in Europæ frigidioribus, Libano. †

- hybrida. 2. **SORBUS** foliis semipinnatis subtus tomentosi
Cratægus fennica. Fl. fvec. 2. n. 433. γ.
Habitat in Gotlandia. ♀
Nova arbor e Cratægo Aria β. ☉ Sorbo Auc
jed speciem distinctam propagans. Folia p
at extima foliola confluent in unum, textura
Sapor medius ex dulci acefcens.
- domestica. 3. **SORBUS** foliis pinnatis subtus villosis. *Hall*
351.
Sorbus fativa. Bauh. pin. 415. Edw. av. t. 211.
Sorbus legitima. Clus. hist. 1. p. 10.
Habitat in Europæ calidioribus. ♀
Fructus magnitudine minoris pomi Mali.

S E S U V I U M.

- Portulaca-
strum. 1. **SESUVIUM.** *Jacq. hist. t. 95.*
Portulaca foliis lanceolatis convexis, peduncul
*floris. Sp. pl. 1. p. 446. Læfl. it. 191. **
Portulaca curassavica, angusto longo lucidoque
procumbens, floribus rubris. Pluk. alm. 303. l
f. 1. Herm. par. 212. t. 212.
Portulaca marina latifolia, flore suaverubente.
spec. 6. ic. 223. f. 2.
Portulaca aizoides maritima procumbens, flore
reo. Sloan. jam. 88. hist. 1. p. 204.
Halimus indicus. Rumph. amb. 6. p. 165. t. 72. l
Habitat in Indiæ maritimis. ☉

P E N T A G Y N I A.

M E S P I L U S.

- germanica. 1. **MESPILUS** inermis, foliis lanceolatis subto
 mentosis, floribus sessilibus solitariis. *Hort. clif*
Hort. upf. 129. Mat. med. 236. Roy. lugd
Bæhm. lipf. 174.
Mespilus germanica, folio laurino non serrato.
pin. 453.
Mespilus. Dod. pempt. 801.
 β. **Mespilus**, folio laurino, major. *Bauh. pin. 45*
Habitat in Europa australi. ♀
Rami villosi. Folia ovali-lanceolata; ad apic
rata, subvillosa, Petiolis brevissimis canaliculatis

lyces terminales, hirsuti, bractea longitudine corollae.

IESPILUS spinosa, foliis lanceolato-ovatis crenatis, calycibus fructus obtusis. *Hort. cliff.* 189. *Vir. cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 271. Pyracantha.

xyacantha dioscoridis f. Spina acuta, pyri folio. *Bauh. pin.* 454.

va urfi. *Dalech. hist.* 164.

abitat in Galloprovinciæ, Italiæ sepibus. †

IESPILUS inermis, foliis lanceolatis crenatis subtus tomentosis. *Hort. cliff.* 189. *Roy. lugdb.* 271. arbutifolia.

atægus virginiana, foliis arbuti. *T. Mill. dict. t.* 109.

rbus virginiana, folio arbuti. *Herm. lugdb.* 578. t. 669.

rbus aucuparia virginiana, foliis arbuti. *Breyn. prodr.* 1. p. 15.

abitat in Virginia. †

IESPILUS inermis, foliis ovalibus ferratis, cauliculis hirsutis. *Mill. dict.* 178. f. 1. Amelanchier.

espilus inermis, foliis ovalibus ferratis acutis. *Hort. cliff.* 189. *Roy. lugdb.* 271.

ni effigie, lanato folio, minor. *Bauh. pin.* 452.

tis idæa III. *Clus. hist.* 1. p. 75.

abitat in Helvetia, Austria, Galloprovincia. †

nella adhuc herba ramis petiolis pedunculis foliis subtus villosa-tomentosa est, adulta fructifera glabra lanam exuit.

IESPILUS inermis, foliis ovato-oblongis glabris ferratis. canadensis.

espilus inermis, foliis subtus glabris obverse-ovatis. *Gron. virg.* 54.

abitat in Virginia, Canada. †

IESPILUS inermis, foliis ovalibus ferratis glabris, floribus capitatis, bracteis dicitis linearibus. Chamæ Mespilus.

atægus foliis ovalibus utrinque glabris plicatis indivisis ferratis. *Hort. cliff.* 497. *Vir. cliff.* 43. *Roy. lugdb.* 272. *Hall. helv.* 353.

otoneaster folio oblongo ferrato. *Bauh. pin.* 452.

otoneaster forte generi. *Clus. hist.* 1. p. 63.

abitat in Alpibus Austriacis, Pyrenaicis. †

Folia pruni argute serrata: serraturis versus apicem flexis tenuissimis, utrinque nuda. Stipulæ in petiolis longiores, deciduæ. Corymbus ex adunculatus, conglobatus in capitulum, pedunculis villosis, foliis dimidio brevior. Bractææ inter lineares, flore longiores, coloratæ, deciduæ.

Cotoneaster. 7. **MESPILUS** inermis, foliis ovatis integerrimis. *cliff.* 189. *Fl. svec.* 403; 438. * *Koy. lugdb.* 271. *helv.* 352.

Cotoneaster folio rotundo non serrato. *Bauh. pin.*

Chamæ Mespilus gesneri. *Clus. hist.* 1. p. 60.

Chamæ Mespilus coidi. *Bauh. pin.* 452.

Habitat in Europæ frigidioris collibus apritis, Pyrenæis, Ararat. †

P Y R U S.

communis. 1. **PYRUS** foliis ferratis, pedunculis corymbosis. *Pyrus* foliis ferratis, pomis basi productis. *Hort.* 189. *Hort. ups.* 130. *Fl. svec.* 401; 436. *Roy.* 266. *Hall. helv.* 351.

Pyræster. *Pyrus* sylvestris. *Bauh. pin.* 439. *Dod. pempt.*

falerna β. *Pyrus* Bergamotta gallis. *Bauh. hist.* 1. p. 44.

pompejana. γ. *Pyrus* boni christiani. *Bauh. hist.* 1. p. 44.

favonia. δ. *Pyrus* jesu s. moschatellina rubra. *Bauh. hist.* 1.

Volema. ε. *Pyrus* dorfolia eademque liberalia dicta. *Lauh.* p. 53.

Habitat in Europa. †

Varietates hujus 80 videndæ in *Milleri dicta Hortulan.*

Malus. 2. **PYRUS** foliis ferratis, umbellis sessilibus. *Pyrus* tobis ferratis, pomis basi concavis. *Hort.* 189. *Hort. ups.* 130. *Fl. svec.* 402; 437. *Mat.* 237. *Koy. lugdb.* 266. *Hall. helv.* 351.

sylvestris. *Malus* sylvestris. *Bauh. pin.* 433. *Dod. pempt.*

paradisifica. β. *Malus* pumila, quæ potius frutex quam arbor. *pin.* 433.

præfomila. γ. *Malus* præfomila. *Bauh. pin.* 433.

rubelliana. δ. *Malus* sativa, fructu sanguinei coloris ex auster dulci. *Tournef. inst.* 635.

cestiana. ε. *Mala* curtispindula dicta. *Bauh. hist.* 1. p. 21.

cavillea. ζ. *Mala* sativa, fructu magno intenso rubente; odore. *Tournef. inst.* 635.

ma orbiculata. *Ruell. stirp.*
bitat in Europa. \dagger

Epirotica.

TRUS foliis ferrato angulatis, umbellis peduncu- coronaria.
tis.

us foliis ferrato-angulosis. *Sp. pl. 1. p. 480. Kalm.*
. 3. p. 10.

us sylvestris, floribus odoratis. *Gron. virg. 55.*
bitat in Virginia. \dagger

bella pedunculata. Pedunculi glabri. Calyces gla-
ri, interne tomentosi. Folia Mali, sed magis glabra
& argutius serrata.

TRUS foliis integerrimis, floribus solitariis. *Hort. Cydonia.*
liff. 160. Mat. med. 238. Roy. lugdb. 267. Kalm.
. 3. p. 107.

us cotonea sylvestris. *Bauh. pin. 435.*

us cotonea major. *Bauh. pin. 434.*

us Cotonea minor. *Bauh. pin. 434.*

cotonea & Cydonia. *Lob. hist. 580.*

bitat ad ripas petrosas Danubii. \dagger

yx patens, serratus, longitudine corollæ.

TETRAGONIA.

TETRAGONIA foliis linearibus. *Roy. lugdb. 250. fruticosa*
tragonia. *Hort. cliff. 188. Hort. upf. 126.*

tragonocarpus africana, rutilans, foliis longis & an-
gustis. *Comm. hort. 2. p. 205. t. 103.*

onymo affinis africana, portulacæ folio. *Seb. thes. 2.*
t. 13. t. II. f. 8.

bitat in Æthiopia. \dagger

lunculi terni, uniflori, ex alis inter caulem & ra-
mulum.

TETRAGONIA foliis ovatis. *Roy. lugdb. 450. herbacea.*

tragonocarpus africana, radice magna crassa & car-
nosa. *Comm. hort. 2. p. 203. t. 102.*

bitat in Æthiopia. \dagger

MESEMBRYANTHEMUM

* *Albis corollis.*

MESEMBRYANTHEMUM foliis alternis tereti- nodiflorum.
neculis obtusis basi ciliatis. *Hort. upf. 129*

Kali

Kali crassulæ minoris foliis. *Bauh. pin.* 289.

hist. 2. p. 610. f. 5. t. 33. f. 7.

Kali neapolitanum aizoides repens. *Col. eceph.* 72. t. 73.

Kali II. *Alp. ægypt.* t. 125. t. 127.

Habitat in Ægypto, Neapoli, locis arenosis quæ ab æstu maris adpunguntur. ☉

crystalli-
num.

2. MESEMBRYANTHEMUM foliis alternis papulosis undulatis. *Hort. cliff.* 216. n. 1. *H.* 127. *Roy. lugdb.* 281.

Mesembryanthemum crystallinum, plantagini undulato. *Dill. elth.* 231. t. 180. f. 221.

Ficoides africana, folio plantaginis undulato migeis adperso T. *Bradl. succ.* 5. t. 15. f. 4

Habitat in Africa? ☉

Caulis primum erectus, digitalis foliis oppositis horizontalibus, longissimis, oppositis, prostratis terne ramosi, Foliis alternis.

copticum.

3. MESEMBRYANTHEMUM foliis semiteretibus papulosis distinctis, floribus sessilibus axillaribus, cibus quinquefidis.

Kali ægyptiacum, foliis valde longis hirsutis. *Bauh.* 286.

Kali III. *ægypt.* t. 129. t. 128.

Habitat in Ægypto. ☉

Statura & magnitudo M. nodiflori. Caulis teretis, herbaceus. Folia opposita, semiteretia, loba, ramulis terminantia, nulla in internodiis, longitudine internodiorum. Flores sessiles, solitarii divaricatura ramorum. Calyx quinquefidus, oblongior. Capsula turbinata, retusa, quinquelobis angulis dilatatis, compressis. Semina subrotunda, subcochleata, striata. Kali 3. Alp. videntur ad hanc speciem pertinere, quam ad Plantainem indicam, quamvis figura vitiosa & plantainem nime hirsuta.

geniculiformum.

4. MESEMBRYANTHEMUM foliis semiteretibus papulosis distinctis, floribus sessilibus axillaribus lyncibus quadrifidis.

Mesembr. ramis undique papillofis folio crasso *Hort. cliff.* 218. n. 29. *Roy. lugdb.* 285.

emb. capense geniculiflorum neapolitanum credim. *Dill. elth.* 271. t. 205. f. 261.

oides neapolitana, flore candido. *H. Bradl. succ.* 5. 17. f. 34.

oides capense, folio tereti, flore albedo. *Pet. gaz.* 78. f. 3.

itat ad Cap. b. Spei. †

x quadrifidus. *Styl.* 4. *Fructus quadrilocularis.*

SEMBRYANTHEMUM foliis semicylindricis noctiflorum, punctatis distinctis, floribus pedunculatis, calycibus quadrifidis.

embr. foliis subulatis semicylindricis laevibus vix unatis apice recurvis. *Hort. cliff.* 220. n. 28. *Koy. zdb.* 286.

embr. noctiflorum, flore intus candido extus phaeo odoratissimo. *Dill. elth.* 273. t. 206. f. 262.

fembr. noctiflorum, flore intus candido extus stramineo odoratissimo. *Dill. elth.* 274. t. 206. f. 263.

itat ad Cap. b. Spei. †

x huic quadrifidus. *Styl.* 4. *Fructus quadrilocularis.*

SEMBRYANTHEMUM foliis semiteretibus imbricatis recurvis distinctis congestis, calycibus terminalibus digitiformibus. splendens.

embr. foliis confertis splendentibus, flore pallido. *Dill. elth.* 270. t. 204. f. 260.

oides capensis frutescens, foliis teretibus confertis, mucis, flore albo. *Bradl. succ.* 1. p. 7. t. 6.

itat ad Cap. b. Spei.

is punctis albidis in ramis non ultimis. Folia tri-etro-teretiuscula, apice patula acuta: axillaria pro incurva. Corolla flavescenti-albida. Calyces cili, digitiformes, mutici.

SEMBRYANTHEMUM foliis subulatis scabri-umbellatum, punctatis connatis apice patulo, caule erecto, rymbo trichotomo.

embr. frutescens, floribus albis umbellatis. *Dill.* h. 277. t. 208. f. 266.

oides africana erecta teretifolia, floribus albis umbellatis. *Herm. par.* 166. t. 166. *Bradl. succ.* 4. p. 12.

34. *Pluk. phyt.* 117. f. 1.

itat ad Caput b. Spei. †

- calamiforme 8. **MESEMBRYANTHEMUM** acaule, foliis fu-
retibus ascendentibus impunctatis connatis, non
octagynis. *Mill. dict.* 176. f. 1.
Mesembr. calamiforme. *Dill. elth.* 239. t. 186. f. 2
Ficoides capensis humilis, cepææ folio, uore str
neo. *Bradl. succ.* 2. p. 10. f. 19.
Habitat ad Cap. b. Spei. 24
*Folia quamvis basi connata recta, tamen sæpe horizi-
liter patentia, apice recurva, superficie pum-
scabrida.*
- Tripolium. 9. **MESEMBRYANTHEMUM** foliis alternis lax-
latis planis impunctatis, caulibus laxis simplici
calycibus pentagonis. *Hort. cliff.* 217. n. 11. h
upf. 128. *Roy. lugdb.* 283.
Mesembr. tripolii folio, flore argenteo. *Dill. elth.*
t. 179. f. 220.
Ficoides africanum procumbens, tripolii succula
folio, flore candido. *Bradl. succ.* 5. p. 14. t. 47.
Ficoides africanum, Mesembryanthemum s. Ficus
zoides major procumbens, tripolii folio magis
culento denticulis fimbriato. *Pluk. mant.* 77. t. 2
f. 4.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♂. 24
* * Rubicundis corollis.
- bellidiflo-
rum. 10. **MESEMBRYANTHEMUM** acaule, foliis
quetris linearibus impunctatis apice trifariam den-
tatis. *Hort. cliff.* 218. n. 13. *Roy. lugdb.* 283.
Mesembr. bellidiflorum. *Dill. elth.* 244. t. 189. f. 2
Habitat ad Cap. b. Spei. 24
- deltoides. 11. **MESEMBRYANTHEMUM** foliis deltoidibus
quetris dentatis impunctatis distinctis. *Hort. c*
218. n. 14. * *Roy. lugdb.* 284.
Mesembr. deltoides & dorso & lateribus murica
Dill. elth. 255. t. 195. f. 246.
Ficus aizoides africana erecta, folio triangulari bre-
uifculo fimbriato, floribus roseis odoratis. *Volk.*
223. t. 224. f. 5.
β. Mesembr. deltoides, dorso & lateribus murica
majus. *Dill. elth.* 254. t. 196. f. 247.
γ. Mesembr. deltoides, non dorso sed lateribus murica
tis. *Dill. elth.* 253. t. 195. f. 243-244.

Habitat ad Cap. b. Spei. h

Pedunculi uniflori, diphylli. Corollæ dilute purpureæ, odoratæ, non calyce longiores. Stamina erecta in conum, alba. Antheris flavis.

22. **MESEMBRYANTHEMUM** foliis subovatis *barbatum*,
 pulosis distinctis apice barbatis. *Hort. cliff. 216. n. 5. * Hort. upf. 127. Roy. lugdb. 282. Mill. dict. t. 176. f. 3.*

Mesembr. radiatum, ramulis prolixis recumbentibus. Dill. elth. 245. t. 190. f. 234.

Ficoides capensis, tereti folio: apicibus hirtis. Pet. gaz. t. 77. f. 6.

Ficoides capensis frutescens, folio tumido extremitate stellata, flore purpureo. Bradl. succ. 1. p. 6. t. 5. 15.

Ficus aizoides, folio tereti in villos radiatos abeunte, flore rubro. Volk. heip. 222. t. 124. f. 6.

23. *Mesembr. radiatum humile, foliis minoribus. Dill. elth. 246. t. 190. f. 235.*

24. *Mesembr. radiatum humile, foliis majoribus. Dill. elth. 248. t. 190. f. 236.*

Habitat ad Cap. b. Spei. h

Calycis foliola apice barbata, æque ac folia plantæ, demonstrant Perianthii ortum. Petala minima interiora, quæ cingunt stamina, alba. Varietas β, hybrida forte, differt ab α. Calyce hexaphyllo, nec 5 phyllo. Stylis Loculisque 6, nec 5. f. 8. Pedunculis hispids pilosis, nec lævibus. Foliorum oppositionibus imbricatis, nec remotis.

25. **MESEMBRYANTHEMUM** foliis cylindricis *hispidum*,
 pulosis distinctis, caule hispido. *Mill. dict. t. 176. f. 3.*

*Mesembr. caule hispido. Hort. cliff. 217. n. 7. * Roy. lugdb. 282.*

Mesembr. pilosum micans, flore saturate purpureo. Dill. elth. 289. t. 214. f. 278.

26. *Mesembr. pilosum micans, flore purpureo pallidiore. Dill. elth. 290. t. 214. f. 280, 279.*

27. *Mesembr. pilosum micans, flore purpureo striato. Dill. elth. 291. t. 215. f. 281.*

28. *Ficoides s. Ficus aizoides africana, folio longo tenui, flore aurantio. Bradl. succ. 4. p. 13. t. 35.*

Ficus aizoides teretifolia, foliis crystallino rore
ganter conspersis, floribus dilute roseis. *Volk. h.*
221. t. 224. f. 2.

Habitat ad Cap. b. Spei. h.

Pedunculus valde decorsum scaber magis visu quam
ctu. Calyx muticus. Flos odoratus, simillimus
barbati (a quo forte olim ortum), demta barba fo
rum, sed cauli inspersa.

villosum. 14. MESEMBRYANTHEMUM foliis pubescenti
connatis impunctatis, caule piloso. *Hort. cliff.* 2
n. 6. * *Roy. lugdb.* 282.

Habitat ad Cap. b. Spei. h.

Folia linearia, semiteretia, canaliculato-plana, opa
margine, versus basim imprimis, villis adperso. C
lis pubescens villis vix exstantibus. Flores non vi

scabrum. 15. MESEMBRYANTHEMUM foliis subulatis
sinctis subtus undique muricatis, calycibus mutic
Hort. cliff. 219. n. 20. * *Hort. ups.* 129.

Mesembr. purpureum scabrum, staminibus collect
Dill. elth. 260. t. 197. f. 251.

Habitat ad Cap. b. Spei. h.

emargina- 16. MESEMBRYANTHEMUM foliis subulatis et
tum. gestis subscabris, calycibus spinosis, petalis emarginat
Mesembryanthemum purpureum scabrum, staminib
expansis. *Dill. elth.* 259. t. 197. f. 250.

Ficoides capensis, triangulari folio acuto, flore p
pureo. *Pet. gaz.* t. 77. f. 3.

Habitat ad Cap. b. Spei. h.

ncinatum. 17. MESEMBRYANTHEMUM articulis caulinis t
minatis in folia connata acuminata subtus denta
Hort. cliff. 218. n. 16. *Roy. lugdb.* 284.

Mesembr. perfoliatum, foliis minoribus diacant
Dill. elth. 250. t. 193. f. 239.

• Ficoides afra, folio triangulari glauco perfoliato t
vissimo apice spinoso. *Bradl. succ.* 3. p. 8. t. 27,
Burm. afr. t. 26. f. 3.

β. Mesembr. perfoliatum, foliis majoribus triacant
Dill. elth. 251. t. 193. f. 240.

Ficoides africana frutescens perfoliata, folio trian
lari glauco punctato. *Bradl. succ.* 5. p. 13. t. 46.

Habitat ad Cap. b. Spei. h.

18. MESEMBRYANTHEMUM foliis tereti-triquetris punctatis distinctis. spinis ramosis. *Hort. cliff.* 216. n. 3. * *Roy. lugdb.* 281. spinosum.
 Mesembr. frutescens, ramis triacanthis. *Dill. elth.* 276. t. 208. f. 265.
 Ficoides africana, aculeis longissimis & foliolis nascentibus ex foliorum alis. *Tournef. act.* 1705. p. 316. *Bradl. succ.* 41. t. 39.
Habitat ad Cap. b. Spei. †
19. MESEMBRYANTHEMUM foliis subulatis papulosis distinctis apice patulis, radice capitata. *Hort. cliff.* 216. n. 4. * *Roy. lugdb.* 282. tuberosum.
 Mesembr. frutescens, radice ingenti tuberosa. *Dill. elth.* 275. t. 207. f. 264.
Habitat ad Cap. b. Spei. †
20. MESEMBRYANTHEMUM foliis semiteretibus subulatis glabris distinctis internodio longioribus. *Hort. cliff.* 220. n. 26. *Hort. upf.* 128. *Roy. lugdb.* 286. tenni folium.
 Mesembr. tenuifolium procumbens, folio tenuiore viridi, flore coccineo. *Dill. elth.* 264. t. 201. f. 256.
 Ficoides capensis humilis teretifolia, flore coccineo. *Bradl. succ.* 1. p. 13. t. 9.
 Ficoides africana minor procumbens, folio tenuiore viridi, flore coccineo. *Morif. hist.* 3. p. 507. f. 12. t. 8. f. 6.
Habitat ad Cap. b. Spei. †
21. MESEMBRYANTHEMUM foliis subtriquetris compressis incurvatis punctatis distinctis congestis basi marginatis. *Hort. cliff.* 220. n. 29. *Roy. lugdb.* 287. stipulaceum.
 Mesembr. frutescens, flore purpureo rariore. *Dill. elth.* 279. t. 209. f. 267; 268.
Habitat ad Cap. b. Spei. †
 Caulis florens rigidus, subgriseus. Folia linearia, carnosa, lateribus valde compressa & punctis pellucidis adpersa, incurva, supra planiuscula, mucronata. Flores subcorymbosi, purpurei, Staminibus luteis.
22. MESEMBRYANTHEMUM foliis semicylindricis impunctatis connatis apice triquetris, caule repente semicylindrico. *Hort. cliff.* 217. n. 9. * *Roy. lugdb.* 283. crassifolium.
 Mesembr. crassifolium repens, flore purpureo. *Dill. elth.* 266. t. 201. f. 257.

Ficoides africana reptans, folio triangulari viridi, saepe saturate purpureo. *Bradl. succ.* 4. p. 16. t. 38.
Habitat ad Cap. b. Spei. 24

falcatum: 23. **MESEMBRYANTHEMUM** foliis subacinaribus incurvis punctatis distinctis, ramis teretibus
Hort. cliff. 219. n. 19. * *Roy. lugdb.* 285.

Mesembr. falcatum minimum, flore purpureo parvo
Dill. elth. 238. t. 213. f. 276.

Ficoides atra, folio triangulari ensiformi brevissimo, flore dilute purpurascente filamentoso. *Bradl. succ.* 5. p. 9. t. 42.

Habitat ad Cap. b. Spei. 25

Corollae purpureae, parvae, petalis dislocatis.

lanceolatum 24. **MESEMBRYANTHEMUM** foliis teretibus compressis punctatis, caule paniculato multifloro
Mesembryanthemum falcatum minus, flore carneo minore. *Dill. elth.* 281. t. 213. f. 274.

Habitat ad Cap. b. Spei. 25

Caulis diffusus, paniculatus. Folia angulis obtusis trigona, glauca punctis diaphanis. Ramulorum rammenta ex alis, foliis confertissimis incurvis. Calyx longius pedunculatus; Germine subverruoso punctis eminentibus obsoletis; Laciniis calycinis apice membranaceis; sub apice spina patula. Corolla purpurea M. deltoidis.

loreum, 25. **MESEMBRYANTHEMUM** foliis semicylindricis recurvis congestis basi interiore gibbis connatis caule pendulo.

Mesembryanthemum loreum. *Dill. elth.* 264. t. 200. f. 255.

Habitat ad Cap. b. Spei. 24

Flores rarissimi prodire apud Engelb. Gother, et patuit distinctam a M. corniculato plantam esse. Flores ex alis foliorum infimis rami, pedunculo brevi; Calyce aequali, mediocri; Corolla purpurea petalis lanceolato-linearibus; Staminibus albidis.

filamentosum. 26. **MESEMBRYANTHEMUM** foliis æquilateris quetris acutis subpunctatis subconnatis angulis scabris, ramis hexagonis.

Mesembr. falcatum majus, flore purpureo medio
Dill. elth. 285. t. 211. f. 273.

Habitat ad Cap. b. Spei. 2

Folia punctata, vix connata. Flores sessiles, pentagyni. Corollæ miserræ, parvæ, obsolete violasæ, petalis subulatis nec lanceolatis.

• **MESEMBRYANTHEMUM** foliis acinaciformibus impunctatis connatis : angulo carinali scabris, petalis lanceolatis. *Hort. cliff., 219. n. 18. * Roy. lugdb, 284.* acinaciforme. me.

Mesembr. acinaciforme, flore amplissimo purpureo. *Dill. elth. 282. t. 211. f. 270. & t. 212. f. 271.*

Habitat ad Cap. b. Spei. 2

• **MESEMBRYANTHEMUM** foliis acinaciformibus obtusis impunctatis connatis apice spinosis, caule ancipiti. forficatum. •

Habitat ad Cap. b. Spei. 2

Caulis debilis. Flores non vidi, affine *M. acinaciformi.*

• • • *Luteis corollis.*

• **MESEMBRYANTHEMUM** foliis æquilateri-tri-quetris acutis strictis impunctatis connatis carina subferratis, caule ancipiti. edule.

Mesembryanthemum falcatum majus, flore amplo luteo. *Dill. elth. 283. t. 212. f. 272.*

• **Ficoides** s. *Ficus aizoides africana* major procumbens, triangulari folio, fructu maximo eduli. *Herm. lugdb. 244. t. 245. Morif. hist. 3. p. 506. f. 12. t. 7. f. 1.*

Habitat ad Cap. b. Spei. 2. §

Folia crassitie digiti, nitida, recta, triquetra, æquilatera, longa, basi connata, carina cartilaginea scabra.

• **MESEMBRYANTHEMUM** foliis subulatis lævibus punctatis distinctis, caule frutescente, corollis bicoloribus. *Mill. dict. t. 177. f. 1.* bicolorum.

Mesembr. tenuifolium frutescens, flore croceo. *Dill. elth. 267. t. 202. f. 258.*

• **Ficoides** s. *Ficus aizoides africana* minor erecta, triangulari folio viridi, flore intus aureo; foris purpureo. *Herm. lugdb. 250. t. 249. Morif. hist. 3. p. 507. f. 12. t. 6. f. 4.*

• **Ficoides capensis** frutescens, folio tereti punctato, petalis luteis. *Bradl. succ. 1. p. 8. t. 7.*

Habitat ad Cap. b. Spei. †

Corollæ extus purpureæ, intus flavæ, apice extus puræ.

- ferratum. 31. MESEMBRYANTHEMUM foliis subulatis quetris punctatis distinctis angulo carinali retrud ferratis. *Hort. cliff. 218. n. 15. Roy. lugdb. 284.*
 Mesembr. ferratum flore acetabuliformi luteo. *D. elth. 249. t. 192. f. 238.*

Habitat ad Cap. b. Spei. †

- micans. 32. MESEMBRYANTHEMUM foliis subcylindricis papulosis distinctis, caule scabro. *Hort. cliff. n. 30. * Roy. lugdb. 287.*

Mesembr. micans, flore phoeniceo: filamentis at *Dill. elth. 292. t. 215. f. 282.*

Ficoides capensis, tereti folio, flore croceo. *Pa. g. t. 7. f. 9.*

Ficoides capensis, folio tereti argenteo, petalis plurimis aurantiacis. *Bradl. succ. 1. p. 9. t. 8.*

Habitat ad Cap. b. Spei. †

- rostratum. 33. MESEMBRYANTHEMUM acaule, foliis cylindricis connatis externe tuberculatis. *Hort. d. 219. n. 23. Roy. lugdb. 285.*

Mesembr. rostrum ardeæ referens. *Dill. elth. 240. 186. f. 229.*

Habitat ad Cap. b. Spei. †

- veruculatum. 34. MESEMBRYANTHEMUM foliis triquetrolindricis acutis connatis arcuatis impunctatis distinctis. *Hort. cliff. 220. n. 24. Hort. ups. 128. R. lugdb. 285.*

Mesembr. foliis veruculiformibus, floribus melli umbellatis. *Dill. elth. 268. t. 203. f. 259.*

Habitat in Africa. †

Folia subtriquetro-cylindrica, pellucida, apice pubescentia. Flores odoratissimi, conferti, parvi. Corolla vix calyce longior, petalis apice fidentatis. Stamina parva: Filamentis basi villosa.

- glaucum. 35. MESEMBRYANTHEMUM foliis triquetris punctatis distinctis, calycinis foliolis ovatoelatis. *Hort. cliff. 220. n. 27. Roy. lugdb. 283.*

lesembr. scabrum, flore sulphureo convexo. *Dill. elth.* 256. t. 196. f. 248.

icoides africana frutescens, folio triangulari breviorre glauco. *Morif. hist.* 3. p. 507. f. 12. t. 5. f. 3.

icoides afra, caule lignoso, erecta, folio triangulari ensiformi scabro, flore luteo magno. *Bradl. succ.* 4. p. 15. t. 37.

icoides f. *Ficus aizoides* africana minor erecta, folio triangulari glauco, flore luteo. *Herm. lugdb.* 247. t. 248.

abitat ad Cap. b. Spei. 5

Alia mucronata, rore glauca, punctis sparjs non scabra, nisi carina.

MESEMBRYANTHEMUM foliis tricuetro-semicylindricis scabrido-punctatis, supra basin lineae elevatis connatis. corniculatum,

esembr. foliis corniculatis longioribus. *Dill. elth.* 262. t. 199. f. 253, 254.

oides capensis, folio triangulari, flore lueo intus pallido. *Pet. gaz.* t. 77. f. 10.

esembr. foliis corniculatis brevioribus. *Dill. elth.* 261. t. 198. f. 252.

oides africana reptans, folio triangulari casto longissimo, flore intus luteo extus aurantiaco. *Bradl. succ.* 4. p. 18. t. 40.

abitat in Africa. 2

ores decagyni.

MESEMBRYANTHEMUM foliis planiusculis lanceolatis impunctatis patentibus distinctis oppositis alternisque remotis. expansum.

esembr. tortuosum, foliis sempervivi expansis. *Dill. elth.* 234. t. 182. f. 223.

oides capensis, folio lato acuto, flore albo intus luteo. *Pet. gaz.* t. 78. f. 10.

oides africana procumbens, foliis planis conjugatis lucidis. *Bradl. succ.* 3. p. 7. t. 15.

abitat ad Cap. b. Spei. 2

ores pentagyni.

MESEMBRYANTHEMUM foliis plusculis tortuosum. oblongo-ovatis subpapillofis confertis connatis, calycibus triphyllis bicornibus.

Mesemb. foliis planis oppositis ovatis acuminatis natis integerrimis. *Hort. cliff.* 217 n. 10. *

Mesemb. tortuosum, foliis sempervivi congestis. *Elth.* 233. t. 181 f. 222.

Ficoides capensis procumbens, oleæ folio, flore medio croceo. *Bratl. succ.* 2. p. 7. t. 16.

Habitat id Cap. b. Spei. 4

Calycis foliola 3. expansa, 2. cornuta. *Corolla* brevior. *Pisillum* tetragynum.

pomeridia-
num.

39. MESEMBRYANTHEMUM foliis planis lanceolatis lævibus subciliatis distinctis, pedunculis germinibusque hirtis.

Habitat ad Cap. b. Spei. ☉

Nova, e seminibus enata primo anno 1769, ab

♂ fruit. *Caulis* herbaceus, palmaris, teres; patulus, confertis, albis. *Folia* spatulata f. lanceolata petiolo basi dilatato, distincta, lævia, subciliata margine inprimis petiolorum subciliata, internodi longiora, patentia. *Pedunculus* terminalis, longior, hirtus uti caulis. *Floris* Calyx

maior, subquinquepartitus, basi albo-villosus, lobis lanceolato-foliaceis, corolla longioribus, basi versus interius fusco-membranaceis. *Con-*

sulphurea, multiplex petalis linearibus, acutis, mercurialibus: intimis setaceis umbilicum floris genibus instar cancelli. *Stamina* lutea. *Stylis*

totiemque fructus loculamenta. *Rami* e fructibus, primo similes, unde dichotoma planta, sed

lis. *Floret* horis pomeridianis ab 1 — 6. nisi via moneat corollam citius claudi, aut flos a

proctior diutius expandatur.

riagens. 40. MESEMBRYANTHEMUM subcaule, foliis hirsutis dentatis punctatis. *Mill. dict.* 1. 177. f. 2. *H. cliff.* 218. n. 12. * *Roy. lugdb.* 283.

caninum. Mesembr. rictum caninum referens. *Dill. elth.* 24 188f. 231.

Ficoides capensis humilis, folio triangulari prope laticus dentato, flore luteo. *Bratl. succ.* 2. t. 1

felinum. β. Mesembr. rictum felinum representans. *Dill.* 240f. 187. f. 230.

Ficoides aspera, folio triangulari ensiformi crasso

marginés laterales multís majoribus spinis aculea-
Mart. cent. 30. t. 30.
rat ad Cap. b. Spei. 5

ESEMBRYANTHEMUM foliis dolabriformi- *dolabriforme.*
 s punctatis. *Hort. cliff. 219. n. 19. Roy. lugdb. 284.*
embr. folio dolabriformi. Dill. elth. 248. t. 191. f. 237.
 ides capensis humilis, foliis cornua cervi referen-
 us, petalis luteis, noctiflora. *Bradl. succ. 1. p.*
t. 10.
rat ad Cap. b. Spei. 24

ESEMBRYANTHEMUM foliis difformibus *diforme.*
 punctatis connatis. *Roy. lugdb. 287. Mill. dict. t.*
5. f. 2.
embryanth. foliis difformibus, flore luteo. Dill.
h. 252. t. 194. f. 241, 242.
 ides Mesembryanthemum crassissimo & valde suc-
 lento folio nigris punctis notato. *Pluk. alm. 148.*
225. f. 4.
rat ad Cap. b. Spei. 5

ESEMBRYANTHEMUM acaule, foliis tri- *albidum.*
 etris integerrimis.
embryanthemum foliis robustis albicantibus. Dill.
h. 243. t. 189. f. 232.
 ides africana, folio triangulari ensiformi glauco
 asso, flore amplo aureo. *Bradl. succ. 5. p. 20. t. 43.*
rat in Æthiopia. 24

ESEMBRYANTHEMUM acaule, foliis lin- *linguiforme.*
 giformibus altero margine crassioribus impunctatis.
Hort. cliff. 219. n. 8. Hort. upf. 128. Roy. lugdb. 282.
embryanth. folio scalprato. Dill. elth. 235. t. 183.
224.
embr. folio linguiformi latiore. Dill. elth. 236. t.
14. f. 224.
embr. folio linguiformi angustiore. Dill. elth. 238.
285. f. 226.
embr. folio linguiformi longiore. Dill. elth. 238. t.
15. f. 227.
rat ad Cap. b. Spei. 24
es Decagyni Calyce quadripartito.

ESEMBRYANTHEMUM foliis alternis sub- *pugioniforme.*
 la-

latis triquetris longissimis impunctatis. *Hort.*
 216. n. 2. * *Hort. upf.* 129. *Roy. lugdb.* 281.
 Membr. folio pugioniformi, flore aureo
Dill. elth. 280. t. 210. f. 269.
 Ficus capensis, caryophylli folio, flore aureo
Bradl succ. 2. p. 5. t. 14.
Habitat ad Cap. b. Spei. ☽
 Flores decagyni. (*)

AIZOON.

- canariense. 1. AIZOON foliis cuneiformio-vatis, floribus
Hort. upf. 127.
 Aizoon foliis obverse ovatis. *Hort. cliff.* 215.
lugdb. 221.
 Ficoides procumbens, portulacæ folio. *Niss.*
 p. 422. t. 13. f. 1.
 Kali aizoides canariensis procumbens. *Pluk.*
 t. 303. f. 4. *Volk. norib.* 236. t. 236.
Habitat in Canariis. ☉
- hispanicum. 2. AIZOON foliis lanceolatis, floribus sessilibus
 Ficodea hispanica annua, folio longiore. *D.*
 143. t. 117. f. 143.
Habitat in Hispania, Africa. ☉
 Varietas capensis caule foliisque hirsutis, at p
 periore minus.
- panicula-
 tum. 3. AIZOON foliis lanceolatis, floribus paniculatis
 Aizoon foliis lanceolatis subtus hirsutis. *Roy. lugdb.*
Habitat in Africa.

SPIRÆA.

* Frutices.

- salicifolia. 1. SPIRÆA foliis lanceolatis obtusis ferratis nudis

(*) Mesembryanthemi Species possunt variis modis dispesci.

Annua: nodiflorum, crystallinum, copticum.

Acaulia: ringens, bellidiflorum, linguiforme, albidum, rostratum,
 lamiforme, difforme, dolabrifforme.

Laxa caule pendulo: Tripolium, tortuosum, expansum, lobatum,
 nunculatum, acinaciforme, edule, forficatum, filamentosum,
 tenuifolium, pomeridianum.

Fruticosa caule lignoso duro: reliqua: 4, 5, 6, 7, 11, 12,

15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 30, 31, 32, 34, 35

Alternifolia: nodiflorum, crystallinum, Tripolium, pugionif

Latifolia: crystallinum, Tripolium, expansum, tortuosum,

Tetragyna: geniculiflorum, nodiflorum, tortuosum.

Decagyna: linguiforme, pomeridianum, pugioniforme.

bus duplicato racemosis. *Hort. cliff.* 191. *Hort. upf.* 31. *Roy. lugdb.* 277.

æa theophrasti forte. *Clus. hist.* 1. p. 80.

tex spicatus, foliis serratis salignis. *Bauh. pin.*

75.

æa falicis folio longiore serrato, floribus rubris.

mh. ruth. 265.

itat in Sibiria, Tataria. †

RÆA foliis lanceolatis inæqualiter serratis subtus tomentosa, pumentosis, floribus duplicato-racemosis.

aria pentacarpos, integris serratis foliis parvis sub-

is incanis, virginiana. *Pluk. alm.* 393. t. 321. f. 5.

Aj. suppl. 330. *Morif. hist.* 3. p. 323.

itat in Philadelphia. *Kalm.* †

ert a præcedenti Foliis magis profunde & inæqua-

ter serratis; subtus valde tomentosiss adeoque

affis; Racemo terminali composito densiori longiori.

loribus demum magis rubris, & Corollis octuplo-

rioribus.

RÆA foliis ovatis integerrimis, umbellis sessilibus hypericifo-

lis. *Hort. upf.* 131.

æa foliis integerrimis, pedunculis simplicibus. *Hort.*

f. 190. *Roy. lugdb.* 277.

o sylvestri affinis canadensis. *Bauh. pin.* 517. *Pluk.*

f. 308. t. 218. f. 5.

itat in Canada. †

RÆA foliis ovatis inciso-serratis glabris, umbel-

lis pedunculatis.

c hamædri-
folia.

æa chamædryos foliis. *Amm. ruth.* 269.

itat in Sibiria. *D. Gmelin.* †

RÆA foliis oblongiusculis apice serratis, corym-

bus lateralibus.

crenata.

æa hispanica, hyperici folio crenato. *Barr. rar.* 1376.

764.

æa hyperici folio ampliore, modo integro modo

crenato. *Amm. ruth.* 270.

itat in Sibiria, Hispania. †

æa ovato-oblonga, alia apice crenata s. serrata, alia

integerrima. Corymbi terminales, perfectissimi, al-

ter totum fruticem sua copia niveum reddentes.

- opulifolia. 6. SPIRÆA foliis lobatis serratis, corymbis ternatis
Spiræa foliis incisif angulatis, floribus corymbosis.
Hort. cliff. 190. Gron. virg. 55. Roy. lugdb. 277.
Evonymus virginiana, ribesii folio, capsulis
bullatis. *Comm. hort. 1. p. 169. t. 87.*
Habitat in Virginia, Canada. ♀
- forbifolia. 7. SPIRÆA foliis pinnatis: foliolis uniformibus
caule fruticoso, floribus paniculatis.
Spiræa foliis pinnatis. *Amæn. acad. 2. p. 352.*
Spiræa forbi folio tenuiter crenato, floribus
albis. *Amm. ruth. 185.*
Habitat in Sibiria uliginosis. ♀
- * * Herbæ.
- Aruncus. 8. SPIRÆA foliis supradecompositis, spicis paniculatis
floribus dioicis.
Aruncus. *Hort. cliff. 463. Roy. lugdb. 278. Gron. 121.*
Barba capræ floribus oblongis. *Bauh. pin. 163.*
Barba capræ. *Cam. hort. 26. t. 9.*
Habitat in Austria, Albornia montanis. ♀
- Filipendula 9. SPIRÆA foliis pinnatis: foliolis uniformibus
tis, caule herbaceo, floribus cymosis.
Filipendula foliis pinnatis: foliolis uniformibus
cliff. 191. Fl. succ. 404, 439. Mat. med. 239. Roy. 277.
Filipendula vulgaris. *Bauh. pin. 163.*
Filipendula. *Cam. epit. 608.*
Habitat in Europæ pascuis. ♀
- Ulmaria. 10. SPIRÆA foliis pinnatis: impari majore lobatis
ribus cymosis. *Fl. lapp. 201. Hort. cliff. 191. 405, 440. Mat. med. 241. Roy. lugdb. 277.*
Barba capræ floribus compactis. *Bauh. pin. 164.*
Regina prati. *Dod. pempt. 57.*
Habitat in Europæ pratis uliginosis, umbrosis. ♀
- trifoliata. 11. SPIRÆA foliis ternatis serratis subæqualibus
subpaniculatis.
Filipendula foliis ternatis. *Hort. cliff. 191. Gron. 131. Roy. lugdb. 277. Gron. virg. 55.*
Ulmaria major tritolia, flore amplo pentameris
virginiana. *Pluk. alm. 292. t. 235. f. 5. Kai. f.*

Rosa virginiana trifolia, floribus candidis amplis
 angulis & acutis. *Morif. hist. 3. p. 323.*
 Habitat in Virginia, Canada.

POLYGYNIA.
ROSA.

Rosa germinibus ovatis, pedunculis subhispidis, alpina,
 caule inermi.

Rosa campestris, spinis carens, biflora *Bauh. pin. 484.*

Rosa rubella flore simplici non spinosa. *Bauh. hist. 2.*

p. 39.

Rosa non spinosa. *Hall. opusc. 218.*

Habitat in alpibus Helvetiæ. *h*

Rosa glabra. Calyces simplices. Petala obcordata,
 lobata.

Rosa germinibus globosis pedunculisque glabris, pimpinelli-
 caule aculeis sparsis rectis, petiolis scabris, foliolis folia,
 obtusis.

Habitat forte in Europa. *h*

Rosa germinibus globosis pedunculisque glabris, eglanteria.
 caule aculeis sparsis rectis, petiolis scabris, foliolis
 obtusis.

Rosa aculeata, foliis odoratis subtus rubiginosis. *Hall.*

Fl. 350. Fl. fvec. 2. n. 443.

Rosa sylvestris, foliis odoratis. *Bauh. pin. 483.*

Rosa eglanteria. *Tabern. ic. 1087.*

Habitat in Helvetia, Anglia. *h*

Rosa odorata. Flores lutei.

Rosa germinibus globosis pedunculisque glabris, cinnamo-
 caule aculeis stipularibus, petiolis subinermibus. mea.

Rosa, odore cinnamomi, simplex. *Bauh. pin. 483.*

Rosa cinnamomea, floribus subrubentibus, spinosa.

Bauh. hist. 2. p. 39.

Habitat in Europa australi. *h*

Rosa germinibus globosis hispida, pedunculis sub- carolina.
 hispida, caule aculeis stipularibus, petiolis aculeatis.

Rosa foliis ferratis medio tenus integerrimis. *Sp. pl.*

p. 22.

Rosa carolina fragrans, foliis medio tenus ferratis. *Dill.*

zh. 325. t. 245. f. 216. p.

Habitat in America septentrionali. †

*Caulis levis. Aculei stipulares, duo. Folia fo
oblongo-ovatis, glabris, serratis, subtus palli
Petiolis aculeatis. Pedunculi plures, ramoſi
mes, adſperſi pilis glanduloſis. Calycis folio
riſa ſubtus hiſpida. Petala obcordata, n
Flos ſerotinus.*

- villoſa. 6. ROSA germinibus globofis aculeatis, pedunculis
ſpidis, caule aculeis ſparſis, petiolis aculeatis
tomentofis.
Rosa foliis utrinque villoſis, fructu ſpiñoſo. *H
350. Fl. ſvec. 2. p. 1295. **
Rosa ſylveſtris pomifera major. *Bauh. pin. 484.*
Habitat in Europa. †
- centifolia. 7. ROSA germinibus ovatis pedunculisque hiſpidis
le hiſpido aculeato, petiolis inermibus.
Rosa caule aculeato pedunculis hiſpidis, calycis
multipinnatis glabris. *Sp. pl. 1. p. 491.*
Rosa multiplex media. *Bauh. pin. 482.*
Rosa centifolia batavica 11. *Cuſ. hiſt. 1. p. 114.*
Habitat - - - †
*Conf. Rosa rubra plena ſpiñoſiſſima, pedunculis
ſcoſo. Mill. dict. 1. 221. f. 1.*
- gallica. 8. ROSA germinibus ovatis pedunculisque hiſpidis
le petiolisque hiſpido-aculeatis.
Rosa rubra multiplex. *Bauh. pin. 481.*
Rosa rubra, flore ſemipieno. *Bauh. hiſt. 2. p. 34.*
- verſicolor. β. Rosa præneſtina variegata plena. *Mill. dict. 1. 222. f. 1.*
Rosa verſicolor. *Bauh. pin. 481.*
Rosa præneſtina alba & verſicolor. *Bauh. hiſt. 2.*
Habitat in Europa. †
- ſempervirens. 9. ROSA germinibus ovatis pedunculisque hiſpidis
petiolisque aculeatis
Rosa caule aculeato, foliis quinque glabris perennantibus.
Sp. pl. 1. p. 492.
Rosa moſchata ſempervirens *Bauh. pin. 482.*
Rosa ſempervirens jungermanni. *Cuſ. hiſt. 2. p. 41.*
Dill. elth. 325. t. 246. f. 318.
Habitat in Germania. †
- canina. 10. ROSA germinibus ovatis pedunculisque glabris
le petiolisque aculeatis.

caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus
 bipinnatis. *Fl. svec.* 406; 441.

sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato. *Bauh.*
t. 483.

canina vulgo dicta. *Dod. pempt.* 187.
tat in Europa. †

SA germinibus ovatis pedunculisque glabris, indica,
 ile subinermi, petiolis aculeatis.

subinermis, foliolis quinis subtus tomentosus :
 pari majori, stipulis obsolete. *Sp. pl.* 1. p. 492.

cheusan glabra, juniperi fructu. *Pet. gaz.* 56. t.
 . f. 11.

tat in China. †

inermes; variis armati una alterave spina te-
 ssima versus folia vel in petiolis. Folia pinna-
 foliolis quinis, subtus tomentosus, supra glabris,
 ratis: extimo duplo majore. Pedunculi longi,
 li, simplices. Calyx incisus, laevis. Fructus ma-
 tudine Sorbi aucupariae.

SA germinibus ovatis glabris, pedunculis caule- pendula.
 hispidis, petiolis inermibus, fructibus pendulis.

sanguisorbæ majoris folio, fructu longo pendulo.
ll. elth. 325. t. 245. f. 317.

tat in Europa. †

SA germinibus ovatis glabris, pedunculis hispidi- alba.
 caule petiolisque aculeatis.

caule aculeato, pedunculis hispidis, calycibus
 bipinnatis glabris. *Sp. pl.* 1. p. 492.

alba vulgaris major. *Bauh. pin.* 482.

alba, flore pleno. *Besl. cyst. vèrn.* 6. t. 3. f. 1.
tat in Europa. †

SA germinibus ovatis glabris, pedunculis caule spinosissima.
 iolisque aculeatissimis.

caule petiolisque aculeatis calycis foliolis in-
 isis. *Fl. svec.* 407; 442.

campestris spinosissima, flore albo odorato.
th. pin. 483.

tat in Europa. †

s Rosarum difficillime limitibus circumscribuntur &
 e natura vix eos posuit.

RUBUS.

* *Frutescentes.*

idæus.

1. RUBUS foliis quinato-pinnatis ternatisque, cauleato, petiolis canaliculatis. *Fl. suec.* 408; *Mat. med.* 242.

Rubus caule erecto hispido, foliis ternatis. *Fl.* 204. *Hort. cliff.* 192. *Hort. upf.* 133. *Roy. lugd.*

Rubus idæus spinosus. *Bauh. pin.* 479.

- β. Rubus idæus fructu albo. *Bauh. pin.* 479.

- γ. Rubus idæus lævis. *Bauh. pin.* 479.

Habitat in Europæ lapidosis. 2. ♂

occidentalis.

2. RUBUS foliis ternatis subtus tomentosis, cauleato, petiolis teretibus. *Kalm. it.* 2. p. 282.

Rubus foliis longioribus subtus molli lanugine etis & incanis, flore & fructu minoribus. *Sloan*

173. *hist.* 2. p. 109. t. 213. f. 1. *Raj. dendr.* 76. Rubus idæus, fructu nigro, virginianus. *Dill. clib.* t. 287. f. 319.

Rubus americanus magis erectus, spinis rariis stipite cæruleo. *Pluk. alm.* 325.

Habitat in Canada. *Kalm.* 2.

Caulis teres, lævis, aculeis recurvis, nebula ca obductus. Petioli teretes aculeis recurvis, ternata intermedio pedicellato, ovata, inciso-serrata subtus albo-tomentosa. Racemus terminalis.

Stylus niger; variat etiam fructu rubro, magis & grato quam *R. idæi*. Differt imprimis a *R. idæo* cui simillimus: Foliis sæpius ternis, quamvis lacinia foliola sepe duo evadant & tum ternatis, pinnatis; Foliolis lateralibus sæpius angulatis; venis alternis, recurvis, nec sparsis & confertis; petioli etiam aculeati, sed primo intuitu nebula ca caulis dignoscitur.

hispidus.

3. RUBUS foliis ternatis nudis, caulibus petiolis hispidis.

Habitat in Canada. *Kalm.* 3.

Caules viticulis longis, procumbentibus lignosis, cum petiolis adpersi setis rigidis. Folia ternata, serrata, inciso-serrata: intermedio pedicellato; Folia etiam hispida.

occidentalis.

4. RUBUS foliis ternatis subnudis: lateralibus hispidis

caule tereti aculeato. *Hort. cliff.* 192. *Fl. suec.* 410;

445. * *Roy. lugdb.* 273. *Hall. helv.* 444.

Rubus repens, fructu cæsis. *Bauh. pin.* 479.

Rubus minor. *Dod. pempt.* 742.

Habitat in Europæ dumetis. †

Folia subtus non tomentosa; quamvis sæpe pubescentia.

RUBUS foliis quinato-digitatis ternatisque, caule fruticoso, petiolisque aculeatis. *Fl. suec.* 409; 444. *

Rubus caule aculeato, foliis ternatis ac quinatis. *Hort. cliff.* 192. *Gron. virg.* 163. *Roy. lugdb.* 273.

Rubus vulgaris f. *Rubus* fructu nigro. *Bauh. pin.* 479.

Rubus. *Cam. epit.* 751.

Rubus vulgaris major, fructu albo. *Raj. angl.* 3. p. 467.

Rubus flore albo pleno. *Magn. hort.* 175.

Habitat in sepibus præsertim maritimis Europæ. †

caulis subangulatus, longissimus. Folia subtus subvillosa.

RUBUS foliis digitatis denis quinis ternatisque, canadensis, caule inermi. *Mill. icon.* t. 223.

Habitat in Canada. *Kalm.*

caulis subpurpureus. Foliola lanceolata, utriusque nuda, tenuissima, argute serrata. Bractæ lanceolatae. Stipulæ lineares, acutæ.

RUBUS foliis ternatis subtus tomentosis, caule parvifolius, petiolisque aculeis recurvis.

Rubus moluccanus parvifolius. *Rumph. amb.* 5. p. 88.

t. 47. f. 1.

Habitat in India. *Osbeck.* †

caules fruticosi, teretes, inædri. Folia subtus albo-tomentosa; venosi, petiolis subtus recurvato-aculeatis; Calyces tomentosi, in racemum digesti.

RUBUS foliis simplicibus cordatis lobatis, caule moluccanus, aculeato decumbente.

Rubus moluccanus latifolius. *Rumph. amb.* 5. p. 88.

t. 47. f. 2.

Habitat in Amboina. †

RUBUS foliis simplicibus palmatis, caule inermi odoratus, multifolio multifloro. *Hort. cliff.* 192. * *Hort. ups.*

t. 33. *Roy. lugdb.* 274. *Mill. ic.* 223.

Rubus odoratus. *Corn. canad.* 149. t. 150.

Habitat in Canada. 2. †

* * *Herbacei.*

- taxatilis.* 10. RUBUS foliis ternatis flagellis nudis reptans herbaceis. *Fl. suec.* 411; 447.
 Rubus caule repente annuo, foliis ternatis. *Fl. suec.* 206. *Roy. lugdb.* 274. *Hall. helv.* 344. *Roy. lugdb.* Chamærubus taxatilis.
Habitat in Europæ collibus lapidosis.
- arcticus.* 11. RUBUS foliis ternatis, caule inermi unifloro. *suec.* 412; 448. * *Mat. med.* 244.
 Rubus caule unifloro, foliis ternatis. *Fl. lapp.* t. 5. f. 2. *Hort. cliff.* 292. *Roy. lugdb.* 274.
 Rubus humilis, flore purpureo. *Buxb. cent.* 5. p. 1. t. 26. mala.
 Rubus trifolius humilis non spinosus, sapore & re fragariæ, fructu rubro polycocco. *Ann. rubi.* *Habitat in Bothnia Sveciæ, Sibiria, Canada.* ¶
- Chamæmor-
rus.* 12. Rubus foliis simplicibus lobatis, caule inermi unifloro. *Fl. suec.* 413; 449. * *Mat. med.* 244.
 Rubus caule bifolio unifloro, foliis simplicibus. *Fl. lapp.* 208. t. 5. f. 1. *Hort. cliff.* 192. *Roy. lugdb.* Chamærubus foliis ribes. *Bauh. pin.* 480.
 Morus norvegica. *Till. aboens.* 47. t. 150. *Oed. dan.* *Habitat in Sveciæ paludibus uliginosis, turfosis, quens.* ¶
Planta dioica est.
- Dalibarda.* 13. RUBUS foliis simplicibus cordatis indivisis cordatis, scapo aphyllis unifloro.
Dalibarda. *Sp. pl.* 1. p. 491.
Habitat in Canada. *Kalm.* ¶
*Radix repens. Stolones repentes, herbacei. (violæ) cordata, obtusa, crenata, venosa, pilis adspersa. Petioli pilosi, longitudine foliorum. Siliques nudi s. aphylli, pilosi, longitudine foliorum, unguiculati. Calyx 5partitus. Corolla alba. Semina 3, ovata, nuda. Stamina longitudine corollæ. Antheræ masculi & feminei in eadem planta? Habitus conjunctionem cum Rubo, imprimis Chamæmor-
uraque distinguenda a Rubis.*

FRAGARIA.

- vesca.* 1. FRAGARIA flagellis reptans. *Hort. cliff.* 192. ¶

upf. 133. *Fl. suec.* 414; 450. *Mat. med.* 245. *Roy. lugdb.* 274. *Hall. helv.* 243.

Fragaria vulgaris. *Bauh. pin.* 326. *Fl. lapp.* 209. *Gron. sylvestris. virg.* 56.

Fragaria fructu albo. *Bauh. pin.* 326.

Fragaria fructu parvi pruni magnitudine. *Bauh. pin.* 327. *pratensis.*

Fragaria chiloensis, fructu maximo, foliis carnosis hirsutis. *Dill. eth.* 145. *t.* 120. *f.* 146. *chiloensis.*

Habitat in Europæ borealis sterilibus, duris, apricis. 2
Varietas β pratensis, quæ in hortis sativa audit, distinguitur Baccæ a calyce non sponte secedente, & ejusdem scrobiculis pro singulis feminibus.

FRAGARIA caule erecto suffruticoso, foliis hirsutis. † *muricata.*

Fragaria arborea, flore herbaceo. *Zan. hist.*

Fragaria major vesca, flore herbaceo. *Morif. hist.* 2. *p.* 186.

Habitat in - - - †

Folia inter flores distinguunt hanc a prima.

FRAGARIA caule decumbente repente. *Roy. lugdb. sterilis.* *274. Dalib. paris.* 14. *Sauv. monsp.* 177. *Huds. angl.* 195.

Fragaria sterilis. *Bauh. pin.* 327.

Fragaria sterilis s. minime vesca hirsuta minime incana. *Morif. hist.* 2. *p.* 186. *f.* 2. *t.* 19. *f.* 5.

Fragaria sylvestris minime vesca s. sterilis. *Lob. ic.* 698.

Habitat in Anglia, Helvetia. 2

Caules procumbentes; nullus rectus; Pedunculi axillares, uniflori; Foliola ovalia; Baccæ exsuccæ.

POTENTILLA.

* *Foliis pinnatis.*

POTENTILLA foliis pinnatis, caule fruticoso. *Hort. fruticosa. cliff.* 193. *Fl. suec.* 416; 451. *Roy. lugdb.* 275. *Huds. angl.* 195. *Kalm. it.* 2. *p.* 263.

Pentaphylloides rectum fruticosum eboracense. *Morif. hist.* 2. *p.* 193. *f.* 2. *t.* 23. *f.* 5. *Hortul. angl.* 54. *t.* 54.

Pentaphylloides rectum frutescens. *Walth. hort.* 95. *t.* 17.

Pentaphylloides fruticosa elatior. *Anm. ruth.* 88. *t.* 17.

89. t. 18. *f.* 1.

Habitat in Eboraco Angliæ, Oelandia australi, Sibiria †

- Anserina 2. **POTENTILLA** foliis pinnatis ferratis, caule
 pente. *Fl. lapp.* 210. *Fl. svec.* 415; 452. *Hort.*
 193. *Mat. med.* 246. *Roy. Lugdb.* 275.
Potentilla. *Bauh. pin.* 321. *Cam. epit.* 758.
Habitat in Europæ pascuis; in argillofis argentea.
- sericea. 3. **POTENTILLA** foliis bipinnatis utrinque tomentosis: segmenti parallelis approximatis, caulibus cumbentibus.
Potentilla foliis pinnatis hirsutis, pinnis tredecimatis crenatis decurrentibus. *Hall. gatt.* 2. p. 106.
Potentilla foliis duplicato-pinnatis: pinnulis linearibus integerrimis brevibus. *Gmel. mss.*
Habitat in Sibiria. 24
Habitus foliorum P. anserinae argentea, quoniam in ma, Caulis vero & fructificationes P. verna. R. Squamis foliorum rudribus nigris vestita. P. pinnata ex 13. circiter foliolis ovatis, tomentosis sericeis, pectinato-pinnatifidis, & parallelis. P. dunculi pilosi. Caules foliis duplo s. triplo longius decumbentes absque sarmentis, nec repentes, a di. folio unico minori magisque divaricato inter teretes, apicè Floribus aliquot luteis, alternis, dunculatis.
- multifida. 4. **POTENTILLA** foliis bipinnatis: segmentis interrimis distantibus subtus tomentosis, caule decumbente.
Pentaphylloides supinum minus, folio glabro ferrato. *Amm. ruth.* 116.
Pentaphylloides repens, foliis pinnatis. *Burk. cat.* p. 30. t. 49. f. 1.
 β. *Pentaphylloides supina minor, foliis alatis hirsute varie dissectis.* *Amm. ruth.* 117.
Habitat in Sibiria, Tataria, Cappadocia. 24
Habitus multa indicat affinia cum P. argentea. P. ex septem foliolis: segmentis linearibus s. lanceolatis quinque s. summum septenis, alternis, at in impari positis, a se invicem hiantibus sive apice remotis, subtus tomentosis.
- fragarioides. 5. **POTENTILLA** foliis pinnatis ternatisque: ext majoribus, flagellis reptantibus.
Potentilla foliis ternatis hirsutis utrinque virid lobatis accessorius. *Gmel. mss.*

Potentilla foliis novenis palmatis apice ferratis. *Hall.*

gætt. 2. p. 106.

Habitat in Sibiria. 2.

Facies *Fragaria sterilis*. Radix subtuberosa. Folia ferricea petiolis pilosis, pinnata ex 3. 5. vel 7. Foliolis ovatis, oppositis, ferratis, basi quo propioribus eo minoribus. Stolones decumbentes.

POTENTILLA foliolis pinnatis alternis: foliolis *rupestris.*
quinis ovatis crenatis, caule erecto. *Hort. cliff.*

193. It. w: goth. 63; 76. Fl. sivec. 2. p. 453.

Pentaphylloides erectum. *Bauh. hist. 2. p. 398. Moris. hist. 2. p. 192. f. 2. t. 20. f. 1.*

Quinquefolium fragiferum. *Bauh. pin. 326. Clus. hist. 2. p. 107. n. 5.*

Habitat ad latera montium Westrogothiæ, Sibiria, Germaniæ. 2.

POTENTILLA foliis pinnatis subæqualibus: foliolis *bifurca:*
oblongis subbifidis: extimis confluentibus.

Pentaphylloides orientale supinum, foliis alatis bifidis vel trifidis. *Tournef. cor. 21.*

Habitat in Sibiria. 2.

POTENTILLA foliis pinnatis, foliolis subrotundis *pimpinelloides.*
dentatis æqualibus, caule erecto.

Pentaphylloides orientale erectum, folio & facie *pimpinellæ.* *Tournef. cor. 21. Buxb. cent. 1. p. 30. t. 48.*

Habitat in Armeniæ saxosis. 2.

POTENTILLA foliis pinnatis, caule dichotomo *supina.*
decumbente. *Hort. cliff. 193. Hort. upf. 133. Roy. lugdb. 275.*

Pentaphyllum alpinum minus supinum. *Pluk. alm. 285. t. 106. f. 7.*

Pentaphyllum supinum quorundam, potentillæ facie. *Clus. hist. 2. p. 107.*

Pentaphylli species flore luteo enneaphyllos hirsuta. *Ambros. phyt. t. 414.*

Quinquefolio fragifero affinis. *Bauh. pin. 326.*

Habitat ad Moguntiam & in Sibiria. ☉

* * *Foliis digitatis.*

POTENTILLA foliis septenatis lanceolatis ferratis *recta.*
utrinque subpilosis, caule erecto.

Potentilla foliis digitatis, caule erecto corymbosa.

Hort. upf. 133. * *Roy. lugdb.* 275.

Quinquefolium rectum luteum. *Bauh. pin.* 325.

Quinquefolium alterum vulgare. *Dod. pempt.* 116.

Habitat in Italia, Narbona, ad agrorum margines. 2

Folia utrinque viridia, at adulta fere nuda.

argentea.

11. **POTENTILLA** foliis quinatis cuneiformibus incisissimis subtus tomentosis, caule erecto.

Potentilla foliis digitatis, caule erecto corymbosa. *Hort. upf.* 417; 454.

Potentilla foliis digitatis inciso-ferratis, caule erecto. *Hort. cliff.* 193.

Quinquefolium folio argenteo. *Bauh. pin.* 325.

Pentaphyllum minus. *Cam. epit.* 760.

Habitat in Europæ tuderatis. 2

hirta,

12. **POTENTILLA** foliis septenatis quinatisque cuneiformibus incisissimis pilosis, caule ascendente.

Quinquefolium montanum rectum hirsutum. *Bauh. pin.* 325. *prodr.* 139.

Habitat Monspeli. D. Sauvages; inque Pyrenæis. 2

Differt a præcedente Foliis radicalibus septenis, & petiolo longis distinctis pilis hirsutis, nec tomentosis, & pedunculo argutius furcatis. Pedunculi uniflori, longi.

stipularis.

13. **POTENTILLA** foliis septenatis sessilibus stipularibus dilatatae infidentibus.

Potentilla foliis novenis stipularibus infidentibus. *Gmel. bot. tatar.* 102.

Habitat in Sibiria. 2

Caulis ascendens, filiformis, lævis, apice divifus. Stipulae amplexicaules, solitariae, emarginatae. Folia 8 ad 9 lineari-lanceolata, subserrata, glabra, & emarginatura stipulae pendentia absque petiolo.

aurea.

14. **POTENTILLA** foliis radicalibus quinatis serratis acuminatis; caulinis ternatis, caule declinato. *Ann. bot. par.* 179.

acad. 4. p. 316. *

Potentilla foliis quinatis acute ferratis ora sericea, petalis maculatis. *Hall. helv.* 339. t. 6. f. 4.

Quinquefolium minus repens alpinum aureum. *Bauh. pin.* 325.

Habitat in Alpibus Helvetiæ. 2

verna.

15. **POTENTILLA** foliis radicalibus quinatis serratis acuminatis; caulinis ternatis, caule declinato. *Ann. bot. par.* 179.

atis retusis; caulinis ternatis, caule declinato.

*Spec. 419. 455. **

stilla foliis quinatis incisif, caule affurgente. *Fl.*

2. 212. Hort. cliff. 194. Roy. lugdb. 276.

uefolium minus repens luteum. *Bauh. pin.*

phyllum f. Quinquefolium minus. *Tabern. ic.*

at in Europæ pascuis siccis, frigidioribus. *24*

GENTILLA foliis radicalibus quinatis cuneiformibus serratis, caulinis suboppositis, ramis filiformibus decumbentibus. *Amæn. acad. 4. p. 274. **

df. angl. 196.

uefolium minus repens lauginosum luteum.

th. pin. 325.

uefolium IV, flavo flore 2. species. *Clus. hist.*

1. 106. f. 106.

uefolio similis enneaphyllos hirsuta. *Bauh. pin.*

1. prodr. 139.

at in Austria, Helvetia, Baldo. *24*

GENTILLA foliis quinatis villosis, caule ascendente hirsuto.

uefolium canadense humilium. *Morif. hist. 2. p.*

at in Canada. *Kalm.*

us *Fragariæ*. Folia radicalia quinata: foliolis oblongis, acute serratis, supra pubescentibus, subtus villosis albo-sericeis, petiolis valde albo-hirsutis. Caulis digitalis, ramosus, rarioribus foliis. Corollæ alba. Similis *P. vernæ*, a qua differt foliis valde serratis, argute serratis, subrotundis & caule valde erecto.

GENTILLA foliis quinatis apice conniventibus, caulibus filiformibus procumbentibus, reticulatis hirsutis. *Hort. cliff. 194. Roy. lugdb. 276.*

uefolium album. *Hall. it. helv. 70.*

uefolium album majus alterum. *Bauh. pin. 325.*

uefolium tragi. *Trag. hist. 507.*

phyllum majus, flore albo. *Clus. hist. 2. p. 105.*

at in alpinis Stiriz, Austriæ, Pannoniæ. *24*

GENTILLA foliis quinatis apice conniventibus, caulibus

ferratis, caulibus multifloris erectis, receptaculis hirsutis. *Amæn. acad. 4. p. 317. **

Quinquefolium album majus. *Bauh. prodr. 139. c. scens. Bauh. pin. 325. Hall. opusc. 263. n. 52. &*

Quinquefolium album minus alterum. *Bauh. pin. 325.*

Quinquefolium s. minus, albo flore. *Clus. hist. 105.*

Habitat in Alpibus Helvetiæ, Austriæ, Stiriz, & Dei. 24

valderia. 20. **POTENTILLA** foliis septenatis obovatis tomentosis, caule erecto, petalis calyce brevibus, receptaculis lanatis.

Habitat in Alpibus Valderianis & Vinadenibus. Folia radicalia septena: foliolis obovatis, comæ ferratis, subtus valde tomentosis. Caulis erectus foliis ternatis. Flores dichotomi, corymbosi, ferti. Petala alba, calyce breviora.

nitida. 21. **POTENTILLA** foliis quinatis tomentosis octo-venti-tridentatis, caulibus unifloris, receptaculis lanatis. *Amæn. acad. 4. p. 316. **

Heptaphyllum argenteum alpinum trifoliatum nudum. *Bocc. mus. 2. p. 20. t. 9.*

Trifolium alpinum argenteum, perfici flore. *pin. 328. Pon. bald. 222. Raj. hist. 615.*

Comaroides alpina argentea sericea, perfici flore. *ver. 1. p. 497.*

Habitat in Baldo. Seguier. 24

reptans. 22. **POTENTILLA** foliis digitatis, caule repentibus, pedunculis unifloris. *Fl. svec. 418; 456. Mar. med.*

Potentilla foliis digitatis longitudinaliter patentibus, caule repente. *Hort. cliff. 194. Gron. virg.*

Quinquefolium majus repens. *Bauh. pin. 325.*

Quinquefolium majus luteum. *Fuch. hist. 624.*

Habitat in Europæ apricis argillofis. 24

* * * *Foliis ternatis.*

monspeliensis. 23. **POTENTILLA** foliis ternatis, caule ramosis, pedunculis supra genicula enatis. *Hort.*

134.

Pentaphylloides majus erectum, flore luteo. *hist. 2. p. 193. f. 2. t. 20. f. 2.*

staphylloides fragariæ folio. *Magn. monsp.* 304.
 garia sterilis alpina caulescens. *Boerh. lugdb.* 1.
 . 42.

bitat Monspeli. ☉

liola ovata, obtuse & æqualiter serrata.

OTENTILLA foliis ternatis, caule dichotomo, norvegica.
 edunculis axillaribus.

entilla foliis ternatis, caule corymboso erecto. *Fl.*
sc. 420; 457. *

entilla foliis ternatis incisis, caule diffuso. *Fl. lapp.*
 11. *Hort. cliff.* 193. *Roy. lugdb.* 275.

inquefolium hirsutum luteum paucioribus laciniis.
Æsel. pruss. 218. t. 79.

bitat in Norvegiæ, Sueciæ, Borussia, Canada
 gris. ☉

liola lanceolata, serrata, dentata.

OTENTILLA foliis ternatis incisis subtus tomentosis, caule ascendente. *Fl. svec.* 2. n. 458. *

entilla foliis ampliter crenatis subtus tomentosis.
Hall. gert. 2. p. 108.

garia sterilis procumbens, foliis betonicæ instar
 erratis. *Amm. ruth.* 109. t. 14. f. 2.

bitat in Alpibus Lapponiæ, Sibiria.

uctura *P. vernæ*, seu folia *P. argentiæ*, at terna &
 riora, magisque hirsuta, subtus tomentosa nivea. Co-
 olla lutea.

OTENTILLA foliis ternatis dentatis utrinque grandiflora.
 ubpilosis, caule decumbente foliis longiore.

entilla foliis ternatis, petalis cordatis luteis. *Hall.*
elv. 342. t. 6. f. 2.

garia sterilis, amplissimo folio & flore, petalis
 cordatis. *Vaill. parif.* 55. t. 10. f. 1.

bitat in Helvetia, Sibiria, Pyrenæis. ☉

lia utraque pagina concoloria, nec inferiori argentea.
 Caules pedales, ascendentes: rufescentes.

OTENTILLA foliis ternatis dentatis utrinque tomentosis, scapo decumbente. subcaulis.

garia sterilis sylvestris sericea s. incana. *Morif. hist.*
 . p. 187.

gariæ affinis sericea incana. *Bauh. pin.* 397. prodr.
 39.

Habitat in Sibiria, Gallia australi, Granada, & provinciæ rupe victoriæ. 24

Folia ternata, rugosa, dense tomentosa, pilosa, cucurbitiformia, obtusa, dentata. Stipulæ late, & pilosæ. Caulis s. Scapus decumbens, foliis superioribus biflorus s. uniflorus. Corolla maxima, petalis emarginatis, basi flavis. Stamina lutea.

TORMENTILLA.

erecta.

1. **TORMENTILLA** caule erectiusculo, foliis ternatis
Tormentilla. Cam. epit. 685. Fl. lapp. 213. Fl. 421; 459. Mat. med. 249. Hort. cliff. 194. Lugdb. 276.

Tormentilla sylvestris. Bauh. pin. 326.

Habitat in Europæ pascuis siccis. 24

repens.

2. **TORMENTILLA** caule repente, foliis pentaphyllum
Huds. angl. 197.

Pentaphyllum minus viride, flore aureo tetrapetalis, radículas in terram e geniculis dimittens. M. hist. 2. p. 190.

Pentaphyllum reptans alatum, foliis profundius ratis. Plot. oxf. 6. §. 7. t. 9. f. 5.

Habitat in Anglia. 24

GEUM.

virginianum.

1. **GEUM** floribus erectis, fructu globoso: aristis
cinatis nudis, foliis ternatis. Hort. cliff. 195. 6 virg. 56.

Caryophyllata virginiana, albo flore minore, & inodora. Herm. par. III. t. III.

Habitat in Virginia, Sibiria. 24

Differt a G. urbano simillimo: Petalis albis calycibus vioribus; Floribus florescentibus nutantibus; Pedicellis versus florem incrassatis; Seminibus glabris; radicalibus subbipinnatis.

urbanum.

2. **GEUM** floribus erectis, fructu globoso villosissimo:
uncinatis nudis, foliis lyratis. Hort. cliff. 195. 6 svec. 423; 460. Mat. med. 249. Roy. lugdb. 27

Caryophyllata vulgaris. Bauh. pin. 321.

Caryophyllata. Dod. pempt. 137.

Habitat in Europæ umbrosis. 24

Folia radicalia lyrata in hac, & stipulæ dentata.

EUM floribus nutantibus, fructu oblongo: aristis rivale. Plumosis. *Hort. cliff.* 195. *Fl. svec.* 424, 461. *Roy. egdb.* 276.

in rivale. *Fl. lapp.* 216.

yophyllata aquatica, nutante flore. *Bauh. pin.* 321.

yophyllata septentrionalium. *Lob. ic.* 694.

yophyllata aquatica altera. *Bauh. pin.* 322.

abit in Europæ pratis subhumidis. 2.

num aristæ apex in hac pilosus, in antecedente nudus.

EUM flore inclinato solitario, fructu oblongo: ar- montanum.
stis plumosis rectis.

yophyllata pinnis confertioribus extrema subro-
unda, tubis rectis. *Hall. helv.* 336. *

yophyllata alpina lutea. *Bauh. pin.* 322.

yophyllata alpina. *Pon. bald.* 342.

yophyllata montana. *Cam. epit.* 727.

yophyllata alpina minor. *Bauh. pin.* 322. *prodr.*
39.

yophyllata alpina minima, flore aureo. *Barr. rar.*
38. t. 399.

abit in Alpibus Helvetiæ, Austriæ, Delphinatus. 2.
ca hirsuta. Flos patens. Caulis uniflorus. Petala
creta.

EUM foliolis uniformibus incisis: alternis mino- reptans.
ribus, flagellis reptantibus.

yophyllata flagellis foliosis. *Hall. enum.* 19.

yophyllata alpina, apii folio. *Bauh. pin.* 322.

yophyllata alpina tenuifolia incana, flore luteo lon-
gus radicata. *Barr. rar.* 589. t. 400. *Bocc. mus.* 160.

128.

abit in Helvetia & valle Barfilionensi.

D R Y A S.

RYAS floribus pentapetalis, foliis pinnatis. *Amæn. pentapetala.*
acad. 2. p. 353. *

yophyllata pentaphyllea. *Bauh. hist.* 2. p. 398.

quoad solam figuram.

abit in Camtschatka. 2.

RYAS floribus octopetalis, foliis simplicibus. octopetala.

yas. *Fl. lapp.* 215. *Fl. svec.* 426; 462. *Hort. cliff.*

195. *Roy. lugdb.* 279. *Hall. helv.* 335. *Segu. ver.* 512.

Cha-

Chamædrys 3 f. *montana*. *Clus. hist. 2. p. 351.*
Leucas; *Chamædrys alpina*. *Oed. dan. t. 31.*
Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Austr
Sabaudicis, Hibernicis, Sibiricis. 2.

C O M A R U M.

palustre. 1. COMARUM. *Fl. lapp. 214. Fl. svec. 422; 462. l*
cliff. 195. Roy. lugdb. 276. Hall. helv. 337.
Quinquefolium palustre rubrum. Bauh. pin. 324.
Pentaphyllum palustre. Cord. hist. 95.
Habitat in Europæ uliginosis. 2.

C A L Y C A N T H U S.

floridus. 1. CALYCANTHUS petalis interioribus longioribus
Butneria anemones flore. Duham. arb. 1. p. 114. t.
Bacteria foliis ovatis acuminatis, caule fruticoso. l
dist. t. 60.
Beurefia petalis coriaceis oblongis, calycis foli
reflexis. Ehret. pict. t. 13.
Frutex corni foliis, floribus instar anemones bell
petalis crassis rigidis colore fordide rubente, o
ce aromatico. Catesb. car. 1. p. 46. t. 46.
Habitat in Carolina. 5

præcox. 2. CALYCANTHUS petalis interioribus minoribus
Abai f. Robai. Kämpf. amæn. 878. t. 879.
Habitat in Japonia. 6
Ignota mihi, videtur præcedentis generis, sed in
speciei, quod floreat ante folia, quodque petala
riora lutea minora flori adscribantur.

Classis XIII.

OLYANDRIA

MONOGYNIA.

MARCRAVIA.

MARCRAVIA. Jacq. *hist.* t. 95.

umbellata.

MARCRAVIA scandens, fructu radiatim posito. *Plum.*
n. 7. ic. 173.MARCRAVIA scandens, foliis caulinis subrotundis ad
argines glandulatis, ramorum integris ovatis alter-
s distiche positis, floribus umbellatis terminalibus.
rown. jam. 244. t. 26.MARCRAVIA scandenti affinis major, folio crasso subro-
tundo. *Sloan. jam.* 15. *hist.* 1. p. 74. t. 28. f. 1. mala.
Itat in America calidiore. †MARCRAVIA alterna, petiolata, ovato-lanceolata, integerrima.
Umbella simplex pedunculis numerosis, in orbem po-
sitis, æqualibus, horizontaliter patentibus. Flores
ascendentes, nudi, corolla calyceque caducis. Di-
scus umbellæ constans glandulis nectariferis, sessili-
bus, sæpius quinis, erectis, forma corollæ ringentis
ulæ s. supremi petali aconiti, ore ambitum respi-
centibus.

R H E E D I A.

RHEEDIA. †

lateriflora.

RHEEDIA folio subrotundo, fructu luteo. *Plum.*
n. 45. t. 257.

Itat in America.

RHEEDIA tam equidem numquam vidi; certiore locum indigi-
nt autoptæ. Folia opposita, petiolata, ovata, in-
tegrissima. Pedunculi laterales s. axillares foliorum,
multiplices, conferti, uniflori. Pl.

M O R I S O N I A.

MORISONIA. Jacq. *hist.* t. 87.

americana.

MORISONIA arbor nucis juglandis folio. *Plum. gen.* 36.

n. 203.

Ha-

Habitat in America calidiorē. ♂
Folia alterna, petiolata, ovata, obtusa.

C A P P A R I S.

- spinosa.* 1. CAPPARIS pedunculis solitariis unifloris, *stip*
spinosis, foliis annuis, capsulis ovalibus.
Capparis aculeata. Hort. cliff. 203. Mat. med.
Roy. lugdb. 476. Gron. orient. 154.
Capparis spinosa, fructu minore, folio rotunda.
pin. 480.
 β. *Capparis folio acuto. Bauh. pin. 480.*
Capparis sicula, duplicata spina, folio acuto. Bonp.
79. t. 42. f. 3.
Habitat in Europæ australis & Orientis ruder
muris. ♂
- zeylanica.* 2. CAPPARIS pedunculis solitariis unifloris, *stip*
spinosis, foliis ovatis utrinque acutis. Fl. zeyl.
Capparis zeylanica, duplicatis spinis, folio acuto.
mus. 625.
Capparis spinosa, foliis oblongis. Burm. zeyl. 3.
Habitat in Zeylona. ♂
Utrum hæc distincta species, aut etiam varietas præ-
tis, dicant qui fructum obtinent.
- sepiaria.* 3. CAPPARIS pedunculis umbellatis, *stipulis spin*
foliis annuis ovatis emarginatis.
Arbuscula baccifera scandens spinosa, foliis bux-
lidioribus. Pluk. mant. 27. t. 338. f. 3.
Habitat in India. ♂
Rami teretes, lignosi. Spinæ stipulares, geminae
curvæ, breves, nigre. Folia subpetiolata, &
nuda, integerrima, emarginata. Umbellæ termi-
simplices, multifloræ: Pedunculo communi, brevi.
- Badraca.* 4. CAPPARIS pedunculis subsolitariis, *foliis per*
tibus ovato-oblongis nudis determinate conf-
Capparis inermis, foliis ovato-oblongis per spati-
*fertis perennantibus. Hort. cliff. 204. **
Capparis alia arborescens, lauri foliis, fructu ob-
ovato. Plum. spec. 7. ic. 73. f. 2.
Breynia fruticosa, foliis singularibus oblongo-
superne nitidis, siliquis minoribus teretibus &
bus. Brown. jam. 246. t. 27. f. 2.

Baducca. Rheed. mal. 6. p. 105. t. 57. Raj. dendr. 1630.

Habitat in Indijs. †

Folia utrinque glabra, venis obsolete reticulata, imprimis subtus.

5. **CAPPARIS** pedunculis multifloris terminalibus angulatis, foliis persistentibus ovalibus obtusis. Cynophal
lophor.

Capparis inermis, foliis ovalibus alternis perennantibus.

*Hort. cliff. 204. **

Capparis arborescens, lauri foliis, fructu longissimo.

Plum. spec. 7. ic. 73. f. 1.

Breynia fruticosa, foliis oblongis obtusis. Brown. jam.

246. t. 27. f. 1.

Cynophallophorus s. Penis caninus caribæorum arbor,

foliis subrotundis clavos pulpiferos phalloses pro

siliquis gerens. Pluk. alm. 126. t. 172. f. 4.

Acaciæ affinis arbor siliquosa, folio subrotundo sin-

gulari, flore stamineo albido, siliqua tereti ventrico-

sa interiore tunica mucosaminiata. Sloan. jam. 1538.

hist. 2. p. 59. Raj. dendr. 102.

Habitat in America meridionali. †

5. **CAPPARIS** pedunculis unifloris compressis, foliis siliquosa.
persistentibus lanceolato-oblongis acuminatis subtus
punctatis.

Breynia arborescens, foliis ovatis utrinque acuminatis,

siliqua torosa longissima. Brown. jam. 247.

Planta forte. Pluk. phyt. 327. f. 6.

Habitat in Jamaica. †

Simillima præcedenti. Folia supra nitida, subtus pul-
vere ferrugineo adpersa, valde acuminata.

7. **CAPPARIS** pedunculis racemosis, foliis persistenti- Breynia.
bus oblongis, pedunculis calycibusque tomentosis,
floribus octandris. *Jacq. hist. t. 103.*

Breynia foliis oblongo-ovalibus. Roy. lugdb. 476. Sp.

pl. 1. p. 503.

Breynia elæagni foliis. Plum. gen. 40. Breyn. ic. 13.

c. fig.

*Breyniæ affinis arbor octandra. Læfl. it. 207. **

Habitat in America. †

8. **CAPPARIS** pedunculis umbellatis, foliis persistenti- ferrugine.
bus lanceolatis subtus tomentosis, floribus octandris.

*Amæn. acad. 5. p. 398. **

Linnaei Spec. plant. pars. 1.

Z z

Cra-

Cratæva fruticosa, foliis singularibus oblongis utrinque acutis subtus quasi villosis, floribus octandris, racemis comosis alaribus. *Brown. jam.* 247. t. 28.

f. 1.

Habitat in Jamaica. †

9. **CAPPARIS** pedunculis congestis terminalibus, foliis persistentibus oblongis obtusis glabris, ramis flexuosis.

Morisona flexuosa. *Amæn. acad.* 5. p. 398. *

Habitat in Jamaica. †

10. **CAPPARIS** pedunculis multifloris, foliis hastato-lanceolatis nitidis. *Jacq. amer.* 23. t. 174 f. 56.

Habitat in America. †

A C T Æ A.

1. **ACTÆA** racemo ovato, fructibusque baccatis.

Actæa. *Hort. cliff.* 209. *Fl. suec.* 431; 464. *Hort. ups.* 138. *Mat. med.* 253. *Roy. lugdb.* 480. *Dalib. parif.* 152.

Actæa caule inermi. *Fl. lapp.* 217.

Aconitum bacciferum. *Bauh. pin.* 183.

Christophoriana. *Clus. hist.* 2. p. 86.

β. **Actæa** racemo ovato, fructibus niveis, radice tuberosa. *Mill. dict.*

Aconitum baccis niveis. *Corn. canad.* 76. t. 77.

Christophoriana americana racemosa baccis, niveis & rubris. *Morif. hist.* 2. p. 8. f. 1. t. 2. f. 7.

Habitat in nemoribus Europæ; β. Americæ. 24

Petala rhombea, plano-membranacea.

2. **ACTÆA** racemis longissimis, fructibus unicapularibus.

Actæa racemis longissimis. *Gron. virg.* 59. *Mat. med.* 253.

Christophoriana americana procerior & longius spicata.

Dill. elth. 79. t. 67. f. 78.

Christophorianæ facie herba spicata. *Pluk. amalth.* 54. t. 383. f. 3.

Habitat in Florida, Virginia, Canada. 24

Petala crassa, gibba, minima, pedicellata, acumine setaceo-acuminata, calycis foliolis plura.

3. **ACTÆA** racemis paniculatis, fructibus quadricapularibus

Cimicifuga *Amæn. acad.* 2. p. 54.

Thalictroides foetidissimum, christophorianæ facie.
Amm. ruth. 102.

Habitat in Sibiria. D. Kraschennnikof. 24

Petala 4. subrotunda, calyce majora, teneriora. Styli. 4.

SANGUINARIA:

SANGUINARIA. *Hort. cliff.* 202. *Gron. virg.* 57. *canadensis.*

Sanguinaria minor, flore simplici. *Dill. elth.* 335. t. 252. f. 326.

Chelidonium majus canadense acaulon. *Corn. canad.* 212. *Morif. hist.* 2. p. 257. f. 3. t. 11. f. 1. *Raj. hist.* 1887.

Ranunculus virginienſis albus. *Park. theatr.* 327. *Raj. suppl.* 314.

Sanguinaria major, flore simplici. *Dill. elth.* 335. t. 252. f. 325.

Sanguinaria major, flore pleno. *Dill. elth.* 335. t. 252. f. 326.

Habitat in America septentrionali. 24

PODOPHYLLUM.

PODOPHYLLUM foliis peltatis palmatis.

peltatum.

Podophyllum. *Hort. cliff.* 202. *Hort. ups.* 137. *Gron. virg.* 57. *Roy. lugdb.* 480. *Trew. ehret.* t. 29.

Anapodophyllum canadense. *Catesb. car.* 1. p. 24. t. 24.

Aconitifolia humilis, flore albo unico campanulato; fructu cynosbati. *Mentz. pug.* t. 11.

Habitat in America septentrionali. 24

PODOPHYLLUM foliis binatis semicordatis.

diphyllum.

Habitat in Virginia. Collinson. 24

Folia radicalia, petiolata, binata ut in *Hymenæa*; glabra, integerrima, semicordata, absque pedicellis. Scapus radicalis, uniflorus, fructu antecedentis. Flos mihi non visus.

CHELIDONIUM.

CHELIDONIUM pedunculis umbellatis.

majus.

Chelidonium pedunculis multifloris. *Hort. cliff.* 201.

fl. ſvec. 430; 465. *Hort. ups.* 137. *Mat. med.* 252.

Roy. lugdb. 478. *Dalib. parif.* 152.

Chelidonium majus vulgare. *Bauh. pin.* 144.

Chelidonium majus. *Fuchf. hist.* 865.

β. *Chelidonium majus*, foliis quernis. *Bauh. pin.* 144

Chelidonium majus, folio laciniato. *Clus. hist.* 203.

Habitat in Europæ ruderatis. 24

glaucium. 2. **CHELIDONIUM** pedunculis unifloris, foliis a
plexicaulibus sinuatis, caule glabro.

Chelidonium glabrum, pedunculis unifloris. *Hort.* 137. *Ray. lugdb.* 473. *Dalib. parif.* 152.

Chelidonium pedunculis unifloris. *Hort. cùf.* 91
Gron. virg. 57.

Papaver corniculatum luteum. *Bauh. pin.* 171.

Papaver corniculatum, flavo flore. *Clus. hist.* 2. p. 9

Habitat in Angliæ, Helvetiæ, Galliæ, Italiæ, Virg-
niæ arenosis. ☉

Planta glauca. *Caulis lævis.* *Folia scabriuscula: n-*
dicalibus pinnatifidis; caulinis solum lobatis. *Flores*
flavi. *Siliquæ scabræ, dissepimento in loculament-*
uti sequentes, distinctæ

cornicula-
tum. 3. **CHELIDONIUM** pedunculis unifloris, foliis
libus pinnatifidis, caule hispido.

Chelidonium hispidum, pedunculis unifloris. *Hort.* 137. *Sauv. monsp.* 286.

Glaucium hirsutum, flore phœniceo. *Tournef. infl.* 25

Papaver corniculatum phœniceum hirsutum. *Bauh.*
pin. 171.

Papaver cornutum, phœniceo flore. *Clus. hist.* 2. p. 9

β. *Papaver corniculatum phœniceum glabrum.* *Bauh.* 171.

Habitat in Hungaria, Bohemia, Monspeli. ☉

Planta viridis. *Folia omnia pinnatifida.* *Flores*
bro-lutei. *Siliquæ hispidae.*

ybridum. 4. **CHELIDONIUM** pedunculis unifloris, foliis
nativis linearibus, caule lævi, siliquis trivalvib

Papaver caule ramofo, foliis linearibus pinnatif-
capsulis sulcatis. *Hort. upf.* 136. *Sauv. monsp.* 2

Papaver corniculatum violaceum. *Bauh. pin.* 171

Papaver corniculatum, violaceo flore. *Clus. hist.*
p. 92.

Habitat in Europa australiore. ☉

Stigmata. 3.

P A P A V E R.

* *Capsulis hispidis.*

PAPAVER capsulis subglobosis torosis hispidis, caule folioso multifloro. *hybridum.*

Papaver foliis ternato-pinnatifidis, capsulis sulcatis hispidis. *Hort. cliff. 201.*

Papaver caule ramofo, foliis lineari-pinnatifidis, capsulis sulcatis hispidis. *Hort. upf. 136.*

Argemone capitulo brevior. *Bauh. pin. 172.*

Argemone capitulo hirsuto rotundo torulis canaliculato. *Morif. hist. 2. p. 278. f. 3. t. 14. f. 9. Lob. ic. 276*

Habitat in Europa australiore. ☉

PAPAVER capsulis clavatis hispidis, caule folioso multifloro. *Argemone.*

Papaver capsulis hispidis oblongo-turbinatis sulcatis. *Fl. suec. 429, 466. Dalib. parif. 152. Gron. orient. 158.*

Papaver foliis ternato-pinnatis, fructu angulato. *Hort. cliff. 201. Roy. lugdb. 419. Sauv. monsp. 252.*

Argemone capitulo longiore. *Bauh. pin. 172. Lob. ic. 276.*

Argemone capitulo tenuiore longiore hirsuto. *Morif. hist. 2. p. 278. f. 3. t. 14. f. 10.*

Habitat in Europæ campis arenosis. ☉

Folia tripartita pinnatifida. Pedunculi scabri. Calyces capsulaeque pilosæ.

PAPAVER capsula hispida, scapo unifloro nudo hispido, foliis bipinnatis. *alpinum.*

Papaver perenne, pilis rigidissimis, foliis pinnatis, flore luteo hirsuto. *Hall. helv. 304.*

Papaver alpinum saxatile, coriandri folio. *Segu. ver. 1. p. 416. t. 4. f. 4.*

Argemone alpina, foliis scandicis, lutea. *Bauh. pin. 172. prodr. 93. Burf. IX. 58.*

Argemone alpina, coriandri folio. *Bauh. pin. 172.*

Argemone minor penæ. *Dalech. hist. 1714.*

Habitat in Helvetia, Schneeberg Austriae, Pyrenæis. 2. Flores plantæ Burserianæ apud C. Bauhinum albi erant, nec lutei, asserente Bursero.

PAPAVER capsulis hispidis, scapo unifloro nudo nudicaule hispidum.

hispido, foliis simplicibus pinnato-sinuatis. *Hort. ups.* 136.

Papaver erraticum, nudicaule flore flavo odorato
Dill. elt. 202. t. 224. f. 291. *Oed. dan.* t. 41.

Papaver erraticum, luteo flore, capite oblongo hispido
Amm. ruth. 61. n. 81.

Habitat in Sibiria. ♂

Pedunculi & calyces pilosi.

* * Capsulis glabris.

dubium.

5. PAPAVER capsulis oblongis glabris, caule multifloro setis depressis, foliis pinnatifidis incis. *Fl. suec.* 2. n. 467.

Papaver erraticum, capite longissimo glabro. *Tournef. hist.* 238. *Rupp. jen.* 3. p. 71.

Argemone capitulo longiore glabro. *Morif. Més.* 231. *hist.* 2. p. 279. f. 3. t. 14. f. 11.

Habitat inter sgetes Europæ septentrionalioris. ☉

Rhœas.

6. PAPAVER capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incis.

Papaver foliis pinnatifidis hispidis, fructu ovato. *Hort. cliff.* 201. *Fl. suec.* 428; 468. *Mat. med.* 251. *Roy. lugdb.* 478. *Dalib. parif.* 151. *Hall. helv.* 303.

Papaver caule multifloro folioso hispido, foliis pinnatifidis, capsulis lævibus. *Hort. ups.* 136. *Sauv. monf.* 252. *Gron. orient.* 157.

Papaver erraticum majus. *Bauh. pin.* 171.

Papaver rhœas prius. *Dalch. hist.* 439.

β. Papaver erraticum, pleno flore. *Bauh. pin.* 171.

γ. Papaver erraticum minus. *Bauh. pin.* 171.

Habitat in Europæ arvis, agris. ☉

Pili in caule patentes sunt.

somniferum.

7. PAPAVER calycibus capsulisque glabris, foliis anplexicaulibus incis.

Papaver caule multifloro, foliis simplicibus glabris incisis caulinis. *Hort. ups.* 135. *Mat. med.* 250.

Papaver foliis simplicibus glabris incis. *Hort. cliff.* 200. *Hall. helv.* 303. *Roy. lugdb.* 879.

Papaver hortenſe, semine albo. *Bauh. pin.* 170.

β. P. papaver hortenſe, semine nigro. *Bauh. pin.* 170.

γ. Papaver cristatum, floribus & semine album. *Bauh. pin.* 171.

δ. Pa-

Papaver cristatum, floribus rubris, semine nigro. *Bauh. pin.* 171.

Papaver flore pleno, album. *Bauh. pin.* 171.

Habitat in Europæ australioris ruderatis. ☉

Caulis, Folia, Calyces, Capsula glabra. Stigmata ro-

PAPAVER capsulis glabris oblongis, caule multifo- cambriticum
ro lævi. foliis pinnatis incis. *Huds. angl.* 203.

Papaver foliis pinnatis, fructu acuminato. Hort. cliff.
201. *Roy. lugdb.* 479.

Papaver cambriticum perenne, flore sulphureo. Dill.
elth. 300. t. 223. f. 290.

Argemone cambro-britannica lutea, capite longiore
glabro. Moris. hist. 2. p. 297. f. 3. t. 14. f. 12.

Papaver erraticum pyrenaicum, flore flavo. Bauh. pin.
171. *prodr.* 92. *Burf. IX.* 45.

Habitat in Cambriæ septentrionalis nemorosis, Pyre-
æis. 2.

Stigmata 5 f. 6, distincta. Capsula oblonga, inferne
angustior, apice subrostrata.

PAPAVER capsulis glabris, caulibus unifloris sca- orientale.
bris foliosis, foliis pinnatis ferratis. *Hort. upf.* 136.

Papaver foliis pinnatis, fructu globoso Roy. lugdb.
279.

Papaver orientale hirsutissimum, flore magno. Tournef.
cor. 17. *itin.* 3. p. 127. t. 127. *Comm. rar.* 34. t. 34.

Habitat in Oriente. ☉

Stigmata 16. Setæ in caule sparse, cauli adpressæ, basi
prominula asperæ.

ARGEMONE

ARGEMONE capsulis quinquevalvibus, foliis spi- mexicana.
nosis.

Argemone. Hort. cliff. 201. *Hort. upf.* 135. *Roy. lugdb.*
479. *Brown. jam.* 244. *Merian. surin.* 24. t. 24.

Papaver spinosum. Bauh. pin. 171. *prodr.* 93. t. 92.
Clus. hist. 2. p. 93.

Papaver spinosum luteum, foliis albis venis notatis.
Moris. hist. 2. p. 277. f. 3. t. 14. f. 5.

Habitat in Mexico, Jamaica, Caribæis, nunc in Eu-
ropa australi. ♂

ARGEMONE capsulis trivalvibus,

armeniaca

Papaver orientale, hypecoi foliō, fructu minū
Tournesf. cor. 17.
Habitat in A. menta.

3. ARGEMONE capsulis quadrivalvibus, caule nob
Habitat in t yrenæis. Tournesf.
 Hæc semiquadrivalvis, uti species secunda semitri
 vis, & prima semiqui quevalvis. Hæ species i
 sub distincto genere simul tradendæ, vel etiam ad p
 nus papaverinum amandandæ omnes. Hujus habu
 plurimum accedit *Papaveri alpino.*

C A M B O G I A.

1. CAMBOGIA. *Am. en. acad.* 1. p. 402. *Fl. zeyl.* 15
Mat. med. 257.
Coddam-pulli. Rheed, mal. 1. p. 41. t. 24.
Habitat in India. h

M U N T I N G I A.

1. MUNTINGIA. *Jacq. hist.* t. 107.
Muntingia pedunculis unifloris. Hort. cli. 203
Muntingia fruticosa villosa, foliis ferratis oblongis
no latere brevioribus. Brown. jam. 245.
Muntingia folio sericeo molli, fructu majori. Pl
gen. 41. ic. 205.
Calabura alba. Pluk. alm. 75. *mant.* 34. t. 152. f.
Loti arboris folio angustiore, rubi flore, fructu po
spermo umbilicato. Sloan. jam. 162. *hist.* 2. p. 80
 194. f. 1. *Raj. dendr.* 32.
Habitat in Jamaica. h

S A R R A C E N I A.

1. SARRACENIA foliis gibbis. *Hort. cliff.* 427. *G*
vig. 164.
Sarracena foliis brevioribus latioribus. Catesb. car
p. 70. t. 70.
Coilophyllum virginianum, brevioris folio, flore p
purascente. Moris. hist. 3. p. 533.
Bucanephyllum americanum, limonio congener dict
Pluk. alm. 71. *amalth.* 46. t. 376. f. 6.
Limonium peregrinum, foliis forma floris aristoloc
Bauh. pin. 192.
Habitat in Americæ septentrionalis udis. 21

ARRACENIA foliis strictis.

flava.

Arracena foliis rectis. *Hort. cliff.* 497. *Gron. virg.* 164.

Arracena foliis longioribus & angustioribus. *Catesb.*

car. 2. p. 69. t. 69.

Dilophyllum virginianum, longiore folio erecto, flore luteo. *Morif. hist.* 3. p. 533.

Canephyllum elatius virginianum f. Limonio congeneris altera species elatior, foliis triplo longioribus.

Pluk. alm. 72. *amalth.* 46. t. 152. f. 3. (mala). t.

376. f. 5. bona.

Turis limpidi folium. *Bauh. hist.* 1. p. 307. *Dalech.*

hist. 1754. *Lob. adv.* 430.

abitat in Americæ septentrionalis udis. 2

N Y M P H Æ A.

YMPHÆA foliis cordatis integerrimis, calyce pe- lutea.

talibus majore pentaphyllo. *Fl. lapp.* 218. *Fl. svec.* 426;

469 *Hort. cliff.* 203. *Roy. lugdb.* 480. *Dalib. paris.* 150.

Symphæa lutea major. *Bauh. pin.* 193.

Symphæa lutea. *Cam. epit.* 635.

abitat ad Europæ littora, sub dulci aqua. 2

Canada eadem, floris magnitudine vix *Calthæ.*

Kalm.

YMPHÆA foliis cordatis integerrimis, calyce qua- alba.

drifido.

Symphæa calyce tetraphyllo, corolla multiplici. *Fl.*

Lapp. 219. *Fl. svec.* 427. 470. *Hort. cliff.* 203. *Mat.*

med. 258. *Roy. lugdb.* 480. *Dalib. paris.* 150.

Symphæa alba major. *Bauh. pin.* 193.

Symphæa alba. *Cam. epit.* 634.

abitat in Europæ & Americæ aquis dulcibus. 2

YMPHÆA foliis cordatis dentatis. *Fl. zeyl.* 194. Lotus.

Hasslq. it. 471.

Symphæa foliis amplioribus profunde crenatis subtus

areolatis. *Brown. jam.* 343.

Symphæa indica, flore candido, folio in ambitu fer-

rato. *Sloan. jam.* 120. *hist.* 1. p. 252. *Raj. suppl.* 630.

Stus ægyptia. *Alp. ægypt.* 103. *exot.* 214. t. 213. 216.

218. 220. 222. 226.

Bel. *Rheed. mal.* 11. p. 51. t. 26.

abitat in calidis Indiæ, Africæ, Americæ. 2

- Nelumbo. 4. **NYMPHÆA** foliis peltatis undique integris. *Hort. cliff.* 203. *Fl. zeyl.* 193.
Nymphæa foliis orbiculatis peltatis subtus radi
Brown. jam. 343.
Nymphæa indica, *Faba ægyptia dicta*, flore incan
tiern par. 205. t. 205.
Nymphæa fabifera, indiae paludibus gaudens, h
 umbilicatis amplis, pediculis spinosis, flore r
 purpureo. *Pluk. alm.* 267. t. 322. f. 1. opt.
Taratti. Rumph. amb. 6. p. 168. t. 73.
Tamara. Rheed. mal. 11. p. 59. t. 30.
Bem-Tamara. Rheed. mal. 11. p. 61. t. 31. l
suppl. 632.
 β. *Nymphææ* affinis glandifera virginiana, umbilicato fo
 flore luteo pleno. *Morif. hist.* 3. p. 514. *Raj. suppl.*
Nymphæa glandifera virginiana lactescens, m
 umbilicato folio, pediculo leui, flore amplo h
 pallescente. *Pluk. alm.* 267.
Habitat in Indiis. 2.
Varietas β. differt seminibus duris, in reliquis com
ut vix distingvenda videatur.

B I X A.

- Orellana. 1. **BIXA.** *Hort. cliff.* 211. *Mat. med.* 266. *Roy. h*
 477. *Brown. jam.* 254.
Orleana f. *Orellana* folliculis lappaceis. *Pluk.*
 272. t. 209. f. 4. *Comm. hort.* 1. p. 65. f. 33.
Arbor mexiocana, fructu castaneæ, coccifera. *I*
pin. 419.
Urucu. Sloan. jam. 150. *hist.* 2. p. 52. t. 181. f. 1.
Habitat in America calidiore, ad fossas & fontes

S L O A N E A.

- dentata. 1. **SLOANEA** foliis cordato-ovatis denticulatis, h
 lis ferratis. *Læfl. it.* 311?
Sloanea. Hort. cliff. 210?
Sloanea amplis castaneæ foliis, fructu echinato. *I*
gen. 49 ic 244.
Castanea foliis oblongo ovatis ferratis, fructu rotu
 maximo echinato. *Mill. dict.*
Apeiba. Marcgr. bras. 123. t. 123. *Raj. hist.* 164
Habitat in America meridionali. h
Sloaneæ genus etiamnum obscurum est, & certe ex
 liis, *Pericarpii* valvulis ac hispiditate nobis

millima occurrit Milleyi sententia, quæ Fagi speciem hanc facit, quam tamen non admittit Læsingii descriptio.

LOANEA foliis oblongis integerrimis emarginatis. *emarginata.*
 Liana foliis laurinis in summitate incis, fructu compresso scabro fusco in medio acumine longo. *Catesb.*
Car. 2. p. 87. t. 87.
abitat in Carolina b

M A M M E A.

MAMMEA staminibus flore brevioribus. *americana.*
 Mamea foliis ovalibus nitidis, fructu subrotundo scabro. *Brown. jam. 248.*
 Mamei magno fructu, persicæ sapore. *Plum. gen. 44. ic. 170.*
amay. Bauh. hist. 1. p. 172. Dalech hist. 1836. Laet. Amer. 356.
 Mamea persica maxima, foliis rotundis splendidibus glabris, fructu maximo scabro rugoso. *Sloan. jam. 179 hist. 2. p. 123. t. 217. f. 3.*
 Mamea indica mamei dicta. *Bauh. pin. 417. Raj. hist. 1665.*
abitat in Hispaniola. Jamaica. h
ami scabri; Folia oblonga, obtusa.

MAMMEA staminibus flore longioribus. *Ojb. it. asiatica.*
 278.
 Mamea maxima, foliis longioribus, cortice sulcato cinereo. *Brown. jam. 248?*
 Mamea Persicæ Mameyæ folio longiore arbor maxima, cortice sulcato cinereo amaro. *Sloan. jam. 180. hist. 2. p. 124?*
abitat in Java. Osbeck. h

Arbor magna, sæpius procumbens. Folia pedalia, ovata s. oblonga, lævia. Pedunculi uniflori. Calyx ovatus, bipartitus. Petala 4, ovata, calyce triplo longiora, brevi decidua, cum staminibus corolla duplo longioribus, numerosis, subulatis, erectis. Antheræ subrotundæ, minimæ. Fructus tetragonus.

O C H N A.

CHINA racemis lateralibus. *Fl. zeyl. 209. ** *squarrosa.*
 Japo.

Japotapita cinnamomi folio, floribus spicatis. *B. zeyl.* 123. t. 56.

β. Arbor africana, subrotundo folio margine denti acutis aspero, floribus pentapetalis atropurpureis. *Pluk. alm.* 41. t. 263. f. 1. 2.

Habitat in India, β. in Africa.

Racemi persistunt squarrosi infra folia a casu pedunculorum & fructificationum.

- Japotapita. 2. OCHNA racemis terminalibus. †
 Jabotapita pyramidato flore luteo, fructu rubro. *L. amer.* 42. ic. 153.
 Jabotapita. *Marcgr. bras.* 101. *Raj. hist.* 1632.
Habitat in America meridionali. †

CALOPHYLLUM.

- Inophyllum. 1. CALOPHYLLUM foliis ovalibus. *Fl. zeyl.* 11.
 Arbor indica, mali medicæ amplioribus foliis. *alm.* 41. t. 147. f. 3
 Bintangor maritima. *Kumph. amb.* 2. p. 211. t. 71.
 Ponna s. Ponna-maram. *Rheed. mal.* 4. p. 79.
Raj. hist. 1525.
Habitat in India. †
- Calaba. 2. CALOPHYLLUM foliis ovatis obtusis. *Fl.* 202. * *Jacqu. hist.* t. 165.
 Calophyllum foliis ovatis obtusis : striis parallelis transversis. *Hort. cliff.* 206. *Roy. lugdb.* 476.
 Inophyllum flore quadrifido. *Burm. zeyl.* t. 60.
 Tserou ponna. *Rheed. mal.* 4. p. 81. t. 39.
Habitat in Indiis. †
An Polygama?

G R I A S.

- cauliflora. 1. GRIAS.
 Calophyllum foliis tripedalibus obovatis, floribus caulem & ramos sparsis. *Brown. jam.* 245.
 Palmis affinis Malus Persica maxima, caudice nudo, foliis longissimis, flore tetrapetalo paleo luteo, fructu ex arboris trunco. *Sloan. jam.* 179.
 2. p. 122. t. 217. f. 1, 2.
Habitat in Jamaica. †

T I L I A.

TILIA floribus nectario destitutis.

europæa.

Tilia Hort. cliff. 204. Fl. svec. 432, 471. Mat. med.

262. Phil. bot. 259. * Roy. lugdb. 477. Dalib. paris. 153.

Tilia femina, folio majore. Bauh. pin. 426.

Tilia urbana. Gesn. tab. III.

Tilia montana, maximo folio. Bauh. pin. 426.

Tilia femina, folio minore. Bauh. pin. 426.

Tilia ulmi folio, femine hexagono. Raj. angl. 3.

3. 473.

Tilia foliis molliter hirsutis, viminibus rubris, fructu

trigono. Raj. angl. 3. p. 473.

Tilia bohémica, foliis minoribus glabris, fructu oblon-

go utrinque acuminato minimo costulato. Till. pif.

165. t. 49. f. 9.

Sitat in Europæ pratis. †

americana

TILIA floribus nectario instructis. Kalm,

Tilia foliis majoribus mucronatis. Gron. virg. 58.

Tilia, amplissimis glabris foliis, nostrati similis. Pluk.

mant. 181.

Sitat in Virginia, Canada. †

L A E T I A.

LAETIA floribus apetalis. Jacq. amer. 24. hist. t. apetalis.

108. Amen. acad. 5. p. 413. *

Laetia Laetia. Læfl. it. 190.

Laetia foliis ovatis utrinque porrectis alternis quan-

toque crenatis, racemis laxis alaribus. Brown. jam. 249.

Sitat in America. †

LAETIA floribus petaloideis completis. Jacq. completa.

mer. 24.

Laetia foliis ovatis levissime crenatis læte virentibus.

nitidis alternis, petiolis brevibus, pedunculis genicu-

atis. Brown. jam. 245?

Sitat in America. †

M I C R O C O S.

MICROCOS panicula terminali. Fl. zeyl. 207. *

paniculata.

Micrococos foliis alternis oblongis acuminatis. Burm.

zeyl. 159. t. 74.

Micrococos ageri-Cottam. Rheed. mal. 1. p. 105. t. 56.

Sitat in India. †

- lateriflora 2. **MICROCOS** pedunculis axillaribus confertis
 tomis. *Fl. zeyl.* 208. *
 Hamdamanias. *Herm. zeyl.* 3.
Habitat in Zeylona. †

ELÆOCARPUS:

- ferrata. 1. **ELÆOCARPUS.** *Fl. zeyl.* 206. *
 Elajocarpus foliis lauri ferratis, floribus sp
Burm. zeyl. 39. t. 40.
 Ganitrus. *Rumph. amb.* 3. p. 160. t. 101.
 Perin-Kara. *Rheed. mal.* 4. p. 51. t. 24. *Raj. hist.*
dendr. 42.
Habitat in India. †

LECYTHIS.

- ollaria. 1. **LECYTHIS.** *Lxfl. it.* 189. * *Jacq. amer.* 5?
Habitat in America meridionali. †
Folia alterna sessilia. Flores racemosi.

MESUA.

- ferrea. 1. **MESUA** foliis lanceolatis. *Fl. zeyl.* 203. *
 Naghas. *Herm. zeyl.* 7.
 Balutta-tsiampacam f. *Castanea rosea indica.* 1
mal. 3. p. 63. t. 53. *Raj. hist.* 1680.
Habitat in India. †

VATERIA.

- indica. 1. **VATERIA.** *Fl. zeyl.* 204.
 Pænoe. *Rheed. mal.* 4. p. 33. t. 15.
Habitat in India. †

LAGERSTROEMIA.

- indica. 1. **LAGERSTROEMIA.**
 Tsjin Kin. *Rumph. amb.* 7. p. 61. t. 28.
Habitat in China. †
Arbor. Folia alterna, subsessilia, oblonga, integ.
glabra; Floralia subrotunda. Thyrsus terminal
xus, pedicellis trifidis f. trifloris.

THEA.

- bohea. 1. **THEA** floribus hexapetalis. *Hort. cliff.* 204.
 med. 264. *Hill. exot.* t. 22.
 Thee. *Kämpf. jap.* 605. t. 606.

Hee frutex. *Bart. act.* 4. p. 1. t. 1. *Bont. jav.* 87. t. 88. *Barr. rar.* 128. t. 904.

Hee sinensium. *Breyn. cent.* 111 t. 112. ic. 17. t. 3. *Rocc. mus.* 114 t. 94.

Haa. *Bauh. pin.* 147.

Honymo affinis arbor orientalis nucifera, flore roseo. *Pluk. alm.* 139. t. 88. f. 6.

Habitat in Japonia, China. †

HEA floribus enneapetalis. *Hill. exot.* t. 22.

viridis.

Habitat in China. †

Hilia hujus longiora, illius breviora.

CARYOPHYLLUS.

CARYOPHYLLUS. *Hort. cliff.* 207. *Mat. med.* 26. aromaticus.

Caryophyllus aromaticus fructu oblongo. *Bauh. pin.* 410.

Caryophyllus aromaticus ind. orient. fructu clavato, monopyreno. *Pluk. alm.* 88. t. 155. f. 1.

Caryophyllus. *Clus. exot.* 16. *Rumph. amb.* 2. p. 1. t. 1, 2, 3.

Habitat in Moluccis, solo aridissimo. †

MENTZELIA.

MENTZELIA. *Hort. cliff.* 492. *Amæn. acad.* 5. p. aspera. 398. † *Læfl. it.* 223.

Mentzelia foliis & fructibus asperis. *Plum. gen.* 41. ic. 174. f. 1.

Mentzelia setis uncinatis munita, foliis lobatis, fructibus sessilibus singularibus ad divaricationes ramorum. *Brown. jam.* 249.

Magra americana, folio betonicae, fructu hispido. *Tournef. inst.* 302.

Habitat in America.

P L I N I A.

PLINIA.

pinnata.

Plinia fructu croceo odorato. *Plum. gen.* 9. ic. 225.

Habitat in America. †

Zor. Folia pinnata, abrupta; foliolis circiter 12. ovato-lanceolatis, integerrimis. Flores sessiles, sparsi per ramos nudos seniores. Fructus edules.

DE-

D E L I M A.

- sarmentosa. 1. DELIMA. *Fl. Zeyl.* 205. *. *Amazn. acad.* 1. p. 40.
Habitat in Zeylona. †

C I S T U S.

* *Exstipulatæ fruticosæ.*

- capensis. 1. CISTUS arborefcens exstipulatus, foliis ovato-
ceolatis petiolatis trinerviis denticulatis utrinque
nudis.
Habitat ad Cap. b. Spei. †
Differt a sequentibus foliorum denticulis.
- pilosus. 2. CISTUS arborefcens exstipulatus, foliis ovatis
petiolatis hirtis.
Cistus mas, folio rotundo hirsutissimo. *Bauh.*
464.
Cistus mas major, folio rotundiore. *I. B. Dukan.*
1. p. 167. t. 64.
Cistus mas matthioli. *Dalech. hist.* 222.
Habitat in Italia, Hispania. †
*Folia petiolata, ovata, subundata, magnitudine
pyri, pilis albis raris adpersa. Flores purpurei.*
- populifolius. 3. Cistus arborefcens exstipulatus, foliis cordatis
vibus acuminatis petiolatis. *Hort. cliff.* 205.
lugdb. 474.
Cistus Ledon, foliis populi nigræ, major. *Bauh.*
467.
Ledum latifolium 2. majus. *Clus. hist.* 1. p. 78.
β. Cistus Ledon, foliis populi nigræ, minor. *Bauh.*
467.
Ledum latifolium 2 minus. *Clus. hist.* 1. p. 78.
Habitat in Lusitania. †
*Planta ramis & foliis pilosa, etiam pilosissima caulis.
Flores albi.*
- laurifolius. 4. CISTUS arborefcens exstipulatus, foliis oblongo-
ovatis petiolatis trinerviis supra glabris, petioli
connatis.
Cistus Ledon, foliis laurinis. *Bauh. pin.* 467.
Cistus Ledon latifolium creticum. *Bauh. hist.*
Ledon 1 latifolium. *Clus. hist.* 1. p. 77.
Habitat in Hispania. †

POLYANDRIA MONOGYNIA.

Folia ovato-oblonga exterioribus ovato-lanceolatis, trinerviis, nuda, subtus subtomentosa, petiolis basi connatis. Bractæ caducæ. Pedunculi longissimi, subumbellati. Flores albi ungue violaceo.

CISTUS arborescens exstipulatus, foliis lanceolatis supra lævibus: petiolis basi coalitis vaginantibus. *ladaniferus.*
Hort. cliff. 205. Sauv. monsp. 147, 150.

Cistus ladanifera hispanica incana. Bauh. pin. 467.

Cistus Ledon 1. angustifolius. Clus. hist. 1. p. 77.

Cistus Ledon flore macula nigricante notato. *I. B. Comm. hort. 1. p. 39. t. 20.*

Habitat in Hispaniæ, Lusitaniæ collibus. †

Flores umbellati. Folia lineari-lanceolata. Corollæ albæ ungue violaceo.

CISTUS arborescens exstipulatus, foliis lineari-lanceolatis sessilibus utrinque villosis trinerviis. *monspeliensis.*
Hort. cliff. 205. Hort. ups. 144. Roy. lugdb. 475. Sauv. monsp. 147.

Cistus ladanifera monspeliensium. Bauh. pin. 467.

Ledum. Dalech. hist. 230.

Cistus Ledon foliis oleæ, sed angustioribus. *Bauh. pin. 467.*

Ledon 5. Clus. hist. 1. p. 79.

Habitat in G. Narbonensi & Regno Valentino. †

Folia suprema basi latiora, reliqua linearia, subtus reticulata trinervia. Racemus longe pedunculatus, sæpe bifidus. Corollæ albæ.

CISTUS arborescens exstipulatus, foliis spatulatis tomentosis rugolis: inferioribus basi vaginantibus connatis. *incanus.*
Hort. cliff. 205. Hort. ups. 143. Roy. lugdb. 475.

Cistus mas angustifolius. Bauh. pin. 464.

Cistus mas 2. Clus. hist. 1. p. 69.

Habitat in Hispania, G. Narbonensi. †

Rami villosi. Folia minime nervosa, in mucronem desinentia, disco parum flexuosa, desinunt basi in Petiolos coalitos vaginantes, vel potius obovato-spatulata, inferioribus magis connatis & fere vaginantibus. Calyces pilosi foliolis subcordatis. Petala rubro-purpurea, emarginata s. obcordata, integerrima, concava.

CISTUS arborescens exstipulatus, foliis ovato-lanceolatis, *albidus.*
Linnæi Spec. plant. pars I. Aaa ceo-

ceolatis tomentosis incanis sessilibus subtrineris
Sauv. monsp. 150.

Cistus mas, folio oblongo incano. *Bauh. pin.* 467.

Cistus mas, 1. *Clus. hist.* 1. p. 68.

Cistus mas 4. monspeliensis, folio oblongo
Bauh. hist. 2. p. 3.

Habitat in G. Narbonensi, Hispania. †

Differt a C. incano, cui simillimus, Ramis tomentosis nec pilosis; Foliis pallidioribus, omnino planis, sessilibus, minime petiolatis aut vaginantibus, lanceolatis, subtrinerviis. Calyces non hirti sed exterioribus longioribus, lateribus reflexis. Petalobro-purpurea, non emarginata, margine subcrenato planiuscula.

creticus, 9. CISTUS arborescens exstipulatus foliis spatulatis ovatis petiolatis enerviis scabris, calycinis lanceolatis.

Cistus ladanifera cretica. *Tournef. cor.* 19. *Bauh.* 3. p. 34. t. 64. f. 1.

Cistus Ledon cretense. *Bauh. pin.* 467. non synonymum Ladanum creticum. *Alp. exot.* 89. t. 88.

Habitat in Creta, Syria. †

Flores rubri.

alvifolius, 10. CISTUS arborescens exstipulatus, foliis ovatis petiolatis utrinque hirsutis. *Hort. cliff.* 205. *Roy. lugdb.* 475. *Sauv. monsp.* 150.

Cistus femina, folio salviæ. *Bauh. pin.* 464.

Cistus femina. *Clus. hist.* 1. p. 70.

Habitat in Italia, Sicilia, Narbona. †

Pedunculi uniflori, diphylli. Corollæ albæ aut fuscæ. Folia ovata, scabra, rugosa: prima utrinque hirsuta mollia.

crispus, 11. CISTUS arborescens exstipulatus, foliis lanceolatis pubescentibus trinerviis undulatis. *Hort. cliff.* 205. *Roy. lugdb.* 475. *Sauv. monsp.* 147.

Cistus mas, foliis chamædryos. *Bauh. pin.* 464.

Cistus mas 5. *Clus. hist.* 1. p. 69.

Habitat in Lusitania. †

Ramuli, pedunculi & calyces tenui lana adpersi. Flores purpurei. Calyces lanceolati.

alimifolius 12. CISTUS arborescens exstipulatus, foliolis duobus

- lycinis linearibus. *Hort. cliff.* 205. *Roy. lugdb.* 475.
Sauv. monsp. 147.
- Cistus femina, portulacæ marinæ folio latiore obtuso.
Bauh. pin. 465.
- Cistus folio halimi 1. *Clus. hist.* 1. p. 71.
9. Cistus femina, portulacæ marinæ folio angustiore mucronato. *Bauh. pin.* 465.
- Cistus halimi folio 2. *Clus. hist.* 1. p. 71.
- Habitat in Lusitaniæ maritimis.* 5
- Flores flavi.
13. CISTUS arborescens exstipulatus, foliis revolutolibanotis.
 linearibus, floribus umbellatis.
- Cistus angusto libanotidis folio, flore singulari. *Barr.*
ic. 294.
- Cistus Ledon angustis foliis. *Bauh. pin.* 467.
- Habitat in Hispania. Læsing.* 5
- Frutex habitu Rosmarini. Caulis nudus, purpurascens.
 Folia opposita, exstipulata, sessilia, linearia, sed utrinque
 revoluta, lævia, marginibus baseos hirsuta, internodiis
 longiora, ad apices ramorum approximata. Folia floralia s.
 suprema breviora, ovata, plana. Pedunculi terminales, foliis
 longiores: Floribus aliquot, albis. Calyces ovati, viscidi.
- * * Exstipulati, suffruticosi.
14. CISTUS suffruticosus procumbens exstipulatus, foliis oppositis
 linearibus, floribus umbellatis. umbellatus.
- Cistus foliis linearibus non stipulatis, caule florali umbellato
 lignoso. *Guett. stamp.* 2. p. 180. *Dalib. paris.* 158.
- Cistus Ledon foliis thymi. *Bauh. pin.* 467.
- Ledon X. *Clus. hist.* 1. p. 81.
- Habitat in Gallia, Hispania.* 5
- Umbellæ pedunculatæ sunt.*
15. CISTUS suffruticosus ascendens exstipulatus, foliis alternis fasciculatis
 linearibus glabris, pedunculis racemosis. *Amæn. acad.* 4. p. 275. * lævipes.
- Chamæ Cistus, ericæ folio, luteus elatior. *Bauh. pin.* 466.
- Helianthemum tenuifolium glabrum erectum, luteo flore. *Bauh. hist.* 2. p. 18.
- Habitat Monspeli.* 5

- nana. 16. **CISTUS** suffruticosus procumbens exstipulatus, foliis alternis linearibus margine scabris, pedunculis unifloris.
 Cistus caule procumbente, foliis alternis. *Fl. suec.* 435. 474.
 Helianthemum foliis linearibus sæpius alternis non stipulatis, pedunculis unifloris, caule lignoso. *Gen. stamp.* 2. p. 18.
 Cistus fruticosus procumbens, foliis aciformibus nudis, floribus auriculatis. *Sauv. monsp.* 46.
 Chamæ Cistus, ericæ folio, luteus humilior. *Bauh. pin.* 466.
 Helianthemum tenuifolium glabrum, luteo flore, per humum sparsum. *Bauh. hist.* 2. p. 18.
Habitat in Gallia, Gotlandia, Helvetia. ♀
Corolla calyce vix major est.
- italicus. 17. **CISTUS** suffruticosus exstipulatus, foliis oppositis hispidis: inferioribus ovatis; superioribus lanceolatis, ramis patentibus.
 Helianthemum, serpilli folio villoso, flore pallido, italicum. *Barr. rar.* 510. t. 366.
Habitat in Italia. ♀
 Frutex Caule erecto, spithamæo: Ramis oppositis, longioribus, patentibus, subdeflexis, rufis. Folia opposita, exstipulata, utrinque adpersa pilis strigosis, raris, subgeminis & subciliata: inferiora petiolata ovata; superiora subsessilia. Racemus terminatus. Calyces hispidi. Corolla pallida petalis vix emarginatis.
- canus. 18. **CISTUS** suffruticosus exstipulatus procumbens, foliis oppositis obovatis villosis subtus tomentosis, floribus subumbellatis.
 Cistus foliis ovatis subtus incanis, alis nudis, caule procumbente. *Sauv. monsp.* 148.
 Chamæ Cistus foliis myrti minoris incanis. *Bauh. pin.* 466.
 Chamæ Cistus foliis myrti tarentinæ canis & cineris. *Bauh. hist.* 2. p. 18.
 Chamæ Cistus 3. *Clus. hist.* 1. p. 74.
- β. Helianthemum alpinum serpilli folio nigricante & hirsuto. *Segu. ver.* 3. p. 195. t. 6. f. 2.
 Helianthemum serpilli folio villoso, flore pallido. *Barr. rar.* 50. t. 366.

Habitat in G. Narbonensi, Hispania. §

Variat β. Foliis ellipticis utrinque pilis raris albis adspersis, nec subtus tomentosus. Calyces semper hirsuti & umbellæ terminales sessiles.

19. **CISTUS** suffruticosus exstipulatus, foliis oppositis marifolius
oblongis petiolatis planis subtus incanis.

Helianthemum alpinum, foliis pilosellæ minoris fuchii. Bauh. hist. 2. p. 18. Segu. ver. 3. p. 196.

Helianthemum foliis ad terram congestis: superne pilosis, inferne tomentosus. Hall. herb. 359.

Helianthemum luteum, thymi durioris folio. Barr. rar. 521. t. 441.

Habitat Massiliæ, Veronæ; in Helvetia. §

Variat Foliis lanceolatis supra glabris, & ovalibus supra subpilosis, semper vero Folia subtus dense tomentosa & incano-alba.

20. **CISTUS** suffruticosus procumbens exstipulatus, fo- celandicus.
liis oppositis oblongis utrinque glabris: petiolis ciliatis; petalis emarginatis.

*Cistus caule procumbente, foliis oblongis utrinque glabris, stipulis nullis. Fl. suec. 434. * 473. **

Habitat in rupibus apricis Oelandiæ. §

* * * *Exstipulati, herbacei.*

21. **CISTUS** exstipulatus perennis, foliis radicalibus, Tuberaria,
ovatis trinerviis tomentosus; caulinis glabris lanceolatis; summis alternis.

Cistus perennis, foliis humi appressis villosis; summis glabris. Sauv. monsp. 149.

Cistus folio plantaginis. Bauh. pin. 465.

Helianthemum, plantaginis folio, perenne. Buxb. cent. 3. p. 33. t. 63.

Tuberaria nostras. Bauh. hist. 2. p. 12.

Tuberaria major. Bauh. hist. 2; p. 12.

Habitat in Galloprovincia, Hispania, Pisis. 21

22. **CISTUS** herbaceus exstipulatus, foliis oppositis guttatus.
lanceolatis trinerviis, racemis ebracteatis. *Hudf. angl. 204.*

Cistus annuus, foliis radicalibus oppositis lanceolatis trinerviis, ramiferis ternatis linearibus. Sauv. monsp. 148.

Cistus foliis oblongo-acuminatis non stipulatis, caule
florali racemoso. *Guett. stamp. 2. p. 181. Dalib. parif.*
158.

Cistus flore pallido, punicante macula insignita
Bauh. pin. 465.

Helianthemum flore maculoso. *Col. ecphr. 2. p. 78. t. 77.*
Habitat in G. Narbonensi, Italia, Anglia. ☉

Racemi capillares omnino, absque ullis bracteis. *Calycis*
foliola duo exteriora majora ciliata.

canadensis. 23. CISTUS herbaceus extipulatus, foliis omnibus
alternis lanceolatis caule ascendente.

Habitat in Canada. Kalm. 2.

Facies C. Helianthemis, sed Folia alterna.

* * * * *Stipulati, herbacei.*

ledifolius. 24. CISTUS herbaceus erectus glaber stipulatus, floribus
solitariis subsessilibus, folio ternato oppositis
Hort. upf. 144. Sauv. monsp. 178.

Cistus stipulis quaternis, foliis oblongis, caule erecto.
Hort. cliff. 475.

Cistus ledi folio. *Bauh. pin. 465.*

Cistus annuus, foliis ledi. *Lob. ic. 2. p. 118.*

Habitat Montpelii. ☉

Calyx corolla longior: foliolis 3. erectis, 2. patulis.

alicifolius. 25. CISTUS herbaceus patulus villosus stipulatus, floribus
racemosis erectis: pedicellis horizontalibus
Hort. upf. 144.

Cistus stipulis quaternis, foliis subovatis subtus tomentosis,
caule procumbente. *Hort. cliff. 206.*

Cistus folio salicis. *Bauh. pin. 465.*

Cistus annuus 1. *Clus. hist. 1. p. 76.*

Helianthemum annuum humile, foliis ovatis, flore fugaci. *Segu. ver. 3. p. 197. t. 6. f. 3. opt.*

Habitat in Lusitania, Hispania. ☉

gyptiacus. 26. CISTUS herbaceus erectus stipulatus, foliis linearilanceolatis
petiolatis, calycibus inflatis corollamajoribus.

Habitat in Ægypto. B. Jussieu. ☉

Conf. CytiCistus foliis inferioribus confertis, superioribus oppositis. *Burm. zeyl. 85. t. 36.*

* * * * * *Stipulati suffruticosi.*

7. **CISTUS** suffruticosus stipulatus, foliis obtectis squamatus, squamis orbiculatis.
Cistus humilis, floribus compactis in verticillos, minoris halimi foliis. *Barr. ic.* 328. *Bocc. mus.* 2. p. 76. t. 64.
Habitat in Hispania. Læfl. it. 67. †
Suffrutex Ramis erectiusculis, inferne tetragonis. Folia ovali-lanceolata, crassiuscula, petiolata, opposita aut tria utrinque. Stipulæ minutissimæ, racemosæ, marcescentes, sessiles. Pedunculi teretes, conferti. Planta tota obtecta squamis orbiculatis, centro depressis.
8. **CISTUS** suffruticosus procumbens stipulatus, foliis ovato-oblongis subpilosis, petalis lanceolatis. *Huds. angl.* 205. *Surrejanus.*
Helianthemum vulgare, petalis florum perangustis. *Dill. elth.* 177. t. 145. f. 174.
Habitat in Angliæ comitatu Surrejano prope Croydon. †
9. **CISTUS** suffruticosus stipulatus, foliis inferioribus orbiculatis, superioribus ovatis. *nummularius.*
Cistus humilis f. *ChamæCistus nummulariæ* folio. *Magn. monsp.* 293.
Helianthemum ad nummulariam accedens. Bauh. hist. 2. p. 20.
Habitat Monspelii. †
10. **CISTUS** suffruticosus stipulatus, foliis oblongis, calycibus lævibus. *Sauv. monsp.* 148. *serpillifolius.*
ChamæCistus repens serpillifolia lutea. Bauh. pin. 466.
ChamæCistus serpylli folio nigricante & hirsuto, flore aureo odorato. Bauh. hist. 2. p. 17.
ChamæCistus 2. *Clus. hist.* 1. p. 73.
Habitat in Alpibus Austriæ, Stiriæ. †
11. **CISTUS** suffruticulofus stipulatus procumbens, foliis linearibus oppositis brevissimis congestis. *Sauv. thymifolius.*
monsp. 148.
ChamæCistus luteus, thymi folio, oliganthes. *Barr. ic.* 444.
Habitat in G. Narbonensi, Hispania. †

- vilosus. 32. CISTUS suffruticosus stipulatus, foliis linearibus subtus bifurcatis incanis, calycibus lævibus. *Sauv. monsp.* 147.
 ChamæCistus foliis thymi incanis. *Bauh. pin.* 466.
 ChamæCistus 4. *Clus. hist.* 1. p. 74.
 β. Cistus stipulis quaternis, foliis lineari-ovalibus incanis, calycibus tomentosis. *Sauv. monsp.* 148.
 Helianthemum flore albo, folio angusto hirsuto. *Bauh. hist.* 2. p. 17.
 γ. Cistus foliis villosis lanceolatis, axillis foliosis, stipulis subulatis. *Sauv. monsp.* 148.
 Helianthemum f. Cistus humilis, folio samplici, capitulis valde hirsutis. *Bauh. hist.* 2. p. 20.
Habitat Montpellier. †
Hæc tres α. β. γ. vel varietates vel valde affines: certiora determinant autoptæ.
- Helianthemum. 33. CISTUS suffruticosus procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis subvilosis.
 Cistus stipulis quaternis, foliis oblongis utrinque nudis, caule procumbente. *Hort. cliff.* 206. *Fl. Jrec.* 433. 472.
 ChamæCistus vulgaris, flore luteo. *Bauh. pin.* 455. *Læf. pruss.* 43. t. 8.
 Flos folis, Panax chironium. *Cam. epit.* 501.
Habitat in Europæ pascuis siccis. †
Petala suborbiculata, integerrima, flava, annulo receptaculum ambiente sæpius fulvo. Racemus ante frutescentiam nutans. Folia pilis raris adspersa.
- hirtus. 34. CISTUS suffruticosus stipulatus, foliis ovatis, calycibus hispidis.
 Cistus foliis lanceolato-linearibus integerrimis subtus incanis. *Grou. orient.* 169.
 Cistus foliis oblongo-linearibus margine revolutis. *L. Monier. obs.* 229. *Sauv. monsp.* 148.
 Cistus Ledon rorismarini foliis subtus incanis. *Bauh. pin.* 467.
 Helianthemum, angusto serpilli folio, villosum, flore aureo, italicum. *Barr. rar.* 511. t. 488.
 Ledon 8. *Clus. hist.* 1. p. 8.
Habitat in Hispania, Narbona. †
- apertinus. 35. CISTUS fruticosus stipulatus patulus, foliis lanceolatis hirtis.

Helianthemum album germanicum. Tabern. icon. 1062.

Helianthemum saxatile, foliis & caulibus incanis oblongis, floribus albis. Mentz. pug. 8. f. 3. Dill. elth. 170.

Habitat in Apenninis, Italiæ montibus. †
Folia supra viridia hirta, subtus incana.

7. **CISTUS** suffruticosus stipulatus procumbens, foliis polifolius oblongo-ovatis incanis, calycibus lævibus, petalis ferratis. *Huds. angl. 205.*

Cistus humilis alpinus durior, polii nostratis folio candicante. Pluk. alm. 107. t. 23. f. 6.

Chamæcistus montanus, polii folio. Raj. angl. 4. p. 274. t. 274. f. 2.

Helianthemum montanum, polii folio incano, flore candido. Dill. elth. 175. t. 145. f. 172.

Habitat in æstuario Sabrinae Anglorum ad Brentdown. †

8. **CISTUS** suffruticosus stipulatus, foliis alternis lanceolatis planis lævibus. *Amæn. acad. 4. p. 275.* arabicus.*

Habitat in Arabia. †

Cistorum historia maxime omnium obscura ob varietatum copiam, illustrabitur si determinant autoptæ in singulis.

1. *Caudicem arborecentem, fruticulosum, annum f. perennem.*

2. *Caulum erectum f. decumbentem.*

3. *Folia opposita f. alterna: cum figura eorundem.*

4. *Stipulas binas f. nullas.*

5. *Pedunculum uniflorum f. multiflorum: nudum f. bracteatum.*

6. *Petalorum figuram.*

7. *Capsulas 5loculares f. 3valves.*

8. *Calycem æqualem f. inæqualem.*

PROCKIA.

PROCKIA. *Brown.*

Habitat in Inf. S. Crucis. †

Frutex Ramis teretibus. Folia alterna, petiolata, ovata, acuminata, serrata, glabra. Stipulæ lineares. Flores nonnulli, terminales, alterni, pedicellati: Bracteis linearibus.

crucis-

CORCHORUS.

- siliquosus.* 1. **CORCHORUS** capsulis linearibus compressis, lanceolatis æqualiter serratis.
Corchorus, folio urini, minor. *Plum. spec.* 7. ic. 107.
Corchorus Coreta. *Amæn. acad.* 5. p. 398.*
Corchoro affinis *chamædryōs* folio, flore staminibus seminibus atris quadrangulis duplici serie dispositis. *Sloan. jam.* 5 c. *hist.* 1. p. 145. t. 94. f. 1. *Raj.* 516.
 Coreta foliis minoribus ovatis crenatis, floribus singularibus. *Brown. jam.* 147.
Habitat in America meridionali. †
 Caulis fere fruticosus, erectus, paniculatus, subscesens. Folia lanceolata s. ovato-oblonga, serris æqualibus absque dente elongato ad basim. Pedunculi uniflori, lateriflori, absque bracteis. Gemina hirta. Siliquæ bivalves, compressæ. Flores vernaes apetalæ, tetrandri, calyce aphyllæ. Autumnales quinquefidi, completi, polyandri.
- olitorius.* 2. **CORCHORUS** capsulis oblongis ventricosis, foliorum serraturis infimis fetaceis. *Fl. zeyl.* 213. *Hort. ups.* 147. *Grøn. orient.* 170.
Corchorus foliorum infimis serraturis maximis reflexis. *Hort. cliff.* 209. *Roy. lugdb.* 478.
Corchorus plinii. *Bauh. pin.* 317.
Corchorus. *Comm. hort.* 47. t. 12.
Habitat in Asia, Africa, America. ☉
- astilac.* 3. **CORCHORUS** capsulis oblongis sexsulcatis sextuplidatis, foliis cordatis infimis serraturis fetaceis. *Læfl. it.* 224. n. 112. β.
Alcea cibaria s. *Corchorus* americana, carpinifolia, sextuplici capsula longiore. *Pluk. phyt.* 127. f. 3.
 Triumfetta subvillosa, foliis rotundioribus undulatis atque dentatis, postremis in setas inermes. *Brown. jam.* 232. t. 25. f. 1.
Habitat in America calidiore. †
- causularis.* 4. **CORCHORUS** capsulis subrotundis depressis rugosis. *Fl. zeyl.* 214.*
Corchorus foliorum infimis serraturis minoribus. *H. cliff.* 210. *Roy. lugdb.* 478.
Alcea olitoria s. *Corchorus* americanus, præloqu

foliis, capsula striata subrotunda brevi. *Pluk. alm.*

18. t. 255. f. 4.

Habitat in India. ☉

CORCHORUS capsulis oblongis cauleque pilosis, hirtus.
foliis oblongis ferraturis æqualibus.

Corchorus, folio ulmi, major. *Plum. spec. 7. ic. 103. f. 2.*

Habitat in America meridionali.

CORCHORUS capsulis subrotundis lanatis, foliis hirsutus.
ovatis obtusis tomentosis æqualiter ferratis.

Corchorus americanus lanuginosus, folio chamædryos,
siliqua tricapsulari lanuginosa & subsæpera. *Breyn.*
prodr. 3. p. 56.

Guazuma frutex chamædryfolia, fructu lanuginoso,
major & minor. *Plum. gen. 36. ic. 104.*

Habitat in America meridionali.

SEGUIERIA.

SEGUIERIA. *Læfl. it. 191. **

americana,

Habitat in Americæ meridionalis umbrosis. †

SYMPLOCOS.

SYMPLOCOS. *Jacqu. amer. 24.*

martinicensis.

Def. r. Læfl. it. 309.

Habitat in America. †

DIGYNIA.

PÆONIA.

PÆONIA foliolis oblongis. *Hort. cliff. 212. Hort. officinalis.*
ups. 149. Mat. med. 267. Sauv. monsp. 307.

Pæonia foliis difformiter lobatis. *Hall. helv. 311. femineæ.*

Pæonia communis f. femina. *Bauh. pin. 323.*

Pæonia femina. *Fuchf. hist. 202. Lob. ic. 602.*

Pæonia foliis lobatis ex ovato-lanceolatis. *Hall. helv. mascula.*
311.

Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas. *Bauh.*
pin. 323.

Pæonia mas. *Lob. ic. 684.*

Habitat in Nemoribus montium Idæ, Helvetiæ. †

Flores explicati regulares, sed æstivatione omnino irregulares sunt.

tenuifolia.

2. PÆONIA foliolis linearibus multipartitis.

Pæonia laciniis foliorum linearibus. *Zinn. gatt.**Habitat in Ucraina. Gorter. 2.*

Radix repens. Folia Delphinii grandiflori s. A. ræ ; supra decomposita multipartita in laciniis merofas, lineares, læves. Flos terminalis P. nalis, sed minor, pedunculatus, solitarius. neque ramosus. Verbo quasi Filia Pæoniæ a nide apennina.

CURATELLA.

americana.

1. CURATELLA. *Læst. it. 260. ***Habitat in America meridionali. †**Statura Coccoloba. Folia alterna, subseffilia, oblonga.*

CALLIGONUM.

Polygonoides.

1. CALLIGONUM. *Hort. cliff. 212.*Polygonoides orientale, ephedræ facie. *Tournef. 47. itin. 3. p. 214. t. 214.**Habitat in monte Ararat. †*

TRIGYNIA.

DELPHINIUM.

* *Unicapsularia.*

Consolida.

1. DELPHINIUM nectariis monophyllis, caule fistuloso.

*vifo. Hort cliff. 212. Fl. svec. 440; 476. Mat. 268. Roy. lugdb. 482. Dalib. paris. 258.**Consolida regalis arvensis. Bauh. pin. 142.**Consolida regalis. Cam. epit. 521.**Habitat in agris Europæ restibilibus. ☉*

Ajacis.

2. DELPHINIUM nectariis monophyllis, caule fistuloso.

*plici. Hort. cliff. 213. Hort. upf. 150. Roy. lugdb. 482.**Consolida regalis hortensis, flore majore & simpliciflora. Bauh. pin. 142.**Consolida regalis hortensis, flore minore. Bauh. pin. 142.**Consolida regalis flore majore & multipliciflora. Bauh. pin. 142.**Flos regius. Dod. pempt. 252.**Habitat - - - ☉.*

* * *Tricapularia.*

PHINIUM nectariis monophyllis, corollis hexa-ambiguum.
lis, capsulis ternis, foliis multipartitis.

inimum elatius, simplici flore. *Clus. hist. 2. p. 206.*

lida regalis, flore minore. *Bauh. pin. 142.*

t in Mauritania. ☉

a *D. Ajacis*, sed magis canescens. Ramis diva-
ri in caule simplici. Corollæ cæruleæ, extus

les. Nectarium monophyllum, bifidum lobis a-
sculis. Calcar sæpe apice bidentatus. Differt

monogynis numero capsularum; a *D. trigynis*

lario interiore monophyllo s. calcare interiore non
cрито; adeoque *Staphisagriae* genere separari ue-

nt. Pistilla variant in eadem planta 1. ☽ 3,

x constans numerus.

PHINIUM nectariis diphyllis, corollis ennea- peregrinum.
lis, capsulis ternis, foliis multipartitis obtusis.

t. *cliff. 213.*

lida regalis latifolia, parvo flore. *Bauh. pin. 142.*

r. 74. t. 74. *Morif. hist. 3. p. 466. f. 12. t. 4. f. 3.*

t in Italia, Sicilia, Melita, Palæstina. ☉

simplex: Ramis virgatis, nudis, strictis. Fo-

D. Ajacis facie. Bractææ subulatae. Corolla

lea, præter Nectaria ☽ quatuor petala inferio-

habet præterea Petala 2. lateralia subrotunda,

ibus longis affixa, quæ deflectuntur versus peta-

xteriora s. infima, ☽ iis incumbunt. Nectaria

habent labellâ deflexa. Capsulæ ternæ.

PHINIUM nectariis diphyllis labellis integris, grandiflo-
bus subsolitariis, foliis compositis lineari-multi-
rum.

itis. *Hort. upf. 150.* *

inimum lusitanicum glabrum, aconiti folio. *Rolof.*

61. t. 3.

inimum elatius subincanum perenne, floribus am-

azureis. *Amm. ruth. 175. Mill. dict. t. 119.*

t in Sibiria. 4

: incanæ sunt.

PHINIUM nectariis diphyllis: labellis bifidis a- elatum.
barbatis, foliis incis, caule recto. *Hort. upf.*

*

Del-

Delphinium nectariis diphyllis, foliis peltatis multifidis acutis. *Hort. cliff.* 213.

Delphinium perenne, aconiti folio ampliori, flori cæruleis. *Amm. ruth.* 174. *Hall. gatt.* 93.

Aconitum cæruleum hirsutum, flore consolidæ lili. *Bauh. pin.* 181.

Aconitum lycoctonum, flore delphinii filefaci. *hist.* 2. p. 94.

Habitat in Sibiria, Helvetia, Silesia. 24

Staphisagria 7. **DELPHINIUM** nectariis diphyllis petalo brevibus, foliis palmatis: lobis obtusis. *Hort. cliff.* *Hort. upf.* 150. *Mat. med.* 269. *Roy. lugdb.* *Sauv. monsp.* 214.

Staphisagria. *Bauh. pin.* 324. *Dod. pempt.* 366.

Habitat in Itria, Dalmatia, Calabria, Apulia, C. Galloprovincia.

Foliorum lobi trifidi. Nectarii cornu brevissimum, tufum.

ACONITUM.

lycoctonum. 1. **ACONITUM** foliis palmatis multifidis villosis.

Aconitum foliis peltatis multifidis, petalo super cylindraceo. *Fl. lapp.* 211. *Hort. cliff.* 213. *Fl. J.* 441; 476. *Roy. lugdb.* 482. *Hall. helv.* 312.

Aconitum lycoctonum luteum. *Bauh. pin.* 183.

Aconitum lycoctonum, flore luteo. *Besl. cyl.* 25. f. 2.

Aconitum II. *Cam. epit.* 827.

Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ, Austriæ, liæ. 24

uncinatum. 2. **ACONITUM** foliis multilobis, corollarum apice basi longius producto.

Habitat in Philadelphia. 24

Folia triloba s. quinqueloba, angulato-dentata, Flores cærulei, singulares, apice galeæ uncinato recto longius, quam ipse unguis galeæ, exte

variegatum. 3. **ACONITUM** foliis multifidis: laciniis semipart superne latis. *Hort. cliff.* 214. *Hort. upf.* 151. *lugdb.* 482.

Aconitum cæruleum minus C. Napellus minor. *B. pin.* 183.

nitum cæruleum parvum. *Dod. pempt. 441. Dalech.*
t. 1743.

itat in Italia, Bohemiæ montibus. 2.

ONITUM foliorum laciniis linearibus superne *Napellus*,
tioribus linea exaratis. *Hort. cliff. 214. Fl. svec.*
2; 477. *Gron. virg. 165. Hall. helv. 312. Af. flokh.*
39. p. 41. t. 2.

nitum cæruleum f. *Napellus 1. Bauh. pin. 183.*

ellus verus. *Lob. hist. 387.*

itat in Helvetia, Bavaria, Gallia. 2.

ONITUM foliis multipartitis: laciniis linearibus pyrenaicum
cumb nitibus squarrosis. *Hort. upf. 152. **

nitum pyrenaicum luteum, foliorum segmentis li-
invicem incumbentibus. *Raj. europ. 367.*

itat in Sibiria, Tataria, Pyrenæis. 2.

mus ante anthesin nutat.

ONITUM floribus subpentagynis, foliorum la- *Cammarum*
niis cuneiformibus incisus acutis.

nitum violaceum f. *Napellus 2. Bauh. pin. 183.*

nitum lycoctonum tauricum. *Clus. hist. 2. p. 95.*

nitum purpureum f. *Napellus 3. Bauh. pin. 183.*

nitum lycoctonum neubergense. *Clus. hist. 2. p. 96.*

nitum cæruleo-purpureum, flore maximo f. *Na-*
ellus 4. Bauh. pin. 183.

nitum lycoctonum judenbergense. *Clus. hist. 2.*

97.

itat in Stiria, Taurero. 2.

ONITUM floribus pentagynis, foliorum laciniis *Anthora*.
nearibus.

nitum foliorum laciniis linearibus distinctis ubique
usdem latitudinis. *Hort. cliff. 214. Hort. upf. 152.*

Mat. med. 270. Hall. helv. 313. Roy. lugdb. 483.

nitum salutiferum f. *Anthora. Bauh. pin. 184.*

hora f. *Antithora. Cam. epit. 837.*

itat in Alpibus Pyrenæis, Helveticis, Taurinis,
Allobrogicis. 2.

TETRAGYNIA.

TETRACERA.

TRACERA. *Hort. cliff. 214. **

Pe-

volubilis.

Nigella chalepensis lutea, corniculis longioribus.
ris. hist. 3. p. 516. f. 12. t. 18. f. 10. *Raj. app.* 21
Habitat circum Alepum. ☉

REAUMURIA.

vermiculata

1. REAUMURIA.

Sedum ficulum vermiculatum, flore saxifrage
 semine villoso. *Bocc. succ.* 1. 6. f. 7. *Morif. hist.*
 481. f. 12. t. 9. f. 6.

Sedum minus arborescens vermiculatum. *Lob. ic.*
Sedum minus fruticosum. *Bauh. pin.* 284.

Kali vermiculatum, albo & amplo sedi roseo
Barr. ic. 888.

Kali arabicum primum genus. *Rauw. it.* 37. t. 37. *pin.* 289.

Habitat in Ægypti, Syriæ, Siciliæ litoribus. D.
que. ☉

*Statura Salsolæ s. Tamarisci, foliis punctis raris
 spersis. Flores terminales, sessiles inter folia, in
 apicem majora. Corollæ albæ: Lamina ciliata,
 bus petalorum utrinque adnexa, constituit aestivam
 Flores inferi sunt.*

HEXAGYNIA.

STRATIOTES.

Aloides.

1. STRATIOTES foliis ensiformi - triangulis cili aculeatis.

Stratiotes. *Fl. lapp.* 222. *Fl. svec.* 444; 479. *Hort.* 1
 221. *Roy. lugdb.* 10. *Gort. gehr.* 313.

Stratiotes militaris aizoides. *Lob. hist.* 904.

Aloë palustris. *Bauh. pin.* 286.

Habitat in Europæ septentrionalis aquis pigris parvis. 1

Alismoides.

2. STRATIOTES foliis cordatis. *Fl. zeyl.* 223.

Ottel-ambel. *Rheed. mal.* 11. p. 95. t. 46.

Habitat in India. 2.

POLYGYNIA.

DILLENIA.

indica. 1. *DILLENIA.* *Hort. clif.* 221.

Songium. *Rumph. amb.* 2. p. 14. t. 45.

- *Syalita*. *Rheed. mal.* 3. p. 39. t. 38. 39.
Habitat in Malabaria. †

LIRIODENDRON.

- LIRIODENDRON foliis lobatis. *Hort. cliff.* 223. *Tulipifera.*
Hort. upf. 154. *Gron. virg.* 69. *Roy. lugdb.* 494. *Kalm,*
it. 2. p. 322. *Trew. ehr,* t. 10.
Tulipifera arbor virginiana, *Herm. lugdb.* 612. t. 613.
Tulipifera virginiana, tripartito aceris folio: media lac-
 inia velut abscissa. *Pluk. alm.* 379. t. 117. f. 5. ☉
 t. 248. f. 7. *Catesb. car.* 1. p. 48. t. 48. *Raj. hist.*
 1798.
 - *Tulipifera caroliniana,* foliis productioribus magis an-
 gulosis. *Pluk alm.* 379. t. 68. f. 3.
Habitat in America septentrionali. †
 . LILIODENDRON foliis lanceolatis. *Lilifera.*
Sampacca montana. *Rumph. amb.* 2. p. 204. f. 69.
Habitat in Amboina. †

MAGNOLIA.

- . MAGNOLIA foliis lanceolatis perennantibus. *grandiflora.*
Magnolia foliis lanceolatis persistentibus, caule erecto
arboreo. *Mill. dict.* t. 172.
 - *Magnolia altissima,* flore ingenti candido. *Catesb. car.*
 2. p. 61. t. 61.
Magnolia maximo flore, foliis subtus ferrugineis.
Trew. ehr. t. 33.
 - *Magnolia altissima,* laurocerasi folio, flore ingenti
 candido. *Anoen. angl.* t. 14.
Habitat in Florida, Carolina. †
 . MAGNOLIA foliis ovato-oblongis subtus glaucis. *glauc.*
Magnolia foliis ovato-lanceolatis, *Hort. cliff.* 222.
Gron. virg. 61. *Kalm. it.* 2. p. 324.
 - *Magnolia laurifolio* subtus albicante. *Dill. elth.* 207. t.
 207. t. 168. f. 205. *Catesb. car.* 1. p. 39. t. 39. *Trew.*
ehr. t. 9.
 - *Tulipifera virginiana,* laurinis foliis aversa parte rore
 caeruleo tinctis, conibaccifera. *Pluk. alm.* 379. t.
 68. f. 4.
Laurus tulipifera, bacis calyculatis. *Raj. hist.* 1690.
 ☉ 1798. n. 4.
Habitat in Virginia, Pennsylvania. †

- acuminata. 3. **MAGNOLIA** foliis ovato-oblongis acuminatis.
Magnolia foliis ovato-lanceolatis acuminatis annuis
horibus obtusis. *Mill. dict.*
Magnolia flore albo, folio majore acuminato ha
albicante. *Catesb. car. 3. p. 15. t. 15. Gron. virg. 6*
Kalm. it. 2. p. 324.
Habitat in Pensylvania. †
- tripetala 4. **MAGNOLIA** foliis lanceolatis, petalis exterioribus dependentibus.
Magnolia foliis lanceolatis amplissimis annuis. *Mi dict.*
Magnolia amplissimo flore albo, fructu coccine
Catesb. car. 2. p. 80. t. 80.
Habitat in Carolina, rarius in Virginia. †

MICHELIA.

- Champaca. 1. **MICHELIA.** *Fl. zeyl. 144. Osb. it. 93.*
Sampacca. *Rumph. amb. 2. p. 199. t. 67, 68.*
Champacam. *Rheed. mal. 1. p. 31. t. 19. Raj. li*
1641.
Habitat in India. †

UVARIA.

- zeylanica. 1. **UVARIA** foliis integerrimis.
Uvaria. *Fl. zeyl. 224. **
Funis musarius. *Rumph. amb. 5. p. 78. t. 42.*
Narum-panel. *Rheed. mal. 2. p. 11. t. 9. Raj. li*
1636.
Habitat in India. †
Conferantur Canangæ. Rumph. amb. 2. t. 65. † 66. f.
- japonica. 2. **UVARIA** foliis ferratis.
Frutex viscosus procumbens, folio telephii vulgari
æmulo, fructu racemoso. *Kämpf. amæn. 476. t. 41*
Habitat in Japonia. †

ANNONA.

- muricata. 1. **ANNONA** foliis ovali lanceolatis glabris nitidis p
nis, pomis muricatis. *Hort. cliff. 222. * Gron. in*
61. Roy. lugdb. 494.
Annona foliis oblongo-ovatis nitidis, fructibus spi
mollibus tumentibus obtusis. *Brown. jam. 254.*

Anona indica latifolia, fructu squamoso aspero. *Pluk. alm.* 31. t. 134. f. 2.

Anona indica fructu conoide viridi squamis veluti aculeato. *Pluk. alm.* 32. t. 135. f. 2.

Anona maxima, foliis latis splendentibus, fructu maximo viridi conoide: tuberculis f. spinulis innocentibus aspero. *Sloan. jam.* 203. *hist.* 2. p. 166. t. 225.

Anona. Comm. hort. 1. p. 133. t. 69. *Mer. jurin.* 14. t. 14.

Guanabanus fructu molliter aculeato. *Plun. gen.* 43. t. 143. f. 1.

Habitat in America calidiore. †

■. **ANNONA** foliis oblongis, fructibus obtuse sub-squamatis.

Annona foliis oblongo-ovatis undulatis venosis, floribus tripetalis, fructibus mammillatis. *Brown. jam.* 256.

Anona tuberosa. *Rumph. amb.* 1. p. 138. t. 46.

Anona foliis odoratis minoribus, fructu conoide squamoso parvo-dulci. *Sloan. jam.* 205. *hist.* 2. p. 168. t. 227. *Raj. dendr.* 77.

Atamaram. *Rheed. mal.* 3. p. 21. t. 29.

Habitat in America meridionali. †

■. **ANNONA** foliis lanceolatis, fructibus ovatis reticulato-areolatis.

Annona foliis oblongis undulatis venosis, fructibus areolatis. *Brown. jam.* 256.

Anona maxima foliis oblongis angustis, fructu maximo luteo conoide: cortice glabro in areolas angulares distincto. *Sloan. jam.* 264. *hist.* 2. p. 167. t. 226.

Catesb. car. 2. p. 62. t. 62. *Raj. dendr.* 77.

Anona. *Rumph. amb.* 1. p. 136. t. 45.

Habitat in America meridionali. †

■. **ANNONA** foliis oblongis obtusiusculis glabris, palustris, fructibus areolatis.

Annona uliginosa, foliis nitidis ovatis, fructibus areolatis odoratis. *Brown. jam.* 256.

Annona foliis oblongis obtusis glabris, fructu rotundo cortice glabro. *Mull. dist.*

Anona aquatica, foliis laurinis atro-virentibus, fructu minore conoide luteo, cortice glabro in areolas distincto. *Sloan. jam.* 205. *hist.* 2. p. 169. t. 228. f. 1.

Raj. dendr. 78.

- Anona americana juxta fluviorum ripas innscenti
 riformi fructu. *Pluk. alm.* 32. t. 240. f. 6.
Habitat in America ad aquas. †
- glabra. 5. ANNONA foliis lanceolato-ovatis, fructibus
 dibus glabris.
 Anona maxima, foliis latis, fructu maximo
 noide: cortice glabro. *Catesb. car.* 2. p. 64. t. 1.
Habitat in Carolina: †
- triloba. 6. ANNONA foliis lanceolatis, fructibus trifidis.
dist. t. 35.
 Anona fructu lutescente levi scrotum arietis re
 te. *Catesb. car.* 2. p. 85. t. 85. *Trew. chr.* t. 5. L
arb. i. p. 56. t. 19.
Habitat in Carolina. †
- asiatica. 7. ANNONA foliis lanceolatis glabris nitidis †
Hort. cliff. 222. * *Fl. zeyl.* 225. * *Roy. lugd.*
 Annona sylvestris. *Burm. zeyl.* 21.
 Guanabanus fructu purpureo. *Plum. spec.* 43.
 f. 2.
Habitat in Zeylona. †
- africana. 8. ANNONA foliis lanceolatis pubescentibus.
cliff. 222. *Roy. lugd.* 494.
 Guanabanus fructu subcæruleo. *Plum. gen.* 42.
 Guanabanus persex folio. *Trew. chr.* t. 49?
Habitat in America. †

ANEMONE.

* Hepaticæ flore calycato.

- Hepatica. 1. ANEMONE foliis trilobis integerrimis.
 Hepatica. *Hort. cliff.* 223. *Fl. svec.* 445; 480.
upf. 155. *Mat. med.* 277. *Gron. virg.* 61. *Roy.*
 487.
 Trifolium hepaticum, flore simplici & pleno
pin. 339.
Habitat in Europæ nemoribus lapidosis. 2.
- palmata. 2. ANEMONE foliis reniformibus lobatis crenat
 volucro multifido, calyce hexaphyllo colli
 Pulsatilla foliis palmatis. *Hort. cliff.* 224. *Roy.*
 487.

Anemone, cyclaminis f. malvæ folio, lutea. *Bauh. pin.* 173. *Morif. hist.* 2. p. 425. f. 4. t. 25. f. 3.

Anemone latifolia flava. *Bauh. pin.* 176.

Anemone hortensis latifolia 1. *Clus. hist.* 1. p. 248.

Habitat in Lusitania ad Tagum. 2

Calyx sexpartitus, integerrimus, villosus, coloratus, nec a flore remotus, conjungit Anemones T. & Hepaticas. D.

* * *Pulsatillæ pedunculo involucrato, seminibus lanatis.*

ANEMONE pedunculo involucrato, foliis digitatis ^{patens.} multifidis.

Pulsatilla folio anemones secundæ f. subrotundo. *Bauh. pin.* 94. *prodr.* 94.

Pulsatilla polyanthos violacea, anemones folio. *Breyn. cent.* 132. *Helw. puls.* 52. t. 2. 3.

Pulsatilla, anemones folio dissecto, lanuginosa, flore majore dilute luteo patente. *Amm. ruth.* 104.

Habitat in Tobolsko Sibiria, Lusatia inferiore. 2

Folia radicalia ternato-digitata: Foliolis sessilibus, laciniatis, acuminatis: Foliolo intermedio tripartito; lateralibus bipartitis. Scapus uniflorus, foliis brevior. Involucrum remotum, villosum. Corolla alba, subtus villosa. Stamina lutea.

ANEMONE pedunculo involucrato, foliis pinnatis, vernalis. flore erecto.

Pulsatilla foliis simpliciter pinnatis: foliolis lobatis, flore erecto. *Fl. svec.* 448; 483.

Pulsatilla involucro piloso nitido. *Fl. lapp.* 223.

Pulsatilla, apii folio, vernalis, flore majore. *Bauh. pin.* 177. *prodr.* 94. *Helw. puls.* 63. t. 9.

Pulsatilla ex vallesia. *Oed. dan.* t. 29.

Pulsatilla lutea, apii hortensis folio. *Bauh. pin.* 177.

Pulsatilla, apii folio, vernalis, flore minore. *Bauh. pin.* 177. *prodr.* 94. *Helw. puls.* 64. t. 10.

Pulsatilla lutea, apii hortensis folio. *Bauh. pin.* 177. *Hall. helv.* - - t. 6.

Habitat in Suecia, Helvetia sylvis sterilissimis. 2

ANEMONE pedunculo involucrato, petalis rectis, ^{Pulsatilla,} foliis bipinnatis.

Pulsatilla foliis decompositis pinnatis, flore nutante: limbo erecto. *Hort. cliff.* 223. *Fl. svec.* 446; 481.

Mat. med. 276. *Roy. lugdb.* 487. *Dalib. parif.* 160
Sauv. monsp. 254.

Pulsatilla folio crassiore & majore flore. *Bauh. pin.*
 177. *Helw. puls.* 62. t. 8.

Pulsatilla. *Cam. epit.* 398.

Habitat in campis sylvestribus exaridis collibusque apricis Europæ borealis. 2.

pratensis. 6. ANEMONE pedunculo involucrato, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis.

Pulsatilla foliis decompositis pinnatis, flore pendulo limbo reflexo. *Hort. cliff.* 223. * *Fl. succ.* 447; 482.

Roy. lugdb. 487. *Sauv. monsp.* 254.

Pulsatilla flore minore nigricante. *Bauh. pin.* 177.
Helw. puls. 66. t. 12.

Pulsatilla vulgaris, saturatiore flore. *Clus. hist.* 1. p. 246.

Pulsatilla flore clauso obsoleto; petalis reflexis. *Helw. puls.* 65. t. 11.

Habitat in Scaniæ, Germaniæ campis pratensibus apricis aridis. 2.

* * * *Anemones caule folioso, seminibus caudatis.*

alpina. 7. ANEMONE foliis caulinis ternis connatis supradecompositis multifidis, seminibus hirsutis caudatis.

Anemone tubis caudatis, foliis omnibus duplicatopinnatis: pinnulis remotis. *Hall. helv.* 331.

Anemone sylvestris. 2. *Clus. hist.* 1. p. 245.

Pulsatilla flore albo. *Bauh. pin.* 177. *Lob. ic.* 282.

β. Anemone alpina alba major. *Bauh. pin.* 176. *prodr.* 94. *Burf. IX.* 80.

γ. Anemone alpina alba minor. *Bauh. pin.* 176. *prodr.* 194. *Burf. IX.* 81.

Habitat in Alpibus Styriacis, Helveticis. 2.

Confer: Pulsatilla lutea, pastinacæ sylvestris folio C. B. 177. quæ vix videtur ab hac diversa.

coronaria. 8. ANEMONE foliis radicalibus ternato-decompositis, involucro folioso. *Hasseltq. it.* 477. *Hill. anat.* 18.

Pulsatilla foliis decompositis ternatis. *Hort. cliff.* 223. *Hort. ups.* 155. *Roy. lugdb.* 487.

Anemone tenuifolia, simplici flore. *Bauh. pin.* 174. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Anemone tenuifolia multiplex rubra. Bauh. pin. 176.

Anemone. Cam. epit. 386.

Anemone angustifolia multiplex, mutata florum facie quotannis nova. H. R. P. Mill. dict. t. 31.

Habitat in Oriente, Constantinopoli allata. 2

ANEMONE foliis digitatis.

hortensis.

Pulsatilla foliis digitatis. Hort. cliff. 224.

Anemone hortensis latifolia. Bauh. pin. 176.

Anemone, geranii rotundo folio, purpurascens. Bauh.

pin. 173.

Anemone hortensis latifolia 3. Clus. hist. 1. p. 249.

Anemone 1. Dod. pempt. 434.

Habitat ad Rhenum ☉ in Italia. 2

*** *Anemoneidæ flore nudo, seminibus ecaudatis.*

ANEMONE pedunculo nudo, seminibus subrotundis hirsutis. *sylvestris.*

Anemone seminibus hirsutis. It. oel. 112. Fl. suec. 449; 484.

Anemone seminibus seta plumosa terminatis. Hort. cliff. 224. Roy. lugdb. 224.

Anemone sylvestris alba major. Bauh. pin. 176.

Anemone sylvestris. 1. Clus. hist. 1. p. 244.

Anemone sylvestris alba minor. Bauh. pin. 176. prodr. 93. Burf. IX. 79.

Habitat in Germania. 2

ANEMONE pedunculis alternis longissimis, fructibus cylindricis, seminibus hirsutis muticis. *virginiana.*

Anemone caule ramoso, petalis lanceolatis. Roy. lugdb. 488. Gron. virg. 165.

Anemone virginiana tertiæ similis, flore parvo. Herm. lugdb. 645. parad. 18. t. 18.

Habitat in Virginia. 2

Caulis nudus, terminatus, Foliis ternis, ternatis, medio trilobo, acuto, serrato, lateralibus bipartitis, lobato-serratis. Pedunculus exit e centro petiolorum, longus, nudus. Flos parvus petalis ovatis, viridibus, instar calycis cujusdam. Pistillorum capitulum elongatum, cylindricum, resolvitur in Semina hirsuta. Juxta pedunculi basin exit caulis ulterius, terminatus pedunculo florifero ☉ foliis duobus oppositis ☉ sic ulterius.

- dichotoma. 12. **ANEMONE** caule dichotomo, foliis sessilibus oppositis amplexicaulibus trifidis incis. *Anem. ed.* 1. p. 155. *
Habitat in Canada, Sibiria. 24
Statura A. nemorose, sed altior, radice repens. Folia posita, sessilia, amplexicaulia, profunde trifida, cisa. Flores A. nemorose, solitarii e dichotomia natis, pedunculati.
- trifolia. 13. **ANEMONE** foliis ternatis ovatis integris serrate caule unifloro. *Hort. upf.* 155. *Hort. cliff.* 224. *l. lugdb.* 488. *Dalib. paris.* 161.
Anemone trifolia, flore albo. Bauh. hist. 3. p. 411
Anemone trifolia. Dod. pempt. 436.
Habitat in Gallia. 24
- quinquefolia. 14. **ANEMONE** foliis quinatis ovalibus serratis, caule unifloro.
Ranunculus nemorum, fragariæ foliis, virginia.
Pluk. alm. 310. t. 106. f. 3.
Habitat in Virginia, Canada. Kalm. 24
- nemerosa. 15. **ANEMONE** seminibus acutis, foliolis incis, caule unifloro. *Hort. cliff.* 224. *Fl. svec.* 450; 485. *l. med.* 275. *Dalib. paris.* 161.
Anemone nemerosa, flore majore. Bauh. pin. 176.
Ranunculus sylvarum. Clus. hist. 247.
Habitat in Europæ asperis, duris, nemoribus. 24
- apennina. 16. **ANEMONE** seminibus acutis, foliolis incis, talis lanceolatis numerosis. *Huds. angl.* 209.
Ranunculus nemorosus, flore cæruleo, apenninimtis. Mentz. pug. t. 8. f. 2.
Ranunculus nemorosus, flore purpureo-cæruleo. A theatr. 325. *Raj. angl.* 3. p. 259.
Anemone, geranii robertiani folio, cærulea. Bauh. pin. 174.
Anemone hortensis tenuifolia, simplici flore i. l. hist. 1. p. 254.
Habitat in Apenninis, Romæ, Anglia.
- ranunculoides. 17. **ANEMONE** seminibus acutis, foliolis incis, talis subrotundis, caule sub-bifloro. *Hort. d.* 125. *Fl. svec.* 451; 486. *Roy. lugdb.* 488. *Dalib. paris.* 161.

Ranunculus nemorosus luteus. *Bauh. pin.* 178.

Ranunculus phragmites luteus nemorosus. *Bauh. hist.*
3. p. 413.

Habitat in Europæ borealis pratis nemorosis. 24

. **ANEMONE caule unifloro, involucrio folioso ob-**

sibirica.

tuso.

Habitat in Sibiria. D. Gmelin. 24

Folia radicalia digitata, multifida, marginibus præsertim hirsuta: petiolis pilosis basi vaginantibus. Scapus nudus, pilosus. Involucrum sub flore tripartitum, lobatum: laciniis lanceolatis. Flos patens: petalis 6, subrotundis, fulvis. Stamina flava. Pistillorum capitula subrotunda, muricata.

. **ANEMONE floribus umbellatis, seminibus depresso-ovalibus nudis.**

narcissiflora.

Anemone multiflora, semine lævi latissimo, petalis feminis ex rotundo-acutis. Hall. helv. 330.

Ranunculus montanus hirsutus humilior, narcissi flore.
Bauh. pin. 182.

Ranunculus montani 2, species altera. *Clus. hist.* 1. p. 235.

Caryophyllata alpina quinquefolia. *Bauh. pin.* 322.

Habitat in Alpibus Austriæ, Helvetiæ, Sibiria. 24

. **ANEMONE floribus umbellatis congestis, foliis multifidis.** †

fasciculata.

Ranunculus orientalis, aconiti lycoctoni folio, flore magno albo. *Tournef. cor.* 20. itin. 3. p. 92. t. 92.

Habitat in Oriente.

Obscure adhuc distincta a præcedente (cui simillima), quamdiu hujus semina non descripta sunt.

. **ANEMONE foliis caulinis simplicibus verticillatis, radicalibus duplicato-ternatis.**

Thalicroides.

Ranunculus nemorosus, aquilegiæ foliis, virginianus, asphodeli radice. *Pluk. alm.* 310. t. 106. f. 4.

Thalictrum caule unifloro, ex eodem puncto foliis quatuor simplicibus instructo. *Gron. Virg.* 62.

Habitat in Virginia, Canada.

Canadensis plantæ ß, a D. Kalmio lectæ, Radix tuberosa. Folia radicalia petiolis longis, duplicato-ternata: foliolis subcordatis; angulatis. Scapus foliis paulo altior, terminatus foliis quatuor simplicibus, folio-

foliis radicalibus similibus, petiolis longis inMeatibus. Pedunculi terminales, conferti s. fasciculati, 2, 3, s. 5, simplices, uniflori, aequales. Corolla alba: petalis ovatis, obtusis, patentibus. Stamina flava. Pistilli capitulum ovatum, uniloculare.

ATRAGENE.

- zeilanica. 1. **ATRAGENE** cirrhis diphyllis, petalis exterioribus quaternis. *Fl. zeyl. 226.**
Atragene. Am.en. acad. 1. p. 405.
Clematis zeilanica, floribus obsoletis parvis Her. zeyl. 35.
Habitat in Zeylona. §
- alpina. 2. **ATRAGENE** foliis duplicato-ternatis ferratis, petalis exterioribus quaternis.
Clematis foliis cordatis crenatis indivisis trilobis ternatisque. Roy. lugdb. 487.
Clematis alpina geranifolia. Bauh. pin. 300. prodr. 135. Pluk. alm. 109. t. 84. f. 7. Moris. hist. 3. f. 154. 2. f. ult.
Clematis cruciata alpina. Pon. bald. 335.
Habitat in Baldi, Austriae, Sibiriae alpibus. §. 2.
Folia biternata, incisa, radicalia. Scapi uniflori. Petala 4. exteriora lanceolata, magna; interiora lanceolata, obovata, parva.
- capensis. 3. **ATRAGENE** foliis ternatis: foliolis incisis dentatis, petalis exterioribus quinis.
Pulsatilla foliis trifidis dentatis, flore incarnato pleno. Burm. afric. 148.
Pulsatilla apii folio rigido, flore magno. Herm. afric. 18.
Habitat ad Cap. b. Spei. §. 2.
Caulis fruticosus. Folia alterna, ternata, cuneiformia, trifida, acuta, dentata, nuda: intermedio longius petiolato. Scapus uniflorus, hirsutus. Involucrum triphyllum, hirsutum. Petala circiter 20, alba: horum 6. inferiora latiora, subtus villosa purpurescentia. Seminum capitulum ovatum, hirsutum.

CLEMATIS.

* scandentes.

◊ **CLEMATIS** foliis compositis decompositisque : fo- Viticella.
liolis ovatis integerrimis. *Hort. cliff.* 225. *Roy.*
lugdb. 486.

◊ **Clematis cærulea** vel **purpurea repens.** *Bauh. pin.* 300.

◊ **Clematis altera.** *Clus. hist.* 1. p. 122. *Cam. epit.*
696.

◊ **Clematis cærulea**, flore pleno. *Bauh. pin.* 300.

Habitat in Italiæ, Hispaniæ, sepibus.

Folia infima cordata ; media triloba, superiora pinna-
ta. Petala decidua, obtusissima, lateribus tenuiora.

CLEMATIS foliis compositis decompositisque : fo- Viorna.
liolis quibusdam trifidis. *Gron. virg.* 62.

◊ **Flammula scandens**, flore violaceo clauso. *Dill. elth.*
144. t. 118 f. 44.

◊ **Clematis purpurea repens**, petalis florum coriaceis.
Raj. hist. 1928.

◊ **Scandens caroliniana** planta, viornæ folio. *Pet. succ.* 27.
Habitat in Virginia, Carolina.

CLEMATIS foliis simplicibus ternatisque ; foliolis crispa.
integristrilobisve.

◊ **Clematis** flore crispo. *Dill. elth.* 86. t. 73. f. 84.

Habitat in Carolina.

CLEMATIS foliis compositis : foliolis incisis angu- orientalis.
latis lobatis cuneiformibus, petalis interne villosis.

◊ **Clematis orientalis**, apii folio, flore e viridi flavescen-
te posteriore reflexo. *Tournef. cor.* 20.

◊ **Flammula scandens**, apii folio glauco. *Dill. elth.* 144.
t. 119. f. 145.

Habitat in Oriente.

Flores cernui : petalis recurvatis, supra villosis.

CLEMATIS foliis ternatis integerrimis, floribus di- dioica,
oicis. *Aman. acad.* 5. p. 398. *

◊ **Clematis scandens**, foliis quinquenerviis ovatis nitidis
pinnato-ternatis. *Brown. jam.* 255.

◊ **Clematis prima** s. **sylvestris latifolia**, foliis ternis.
Sloan. jam. 84. *hist.* 1. p. 199. t. 128. f. 1.

Habitat in America calidiore.

- virginiana. 6. CLEMATIS foliis ternatis : foliolis cordatis lobato-angulatis scandentibus , floribus dioicis. *Acad. 4. p. 274. **
 Clematis virginiana pannonicæ similis. *Pluk. mant. t. 389. f. 4.*
 Clematis floridensis , flore albo odoratissimo. *Anat. t. p. 79. t. 7.*
 Clematis aquatica trifoliata late scandens , floribus odoratis. *Gron. virg. 62. n. 270.*
Habitat in America septentrionali. ♀
Femina gaudet staminibus , sed antheræ polline tuuntur.
- cirrhosa. 7. CLEMATIS cirrhis scandens , foliis simplicibus. *cliff. 226. Roy. lugdb. 487.*
 Clematis peregrina , foliis pyri incisus. *Bauh. 300.*
 Clematis altera bætica. *Cus. hist. 1. p. 123.*
 Clematis peregrina , foliis pyri incisus : nunc singulis nunc ternis. *Tournef. cor. 20.*
Habitat in Bætica , arbores operiens & deprimens.
Cirrhi oppositi , a foliis distincti. Folia sæpius fasciata , serrata , petiolata , ovata , ex iisdem generibus caulibus plura. Pedunculi axillares , uniflori ; sub gulo flore calyculus remotus , hemisphæricus , nutus.
- Vitalba. 8. CLEMATIS foliis pinnatis ; foliolis cordatis lobato-angulatis. *Hort. cliff. 225. Roy. lugdb. 486. Helv. 334. Gron. virg. 62. Sauv. monsp. 249. G. gelr. 315.*
 Clematis latifolia integra. *Bauh. hist. 2. p. 125.*
 Clematis tertia. *Cam. epit. 697.*
 β. Clematis latifolia dentata. *Bauh. hist. 2. p. 125.*
Vitalba Dod. pempt. 404.
 γ. Clematis sylvestris latifolia. *Bauh. pin. 300. Jam. 84.*
Habitat in sepibus Europæ australis , Virginie , majicæ.
- Flammula. 9. CLEMATIS foliis inferioribus pinnatis scandentibus laciniatis : summis simplicibus integerrimis lanceolatis. *Hort. cliff. 225. Roy. lugdb. 486. Hall. herb. Sauv. monsp. 249.*

Clematis f. *Flammula repens*. *Bauh. pin.* 300. *Raj. hist.* 621.

Flammula. *Dod. pempt.* 404. *Dalech. hist.* 1171.

Habitat in *Monspelli*, *Jenæ*, *inque Rhetia sepibus*.

* * *erecta*.

CLEMATIS foliis pinnatis linearibus, caulis simplicibus hexagonis. *maritima*.

Clematis *maritima repens*. *Bauh. pin.* 300. *prodr.* 135.

Allion. nic. 142.*

Habitat ad litora maris Adriatici, Venetiis, Monspelli.

Planta perennis. Caules, e sarmentis procumbentibus, plures, erectiusculi, erecti. Folia opposita, pinnata: foliolis sæpius 5 paribus, remotis, linearibus, rigidiusculis, subsessilibus, lævibus, indivisis s. rarius bi- vel trifidis. Flores C. rectæ. Varietatem C. *Flammula* statuunt *Magnol.* & *Rajus*; meam potius C. rectæ judicarem ex solo mutata?

CLEMATIS foliis pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, caule erecto, floribus pentapetalis *recta*.

tetrapetalisque. *Hort. cliff.* 225. *Hort. ups.* 155. *Roy. lugdb.* 486. *Sauv. monsp.* 249.

Flammula *recta*. *Bauh. pin.* 300.

Flammula. *Cam. epit.* 698. *Clus. hist.* 1. p. 124.

Habitat in collibus *Austriae, Pannoniae, Tatariae, Monspelli.* 2.

varietate erecta & stricta sunt.

CLEMATIS foliis simplicibus sessilibus ovato-lanceolatis, floribus cernuis. *integrifolia*.

Hort. cliff. 225. *Hort. ups.*

256. *Roy. lugdb.* 486.

Clematis *cærulea erecta*. *Bauh. pin.* 300.

Clematis *cærulea pannonica*. *Clus. hist.* 1. p. 123.

Habitat in *Hungaria, Tataria.* 2.

THALICTRUM.

THALICTRUM caule simplicissimo subnudo, ramis alpinum.

summo simplici terminali, *Hort. cliff.* 227. *Fl. svec.*

255; 491. *Roy. lugdb.* 485.

Thalictrum caule subnudo simplici, foliolis obtusis.

Fl. lapp. 225.*

Tha-

Thalictrum montanum minimum præcox, foliis
dentibus, *Morif. hist. 3. p. 325. f. 9. t. 22. f. 11.*
dan. t. 11.

Habitat in Alpibus Lapponiæ, Arvoniz. 2.
Petala 4, Stamina 12, Pistilla 8, Racemus
floribus cernuis.

foetidum. 2. **THALICTRUM** caule paniculato filiformi
fissimo folioso.

Thalictrum caule filiformi ramosissimo in partibus
disperso subjectis foliolis. Hort. cliff. 227.
lugdb. 485. Sauv. monsp. 251.

Thalictrum minimum foetidissimum. Bauh. pin.
prodr. 147. Bauh. hist. 3. p. 488. Burf. XIX
Morif. hist. 3. p. 325. f. 9. t. 20. f. 13. Pl.
367. t. 65. f. 4.

Habitat Montpelii, inque Valleſia, Helvetia. 2.

tuberosum. 3. **THALICTRUM** floribus pentapetalis, radice
rosa. *Hort. cliff. 226. Roy. lugdb. 486.*

Thalictrum minus, asphodeli radice, magis
Tournef. infl. 271.

Thalictrum minus, grumosa radice, floribus majus
Herm. flor. 9. Bærh. lugdb. 1. p. 45.

Ranunculus thalictri folio, asphodeli radice.
hist. 2. p. 438. f. 4. t. 28. f. 13.

Oenanthe hederæ foliis. Bauh. pin. 163.

Habitat in Hispania, Pyrenæis. 2.

cornuti. 4. **THALICTRUM** floribus pentapetalis, radice
sa. *Roy. lugdb. 486.*

Thalictrum canadense. Corn. canad. 186.

Thalictrum americanum. Park. theatr. 265.

Thalictrum majus, foliis aquilegiæ, flore albo.
hist. 3. p. 325.

Habitat in Canada. 2.

dioicum. 5. **THALICTRUM** floribus dioicis.

Habitat in Canada. Kalm.

Altitudo vix pedalis. Caulis rectus. Flores
tali corollis 3 staminibus 40. albis. Antheræ
scentes. Foliola cernua sunt, qua nota dis-
tinguitur planta ex habitu. Femine styli
longiores quam in congeneribus.

THALICTRUM foliis sexpartitis, floribus cernuis.

Thalictrum caule folioso, foliolis caulinis acutis, panicula divaricata, floribus nutantibus. *Fl. svec.* 454; 489. *It. gotl.* 180. * *Dalib. paris.* 454.

Thalictrum minus. *Bauh. pin.* 335. *Dod. pempt.* 58.

Ruta pratensis minor. *Tabern. ic.* 55.

Habitat in Europæ pratis. 2.

Dignoscitur apicibus foliorum purpurascens & *Caulis* nebula cœrulescente. Floret præcocius cum *T. aquilegifolio*, alpino, purpurascens; angustifolio & contorto.

THALICTRUM foliis tripartitis, caule foliis duplo altiore, floribus cernuis. purpurascens.

Thalictrum virginianum elatius glaucum, staminibus purpurascens. *Morif. hist.* 3. p. 324.

Habitat in Canada. 2.

Habitus Thalictri minoris, at dimidio humilior evadit, ubi illud tripedale. Calyces purpurascens, staminibus luteis. *Caulis* purpurascens, abque nebula.

Differt a T. minori foliolis minime apice purpurascens. *Tempore* florendi præcocius cum *T. minori*, nec cum *T. flavo*. *Flos* ut in præcedenti: *Petalis* 4, *Staminibus* 14, *Pistillis* 8.

THALICTRUM foliis tripartitis: foliolis subreflexis sibiricum, argute incis, floribus cernuis.

Thalictrum alpinum minus saxatile, rutæ folio, staminibus luteis. *Segu. ver.* 1. p. 476. t. 11?

Habitat in Sibiria. *Gmelin.*

Habitus Th. minoris s. purpurascens; at *Foliola* parva, sextuplo minora, glauca colore *Rutæ* s. *Fumariæ*. *Caulis* viridis, maxime paniculatus. *Panicula* ad divaricationes fusca. Floret serius, nempe cum *T. flavo* & *Dioico*.

THALICTRUM foliolis lanceolato-linearibus intergerimis. *Hort. cliff.* 226. *Amæn. acad.* 3. p. 48. *Roy. lugdb.* 478. *Hall. helv.* 308. *Sauv. monsp.* 250. angustifolium.

Thalictrum pratense, angustissimo folio. *Bauh. pin.* 337; *prodr.* 146. t. 146. *Pluk. alm.* 364. t. 65. f. 6.

Habitat in Germania rarius. 2.

Petala 4, *stamina* 16, *Pistilla* 7.

- flavum.** 10. **THALICTRUM** caule folioso fulcato, panic
multiplici erecta. *Hort. cliff.* 226. *Fl. svec.* 488. *Roy. lugdb.* 485. *Hall. helv.* 308. *Dalib. p.*
162.
Thalicttrum pratense. *Fl. tapp.* 224.
Thalicttrum majus, siliqua angulosa f. striata. *B*
pin. 336.
Thalicttrum magnum. *Dod. pempt.* 58.
- speciosum.** β. **Thalicttrum majus flavum**, floribus luteis f. gla
folio. *Bauh. pin.* 336. *flaminibus fulvis.*
Habitat in Europæ septentrionalioris subhumidis,
in Hispania. 4
Petala 4, *Stamina* 24, *Pisilla* 10—16.
- lucidum.** 11. **THALICTRUM** caule folioso fulcato, folii
nearibus carnosis. *Dalib. paris.* 162. †
Thalicttrum minus lucidum, libanotidis coronari
liis. *Pluk. alm.* 363. t. 65. f. 5.
Thalicttrum minus alterum parisiensium, foliis cr
ribus & lucidis. *Tournef. inst.* 271.
Thalicttrum 1, vel *pratense* 1. *Clus. hist.* 1. p. 23.
Habitat Parisiis & *in Hispania.*
Planta, an satis distincta a T. flavo? videtur
ris filia.
- aquilegfoli-
um.** 12. **THALICTRUM** fructibus pendulis triangulari
rectis, caule tereti.
Thalicttrum seminibus triangularibus pendulis, fl
lis caulinis. *Hort. cliff.* 226. *Fl. svec.* 452; 487. *l*
lugdb. 285. *Hall. helv.* 309.
Thalicttrum majus, florum staminibus purpurace
bus. *Bauh. pin.* 337.
Thalicttrum majus, folliculis angulosis, caule
Bauh. hist. 3. p. 487.
Habitat in Scania, Helvetia. 4
Petala 4, *Stamina* 60, *Pisilla* 16.
- contortum.** 13. **THALICTRUM** fructibus pendulis triangulari
contortis, caule subancipiti.
Thalicttrum hybridum seminibus contortis. *Aman.*
3. p. 47.
Habitat in Sibiria. *G. Demidoff.* 4
Petala 4, *Stamina* 60, *Pisilla* 8. *antecedenti*
sed humilior floribus albis.

14. **THALICTRUM** scapo subumbellato, florum filamentis oblancoelatis coloratis anthera latioribus. petalodeum

Habitat in Sibiria. 24

Folia radicalia duo, supradecomposita ut in congeneribus, sed reliquis longe minora. Foliolis ovatis, obtusis, sæpe trilobis. Scapus vix pedalis, striatus, aphyllus, raro unico folio decomposito & pedunculo laterali. Flores fere in umbellam terminalem congesti. Calyx tetraphyllus, deciduus, rotundatus. Stamina numerosa: Filamentis membranaceis, superne magis dilatatis, coloratis, incarnatis, Antheris latioribus. Germina sessilia.

A D O N I S.

1. **ADONIS** floribus pentapetalis, fructibus ovatis. æstivalis.

Mill. lex.

Adonis sylvestris, flore phœniceo, ejusque foliis longioribus. *Bauh. pin.* 178.

Adonis flore pallido. *Cam. epit.* 648.

Habitat inter segetes Europæ australis. ☉

Affinis nimium A. autumnali.

2. **ADONIS** floribus octopetalis, fructibus subcylindricis. autumnalis

Hort. ups. 156.

Adonis radice annua. *Hort. cliff.* 321. *Roy. lugdb.* 488.

Dalib. paris. 162. *Sauv. monf.* 253.

Adonis flore majore. *Bauh. pin.* 178.

Adonis hortensis, flore minore atro-rubente. *Bauh. pin.* 178.

Flos adonis. *Cus. hist.* t. p. 336.

Habitat inter segetes Europæ australis. ☉

ADONIS flore dodecapetalo, fructu ovato.

vernalis.

Adonis radice perenni. *Hort. cliff.* 231. *Fl. suec.*

456; 492. *It. æl.* 73. *Roy. lugdb.* 488. *Sauv. monsp.*

253.

Helleborus niger tenuifolius, buphthalmi flore. *Bauh.*

pin. 186.

Buphthalmum. *Dod. pempt.* 261.

Habitat in Oelandiæ, Borussia, Bohemiæ collibus apricis. 24

Hec Soror A. apennina, ut A. æstivalis est A. autumnalis.

- apennina. 4. **ADONIS** floribus pentdecapetalis. fructu ovato. Helleborus niger ferulaceus, caule geniculato, flore magno tulipæ minoris instar. *Menz. pug. t. 3. f. 1.*
Habitat in Sibiria, Apenninis. 2.
Difficillime distinguuntur plantæ 4 & 3. simillimæ. Caulis 3 adpersus pilis; 4 punctis farinosis pellucidis. Rami 3 ex caulis parte inferiore; 4 ex alis superioribus. Pedunculus 3 brevissimus; 4 longior. Folia in 3 mirus pinnata; 4 magis divisa, latiora, nitidiora. Calyx in 3 griseus striatus villosus concavus; 4 luteo-virescens, glaber, avenius, planus. Petala in 3 lanceolata, sæpius duodecim; 4 ovata, imbricata, sæpius quindecim. Flos in 3 unicus; in 4 plures. Stamina in 4 valde reflexa. Planta 4. diutius æstate durat, 3. vero vernalis est.

- capensis. 5. **ADONIS** floribus pentdecapetalis, fructibus depresso, foliis duplicato-ternatis foliolis incis de-tatis
Actæa trifoliata hirsuta, foliis scabris, flore sulphureo rariore. Burm. afr. 147. t. 51.
Christophoriana africana ranunculoides, foliis rigidis Boerh. lugdb. 2. p. 62.
Ranunculus æthiopicus, foliis rigidis, floribus ex lacteo-virescentibus. Comm. hort. 1. p. 1. t. 1. R. suppl. 316.
*Ranunculus perelegans Franqueville, foliis aculeatis Lob. illustr. 135. **
Astrantia africana, aserpitii foliis latioribus rigidis & spinosis. Moris. hist. 3. p. 279.
Imperatoria ranunculoides africana enneaphyllos, aserpitii lobatis foliis rigidis margine spinosis. Mart. atm. 198. t. 95. f. 2.
Habitat ad Cap. b. Spei. 2.
Caulis subdorsus, umbelligerus. Folia radicalia. ternata: intermedio foliolo partiali sæpe pinnato-pentaphyllo. Calyx pentaphyllus. Petala sæpe 15, longiora; horum 5 exteriora. Planta caustica variat glabra aut hirsuta.

RANUNCULUS.

* Foliis simplicibus.

Flammula. 1. **RANUNCULUS** foliis ovato-lanceolatis petalis

tis, caule declinato. *Hort. cliff.* 228. *Fl. svec* 458; 493. *Roy. lugdb.* 489. *Hall. helv.* 322. *Dalib. paris.* 163.

Ranunculus foliis ovato-oblongis integerrimis, caule procumbente. *Fl. lapp.* 325.

Ranunculus longifolius palustris minor. *Bauh. pin.* 180.

Flammula Ranunculus. *Dod. pempt.* 432.

3. *Ranunculus palustris, foliis ferratis.* *Bauh. pin.* 180. *Habitat in Europæ pascuis udis.* 2

1. **RANUNCULUS** foliis linearibus, caule repente. reptans. *Fl. lapp.* 236. t. 3. f. 5. *Fl. svec.* 459; 495.

Ranunculus flammeus minimus, spergulæ folio. *Buxb. cent.* 5. *app.* 41.

Ranunculus repens, gramineis foliis, e singulis geniculis radices agens. *Amm. ruth.* 80. t. 13. f. 1.

Habitat in Svecia, Russia ad ripas lacuum, antecedenti valde affinis & forte varietas.

2. **RANUNCULUS** foliis lanceolatis, caule erecto. *Lingua.* *Hort. cliff.* 228. *Fl. svec.* 457. *Roy. lugdb.* 489. *Dalib. paris.* 163.

Ranunculus longifolius palustris major. *Bauh. pin.* 34.

Ranunculus lanceolatus major. *Tabern. ic.* 48.

3. *Ranunculus flammeus, latiori plantaginis folio marginibus pilosis.* *Pluk. alm.* 312.

Habitat in Europæ borealioris fossis, aquis limosis. 2

6. **RANUNCULUS** foliis ovatis petiolatis, floribus nodifloris, sessilibus. *Hort. cliff.* 228. *Dalib. paris.* 164.

Ranunculus parisiensis pumilus, plantaginellæ folio.

Pet. gaz. 40. t. 25. f. 4. *Vaill. act.* 1719. p. 52. t. 4. f. 4.

7. *Ranunculus ficulus, folio rotundo vix ferrato.* *Pet. gaz.* 39. t. 24. f. 9.

Habitat Parisiis & in Siciliæ locis paludosis.

8. **RANUNCULUS** foliis lanceolato-linearibus sessilibus, caule erecto, radice bulbosa. *gramineus.* *Hort. cliff.* 228. *Roy. lugdb.* 489. *Dalib. paris.* 163. *Sauv. monsp.* 75.

Ranunculus, gramineo folio, bulbosus. *Bauh. pin.* 181.

Ranunculus pumilus, gramineis foliis. *Bauh. hist.* 3. p.

Hydropiper lanceolatum. *Dalech. hist.* 1038.

β. Ranunculus montanus, folio gramineo. *Bauh. pin.*

γ. Ranunculus montanus, folio gramineo, multij
Bauh. pin. 181.

Habitat in Pyrenæis & Galliæ prætis aridis. 2

parnassifolius.

6. RANUNCULUS foliis subovatis nervosis interminis petiolatis.

Ranunculus montanus, graminis parnassii folio. *Ta inst.* 286.

Habitat in Europa australi.

Gemma radicalis promit Folia duo, lanceo membranacea, supra terram eminentia. Folia ta, obtusa, coriacea, nervosa, integerrima, pubescentia, imprimis basi involuta, longius peti. Caulis simplicissimus, i divisus, aphyllus. In crum terminale, diphylum. Pedunculi 2—4 flori, pubescentes. Calyx purpurascens. C albida vel purpurascens nervis purpureis.

amplexicaulis.

7. RANUNCULUS foliis ovatis acuminatis amplexicaulis, caule multifloro, radice fasciculata. *cliff.* 229. *Roy. lugdb.* 484. *Sauv. monsp.* 76.

Ranunculus montanus, folio plantaginis. *Bauh.* 180. *Morif. hist.* 2. p. 444 f. 4. t. 30. f. 36.

Ranunculus dulcis, foliis latis rapistris perfoliatis ribus albis. *Menz. pug.* t. 8. f. 6.

Habitat in Pyrenæis, Apenninis. 2

bullatus.

8. RANUNCULUS foliis ovatis ferratis, scapo unifloro. *Hort. cliff.* 229.

Ranunculus latifolius bullatus, asphodeli radice. *B pin.* 181

Ranunculus lusitanicus. *Dod. pempt.* 429.

Ranunculus grumosa radice 1. *Clus. hist.* 1. p. 138.

β. Ranunculus latifolius bullatus autumnalis, flore mono & prolifero. *Morif. hist.* 2. p. 447. f. 4. t. 31 49, 50, 51.

Ranunculus lusitanicus, folio subrotundo, parvo *la Tournef. inst.* 286.

Habitat in Lusitania, Creta. 2

ficaria.

9. RANUNCULUS foliis cordatis angulatis petiolatis
Fl. suec. 460; 496. *Hort. cliff.* 228. *Ma.*

274. *Roy. lugdb.* 490. *Dalib. paris.* 167.

Chelidonia rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 309.

Chelidonium minus. *Fuchf. hist.* 866.

β. *Chelidonia rotundifolia major.* *Bauh. pin.* 309. *prodr.* 137.

Habitat in Europæ ruderatis; umbrosis, spongiosis. 24

10. RANUNCULUS foliis reniformibus subtrilobis Thora.

crenatis: caulino sessili, floralibus lanceolatis, caule subbifloro. *Jacq. virid.* 249. *

Aconitum pardalianches, f. *Thora major.* *Bauh. pin.* 184.

Thora major. *Cam. epit.* 825.

Pthora valdensium. *Lob. ic.* 604. *Clus. hist.* 1. p. 239.

8. *Aconitum pardalianches alterum*, f. *Thora minor.*

Bauh. pin. 184.

Thora minor. *Cam. epit.* 826.

Limeum pardalianches genus, uno tantum folio. *Dalech. hist.* 1738.

Ranunculus foliis radicalibus cordato subrotundis, caulinis sessilibus lanceolatis integerrimis. *Hall. helv.* 327. *

Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenæicis. 24

Varietates α β conjunguntur ab *Hallero*, distinguuntur a *Seguiero*. *

* * *Foliis dissectis & divis.*

11. RANUNCULUS foliis radicalibus reniformibus creticus.

crenatis sublobatis, caulinis tripartitis lanceolatis integerrimis, caule multifloro.

Ranunculus foliis radicalibus cordato-subrotundis, caulinis tripartitis sessilibus lanceolatis integerrimis. *Roy. lugdb.* 490.

Ranunculus, *asphodeli radice*, *creticus.* *Bauh. pin.* 181.

Ranunculus creticus latifolius. *Clus. hist.* 1. p. 239.

Habitat in Creta. 24

12. RANUNCULUS foliis radicalibus subrotundo-cassubicus.

cordatis crenatis; caulinis digitatis dentatis, caule multifloro.

Ranunculus rotundifolius vernus sylvaticus major vel cassubicus, folio thoræ calthæ. *Breyn. prodr.* 1. p. 45.

Habitat in Cassubia, Sibiria. 24

13. RANUNCULUS foliis radicalibus reniformibus cre- auricomus.

natis incis; caulinis digitatis linearibus, caule multifloro.

Hort. cliff. 229. *Fl. svec.* 462; 498. *Roy. lugdb.*

490. *Hall. helv.* 327. *Dalib. paris.* 167. *Leys. bal.* 487.

Ranunculus nemorosus f. *sylvaticus*, folio subrotundo. *Bauh. pin.* 178

Ranunculus 1. *sylvestris*. *Daléch. hist.* 1028.

Habitat in Europæ paucis humidiusculis. 2.

Flores nobis mense *Frondescentiæ apetalæ*, *Florescendi-f. tripetalæ*, *Grossificationis pentapetalæ*.

abortivus.

14. **RANUNCULUS** foliis radicalibus cordatis natis, caulinis ternatis angulatis, caule subtrifido.

Ranunculus foliis radicalibus crenatis, caulinis digitatis petiolatis. *Roy. lugdb.* 490.

Ranunculus foliis radicalibus reniformibus crenatis tiolatis; caulinis paucis digitatis sessilibus. *Groz.* 166.

Ranunculus virginianus, flore parvo, molliori f. *Herm. lugdb.* 514.

Habitat in Virginia, Canada.

sceleratus.

15. **RANUNCULUS** foliis inferioribus palmatis; imis digitatis, fructibus oblongis. *Hort. cliff.*

Fl. suec. 463; 499. *Roy. lugdb.* 490. *Hall. helv.*

Gron. virg. 63. *Dalib. paris* 167. •

Ranunculus palustris, apii folio, lævis. *Bauh. pin.*

Ranunculus sylvestris 1. *Nod. pempt.* 426.

Habitat ad Europæ fossas & paludes. ☉

aconitifolius.

16. **RANUNCULUS** foliis omnibus quinatis lanceolatis inciso-ferratis. *Hort. cliff.* 229. *Hort. ups.*

Fl. suec. 2. n. 497. *Roy. lugdb.* 490. *Hall. helv.* 3

Ranunculus montanus, aconiti folio, albus: flore 1 jore. *Bauh. pin.* 182.

β. *Ranunculus montanus*, aconiti folio, albus flore 1 nore. *Bauh. pin.* 182.

Ranunculus montanus. 4. *Clus. hist.* 1. p. 236.

γ. *Ranunculus* folio aconiti, flore albo multiplici. *Ba pin.* 179.

Ranunculus pleno flore albo. *Clus. hist.* 1. p. 236.

Habitat in Alpibus Helveticis, Austriacis, Pyrenæi Norvegicis, Horto Dei. 2.

illyricus.

17. **RANUNCULUS** foliis ternatis integerrimis lanceolatis. *It. æl.* 71. *Fl. suec.* 471; 500.

Ranunculus foliis tripartitis: laciniis linearibus, caul multifloro, radice tuberosa. *Hort. cliff.* 230. *Roy*

lugdb. 491. *Sawv. mansp.* 181.

- Ranunculus lanuginosus angustifolius, grumosa radice, major ♂ minor. *Bauh pin.* 181.
- Ranunculus grumosa radice 4. *Clus. hist.* 1. p. 240.
Habitat in Oelandia, Hungaria, Narbona, Italia. 2.
8. RANUNCULUS foliis ternatis biternatisque: foliolis trifidis incisus, caule inferne ramoso. *Mill. dict.* 1. 216. asiaticus.
- Ranunculus foliis tripartitis laciniatis, caule inferne ramoso, radice tuberosa. *Hort. cliff.* 230. *Hort. upf.* 156. *Roy. lugdb.* 490.
- Ranunculus, grumosa radice, ramosus. *Bauh. pin.* 181.
- Ranunculus asiaticus polyclonos f. grumosa radice 2. *Clus. hist.* 1. p. 241.
- Ranunculus grumosa radice, flore flavo vario. *Bauh. pin.* 181.
- Ranunculus grumosa radice, flore albo. *Bauh. pin.* 181.
- Ranunculus grumosa radice, flore albo leniter crenato. *Bauh. pin.* 181.
- Ranunculus grumosa radice, flore niveo. *Bauh. pin.* 181.
- Ranunculus grumosa radice, flore phoeniceo minimo simplici. *Bauh. pin.* 181.
- Ranunculus asphodeli radice, flore sanguineo. *Bauh. pin.* 181.
- Ranunculus asphodeli radice, flore subphoeniceo rubente. *Bauh. pin.* 181.
- Ranunculus, asphodeli radice, prolifer miniatus. *Bauh. pin.* 181.
Habitat in Asia & Mauritania. 2.
9. RANUNCULUS foliis supradecompositis, caule simplicissimo unifolio unifloro, radice tuberosa. *Hort. cliff.* 230. *Roy. lugdb.* 491. rutæfolius.
- Ranunculus rutaceo folio, flore suave rubente. *Bauh. pin.* 181. *Morif. hist.* 2. p. 448. f. 4. t. 31. f. 54.
- Ranunculus præcox 1, rutæ folio. *Clus. hist.* 1. p. 232.
Habitat in Alpibus Austriæ, Delphinatus. 2.
10. RANUNCULUS calycibus hirsutis, caule bifloro, foliis multifidis. *Fl. svec.* 464; 501. glacialis.
- Ranunculus caule bifloro, calyce hirsuto. *Fl. lapp.* 233. t. 3. f. 1.
- Ranunculus montanus purpureus, calyce villoso. *Bauh. hist.* 3. p. 868. *Scheuch. alp.* 339. t. 20. f. 1.
Oed. dan. t. 19.

Ranunculus alpinus, coriandri folio, flore albo-purpureo. *Barr. ic.* 456.

Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ, Delphinatus.

- alpestris.** 21. **RANUNCULUS** calyce hirsuto, caule unifloro, foliis radicalibus palmatis: caulinis multipartitis sessilibus. *Fl. lapp.* 232. t. 3. f. 2. *Fl. Jvec.* 465; 502. *Hall. helv.* 326.
- Ranunculus minimus alpinus luteus.* *Bauh. hist.* 3. p. 861. f. interior.
- β. *Ranunculus idem pygmæus.* *Fl. lapp.* 232. t. 3. f. 3. *Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ.* 4. *Planta tota glaberrima nequit esse R. monspeliacus.*
- alpestris.** 22. **RANUNCULUS** foliis radicalibus subcordatis obtusis tripartitis: lobis trilobatis; caulino lanceolato integerrimo, caule unifloro.
- Ranunculus caule aphylo unifloro, foliis subrotundis semitrifidis.* *Hall. helv.* 326. *Sauv. monsp.* 205.
- Ranunculus alpinus humilis rotundifolius, flore majore & minore.* *Bauh. pin.* 181.
- Ranunculus alpinus humilis albus, folio subrotundo.* *Segu. ver.* 1. p. 489. t. 12. f. 1.
- Ranunculus montani* 1. species 1. & 2. *Clus. hist.* 1. p. 234. *Habitat in Alpibus Austriacis, Helveticis.* 4.
- lapponicus.** 23. **RANUNCULUS** foliis tripartitis lobatis obtusis, caule subnudo unifloro. *Fl. Jvec.* 461; 502. *
- Ranunculus caule unifloro unifloro, foliis tripartitis.* *Fl. lapp.* 231. t. 3. f. 4. *
- Habitat in Alpibus Lapponicis.*
- monspeliacus.** 24. **RANUNCULUS** foliis tripartitis crenatis, caule simplici villoso subnudo unifloro. *Sauv. monsp.* 181.
- Ranunculus saxatilis, magno flore.* *Bauh. pin.* 182. *prodr.* 96.
- Habitat Monspeli.*
- bulbosus.** 25. **RANUNCULUS** calycibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis compositis. *Fl. Jvec.* 469; 504. *Dalib. parif.* 165.
- Ranunculus radice simplici globosa.* *Hort. cliff.* 27. *Roy. lugdb.* 491. *Hall. helv.* 323.
- Ranunculus bulbosus.* *Lob. ic.* 666. *Fl. lapp.* 239.

- Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotunda.
Bauh. pin. 179.
 Habitat in Europæ pratis, pascuis. 24
26. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis sulcatis, sarmentis repentibus, foliis compositis. *Fl. svec.* 468; 505. repens.
 Ranunculus foliis ternatis, foliolis petiolatis trifidis: medio productiore, caule multifloro. *Hort. cliff.* 230. *Gron. virg.* 166. *Roy. lugdb.* 491.
 Ranunculus pratensis repens hirsutus. *Bauh. pin.* 179. *Fl. lapp.* 230.
 Ranunculus hortensis 1. *Dod. pempt.* 425.
 Habitat in Europæ cultis. 24
Varietas potius præcedentis auctore Hallero, licet Calyx non retroflexus; Radix fibrosa nec bulbosa; Caules numerosi late diffusi repentes, nec erecti.
27. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis multipartitis. *Fl. svec.* 467; 506. polyanthemos
 Ranunculus polyanthemos simplex. *Lob. ic.* 666.
 Ranunculus sylvestris. *Tabern. ic.* 42. *hist.* 117.
 Habitat in Europæ borealis graminosus. 24
28. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis: summis linearibus. *Fl. svec.* 466; 507. *Dalib. paris.* 164. acris.
 Ranunculus foliis peltatis quinquangularibus multipartitis: laciniis linearibus, caule multifloro. *Hort. cliff.* 231. *Roy. lugdb.* 492.
 Ranunculus pratensis erectus acris. *Bauh. pin.* 178. *Fl. lapp.* 228.
 Ranunculus hortensis. *Dod. pempt.* 426.
- β. Ranunculus hortensis erectus, flore pleno. *Bauh. pin.* 179.
 Habitat in Europæ pratis, pascuis. 24
29. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis teretibus, caule petiolisque hirtis, foliis trifidis lobatis crenatis holosericeis. lanuginosus
 Ranunculus foliis radicalibus pinnatis. *Sauv. monf.* 227.
 Ranunculus montanus lanuginosus, foliis ranunculi pratensis repentis. *Bauh. pin.* 182. *prodr.* 96.

Ranunculus magnus valde hirsutus, flore luteo. *Balk. hist.* 3. p. 417.

β. *Ranunculus montanus* subhirsutus, geranii folio. *Balk. pin.* 182.

Ranunculus montanus subhirsutus latifolius. *Balk. prodr.* 96. t. 96.

Ranunculus nemorosus hirsutus, foliis caryophyllat. *Laf. pruss.* 220. t. 71.

Habitat Monspelii, in Helvetia, Lusatia. 2.

Caulis altus, hirtus, erectus. Folia *Aconiti* s. *R. acris*, sed magis incisa. Semina acuta, compressa. Pedunculi longi, teretes. Macula pallida ad finis liorum, quæ tactu crassiora sentiuntur.

chærophyl-
los

30. *RANUNCULUS* calycibus retroflexis, pediculis fulcatis, caule erecto unifloro, foliis compositis linearimultifidis. *Guett. stamp.* 275. *Dalib. parif.* 1

Ranunculus foliis compositis, caule teretis villis subnudo unifloro, radice tuberosa. *Zinn. gert.* 1

Ranunculus grumosa radice, folio *Ranunculi* bull. *Bauh. pin.* 181. *prodr.* 96.

Ranunculus chærophyllos, asphodeli radice. *B. pin.* 181. *Barr. ic.* 581.

Ranunculus montanus leptophyllos, asphodeli radice. *Col. ecphr.* 1. p. 312. t. 311.

Habitat in Gallia, Italia. 2.

arvensis.

31. *RANUNCULUS* feminibus aculeatis, foliis superioribus decompositis linearibus. *Hort. cliff.* 2. *Fl. svec.* 470; 508. *It. æl.* 104. *. *Roy. lugdb.* 4. *Dalib. parif.* 166.

Ranunculus arvensis echinatus. *Bauh. pin.* 179.

Ranunculus sylvestris 3. *Dod. pempt.* 427.

Habitat in Europæ australioris agris. ☉

muricatus.

32. *RANUNCULUS* feminibus aculeatis, foliis simplicibus lobatis obtusis glabris, caule diffuso. *Hort. cliff.* 229; *Hort. ups.* 157. *Roy. lugdb.* 491. *Samonsp.* 204.

Ranunculus palustris echinatus. *Bauh. pin.* 180. *prodr.* 3

Ranunculus creticus echinatus latifolius. *Alp. ex* 263. t. 262.

Habitat in Europæ australis fossis & humentibus. ☉

parvidorus.

33. *RANUNCULUS* feminibus muricatis, foliis simplicibus

- plicibus laciniatis acutis hirsutis, caule diffuso. *Huds. angl.* 212.
- Ranunculus hirsutus annuus, flore minimo. *Pluk. alm.* 311. t. 55. f. 1. *Raj. angl.* 3. p. 248. t. 12. f. 1. *Morif. hist.* 2. p. 440. f. 4. t. 28. f. 21.
- Habitat in Europa australi.* ☉
- Differt a R. Muricato: flore parvo; Caule magis prostrato; Foliis profunde lacinulatis; Seminibus latere tantum tuberculis, nec aculeis muricatis.*
34. RANUNCULUS seminibus spinoso-subulatis re- orientalis.
curvis, calycibus reflexis, foliis multifidis.
- Habitat in Oriente.*
- 35 RANUNCULUS caule erecto bifolio, foliis mul- grandiflo-
tifidis; caulinis alternis sessilibus. *Roy. lugdb.* 492. rus.
- Ranunculus orientalis, aconiti folio, flore maximo.
Tournef. cor. 22.
- Habitat in Oriente.* †
36. RANUNCULUS foliis filiformi-ramosis, semini- falcatus.
bus falcatis, scapo nudo unifloro *Hort. ups.* 157.
Sauv. monsp. 205. *Gron. orient.* 69. *Jacq. virid.* 250.
- Myosuros foliis ramosis. *Hort. cliff.* 117. *Roy. lugdb.* 492.
- Melampyrum luteum minimum. *Bauh. pin.* 234.
- Ranunculus ceratocephalus, seminibus falcatis in spi-
cam adactis. *Morif. hist.* 2. p. 440. f. 4. t. 28. f. 22.
- Ranunculus alopecuroides, ajugæ foliis. *Boc. sicc.* 28.
- Habitat inter segetes Europæ australis & Orientis.* ☉
37. RANUNCULUS foliis subrotundis trilobis inte- hederaceus,
gerrimis, caule repente. *Hort. cliff.* 231. *Roy. lugdb.*
492. *Dalib. parif.* 167. *Gort. gelr.* 325.
- Ranunculus aquaticus hederaceus luteus. *Bauh. pin.*
180. *Morif. hist.* 2. p. 441. f. 4. t. 29. f. 29.
- Habitat in aquis vadosis Angliæ, Belgii.*
38. RANUNCULUS foliis submersis capillaceis, emer- aquaticis.
sis subpeltatis. *Fl. svec.* 2. n. 509.
- Ranunculus foliis inferioribus capillaceis, superioribus
peltatis. *Fl. lapp.* 234. *Roy. lugdb.* 492. *Hall. helv.* 328.
- Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo.
Bauh. pin. 120.
- Ranunculus aquatilis. *Dod. pempt.* 387.
39. Ranunculus foliis submersis capillaceis. *Fl. svec.* 1. n.
472. *Dalib. parif.* 168.

- Ranunculus foliis omnibus capillaceis circumscriptis rotundis. *Hort. cliff.* 231. *Roy. lugdb.* 492. *helv.* 328.
- Ranunculus aquaticus albus, circinatissimis tenuissimis foliis. *Pluk. alm.* 311. t. 52. f. 2.
- Millefolium aquaticum cornutum majus. *Bauh. pin.* 141.
- γ. Ranunculus foliis capillaceis circumscriptione brevioribus. *Hall. helv.* 328.
- Ranunculus aquaticus capillaceus. *Bauh. pin.* 141.
- Millefolium aquaticum, foliis abrotani, ranunculi re & capitulo. *Bauh. pin.* 141.
- Ranunculus trichophyllos aquaticus medio luteus. *ecphr.* 1. p. 315. t. 316.
- δ. Ranunculus foliis omnibus capillaceis circumscriptis oblongis. *Roy. lugdb.* 492.
- Ranunculus albus fluitans, peucedani foliis. *H. lugdb.* 517.
- Millefolium aquaticum, foliis fœniculi, ranunculi re & capitulo. *Bauh. pin.* 141.
- Habitat in Europæ aquis undosis, fossis, rivulis.*
Conf: Ranunculus aquaticus, cotyledonis umbilicifolio. Col. ecphr. 1. p. 315. t. 316, *quem, cum lantio facile hujus generis speciem dicerem, nisi drocotylis illum adscriberet Till. pis: - - ? determi boni itali.*

TROLLIUS.

- europæus. 1. TROLLIUS corollis conniventibus, nectariis longitudine staminum.
 Helleborus flore clauso erecto petiolato, caule simplicissimo. *Fl. svec.* 474; 510.
 Helleborus foliis angulatis multifidis, flore globoso. *Hort. cliff.* 227. *Roy. lugdb.* 484.
 Helleborus caule simplici, flore pedunculato. *Fl. lapp.*
 Ranunculus montanus, aconiti folio, flore globoso. *Bauh. pin.* 182.
 Ranunculus flore globoso. *Dod. pempt.* 430.
Habitat in Alpibus & subalpinis Sueciæ, Germaniæ, Angliæ. 2
- asiaticus. 2. TROLLIUS corollis patentibus, nectariis longitudine petalorum.
 Trollius humilis, flore patulo. *Buxb. cent.* 1. p. 15.
 Helleborus niger orientalis, ranunculi folio, flore quam globoso. *Tournef. cor.* 20.

Helleborus aconiti folio, flore globoſo croceo. *Amm. ruth.* 101.

Habitat in Sibiria, cappadocia. 2

ISOPYRUM.

ISOPYRUM stipulis subulatis, petalis acutis. *Hort. fumarolides.* *upf.* 157.

Helleborus fumaricæ foliis. *Amm. ruth.* 74. t. 12.

Habitat in nemoribus Sibiricæ. ☉

Confer. Aquilegiæ corniculis, Moschatellinæ foliis, planta pusilla ex insula cheusan. *Pluk. amalth.* 3. p. 360. f. 3.

ISOPYRUM stipulis ovatis, petalis obtusis. *Scop. thalictroides.* *carn.* 555.

Thalictrum batrachioides, flore albo, italicum. *Bocc. mus.* 84. t. 79. f. 1. *

Ranunculus nemorosus, thalictri folio. *Bauh. pin.* 178.

Raj. hist. 584. *Morij. hist.* 2. p. 437. f. 4. t. 28. f. 12.

Ranunculus præcox II, thalictri folio. *Clus. hist.* 1. p. 233.

Habitat in Alpibus Italicis, Gratianopoli, inque agro Viennenſi, Carniolæ, locis umbrosis; vernalis.

ISOPYRUM stipulis obsoletis.

aquilegioides.

Aquilegia montana, flore parvo, thalictri folio. *Bauh. pin.* 144. *prodr.* 75. *Bauh. hist.* 3. p. 484. *Raj. hist.* 707. *Morij. hist.* 8. p. 458. f. 12. t. 11. f. 5. *Hall. helv.* 310.

Habitat in Alpibus Helveticis, Tridentinis, Apenninis.

HELLEBORUS.

HELLEBORUS flore folio infidente. *Hort. cliff. hyemalis.* 227. *Hort. upf.* 158. *Roy. lugdb.* 484.

Helleborus ranunculoides præcox tuberosus, flore luteo. *Morij. hist.* 3. p. 459. f. 12. t. 2. f. 4.

Aconitum unifolium bulbosum. *Bauh. pin.* 183. *Hill. anat.* t. 11.

Habitat in Lombardia, Italia, Apenninis. 2

HELLEBORUS scapo subunifloro subnudo, foliis pedatis. *Hort. upf.* 157. *Roy. lugdb.* 484. *Mat. med.* 273.

Helleborus scapo florifero subnudo, petiolo communi bipartito. *Hort. cliff.* 227.

Helleborus niger, flore roseo. *Bauh. pin.* 186. *Hill. anat.* t. 1.

El-

Elleborus niger, legitimus. *Clus. hist.* 1. p. 275.
Habitat in Austriæ, Hetruriæ, Apennini asperis. 4
Folia consistentia, hyeme perennantia.

viridis.

3. HELLEBORUS caule multifloro folioso, foliis digitatis.

Helleborus caule æquali folioso, foliis radicalibus caulem tandem superantibus. *Hort. cliff.* 227. *Roy. lugdb.* 484.

Helleborus niger hortensis, flore viridi. *Bauh. pin.* 185.

Elleborum nigrum alterum. *Cam. epit.* 941.

Habitat in montibus Viennensibus, Euganeis. 4

-fœtidus.

4. HELLEBORUS caule multifloro folioso, foliis pedatis.

Helleborus caule inferne angustato multifloro multirubro, foliis caule brevioribus. *Hort. cliff.* 227. *Roy. lugdb.* 484. *Dalib. parisi.* 169. *Saurv. monsp.* 180.

Helleborus niger fœtidus. *Bauh. pin.* 185.

Helleboraster maximus. *Lob. ic.* 679.

Helleborus femina. *Sterb. fung.* 372. t. 36. f. C.

3. Helleborus niger trifoliatus. *Morif. hist.* 3. p. 460. t. 4. f. 7.

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia. ♂. 4

Caulis infra folia nudus.

trifolius.

5. HELLEBORUS scapo unifloro, foliis ternatis. *Ann.*

acad. 2. p. 356. t. 4. f. 18. *Kalm. it.* 3. p. 379.

Habitat in Canadæ, Sibiria sylvis nemorosis cum Oxalide, Circaea.

C A L T H A.

palustris.

1. CALTHA. *Fl. lapp.* 227. *Fl. svec.* 473; 511. *Hort. cliff.*

228. *Roy. lugdb.* 484. *Clayt. virg.* 166. *Dalib. parisi.* 169.

Caltha palustris, flore simplici. *Bauh. pin.* 276.

Populago major. *Tabern. ic.* 750.

α. Populago minor. *Tabern. ic.* 750.

γ. Caltha palustris, flore pleno. *Bauh. pin.* 276.

Habitat in humidiusculis Europæ. 4

H Y D R A S T I S.

canadensis.


1. HYDRASTIS. *Ellis.*

Hydrophyllum verum canadensium. *Sp. pl.* 1. p. 146.

Habitat in Canadæ aquis. 4

Similis Hydrophylo. Folia bina, petiolata, basi emarginata, palmata, serrata: lobis utrinque lobulato-terali.









Stanford University Libraries



3 6105 011 551 012

22
E9
V.1

H18 H53

FALCONER
BIOL. LIB.

